

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

# 四庫全書存目叢書

子部  
第五二冊





魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



EB66/06

# 四庫全書存目叢書·子部五二

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 48 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

# 子部第五二冊目次

## 子部·醫家類

李氏醫鑑十卷續補二卷

〔清〕李文來輯  
中國中醫研究院圖書館藏清康熙三十五年李氏貽安堂家刻本

一

濟陰綱目十四卷

〔明〕武之望輯 〔清〕汪淇箋釋  
中國科學院圖書館藏清雍正天德堂刻本

一九七

保生碎事一卷

〔清〕汪淇輯  
中國科學院圖書館藏清雍正天德堂刻濟陰綱目附

四五八

成方切用二十六卷

〔清〕吳儀洛輯  
山東省圖書館藏清道光二十七年瓶花書屋刻本

四六四



李氏醫鑑十卷續補二卷

〔清〕李文來輯

中國中醫研究院圖書館藏清康熙三十五年李氏貽安堂家刻本

附《四庫全書總目·李氏醫鑑  
十卷續補二卷》提要

昌期李氏得汪訥菴本草備  
要醫方集解二書區以病名分  
條彙輯俾臨證求方一目瞭然  
書成汪氏及為鑒定四庫全  
書所載甚詳查成方切用金鑑  
三度兩書出入汪氏醫方亦可  
法是書增加恭攷研求藥物史  
臻完備為醫家必讀之書四  
庫收之坊間絕少此歷年不  
得者遂予植運於京師購  
得郵歸余笥中又添四庫醫  
書一種矣止兒長齡平生愛四

庫藥本今夏但化未獲一睹  
使我增無限傷感耳濟時揮  
淚識此兩孫其永保之  
民國十四年乙丑大雪後二日

序

嘗考良醫之功與良相等又云  
醫道易於種德信然但學醫未  
精而致害亦易生人命脉係於  
三指之下兩劑之中若無主見  
未有不殺人者故愚人不知重  
醫卽醫家亦不知自重畧習本  
草之粗解出應當世之深求是  
何異於矮人觀劇而於本末原  
委總未之悉也醫書自內經後



東垣丹溪諸先生所載幾於充  
棟其間寒熱虛實之辯論君臣  
佐使之調燮五臟六腑之病源  
亦甚微渺而難明也非具十分  
識力十分小心十分閱歷窮究

序二

更未易妥確而精詳予友瑤圃  
再叔昌期蓋苦心之士也夙患  
體弱博致群書審取名儒訥菴  
醫方集解本草備要彙成一帙  
名曰醫鑑求序於予余固不知

醫而嘆醫之難言也今觀其醫  
鑑自首至足由內及外分門別  
類之可稽一類數症一症數解  
淺深詳畧之各當既剖其病症  
之表裏又晰其草木之主治早

序三

作夜思匪朝伊夕其殆閱歷既  
久參考而出之以慎重者乎後  
之有心救世問津於醫者守此  
而知所扼要或不至於差謬以  
生人之道翻爲害人之具也如

是則醫家既知自重而延醫者  
其亦讀是編而憬然起悟乎予  
願公之海內可已



康熙乙亥嘉平上浣

賜進士第通政大夫通政使司

序

通政使加三級年家眷弟羅

秉倫拜題



李氏醫鑑序

李子昌期乃新安婺源之名族淵博理學之真儒也心仁而慈行方而潔幼攻舉子業見試防嚴專意經史不求仕進因以多病之身究心岐黃之術於立齋醫案諸書罔不殫心研窮而於本草備要醫方集解兩書尤三折肱焉既善二書之詳苦無分門之別挑燈五夜驚枕三冬集二美之全分諸門之萃顏曰李氏醫鑑噫誠度世之指南航海之寶筏也一日問序於余余經生也非越人烏知醫道哉

廿五

夫醫何可漫言哉天下之物可以生人殺人者惟兵與藥耳兵有奇有正必讀孫吳之書讀五花八陣之圖虛實有法進退有方雖非百勝之師而必不致於敗績脉存浮沉遲數藥有君臣佐使必習岐黃之經熟五運六氣之理補瀉不謬溫涼咸宜雖非萬全之術必不至於有失今昌期集二書之要解參十全之良方今後之學者因病驗方開卷了然斷不致於有敗亡也况皆驗之於沉疴諸症者乎或曰醫者意也古方何可盡依也雖然以方殺人者十之



三以意役人者十之七以書方面酌今意隨時損益因正  
畫變鄭重思惟百鮮一失吾子昌期心醉仁術矣顏之曰  
醫鑑永爲初庵之功臣後學之矩範也暗室一燈善身壽  
世功與海嶽崇深矣

康熙丙子季春朔于湖同學弟甘韋柔安氏題於寶善堂



李氏醫鑑序

昔人云醫者之功與宰相等又云醫道好種德合之人多學  
其志固可嘉然吾謂醫亦有害何害乎爾脉理之未精用  
藥之不善也夫人既學醫則必讀書讀書則必明理醫家之  
書先聖先賢之所著其義固已大備而近來國手又各有名  
編學者一開卷而五臟六腑之症君臣佐使之宜傳經炮製  
之理莫不了然於胸中矣又安得尚有脉理未精用藥不精  
者殊不知醫書如天下之山水學者正如天下之觀山玩水  
者也使業醫者天資過人無書不覽融會貫通亦猶穆滿之  
醫鑑

序一

周行天下羣山之秀麗萬派之汪洋靡不畢知其餘則如居  
一方者知一方之奇勝而已居一國者知一國之奇勝而已  
卽有恣情山水奔走四方登臨覽眺者終未能窮滄溟抵崑  
崙折若木而淹蒙汜也如是則書未能徧觀亦安得無害思  
夫禹貢一書其書不過數篇而天下山之脉絡水之源流燥  
如指掌竊謂醫家之書苟有如此之簡要而會通者使學者  
讀之則敏者得辭勞而就逸鈍者得因顯而知微庶幾可副  
其剖股之心而無害於天下然卒不可得甲戌春李子昌期  
以所著醫書見示名曰醫鑑予細玩之要不外先聖先賢及

諸國手之旨然而博者約之畧者詳之分者合之近似者辨  
別之誠簡要而會通予大喜曰欲使學者辭勞而就逸因題  
而知微可以副其割股之心而無害於天下者其在斯乎其  
在斯乎李子受業於予伯氏深知其爲人少時博洽羣書繼  
因體弱旁究醫書因而精通醫理今造門求醫者甚多彼自  
謂曰治舉子業者非徒取功名當以道濟天下治岐黃術者  
非徒覓利當以術濟天下然療一病不過濟一人卽療千萬  
病亦不過濟千萬人所濟者有限惟著書傳世則所濟者無  
窮因取醫方集解本章備要及諸名書分門別類會成斯編

醫鑑

序二

因貧劬劬無資舊醫者久同邑王子錫三立心種德恒憾不  
能廣濟天下適見是書曰此真醫家寶鑑輒壽之梓將不脛  
走天下天下岐黃家皆功侔良相矣是李非王無以成著書  
之功王非李無以遂廣濟之願二公之德益相與以有成也  
予樂爲之序

康熙丙子歲夏月歸溪弟江賓爲題



醫鑑敘

士君子讀書窮理豈惟是咕嚕文辭諧聲叶律學爲靡麗之  
文已哉蓋將以達五行之理通二氣之蘊而期有用於世也  
顧士之用於世者居變理之任調和萬物災異不生而疾疢  
不作信乎美矣若其平居草茅不得尺寸安所得一展其經  
綸參贊之奇哉予嘗論輔相造化洩所有餘而補所不足  
寓參贊之功者九流百家之中醫爲最故以世俗觀之直一  
技藝耳然人之死生於是乎在非達五行而通二氣者弗能  
精也獨惟世之業此者苟且以延旦夕之計問以陰陽寒暑

醫鑑序

一

之宜慨謝不知間有一二稍知此者則又矜爲獨得之秘曰  
某某吾異傳也某某吾奇方也私於已不欲公於世凡此皆  
利心爲之蔽也揆之天地生人之意不無遺議焉家叔祖昌  
期既已肆力詩書又浸淫於百家九流之說靡不條貫醫其  
一也數年來造其門而求活者指不勝屈然猶哀夫世之業  
此者汶汶而不知所趨又以前此傳是書者汗牛充棟浩衍  
而不可校於是取初庵二書分門別類因其內外條理而爲  
之治文甚約而旨極該使窮鄉僻壤各置一編倉公扁鵲如  
與共晨夕又何獨得之奇不傳之秘哉大哉仁人之用心此



真可以參贊造化之微矣或疑叔祖窮年矻矻不得一展其  
經濟疑若有所憾然太上云活一人卽爲陰德此書流傳千  
百世所活豈止千萬人哉其慶衍流長蓋於是乎卜之矣彼  
獨得自矜秘而不欲公於世者其亦知愧也夫  
康熙丙子仲秋再姪若奇瑤氏書于務本堂



自序

語曰士生天地不爲良相便爲良醫蓋求寧求瘼者良相  
事也至若疾苦呻吟者唯良醫能望聞問切有以施治而  
安全之耳非謂醫道之易而無難也其理至精至微非賢  
聖之神明不能著其書非精深之學識不能習其業是以  
三年之中不乏三及第十載之內難出一良醫何世之人  
一覽藥性捷徑等書遂謂醫道在是輒欣然懸壺射利冀  
管物命恬然罔忌善乎蘇文忠公有言曰學醫人費嚙人  
命至重其可費乎甚矣醫道之難深可畏也 何人斯敢  
漫言哉 因稟氣其薄自襁褓至弱冠皆以藥餌爲命及  
習帙帙時卽旁及汪石山先生藏書以及諸集凡遇高明  
輒虛心聆誨日就月將漸識溫涼據案立方頗知向導昔  
之倚醫士以爲命者漸轉而倚方書以爲命矣由是治及  
妻孥昆季漸廣而徧及鄰里親朋亦往往倖効家中子兄  
博洽淹雅倏隱杏園于 質疑領畧下以初庵汪先生本  
草備要稱頌不置且謂此書固已超越古今但其主治註

釋議論驗案世就藥味條下詳晰不便考究記憶者爲分  
其病門則如諸實之分於虛證而又各歸其府更令耀目  
真心來 弟兄衆屏諸務將本草備要細微分析一載告  
竣庚午偶館金陵復賂醫方集解益知初庵先生博古窮  
今並岐而下所有名編無不入於目而富於胸可謂集醫  
家之大成堪垂不朽第其門部惟分補瀉表裏寒暑燥濕  
等類古方主治逐類隨之至一方之統治及加減而廣療  
諸症連類而及未嘗分疏病門亦猶備要之不能兼及若  
自序二

方圓之弗克齊畫縱橫之弗克並行理勢固然非缺陷也  
來 欲合二書而爲一集舌耕弗暇癸酉春堅謝學政鍵戶  
彙輯詳列病門精論羣以分之古方類以聚之本草主治  
註釋逐味分而附之提綱挈領不獨業醫者便於按圖稽  
考卽安居行旅咸可對卷療痊方之葉法師之鐵鑑洞見  
病因者其庶幾乎故顏之曰醫鑑月閱五而集成隱隱若  
有神助焉編錄方半之時宗弟其善見來 家居食貧功太  
嚴苦若深爲憫恤慰勞也者來 起而謝之曰吾人讀書懷

古德功言三者既不克立慚無以報君父而于濟世名編  
復不克尊信闡揚俾効之於天下縱持甘齒肥優游百歲  
曾與夢幻泡影枯木腐草奚異所以汲汲孜孜不憚貧苦  
者欲早以此書昭示當世使黠者明而難者易良醫輩出  
疾苦呻吟者咸得轉危爲安羣躋壽域將見遡流窮源傳  
初庵先生之書於不朽頌初庵先生之功於不衰俾蠅得  
附驥尾於千載榮幸爲何如哉

肯

自序三

康熙丙子歲桂月發源理田呂期李之來題於書堂

翻刻誠語

子輿氏有曰。或勞心。或勞力。凡人必自竭心力而獲。始爲我有。方可久長。若竊人之有。以爲己有。不勞而獲。必有天殃。如坊間送訂名家。研精劬核。累月窮年。始得成集。功宏宇宙。裨益後人。卽有所得。亦適以償其勞已耳。何喪心無耻之徒。貪利翻刻。不恤攻苦。不顧舛訛。魚目混珠。多承誤世。殘忍狠毒。甚於綠林。平素一見此刻。如刺入目。宋今是書。閉戶纂輯。殫精竭神。幾於謝世。赤手難刊。婆心莫慰。誠恐淹沒廢寢忘食。幸預親友假資付梓。俾遂廣濟博施。

熱衷心力。亦可謂勞矣。境界亦可謂苦矣。倘有復蹈惡習。贗偽亂真。誓必遠覓根由。弁控。

當路。懲其辜。劈其板。而後已。況是篇一字差訛。性命攸關。遺害不小。天譴人誅。勢必並致。勿萌妄念。俯慰苦衷。

詒安堂昌期氏勸誠



李氏醫鑑凡例

一 醫理極其淵微。非極高明弗輕著述。宋既庸陋。又不精醫。安敢妄與衆聚。希緣叨菴先生本草備要。醫方集解二書。膾炙人口。因以支分縷晰。傳述表彰。易於考究。俾未見先生之原本者。由此而購閱之。以窺全豹。廣慰婆心。

一 本草備要。每味條後妙論。固已逐段歸幸於各門之前。而主治註釋。復一一採摘於方論之末。猶天孫集錦。萬派朝宗。雖由集聚。實費苦心。

李氏醫鑑

凡例

一

世人情惡繁喜簡。故于藥味註解。難明者存之。顯易者節之。庶免望洋之阻。而有樂就之功。

一 醫書以論爲主。徒規規於方。不足貴也。坊本有詳於方。而畧於論者。間有論方得中。或博而不精。詳而不驗。卽精驗矣。而未及於藥性。卽具藥性。而未詳於主治註釋。茲則美備兼該。對症參詳。如數家珍。有得手應心之樂。而無疑慮徘徊之擾。

一 人身體以頭爲尊。先聖所以重元首也。是編故以頭冠諸部。漸及全體。體賴飲食滋養。土爲萬物之母。故由脾胃而

及飲食調養失宜則病叢生。因及感冒連類而及雜症諸疾男婦一治。惟經帶崩漏胎產不同。故別立門類。小兒首重驚癇。茲已詳載。餘症自有專科。因原本之畧而畧之。不敢尾續。此次列後之意也。由內及外。癰疽等毒。蛇蝎等以食物諸傷。以及溺縊鬼擊卒死。一一詳救。不欲凶惡險噓驚入於頃刻。亦聊以仰體天地好生之意也。

一雜症而外。四時感冒居多。真正傷寒甚少。痰厥食厥中氣中濕中食及類中風者多。真中風與中寒者少。因將發表和解攻裏祛寒諸類。合入傷寒與中風中寒。厥逆僵仆口眼喎僻角弓反張

李氏醫鑑

凡例

二

反張。種種險狀。狀同症異。集為一帙。以便分別施治。其餘清暑利濕潤燥瀉火等類。論方散入雜症。惟氣血特出其類者。蓋人身以氣血為主。而主治必以調和二者為先。故特立門部。方論并本草主治。廣彙註釋。與補養消導收瀉三論未列病門。及用藥加減。彼此相濟。寒熱因用。病後調理等類。另集一卷。已裕六轡在手之勢。更摘本草經疏全部統治精論。彙成一卷。同附於後。俾情進斯業者。得其一二說。而又有一說之妙。猶六經之詳於解義。章旨開微。作文自中肯綮。門內可資印證。戶外可藉升堂。一覽知醫。不其

然乎

一傷寒變現危險等形。諸家與原本惟就其時日。方內因類而兼及之。茲于躁狂斑厥以及種種令人驚恐諸態。主治方論逐一分析門類。急遽之時。便於因門參治。而無棘手之虞。

一圈勾法。批湯頭。稿本原自清楚。為刻家因忽率忽畧。有無不一。惟在閱者會意。恕其小疵可耳。

一原本勿藥玄詮。却病養生之道。最為詳備。未登斯錄者。以刻費維艱。非敢遺珠。特而不載也。

李氏醫鑑

凡例

三

一原本方論之中。并兼及於脈者。俱入于各門之內。間有未詳者。近世李士材先生診家正眼。誠為診視金針。故不復刊。

二是刻合數書而為一集。簿冊繁多。因慮刻費艱難。委曲用意。惟欲取巧成編。不謀廣幅博價。部本雖居中上。方論實備大全。既用克己之苦衷。亦仰仁人之冰鑑。

李氏醫鑑		姓氏
顧日昭	煜	婺源
詹存古	法祖	婺源人 池州籍
王采三	泮	婺源
汪勿阮	誕保	婺源人 歙武籍
汪天玉	文璉	江寧
高太侯	聯	繁昌
汪卜周	鼎洛	婺源
施於民	有博	婺源
童永年	昌齡	婺源
甘豹倫	韋	蕪湖
王汾仲	楫	黟縣
劉勉旃		蘇州
王右俊	廷英	婺源
程斯獻	琛	池州
汪蘭友	陞	婺源
汪景任	昉	婺源
汪致遠	弼	江寧

李氏醫鑑		姓氏
嗣尚	向書	
宗再	男峨	特俱池州籍
兄	中子	新一 文止 賁元
姪	廣尹	之諧 子任 之重
伊衡	元佐	天一 兆清
仙李	根大	蔚也 芳椿
仙杏	根深	瑞岡 芳奇
符石	祖兆	從郁 燦
王簡良	士循	婺源
程羽吉	世儀	婺源
汪淑黃	度	江寧
江芳遠	懋蘭	婺源
俞文微	士標	婺源
俞希韓	宗潮	婺源
游彤上	志霞	婺源
黃履德	成基	臨江
俞孔碩	俊寬	婺源
李氏醫鑑		姓氏
門人		



李氏醫鑑目錄

卷之一

頭 頭痛 附傷寒頭痛 頭旋 因怒氣傷肝痛 因傷  
酒食痛 附面 項 髮變白為黑 禿瘡  
鼻 鼻赤腫痛 內外翳膜 瞳子散大 令淚羞明怕日  
近視遠視 同胎舉毛 爛弦風 目中溜火  
應肉 翳 翳 塞 瘵 不開香臭  
婦人經脈逆行吐衄 酒鼓鼻面紫赤

口唇腮

舌

齒

李氏醫鑑

目錄

一

耳

咽喉

聲音

諸得

肩背

心腹

卷之二

身體

門

耳 氣滯 耳聾 東耳  
咽喉 津液 喉不利 咽乾 介介如梗 不能進食  
聲音 牙關緊閉 厥冷 爛痛湯水難入 喉癰如有虫  
諸得 氣 寒 寒不出 喉癰 瘰癧 瘰癧 瘰癧  
肩背 胸膈膨脹 少腹 胸膈膨脹 胸膈膨脹 胸膈膨脹  
心腹 心腹膨脹 心腹膨脹 心腹膨脹 心腹膨脹  
身體 四肢 肩背以及諸痛麻木 遍身諸痛詳論見前  
門 兩臂疼痛 痰 瘰癧 皮膚皺揭筋脈枯

諸痿

腰膝

疝

脚

卷之四

脾胃

飲食

感冒

諸熱約畧

李氏醫鑑

目錄

二

潤燥

濕

暑

噎膈

卷之五

積聚癥瘕

痞滿結胸

腫滿蠱脹

疝

黃汗

諸痿 風濕諸痿 筋骨疼痛 痿痺 筋骨疼痛 拘攣  
腰膝 腎 水大命門 陰陽論 小腸氣痛 筋急 拘攣  
疝 小腸氣 前腰腎門 陰陽論 陰丹 陰丹 陰丹  
脚 濕氣 流注 足腫 腫痛 增寒 壯熱 頭痛 狀類傷寒 乾  
脚氣 濕脚氣 足腫 腫痛 增寒 壯熱 頭痛 狀類傷寒 乾  
脾胃 火邪乘虛生熱 不知胃 不思食 不為肌膚  
飲食 中食厥逆 傷食痛連胸膈 痞悶不通 悶亂不快  
感冒 寒熱內外傷 傷寒 傷寒 傷寒 傷寒 傷寒  
諸熱約畧 天災流行 時氣 另見傷寒卷末 手足逆冷  
李氏醫鑑 後勞瘵門 解肌退熱 熱 五心煩熱 陰虛  
潤燥 諸方散入各門 火 論藥方  
濕 濕熱 風熱 中濕 濕邪 不遂 舌強 諸痛 腹脹 肉如  
暑 暑熱 傷暑 傷暑 傷暑 傷暑 傷暑 傷暑 傷暑  
噎膈 水即吐 暑濕 相搏 脘中 腹滿 頭痛 身重 多汗 諸  
卷之五 積聚癥瘕 伏梁 肥氣 息奔 痞氣 奔豚  
痞滿結胸 諸傷 傷寒 另見九卷末 論方  
腫滿蠱脹 後傷寒 火血門更詳 疝 黃汗

<p>李氏醫鑑</p> <p>卷之六</p> <p>吐酸吞酸</p> <p>嘔吐</p> <p>喉嘔吐</p> <p>後傷寒末</p>	<p>卷之六</p> <p>咳嗽</p> <p>喉介介腫</p> <p>喉則遺尿</p> <p>冬時寒嗽如</p>	<p>咳吐唾咯血</p> <p>肺癆肺癰</p>	<p>卷之七</p> <p>瘡</p> <p>種類多治法備</p> <p>黃病痰滯下</p> <p>俗名別疾脫肛方論</p>	<p>李氏醫鑑</p> <p>目録</p> <p>小便</p> <p>頻數</p> <p>脫肛</p> <p>大便</p> <p>秘澀</p> <p>風結</p> <p>風結</p>	<p>泄瀉</p> <p>腸鳴</p> <p>脫肛</p> <p>腸風</p> <p>脫肛</p> <p>痔瘻</p>	<p>卷之七</p> <p>驚悸怔忡健忘</p> <p>恍惚虛煩不得眠</p> <p>寢汗</p>	<p>夢遺失精</p> <p>淋濁</p> <p>赤白</p> <p>淋瀝</p>	<p>經</p> <p>白汗盜汗</p> <p>附</p> <p>傷寒汗後諸症</p> <p>姪媛傷寒</p>	<p>姪媛</p> <p>不孕育</p> <p>子懸</p> <p>子腫</p> <p>子氣</p> <p>子淋</p> <p>子嗽</p> <p>子</p>
---	---	--------------------------	--	---	---	---	---	---	---

<p>崩帶</p> <p>乳妳</p> <p>嚴癰</p>	<p>小兒</p> <p>驚風</p> <p>驚風</p> <p>驚風</p> <p>驚風</p>	<p>卷之八</p> <p>外科</p> <p>跌撲損傷</p> <p>從高墜下</p> <p>刀</p>	<p>解毒咬傷</p> <p>楊梅瘡</p> <p>杖瘡</p> <p>癰</p> <p>跌撲損傷</p> <p>從高墜下</p> <p>刀</p>	<p>救急良方</p> <p>雷震殺傷</p> <p>鬼擊卒死</p>	<p>李氏醫鑑</p> <p>目録</p> <p>補養丸</p> <p>理血論</p> <p>理血論</p> <p>氣血論</p> <p>氣血論</p> <p>氣血論</p>	<p>用藥加減約畧</p> <p>彼此相濟約畧</p>	<p>寒熱附用正反主治論</p> <p>病後調理</p> <p>服食忌宜</p> <p>癰積</p> <p>酒積</p> <p>肉積</p> <p>氣積</p> <p>血積</p>	<p>卷之十</p> <p>治法提綱</p> <p>治法提綱</p> <p>治法提綱</p> <p>治法提綱</p>	<p>治法提綱</p> <p>治法提綱</p> <p>治法提綱</p> <p>治法提綱</p>
-------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---

李氏醫鑑卷之一

葵源昌期李文來彙輯

友人錫三王世龍參訂

元冬周佐

元峯景嶽

元夏雲生

元旭子昭

元晟西平

元象寶子

元昂廷曜錄次

元晶永曜

頭 面項鬚髮 兼傷寒頭痛

頭者天之象也陽之分也六腑清陽之氣五臟精華之血皆朝會于高巔天氣所發六淫之邪人氣所變五臟之逆皆能犯上而為酷害或蔽覆其清明或逆其經路與正氣相薄鬱而成熱則脈滿而痛若邪氣稽留六脈滿而痛

李氏醫鑑

卷之一

頭

是皆為實也若寒濕所侵雖正氣衰微不與相搏而成熱然邪襲于外則血凝滯而脈收引小絡而痛得溫則痛減是為實也○因風而痛者抽掣惡寒或汗自出○因暑而痛者或有汗或無汗皆惡熱而痛○因寒而痛者細急惡寒○因氣虛而痛者遇勞則甚其脈大○因濕而痛者頭必重遇太陰尤甚○因痰飲而痛者亦昏重而痛憤憤欲吐○因血虛而痛者善驚故其脈芤○用是病形更以脈證參之自無妄治之過矣○太陽經痛者在正額○少陽經痛者在耳前髮際○陽明在額間○氣虛痛者耳鳴九竅不利○腎與膀胱寒濕而痛則下虛上實氣能上而不通下○心與小腸挾熱而痛令人煩心○厥逆頭痛者不止者屬外感宜發散午痛者屬內傷宜補虛又有偏頭痛者左屬風與血虛右屬痰熱與氣虛○頭痛如破乃陽明中風可用葛根湯治之若太陽初病未入陽明而頭痛者不可使服升葛湯湯之反引邪氣入陽明也仲景治太陽陽明合病桂枝湯加麻黃葛根又有葛根黃芩解肌湯是以用葛根湯入陽明之路非太陽藥也○自魚尾上攻多有目眩宜四物加細辛白芷如氣虛頭痛者多亡清

魚尾之上

晨宜芎藭倍參黃○時珍曰肺開竅于鼻陽明胃脈環鼻上行腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不利○脾胃有濕熱則頭重○李東垣曰夫風從上受○風寒傷上邪從外入令人頭痛身重惡寒此傷寒頭痛也○心煩頭痛者過在手太陽少陰乃濕熱頭痛也○如氣上逆下頭痛者過在手太陽少陰過在足太陽少陰其則入腎寒濕頭痛也○如頭半寒痛者先取手少陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也○有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒身重死不治天門真痛上引泥丸夕發旦死○發夕死○腦盡痛手足寒身重死不治天門真痛上引泥丸○中之一然天柱折者手足皆至節者亦難為力矣○凡治頭痛皆取風藥者蓋高巔之上惟風可到味之薄者陰虛活獨活麻黃之類為主○太陽頭痛惡風寒脈浮緊川芎芩為主陽明自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根白芷石膏為主太陰體重必有痰或腹痛為痰癰其脈沉緩者木半夏南星為主少陰頭痛三陰三陽經不流行而足

寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛湯主之厥陰頭痛或吐涎沫厥冷脈浮緩吳人參生薑大棗主之虛當歸川芎為主氣虛人參黃耆為主氣血俱虛調中氣湯加川芎蔓荊子細辛清空瀉風濕頭痛藥也白木半夏天麻湯痰厥頭痛藥也羌活附子湯厥逆頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治初庵曰以苦吐之瓜蒂散濃茶之類是也○淫慾過度腎氣不能歸元此氣虛頭暈也○吐衄崩漏肝不攝血致血妄行此血虛頭暈也○痰逆者痰厥厥逆而生也痰逆則實故令頭痛目眩眼前見黑色也○東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足寒而氣逆也○太陰少陰二經雖不上頭然痰與氣逆積于膈中頭上氣不得暢而為痛也○偏頭痛者少陰相火也升溪曰有痰者多左屬風屬火多血虛右屬痰屬熱多氣虛醫書多分頭痛頭風為二門然一也也淺而近者為頭痛深而遠者為頭風當審其邪所從來而治之○有頭痛風眉發骨痛投以風藥不効投以痰藥見功此痰飲為病當以治飲為先飲治而病自愈○頭痛用羌活防風柴胡川芎升麻細辛藥本之異者分各經也用黃芩黃連黃柏

李氏醫鑑

卷之一

頭

三

知母石寄生地之異者分各臘瀉火也。用茯苓澤瀉者導  
濕也。用參耆者補氣也。用歸考者養血也。海藏曰熱在至  
高之分。當以輕劑抑之。從緩治也。若急服之。上熱未除。中  
寒生矣。○眉稜骨痛。眉骨者目系所過。上抵于腦。諸陽經  
挾外邪。鬱成風熱。毒上攻。腦下注。目睛而痛。赤目系與肩  
後骨牽連。而痛風寒上攻者。亦然。若脾家濕氣內鬱。寒迫  
下焦。痛留于項。互引眉骨。有痰者。有抽掣者。有重者。有悶  
者。各審明而治之。迷奇湯最効。羌活防風各三錢。酒芩一  
錢。甘草三錢。煎分三服。風熱者。祛風清上散。酒芩二錢。白  
芷一錢。五吳茱萸。防風。柴胡。各一錢。川烏一錢。二分。荆芥  
八分。甘草五分。水煎服。○因痰者。二陳加黃芩。白芷。因風  
寒者。羌烏散。羌活。細辛。川烏。草烏。各一錢。俱用便浸。二  
一肝經傷頭。痛并眉稜骨痛。眼不可開。晝靜夜劇。宜導痰  
湯。加川烏。細辛。一肝虛而痛。方見光明。即發。宜生熟地黃  
九。○陰經頭痛。只用溫藥。乾薑。肉桂。吳茱萸。附子。風濕熱  
痛。上壅。損目及偏正頭風。年深不愈。並宜清空膏。頭旋眼  
黑者。安神散。羌活。防風。與升麻。柴胡。知母。黃柏。黃芩。黃連。

李氏醫鑑

卷之一

頭

四

木天麻湯。腎厥頭痛。玉真丸。硫黃二兩。石膏半夏。硝石各  
一兩。薑汁糊丸。薑湯送下。灸關元百壯。寒甚者。去石膏。  
用鐘乳。或黑錫。丹。備蒙招尤。日眩耳聾。肝風虛動也。鈞藤  
散。鈞藤。陳皮。半夏。夏麥冬。甘草。茯苓。石。青。人。參。甘。菊。防。風。傷  
食。頭。痛。胸。滿。惡。食。吞。酸。噯。腐。香。砂。枳。木。山。查。麥。芽。神。曲。黃  
子。或。用。紅。九。子。三。棱。莪。朮。青。皮。陳。皮。乾。薑。胡。椒。醋。糊。丸。香  
紅。為。衣。傷。酒。頭。痛。乾。葛。知。母。解。醒。湯。人。參。茯。苓。陳。皮。木。香  
砂。仁。神。曲。豆。蔻。香。青。皮。乾。葛。知。母。解。醒。湯。人。參。茯。苓。陳。皮。木。香  
降。氣。散。沉。香。木。香。青。皮。陳。皮。蘇。子。白。芍。細。辛。柴。胡。吳。茱。萸。香  
荷。石。斛。血。虛。者。川。芎。當。歸。右。歸。桑。寄生。左。歸。風。者。荆。芥。薄  
黃。芩。石。膏。○單。搗。細。辛。同。指。撻。捕。鼻。車。麻。子。五。錢。去。殼。大  
藥。十。五。箇。共。搗。爛。塗。紙。上。用。筋。一。隻。捲。之。去。筋。塞。鼻。中。良  
久。取。下。清。涕。即。止。○生。蘿。蔔。汁。仰。臥。注。鼻。左。痛。注。右。右。痛  
注。左。

川芎茶調散 治諸風上攻。正偏頭痛。頭暈。頭眩。正偏頭痛  
者。風中于  
腦。作止無時也。火升故痰  
盛。痰熱上攻。故頭暈頭眩。  
薄荷 錢八 荊芥 錢四 羌活 白芷 甘草 錢二 防風 錢二  
細辛 錢一 每三錢食後茶調服。一方加菊花一殭。蚕分三  
菊花茶調散。治頭目風熱。凡頭痛用羌活。芎。芷。辛。溫。等。藥  
痛。故用此助肝以升散之。若服之  
而及甚者。則宜用酸溫收而降之。  
白木附子湯 治風虛頭眩。頭重苦極。食不知味。用此煖肌  
補中益精氣。  
白木 二 甘草 一 附子 一枚 每服五錢。薑五片。棗一枚  
煎。喻嘉言曰。腎氣空虛。外風入之。風扶腎中。濁陰之氣。厥  
逆上攻。頭間重眩。極苦難耐。兼以脾虛不知食味。此脾

腎兩虛風已入臟方中全不用風藥但用附子煖其水勝  
白木按其土臟水土一爰則濁陰之氣蒸趨于下而二症  
自止製方 本方加官桂川芎名芎木除濕湯 治寒濕

頭痛眩運

羌活勝濕湯 治濕氣在表頭痛頭重或腰脊重痛或一身

盡痛微熱皆俗 濕氣在表外傷于濕也濕之為邪著而不

留則為熱陰邪微但微熱而昏倦也東垣曰頭痛脊強

此湯雖名勝濕實傷風頭痛通用之方

羌活 獨活 川芎 藁本 防風 甘草 蔓荊

子 如身重腰中沉沉然中有寒濕也加酒洗漢防已附

李氏醫錄

子

此足太陽藥也經曰風能勝濕如物之濕 羌活防藁芎蔓

皆風藥也濕氣在表六者辛溫升散又皆解表之藥使濕

從汗出則諸邪散矣 藥本專治太陽寒濕則防藁散太陽

能升厥陰清氣上治頭痛甘草助諸藥

辛甘發散為陽氣味俱平發中有補也

如山惡心煩悶四肢厥冷謂之足太陰痰厥頭痛 解見

半夏 麥芽 神曲 白朮 蒼朮 人參

黃耆 陳皮 茯苓 澤瀉 天麻 乾姜 黃

栢二分 每服五錢

此足太陰藥也痰厥頭痛非半夏不能除 半夏燥痰

眼黑虛風內作非天麻不能定 天麻有風不 黃耆人參甘

溫可以瀉火亦可以補中 二木甘苦而溫可以除痰亦可

以益氣 健脾胃益氣 茯苓澤瀉瀉熱導水陳皮調氣升陽

神曲消食蕩胃中滯氣麥芽化結助戊己運行 脾胃已土

乾姜辛熱以滌中寒黃栢苦寒酒洗以療少火在泉發躁

也

清空膏 治正偏頭痛年深不愈及風濕熱上壅頭目及

李氏醫錄

腦苦痛不止 論解

黃芩 黃連 羌活 防風 柴胡 川芎

甘草 為末每服三錢茶調如膏白湯送下如少陰頭

痛加細辛太陰頭痛脉緩有痰去羌活防風川芎甘草加

半夏如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡

一倍 散少陽 如自汗發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白

虎湯加白芷 太陰頭痛必有痰也少陰頭

此足太陽少陽藥也頭為六陽之會其象為天乃清空之

位也風寒濕熱干之則濁陰上壅而作貢矣羌防入太陽



柴胡入少陽皆辛輕上升祛風勝濕之藥川芎入厥陰爲通陰陽血氣之使甘草入太陰散寒而緩痛辛甘發散爲

陽也芩連苦寒以爲防之屬升之則能去濕熱于高巔之

上矣芩連用酒炒非獨制其寒欲其上升也丹溪曰東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂巔頂痛也

六味地黃丸 治頭暈目眩淫慾過度腎氣不能歸元此氣虛頭暈

補中益氣湯 加白芍細辛川芎蔓荊子名順氣和中湯治清陽不升頭

痛惡風脉弦微細

小柴胡湯 加青黛姜汁糊丸名清鎮丸治脉弦頭痛

李氏醫鑑 卷之一 頭諸方 十

小半夏湯 加茯苓治眩悸水停胸間上干于頭則眩凌于心則悸

黃丸 治三焦積熱頭項腫痛目赤口瘡心膈煩躁

當歸龍薈丸 治頭暈目眩

人參散 治頭痛目昏 逍遙散 治頭運

瓜蒂散 治頭額兩太陽痛令病人飲水一口以此散一字吹入鼻中出黃水即愈

防風通聖散 治頭目昏運

二陳湯 加白芷治頭目昏運

宜養本酒 治頭目昏運

湯加川芎白芷爲主即前所謂用痰藥收功是也

玉真丸 治腎厥頭痛

生硫黃二兩 生硝石 石膏 半夏各一兩 姜汁糊丸姜湯

本草備要主治註釋

川芎 頭痛必用之藥加各引經藥大陽羌活湯明白芷少

經氣鬱滯亦致升麻 治頭痛寒熱陽明頭痛連辛夷治頭

頭痛頭風 升麻 治頭痛寒熱陽明頭痛連辛夷治頭

助通于清氣上生薑 治傷寒厚朴 治傷寒頭痛用荆芥治

寒頭痛羌活 治頭痛熱風少陰獨活細辛 治頭痛桂枝治

風頭痛無藥本 治正偏頭痛治寒鬱太陽頭痛連腦者必

汗能發 治後傷風血虛頭痛又治黑芝麻 治頭痛或蒸或

白芷 治後傷風血虛頭痛又治黑芝麻 治頭痛或蒸或

李氏醫鑑 卷之一 頭 八

殺羊角 治頭痛 澤蘭 殺精草 威靈仙 族覆花 虎

頭骨 殭蚕 地骨皮 治頭痛 釣鈞藤 治頭痛 貝母 治頭痛

藥治肝氣上 天麻 治頭痛 釣鈞藤 治頭痛 貝母 治頭痛

澤瀉 治頭痛 柴胡 治頭痛 甜瓜蒂 治頭痛 天南星 治頭痛

肝木用不能營勞也 蝎 治頭痛 鉅 治頭痛 益母子 治頭痛

丹溪曰無痰不作眩 蝎 治頭痛 鉅 治頭痛 益母子 治頭痛

子 治頭痛 杏仁 治頭痛 防風 治頭痛 益母子 治頭痛

菖蒲 治頭痛 薄荷 治頭痛 蒼耳子 治頭痛 茵陳 治頭痛

治頭痛 雄黃 治頭痛 華髮 治頭痛 荊瀝 治頭痛 慈 治頭痛

附髮髮變白方藥

女貞實 地黃 何首烏 人參 麥冬 罕蓮草 南

燭子 牛膝 枸杞 山藥 沒石子 桑椹 黃柏

椒紅 蓮鬚 女貞實變白屢試屢驗陳藏器云拔去白髮用母丁香末姜汁調塗孔中重出即黑

覆盆子 能令鬚髮不白而兼能長 槐角 烏髮髮十月上已採漬牛胆中黑

石榴皮 浸水汁黑如墨烏髮 五倍子 能染白髮 扁栢汁 烏髮

熟地 青鹽 猪胆 沐髮去垢光澤 核桃 殼外青皮壓油烏髮

公英 擦牙烏髮 龜尿 染髮髮以鏡照之自見其形則淫發而尿出

附白禿

李氏醫鑑

卷之一

頭面

九

馬齒莧 煎成膏 山豆根 為末傅 白頭翁 治禿 百草霜 治禿

松樹葉 生毛

面 點好炮 酒刺

凡頭面諸疾皆由清陽不升濁陰逆上所致○東垣曰雷頭風症頭面疔瘡腫痛憎寒壯熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒涼重劑誅伐無過處清震湯治之

清震湯 治頭面疔瘡腫痛 并治雷頭風頭痛

荷葉一 升麻 蒼朮 各五錢 煎服立愈

四物湯 加酒炒黃芩治面赤腫

如聖湯 咽喉 加枝子大黃治面腫

雷頭風頭痛而成塊者是也或頭中如雷之鳴為風邪所客故也前清震湯主之 腫核宜刺出血亦有痰熱者熱生風也

方 半夏 皂角 姜汁製 大黃 酒浸透紙包熨再浸 白殭蚕

連翹 橘紅 桔梗 天麻 各五錢 片苓 七錢 薄荷葉 三錢 白芷

青礞石 各一錢 共為末蒸餅丸茶豆大臨臥茶吞二錢

喝僻面腫方 蟹治之 喝僻者厥陰風熱也 解二經之熱則

筋得養而氣自益 喝僻面腫俱除矣

口眼喎角僻喝 凡風中血脉則口角僻喝 三年雄雞冠

李氏醫鑑

卷之一

面

十

血塗頰上左塗右右塗左効 血鹹而走血透肌肉故治之

本草備要主治註釋

白附子 治面上百病能去頭面 白斂 治面上疔瘡 蔓荊子 治

而風 辛夷 治面點可作面脂消癰 烏梅 燒灰存性研末 白果漿 治

菜本 白芷 同作面脂能祛風又能治濕除 白及 除

上疔癰○癰 藥本和自芷 作面脂除 酒釀 音 粉刺 鷄屎白 滅

痕 本驚子 除面點 殭蚕 滅痕 千金外臺洗面澡頭方盛用

豌豆麵 取其白膩去點 防風 荆芥 白芷 薄荷葉

連翹 川芎 牛蒡子 石膏 均治頭面腫 蘇子 枇杷葉

天冬 麥冬 玄參 花粉 白芍 五味 梨柿  
蔗 童便 均治頭面赤 熱上焦火升 菊花 蟬蛻 知母 竹葉 甘草  
草 治同

瘰癧癰癰結核

朱丹溪曰因食味之過鬱氣之積曰毒曰風曰熱此二端  
一經引須分虛實者易治虛者可慮夫初發于少陽  
一經不守禁戒延及陽明蓋胆經至主決斷有相火而  
一經血少楊登甫曰大抵皆項痰所結莫不有根內用班  
爛肉此其驗也以木通滑石燈心等導之外用蓖麻子搗  
爛敷忌鐵器○又曰行積痰則結核自消癰癰結核也  
屬少陽胆經忌補氣辛熱酸飲宜清熱散結和肝涼胆外  
有蝦蟆瘰癧在陽明結核按之癰癰或隱勞瘵結核連數箇  
無核但腫瘰癧少陽經結核走痛癰癰僻處勞瘵結核耳邊或

聚或 癰等亦 鼠瘻 音漏

治宜瀉火散結虛則補元氣實則瀉陽火補則十全散下

則玉燭化堅湯 升麻 一錢 乾葛 五錢 漏蘆 足陽 丹皮 三錢

間留 地黃 三錢 連翹 一錢 生黃耆 一錢 白芍 三錢 桂枝 三錢

散結因寒因 柴胡 八錢 黍粘 一錢 羌活 一錢 獨活 各錢半

昆布 軟 廣木 人參 朴 腹脹 連 陳皮 木香 順加 大

黃 酒浸 秘加

大黃湯

大黃 酒浸 皂角刺 甘草 煎服仍以麝香加瓜蒌仁敷

之結未破核者用火針針之其上即用追毒膏點穿線頭  
內釘孔中又用牡牛膝搗汁敷其上 一日一易 膿將盡  
又用玄參地榆滑石寒水石大黃等 末敷其瘡 又用  
白厄萊聖草用敷其瘡以大黃寒水石 骨木香枳朮  
收口 後又用竹茹亦能長肉白膏藥收後紅不退用此  
蟬蛻窠敷如已潰久不收口須用香付燈燒鐵烙其腐肉  
處盡依前法治之

治耳接 耳邊項上 五倍 白芷 為末蜜調敷

假鼠糞 以黃泥 查樹葉汁敷

李氏醫鑑 卷之一 瘰癧癰癰結核 主

去癰癰毒 皂角子 五兩 大黑豆 一斤 甘草 一斤 冬青葉 一斤 同煮汁

乾為度常食不過二料

南省傳方

大黃 五錢 麻黃 三錢 夏月 當歸頭 三錢 荆芥 三錢 乳香 三錢 土木

脂 三錢 去油 用無灰酒一碗 水一碗 煎至一碗晚膳後服

蓋暖出汗行三四次用飲湯止渣放水一碗煎半碗對酒

半碗服下發汗照前忌百日生冷花胡椒四日一劑四日

全愈

本草備要主治註釋



肝主風心主火。瞳子散大風火搖動之徵也。水不能制火。則清和之氣乖亂。而精液隨之走散矣。精液走則光華。故視物不清也。○綱目曰。心脉按目系。肝脉連目系。手少陽之脉終于目。外小背風熱從此道。上攻頭目。致偏頭痛。腫瞳子散大。視物昏花。而虛陰弱。故也。宜涼血養血。散火散火而除風熱。

熟地黃 兩 生地黃 一方兩半 柴胡 八錢 黃芩 酒炒 當歸 酒洗 方士錢半

天門冬 地骨皮 五味子 黃連 酒炒 甘草 炙 人參

枳殼 二錢 密丸 茶清下 日二服 忌食辛熱之物 助火寒涼

之物損胃使藥不上行

諸藥涼血瀉火養血滋腎升陽斂散益氣補中惟枳殼利

氣行滯 本草云枳實枳殼皆能 明目故目疾方多用之

李氏醫鑑

卷之一

目疾

主

消風養血湯 治目赤腫痛 風熱傷血則赤風熱作實則腫

外向面者為外眦在內近鼻者為內眦上為外眦下為內眦目痛赤脉從上下者為太陽症宜溫之散之從下上者為陽明症宜寒之下之從外

走內者為少陽症宜和解之

荊芥 蔓荊子 菊花 白芷 麻黃 防風 桃仁 去

皮 紅花 酒炒 川芎 五錢 當歸 酒洗 白芍 酒炒 草決明 石決明 甘

草 一錢

此足太陽厥陰藥也荊芥防風麻黃白芷甘菊蔓荊輕浮

上升並能消風散熱桃仁紅花川芎歸芍辛散酸收並能

養血去瘀兩決明皆除肝經風熱專治目疾瘀去血活則

腫消風散熱除則痛止又目為肝竅搜風養血皆以和肝

加甘草者亦緩肝而止痛也 保命集云目病在府則為表

養血安神暴發者為表

易療久病者在裏難治

洗肝散 治風毒上攻暴作赤腫目痛難開隱澹眵淚

凡目赤腫或大府秘結實有力者為有裏症宜

微利之瀉青丸洗肝散之類是也 駝音賜眼脂

薄荷 羌活 防風 當歸 川芎 枝子 大黃 炙

甘草 等分為末每服二錢 無表症者除 枝子大黃

補肝散 治肝虛目痛筋脉疼痛冷淚不止羞明怕日

及夜則痛甚點苦寒之藥反劇者 目白珠屬陽白珠痛者

則晝甚黑珠屬陰黑珠

李氏醫鑑 卷之一 目疾

痛者則 夏枯草 五錢 香附 一兩 每服五錢 臘茶下 丹溪方夏枯

草香附各二兩加甘草五錢

此足厥陰藥也夏枯草遇夏至陰生則枯蓋稟純陽之氣

有補養厥陰血脉之功夜痛及用苦寒藥反甚者夜與寒

皆陰也夏枯草能治之者陽勝陰也香附行

氣散肝和中解鬱推陳致新故用以為佐

瀉青丸 治目赤腫痛 風熱發于目故腫痛有口赤羞

愈此痰飲為患 飲治而目自愈

二陳湯 加蒼木枳殼片子姜黃治痰攻眼腫

防風通聖散 治目赤睛痛

撥雲退翳丸 治風熱障翳 翳膜有氣血

挾濕陰虛火動七  
情六淫種種不同

當歸<sub>雨</sub> 川芎 地骨皮 白蒺藜 蜜蒙花 甘菊花

羌活 荆芥 木賊<sub>雨</sub> 花粉 蔓荊子 薄荷 枳實

甘草<sub>錢五</sub> 川椒<sub>七錢</sub> 黃連 蛇脫 蟬脫<sub>錢三</sub> 蜜丸每兩作

十九每服一九日三服者米泔下晴暗當歸湯下內障木  
香湯下

此足太陽厥陰藥也羌活荆芥蔓荊薄荷以升陽散風當

歸川芎以和肝養血黃連地骨花粉清火熱枳實破滯氣

川椒溫下焦木賊二脫以退翳蜜蒙蒺藜甘菊目家專藥

李氏醫鑑

卷之二

七

以潤肝補腎瀉火清金炙草補中以和諸藥也

加減駐景丸<sub>補肝</sub> 治肝腎氣虛兩目昏暗<sub>目為肝竅瞳子神光故肝腎虛</sub>

枸杞子 五味子 車前子<sub>炒一兩</sub> 楮實 川椒<sub>炒一兩</sub> 熟地

黃 當歸<sub>雨</sub> 菟絲子<sub>八兩</sub> 蜜丸酒下本方除當歸五味楮

實川椒名駐景丸治同

此足少陰厥陰藥也熟地枸杞補肝滋腎菟絲楮實益精

強陰五味斂耗散而助金水<sub>滋腎水收</sub> 當歸和氣血而益

肝脾川椒補火以退下焦虛寒車前利水而瀉肝腎邪熱

車前子清肝明目利小便而不走氣得此瀉邪則補藥更  
為得力張子和曰目赤腫是厥陰肝經風熱利小便能去  
肝經風熱

分志丸<sub>驚悸</sub> 治目不能遠視能近視<sub>王海藏曰能近視實</sub>

其無火法 宜補心 人參補心氣清蒲開心竅茯苓能交心氣于腎遠志能通

腎氣于心砂砂色赤清肝鎮心心屬離火火旺則光能及  
也

地芝丸<sub>不能近視</sub> 治目能遠視不能近視

生地<sub>焙</sub> 天冬<sub>四兩</sub> 枳殼<sub>炒</sub> 菊花<sub>去皮</sub> 蜜丸茶清或酒下<sub>用茶</sub>

火熱之下降用酒 者欲藥力之上行

李氏醫鑑

卷之二

七

人參益胃湯<sub>內障</sub> 治勞役飲食不節內障日病<sub>內障者睛裏</sub>

之暇無異惟瞳人 內有隱隱青白者

黃耆 人參<sub>一兩</sub> 甘草<sub>錢八</sub> 白芍<sub>炒</sub> 黃柏<sub>酒炒四錢</sub> 蔓荊子<sub>二錢</sub>

每四錢日二服

此足太陽陽明藥也參耆甘草大補中氣以強脾胃蔓荊

升清陽而通九竅白芍入厥陰而和榮血<sub>目得血而能視</sub> 黃柏除

濕熱而滋腎<sub>腎水足</sub> 使精氣足而清陽升則藏府和而障

醫退矣<sub>要全善日治目不明氣虛而未脫可于參耆中</sub>

石膏羌活散<sub>一切目病</sub> 治久患雙目不明遠年近日內外氣障



風悍拳毛倒睫一切目疾

羌活 荆芥 白芷 藁本 細辛 川芎 蒼朮 甘

菊 蜜蒙花 萊子 木賊 黃芩 石膏 麻子 甘

草 等分爲末每服一二錢食後臨臥蜜水調下或茶清

米泔亦得

此足太陽陽明厥陰藥也厥文口羌活治腦熱頭風藥本  
治正偏頭痛白芷清頭目川芎療頭風荆芥治頭目中  
瘡瘻藥治羞明怕日蒼朮明目煖水藏木賊退障翳麻子  
起拳毛細辛萊子起倒睫黃芩石膏洗心退熱甘菊降火  
除風甘草  
調和諸藥

防風飲子 治倒睫拳毛 倒睫拳毛由日急皮縮之故也蓋  
伏熱內攻陰氣外行當去其內熱

李氏醫鑑

卷之一

尤

併火邪使眼皮

黃連 甘草 人參 當歸 錢 葛根 防風 五 細辛 蔓

荆子 食後避風寒濕熱

本方除人參當歸黃連加黃芩名神効明日尤 東 治前症

兼赤爛痒痛冷淚多眵

羊肝丸

治目疾內障 倪仲賢曰經曰心者五藏之專精

之精爲神水故肝木不平內熱心火爲勢妄行火炎不制  
神水受傷上爲內障此五藏病也諸脉皆屬于目相火者  
心包絡也主百脉上榮于目火盛則目赤赤者爲內障  
此虛陽病也勝於小腸二焦胆氣俱循于目其清氣亦上  
注爲目之精四府一衰則精氣盡散邪火乘之上爲內障  
此六府病也神水黑眼皆法于陰白眼赤脈皆法于陽陰

齊陽作故能爲視陰微不立陽盛即淫經曰壯火食氣壯  
火散氣上爲內障此弱陰病也四者皆爲陰弱不能配其  
也

夜明砂 淘 蟬脫 木賊 去 當歸 一兩 羊肝 四兩 煮以羊肝

去筋膜水煮搗爛和丸

此足厥陰藥也蚊食血之蟲夜明砂皆蚊眼也故能散目

中惡血而明日 蟬食蚊而眼不 木賊輕揚而善磨木故

能平肝散熱而去障蟬性善蛻故能退翳當歸能入厥陰

養血而和肝用羊肝者羊性屬火取其氣血之屬能補氣

血引諸藥入肝以成功也

李氏醫鑑

卷之一

辛

濟生羊肝丸黃連一兩羯羊肝一具去筋膜生用搗爛和

丸本方煮爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青盲

細目云但見目疾及障翳青盲皆治忌猪肉冷水○聖全

善日減哉河間之言目有耳聾鼻不聞臭舌不知味手足

不能運用者皆由玄府閉塞而神氣出入升降之道路不

通利也故先賢治目皆花如羊肝丸用羊肝引黃連等藥

入肝解肝中諸熱蓋肝主目肝熱則目之玄府通利而

明矣黃連之類解熱也椒目之類解濕熱也玄府通利而

之類解熱也椒目之類解濕熱也玄府通利而

等劑助氣血運行而明也○經曰玄府

兔矢湯 治瘡疹入眼及昏暗障翳

兔矢 茶清調下或吞服須待瘡疹

此足厥陰陽明藥也兔者明月之精得金之氣其矢名

明目能解毒殺蟲故能明目又可兼治痧痢也

一百味草花膏 治目赤流淚或痛或痒豈不能視夜

惡燈光 血熱則目赤肝熱則多淚然微則痒熱甚則

霜出 霜取點眼

許或點目中又法臘月入蜜膽中紙籠套住懸屋簷下待

此足少陽厥陰藥也羊膽苦寒益膽瀉熱蜂蜜甘潤補中

李氏醫鑑

卷之一

目

三

緩肝曰二百味草花膏者以羊食百草蜜採百花也

肝開於目目睛汁減則目暗日者肝之外候睛之精華也

故諸睛皆治目疾點服說云病有內外治各不同內疾既

發其眼不除外疾既成非點不退內疾始盛流淚不如塞

而外點反致其火動其血氣無益反損若外障已成雖服

點眼方 治目中百病陽症者

黃連 人乳 浸點或煎點或加朴硝

此足厥陰藥也治目赤心主血肝藏血目受血而能視蓋

水入于經其血乃成又曰目之睛為乳汁下則為月水故知

百點膏 治翳遮瞳人如雲氣障隔

黃連 二錢以水一碗煎當歸 甘草 六分防風 八分

三同熬滴水不散去渣入蜜少許再煎少時要病人淨心

點之點至口微痛為度日五七點使藥力相續故曰百點

臨卧點尤妙

此足厥陰藥也黃連瀉火防風散風甘草

和中當歸養血凝仁清風散熱益水生光

四明膏 內障生翳及瞳子散大因勞心過度飲食

失節 柴胡 麻黃 黃連 生地 五錢歸身 三錢甘草 訶子皮 濕

李氏醫鑑

卷之一

目

三

二錢以水二碗先煮麻黃至一碗去沫入後藥同熬至滴

水不散去渣入蜜少許再熬點之

此足少陽厥陰藥也柴胡麻黃發表散邪當歸生地和肝

養血黃連清肝火甘草和中州瞳子散大故加訶子以收

也 麻黃白水湯 治頂額如水目中溜火鼻不聞香

急濟仙方 治風熱赤眼

冬青子不拘多少搗汁重湯煎熬膏淨餅收固點効

普濟方 治一切眼疾

冬青葉研爛入朴硝貼之海上方也

益氣聰明湯 治內障目昏五藏皆稟氣于脾胃以達于九竅煩勞傷中使中和之氣不能

上升故目昏而耳鳴耳聾也宜理脾胃養血安神

黃耆 人參 葛根 蔓荊子 白芍 黃柏二錢如有

月漸加夏倍之如脾 升麻 炙甘草 每四錢臨臥服五

更再服

此足太陽陽明少陰厥陰藥也十二經脈清陽之氣皆上頭面而走空竅因飲食勞役脾胃受傷心火太盛則百脈沸騰邪害空竅矣和補脾胃鼓舞氣上行頭目中氣既足清陽上升則九竅通利耳聰而目明矣

明目地黃丸即滋陰補腎丸 治腎虛目昏

熟地 二山藥 山萸 丹皮 歸尾 五味 柴胡各五錢

李氏醫鑑 卷之一 日

茯神 澤瀉各二錢半 蜜丸 砂為衣加柴胡者所以升陽于上也

涼膈散見口 治目赤頭眩

龜鹿二仙膏 治目視不明

龍腦雞蘇丸見口 清心明目

滋腎丸腰膝 本方去桂名療腎滋本丸治腎虛目昏

逍遙散 加丹皮枝子名八味逍遙散 治怒氣傷肝血少

目暗

當歸龍薈丸傷寒變現門 治肝膽火盛目眩

目赤腫痛刺血方 屬血熱用三稜針刺破眼眦腫處將出

熱血立解遲則血貫瞳人目損矣

甘桔湯 加枝子大黃治目赤

明目流氣飲 治風熱眼目赤腫

枝子 黃芩 牛蒡子 白蒺藜 細辛 荊芥 蔓荊

子 蒼朮 防風 菊花 黑參 甘草 草決明 木

賊 川芎 大黃

有神夜光丸 治肝腎虛弱兩目昏暗不明

當歸 遠志 肉桂 牛膝 地骨皮 熟地 枸杞 枳

殼 兔絲子 煅爛酒乾 菊花 等分為末煉蜜丸空心用

李氏醫鑑 卷之一 日

淡湯下食後用酒下臨臥茶清下日三服

茯苓甘木湯肩背胸脇門 治心下有痰飲目眩痰飲阻其胸中之陽水情不能

上旬 故眩

點翳膜

山川甲 一錢 牙皂 炒末一錢五分 細辛 一錢 辰砂 二錢 加麝少許

飛絲芒塵入目方

陳好墨 濃磨點之

本草備要主治註釋

龍膽草 清赤熱勞肉瀉肝火眼科多用之 決明子 除風熱



鼻

鼻為肺竅因心肺上病而滯塞流涕不利有寒有熱寒邪傷于皮毛氣不利而鼻塞宜先表散寒邪後補衛氣使心肺之氣交通○經曰天氣通于肺陽明無痰火積熱則平常上升皆清氣也若內燥火焚風寒外束血氣壅滯則鼻生瘰癧而鼻室不通也○氣清則鼻通氣熱則鼻塞濕熱盛其蒸于肺門則生瘰癧肉腐濕地得熱而生芝菌也○鼻流清涕曰鼻淵乃風熱燥腦而熱下滲也經曰腦滲為涕又曰腦移熱于腦則辛額鼻淵額即山根原病式曰如以火燥金熱極則反化為水肝熱其則出泣心熱其則出汗脾熱其則出涎肺熱其則出涕腎熱其則出唾皆火熱盛極銷鑠以致之也○腦移熱于腦則多濁涕而風寒客于腦則塞○寒熱入腦故氣不宜通寒宜表熱宜清○腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不利○鼻息乃肺氣盛熱壅清道則氣不宜通○血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅而衄○口鼻出血皆由上盛下虛有升無降血隨氣升法當

李氏醫鑑

卷之一

鼻

先順氣氣降則血歸經矣○陽熱拂鬱胃中越出于口鼻故吐血衄血○肺火盛則衄血吐行濁道衄行清道喉與咽二管不同經者循經之血走而不守隨氣而行火氣急迫故隨經直犯清道上腦而出于鼻為衄吐血之熱在府衄血之熱在經雖病衄血為寒熱傷寒衄血為表熱注石山口鼻寒流涕感風寒治宜發散可使之安素有此病感寒便發此傳火邪治用羌活勝熱移腦辛額鼻淵通聖連薄驅散是專驅鼻道肉肺氣過盛瓜蒂吹之可使消淨面鼻赤紫多酒黃熱○辛額鼻痛也○經音

辛夷散 治鼻生瘰癧肉氣息不通不聞香臭

辛夷 白芷 升麻 藁本 防風 川芎 細辛 木

通 甘草 等分為末每服三錢茶調下外用燒燐為末

加硃砂少許吹鼻中能消化

丹溪方 枯礬研如而脂綿裹塞鼻數日自消

蒼耳散 治鼻淵

白芷 薄荷 辛夷 蒼耳子 炒五錢 為末食前茶葱湯

調下

凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆上所致白芷上行頭面通表汗除濕散風辛夷通九竅散風熱能助胃中清陽上行頭腦蒼耳子疎風散濕上通腦頂外達皮膚薄荷泄肺疎肝清利頭目葱白升陽通氣茶清苦寒下行使清升濁降風熱散而腦液自固矣

羌活散 治鬱火邪鼻塞流涕感寒便發

羌活 枳殼 黃芩 蔓荊子 菊花 石膏 前胡

李氏醫鑑

卷之一

鼻

細辛 半夏 麻黃 茯苓 薄荷 川芎 防風

防風通聖散 治鼽鼻塞肉

黃連解毒湯 治三焦實火衄血

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分為末

仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃連黃芩芩瀉心包肝脾胃四經之伏火也或問心氣不足而吐血衄血何以不瀉心而反瀉心并淡曰少陰不足亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不足肺肝各受火邪而病作故用黃芩黃連黃柏瀉肝肺者陰之主肝者心之袂血之舍也肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱即以苦補其心蓋一用而兩得之李士材曰古人用大黃治虛勞吐血衄意甚深遠濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生也

犀角地黃湯 詳論見 治衄血 初唐曰此衄

六味地黃丸 治吐血 由肝不攝血

參蘇飲 感冒 合四物名茯苓補心湯 治吐血極効

四物湯 加黃芩 紅花 治酒鼓鼻并面赤紫

黃芩芍藥湯 治火升鼻衄

黃芩 酒炒 白芍 甘草 煎服

龍腦雞蘇丸 見後 治衄血

蘇子降氣湯 吐血 加入參阿膠 各一錢 治衄血

麻黃白朮湯 大便 治鼻不聞香臭

李氏醫鑑 卷之一 鼻 兼

酒鼓鼻并面赤紫方

乳香 硫黃 蘿蔔 內輕粉 烏頭尖酥油敷

又方 鴨嘴 膽礬敷

婦人經脉逆行鼻衄方 經不下行上

鬱金末 加韭汁薑汁童便服其血自清痰中帶血加竹

瀝

衄方 髮燒灰存性研細水服并吹灰入鼻止衄

又方 白芨末 新汲水調下一錢津調參山根上衄血

立止

賈仲 一味爲細末水調一錢治衄血有効

簡要濟衆治鼻衄不止服藥不應 用蒜一枚去皮細研如

泥攤一餅子如錢大厚一豆許左鼻血出貼左足心右鼻

血出貼右足心兩孔俱出皆貼之立瘥血止急以溫水洗

足足心 此引火 下行也 ○土泥作枕睡片時立止冬月用布袋托

一層

衄血不止 用紙數十層水浸濕安頭頂中心以火熨之紙

乾立止又用綿扎中指中節左孔出血扎左指右孔出血

扎右指兩孔出血則俱扎之 又方 青蒿搗汁服之并

李氏醫鑑 卷之一 兼

塞鼻中極驗 又方 百草霜搗水塗鼻則止墨亦可

本草備要主治註釋

細辛 治鼻 辛夷 治鼻 木通 治鼻 草薢 治鼻 蓖麻子 搗爛

塞鼻治 白礬 治鼻中 麝香 治鼻 冰片 治鼻 盧薈 吹鼻

鼻除 通草 治鼻 草決明 治鼻 蒼耳根 治衄 鬱金

荆芥 澤蘭 白茅根 治肺火衄血甘和血寒 車前草

根葉搗汁飲 生地 丹皮 香附 白頭翁 韭汁 并墨

之治衄血 黑薑 滑石 代赭石 伏龍肝 槐花 竹茹 荷葉

大薊 並止 衄血 卷一終



李氏醫鑑卷之二

口唇腮與後舌齒參看

脾司在口熱則甘甜治宜瀉火三黃無嫌謀慮不決膽熱口苦小柴胡湯龍膏丸與肺熱口辛宜甘桔湯腎熱口酸用滋陰方心熱口瘡是宜涼膈亦有陽虛理中黃連口臭之由熱熱于中脾氣不清引之上衝清胃化毒用之有功○脾熱則口甘生地白芍黃連瀉火神曲龍膏丸黃連肝熱則口酸黃連連龍膽瀉肝心熱則口苦柴胡龍膏丸黃連通瀉火肺熱則口辛黃連枝子瀉肺白芍瀉脾麥冬瀉心腎熱則口鹹知母烏龍骨淡竹葉胃熱則口淡茯苓白木半夏生薑燥脾勝濕口澀黃連瀉火葛根生津防風薄荷疎風木瓜茯苓行痰○丹溪曰脾有積火溢入肺中濁氣上行發為口臭治以丁香是湯湯止弗耳惟香薷甚捷○口為脾竅火下則熱除○凡口瘡用涼藥不効者乃中氣不足虛火上炎宜用反治之法參朮甘草補土之虛于姜散火之標甚者加附子或喻官桂引火歸元○唇屬脾

李氏醫鑑

卷之二

一

大腸經燥則乾熱則裂風則癢寒則揭若腫裂如蚕繭名曰齒唇唇者肌肉之本也人中平滿者為反唇唇反者肉先死○風寒濕熱之氣上干○關音絕則目赤口瘡傷于陽明則腮腫○動也

龍腦雞蘇丸

治口臭口苦

脾胃有熱則口臭肝胆有熱則口苦胆液溢則口苦

雞蘇葉

一名大葉薄荷一兩六錢

生地

六錢

麥冬

四錢

柴胡

二錢

甘草

半錢

黃耆

人參

一先將木通柴胡浸二日熬汁地黃浸汁熬膏再用蜜三兩煉過和丸梧子大每服二

十丸細嚼湯下一方有黃連

喻嘉言曰此丸兩解氣血兩分之熱宜常服之切庵曰此亦為熱而涉虛者設

涼膈散隔治心火上盛中焦燥實口瘡唇裂

連翹

四兩

大黃

酒浸芒硝

甘草

二兩

枝子

為末每服三錢加竹葉生薑煎

藥生竹上

故治上焦

導赤散

治小腸有火口糜舌瘡

君火是五藏六府火之

主故諸經之熱皆應

于口舌為心苗若心火上

炎黃連于口則口糜舌瘡

生地

木通

甘草

稍

淡竹葉

等分煎服

小腸為乃火心為丁火心熱泄小腸釜底抽薪之義也易

老用導赤散合五苓散治口糜神効經曰膀胱移熱于小

腸腸腸不便上為口糜亦有理中湯加附子者因脾胃

虛衰之火被遏上炎故用參朮甘草補其上姜附散其寒

則火得所助散引退舍矣○綱目曰心氣熱

則口瘡宜導赤散散腎氣虛則下竅宜地黃丸

錢乙瀉黃散

治唇口皸爛燥裂

脾之華在唇動也

風也燥裂火也白芷

錢乙瀉黃散

治唇口皸爛燥裂

脾之華在唇動也

風也燥裂火也白芷

升麻皆陽明藥防風祛風而散脾火燥在唇口故從其性

而升發之也黃芩瀉中上之熱枳殼利中上之氣半夏能

燥能潤發表開解石斛清脾平胃退熱補虛

甘草和脾兼能瀉火亦火鬱發之義也

甘露飲

治胃中濕熱口臭喉瘡齒齦宣露及吐衄齒

血胃之竅在口其脉上齒使鼻濕熱內盛故口臭口瘡陽

熱拂胃胃中越出于口鼻故吐血衄血齒齦少陰腎經

屬陽明胃二經有熱則齒齦宣露也

血名齒齦或牙齦在脫齒齦宣露也

生地

熟地

天冬

麥冬

殼

枇杷葉

甘草

等分每服五錢一方加桂苓名桂

苓甘露飲本車方加犀角云如此甚有道理

犀角涼心瀉

肝清胃中大

滋陰降火湯 治腎熱口膩

川芎 當歸 白芍 地黃 知母 黃柏 白木 甘

草 陳皮 麥冬 遠志 水煎服

清胃散 見齒 治脾氣不清蘊熱口臭或唇口煩腮腫痛

五福化毒丹 治唇舌腫破口臭生瘡煩渴

玄參 桔梗 各一兩 茯苓 二兩 人參 五錢 馬牙硝 枯 青黛 各一兩

甘草 七錢 細末煉蜜九皂子大金薄為衣薄荷湯化下

一丸口臭生地黃汁化下

當歸龍薈丸 治謀慮不決膽熱口苦 當歸

李氏醫鑑 卷之二 三

龍膽草 大枝子 黃連 黃芩 各一兩 當歸 大黃 青

黛 各一兩 木香 二錢 麝香 五分 另研 一方加柴胡青皮 各一兩 為末

神曲糊丸每服二十九姜湯下

龍腦瀉肝湯 見耳 治膽溢口苦

三黃丸 治口甘甜

人參敗毒散 治口瘡腮腫 紫雪 傷寒變現 治口瘡

升陽益胃湯 脾門 治口苦舌乾陰火上炎

黃芩加半夏生薑湯 咳門 治口苦

瀉黃湯 脾門 治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭

小柴胡湯 治謀慮不決膽熱口苦 丹溪方柴胡湯加麥

冬棗仁志肉地骨皮

如聖湯 咽喉 治口舌諸瘡

本草備要主治註釋

花粉 治口燥 柴胡 治口苦 木通 治口燥 細辛 治口瘡 升麻

治口瘡 薄荷 錫蘇 並治口瘡 香薷 治口瘡 菟絲子 治口瘡 升麻

生內熱益陰 砂仁 散口瘡 蓬砂 治口瘡 茶等分治口瘡 百草霜

清熱故治之 羊乳 含漱治口瘡 茯苓 治口瘡 黃連 并細辛 治口瘡

諸瘡 之丁香 治口瘡 乾柿餅霜 治口瘡 黃連 并細辛 治口瘡

李氏醫鑑 卷之二 四

陽相配 五倍子 治口瘡 乳香 治口瘡 巴豆 治口瘡 胡桐淚 口瘡家

之妙 藥 為要

本草經疏口唇生瘡

麥冬 生地 甘草 白芍 烏梅 黃連 黃柏 黑

參 連翹 花粉 乾葛 石膏 龍膽草 大青 竹

葉

口瘡同口瘡上藥

舌津液

并看雜症以及傷寒舌胎法

重舌木舌咽

舌為心苗，肝膽絡係心，脈係舌根，脾脈係舌旁，肝脈係舌下。因風寒所中，則舌捲縮而不言，七情所鬱，則舌腫而不得息。用藥則血上湧，心熱則裂而痛，脾熱則滑胎是虛熱，心經熱則口乾，陰虛則白胎如雲，脾熱則舌強舌捲而胎縮者，厥陰絕也，死不治。足少陰腎脈伏舌本，足太陰脾脈循舌本，少陰心別脈係舌本，三經虛則痰涎壅其胎，道舌不轉，而不可言，或三脈亡血，舌無血，營養而瘡，舌病者，中風不能轉運之類，而咽喉音聲如故，喉音者，勞嗽之類，而舌本則能轉運言語也。口中燥潤及舌胎淺深，須細詳察，舌為心苗，應南方火邪在表，則未生胎邪入真津液，搏結則生胎，而滑胎白者，升田有熱，胸中有寒邪，在半表半裏也，熱入漸深，則燥而澀，熱聚于胃，則黃宜承氣及白虎湯，若熱病口乾舌黑，乃腎水刑于心，火炎益深，而病篤矣，然亦有胎黑屬寒者，舌無芒刺，口有津液也，又當用溫補之劑，尤宜細察細辨，凡有實熱者，舌胎必燥而焦，然假熱亦有黑舌，但不兼熱燥耳。假熱者，舌雖有

李氏醫鑑

卷之二

舌

五

白胎而必滑口，雖渴而不能飲水，縱飲不過一二口，甚者少頃亦吐出，面雖赤必嬌嫩，舌見熱硬黑形，用調胃承氣湯下之即愈。舌見純紅色者，熱蓄于內，也不問何經絡，宜用透頂清神散治之。三十六舌甚是詳悉，恐太繁冗，姑俟後刊。

黃連瀉心湯

治大人小兒心火妄動，結成重舌，木舌，紫舌。

脹腫堅硬，語言不利者，並宜服之。

黃連

山枝

荆芥

黃芩

連翹

去心

木通

薄荷

牛

勞子

各一錢

甘草

分五

燈心

二十根

食後服

大人小兒重舌，乃心火妄動，結成以針刺患處，令出血，而服黃連瀉心湯，外以冰硼散搽之，又有紫舌，木舌，亦由心火而發，可用龍膽加冰片少許，勤搽，自能自愈，又有痰氣結于舌上，成核作痛，腫強者，用線針點破出血，用水調散

搽之，服黃連瀉心湯，外科正宗曰：針刺法，治以上等腫痛，服藥，痛速強難語，又兼舌根，并兩齒合縫處，作腫，肉穿塞口，難開，俱用此法，刺之，用粗線針，扎在筋頭上，在患處點刺出血，紅紫毒輕，紫黑毒重，患重者，數十點，皆可，血盡，惡毒消之，甚者，金鎖匙，輕者，水硼散，搽患處，上流去，熱毒，內服清血散，清涼飲，二散俱見咽喉門。

金沸草散

治風寒傷心脾，令人寒熱，齒浮，舌腫。

荆芥

四兩

前胡

旋覆花

麻黃

兩半

夏雨

升麻柴胡湯

治心脾虛熱上攻，舌上生瘡，舌本強，兩頰腫痛。

痛

升麻

柴胡

白芍

枝子

木通

杏仁

大青

黃

錢三石

膏

煨二兩

李氏醫鑑

卷之二

舌

六

黃連解毒湯

治脾開胎結，心熱舌瘡，肝壅出血。

黃連

黃芩

黃柏

枝子

各等分

每服一兩

水二鍾

煎至

一鍾服

導赤散

見前

治口糜舌腫

心火

涼膈散

口

治同上

天王補心丹

驚悸

治口舌生瘡

六味地黃丸

治舌燥咽痛

舌出血如泉方

五倍子

白膠香

牡蠣粉

白胎語澀方

薄荷汁

白蜜

薑片

搗敷

案

一婦人，舌脹滿口，以蒲黃頓換，此曉乃愈。宋庚宗舌，服滿口，用蒲黃干姜末搽之，愈。蓋舌為心苗，心包相

火乃其臣使得以  
姜是陰陽相濟也

本草備要主治註釋

舌脹不消 以醋酢和釜底墨厚敷舌之上下脫則更敷須臾則消 薄荷 洗含漱瘡

木通 治舌 蓖麻子 取油作紙煨爛 百草霜 治舌 羊乳 含漱

治舌 茯苓 治舌 水片 治舌出 吳茱萸 為末醋調貼足心移夜舌瘡便愈能引熱

行 下 天南星 治舌 餘藥俱與口症參用

本草經疏舌破忌宜 忌補斂 升熱 溫燥

舌破屬心火 宜 降火清熱○苦寒以折之○辛寒以散之○甘寒以緩之○酸寒以潤之

黃連 犀角 石膏 丹砂 丹皮 滑石 生甘草

李氏醫鑑

卷之二

舌

十

麥冬 竹葉 童便 便結燥加芒硝大黃

齒

齒雖屬腎為骨之餘而上頤屬足陽明下頤屬手陽明陽明風熱上攻則動搖腫痛散陽明之風熱則齒自堅矣若牙齦宜露者則為腎虛又當補腎○足陽明胃脈循頰而入上齒中俠口環唇循頰車上耳前主上牙齦喜寒飲而惡熱足陽明別絡腦故腦痛陽明之脈營于面故面熱二經熱盛故唇口齒頰病而腫痛也齒為骨屬腎牙宣牙齦出血或齒縫出血也亦名齒衄乃腎病若血多而湧出不止為陽明熱盛以陽明多氣多血也○齒齦少陰腎經屬陽明胃二經有熱則齒齦齒縫出血或為祖脫齒齦宜露也○大腸壅塞齒乃為之浮大腸虛乃為之宜齦熱甚則齒動齦脫作痛不已寒邪風邪客于頰則腦痛項筋急祖露疼痛齒缺少而色變痒痛○齒乃骨餘腎經所主下齦大腸上齦屬胃味厚蘊積濕熱上攻為腫為痛或血或蟲降火去風涼血驅風清胃去熱調胃下通合散指擦種種不同○薛新甫曰濕熱盛而牙痛者承氣湯輕

李氏醫鑑

卷之二

齒

人

者清胃散大腸熱而齦腫痛者清中益氣湯思慮傷脾而痛者歸脾湯胃經虛熱而痛者六味丸腎經虛寒而痛者還少丹重則入味九其屬風熱者獨活散而

活散

麻黃 去根 羌活 一錢 防風 二錢 細辛 五分 升麻 五分 柴胡 五分

歸 蒼朮 五分 白芷 三錢 桂枝 黃連 羊骨灰 三錢 先以湯漱

口淨擦之

清胃散 見口 治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦滿面發熱

其牙喜寒惡熱或牙齦潰爛或牙宣出血

金沸草散 見舌 治牙痛 一婦人牙痛治療不効口頰皆腫以此湯大劑薰漱而愈



耳 附凍耳

耳為腎竅舌為心竅非孔竅故心亦寄竅于耳十二經中除足太陽經外餘十經皆入絡耳中腎治內之陰心治外之陽清淨精明之氣上走空竅而聽斯聰矣若二經不調陰陽不和或煩勞陰虛或衛氣不下循經脈或得于風邪或經藏積熱或大怒氣逆或濕飲痞膈或聚而不散流出膿血或風熱搏結成核塞耳皆令暴聾宜通耳調氣安腎之劑○外科正宗曰耳病乃三焦肝風妄動而成大人有虛火實火之分小兒有胎熱胎風之別虛火耳內蟬鳴或兼重聽出水作痒外無癰腫此屬虛火妄動之症也四物湯加丹皮石菖蒲及腎氣丸主之實火者耳根耳竅俱腫甚則寒熱交作疼痛無時宜柴胡清肝湯主之又有耳挺結于竅內氣脈不通疼痛不止以枝子酒湯湯為治外用黃線藥插入挺內繞旁化盡乃愈小兒胎熱或洗面水灌竅中亦致作痛生膿初起月間不必搽藥治耳不聽以和線股治之則安矣

李氏醫鑑

腎熱湯 治腎熱耳流膿血不聞人聲

磁石 煅紅燂 牡蠣 鹽水煮 白朮 炒五 麥冬 白芍 四 甘草 兩

一 生地汁 葱白 升 大棗 枚 分三服

磁石體重辛鹹色黑補腎祛熱通耳明目故以為君牡蠣

鹹寒軟痰破結生地大寒瀉火滋腎麥冬甘寒補肺清金

肺為腎母又聲屬金肺虛則少氣不能報息而耳致聾白芍酸寒平肝和血肝病

聾不聰又曰耳皆能生水而制火退熱而斂陰木甘棗補

脾之品益土氣正所以制腎邪也皆固本之藥使精氣充

足邪熱自退耳竅自通加葱白者以引腎氣上通于耳也

聰耳蘆薈丸 外 治肝膽有火耳內癰為漸至重聽不聞

聲息

蘆薈 大黃 酒蒸 青黛 柴胡 各五 龍膽草 酒 當歸 山

枝 青皮 黃芩 各一 木香 二 南星 三 麝香 五 神曲 糊

為丸菜豆大每服二十一丸日服三次漸加

柴胡清肝湯

川芎 川歸 白芍 生地 柴胡 黃芩 山枝 花

粉 防風 勞子 連翹 甘草節 各一

犀角飲子 治風熱壅聚耳出腥膿等症

李氏醫鑑

犀角 赤小豆 石菖蒲 木通 玄參 赤芍 甘菊

各一 甘草 錢五 每服四錢水一鍾姜五片煎溫服

蔓荊散 治風熱壅塞氣滯不通因熱聚膿耳出腥膿

蔓荊子 麥冬 桑白皮 甘草 升麻 木通 菊花

赤茯苓 前胡 赤芍

復聰湯 治耳鳴耳聾等症

半夏 陳皮 茯苓 甘草 木通 瞿麥 扁蓄 黃

栢

防風通聖散 涼膈散 並治風熱壅塞耳疾諸症

大補陰丸 治耳鳴耳聾

益氣聰明湯 治耳鳴耳聾 當歸龍薈丸 治同

六味地黃丸 治耳鳴耳聾

風毒耳痛方

全蝎 生薑 切作四方塊同炒熟去薑為末吹之

湯點耳膿出方

桑螵蛸 一个 麝 二分 另研 參之又加 吹之

又方 枯礬 龍骨 油脂 加麝少許 吹之

腎虛耳鳴方 花椒子同巴豆石菖蒲研細以松脂黃蠟溶

化作挺納耳中抽之一日一易効

本草備要主治註釋

菖蒲子 去殼搗爛綿裹 石菖蒲 通耳 細辛 治耳 柴

胡治耳聾乃木通 治耳聾通竅 麝香 巴豆 冰片

耳聾 澤瀉 仙茅 骨碎補 狗脊 菟絲子 磁石

女貞子 桑甚 胡麻 梔子仁 通竅故也 莢肉 治耳

耳閉不通氣 甘草甘遂末各包各入一耳遂通

耳凍瘡方 白芨 白欬 黃柏 共為末油調之 又方 橄欖核燒研細調塗効 又姜蒜膏塗効

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

咽喉 喉痺 重舌 木舌 諸哽 誤吞 附津液

半夏之功實善用半夏之功擅古今未有之奇矣詞曰  
仲夏亦脾胃藥能燥能潤以能行水故燥以味辛故潤也  
人率以為燥而疑之則誤矣

麥門冬七升 半夏一升 人參三兩 甘草二兩 大棗十二枚 粳米三合

地黃飲子三消 治咽乾面赤

黃芩湯煩躁 治心中煩躁不生津液

當歸龍薈丸傷寒變 治咽噤不利

活血潤燥生津湯 治內燥津液枯少火炎水乾故津液枯少

當歸 白芍 熟地一錢 天冬 麥冬 桔梗八分 桃仁研紅

花五分 用各有所專能分能合更互相濟

李氏醫鑑 卷之三 咽喉

利膈湯 治脾肺火熱虛煩上壅咽痛生瘡

薄荷 荆芥 防風 桔梗 甘草 牛蒡子炒 人參

等分為末每服二錢或加殭蠶其氣清化能散相火逆結之痰

甘桔湯 治少陰咽痛喉癰亦治喉中中介介如梗狀

甘草二兩 桔梗一兩 或等分王好古加法失音加訶子聲不出

加半夏酒毒加葛根

宋仁宗 加荆芥防風連翹名如聖湯通治咽喉諸病

本方除桔梗名甘草湯治同本方加防風名甘桔防風湯

治同本方加連翹薄荷竹葉枝子黃芩亦名桔梗湯治上

焦雍熱喉痺熱腫

防風通聖散感冒 治咽噤不利

稀涎散 治喉痺不能進食

皂角末一兩 明礬五錢 每用一錢溫水調灌或加熬蘆少麝香

胡探喉令微吐稀涎再用藥治老年氣虛人禁用 本方加雄黃熬

蘆名如聖散為末搗鼻治纏喉急癰牙關緊閉

玉屑無憂散 治纏喉風痺咽喉腫痛嚥物有碍或風涎壅

滯及骨屑硬塞

玄參 黃連 荆芥 貫仲 山豆根 茯苓 甘草

李氏醫鑑 卷之三 咽喉

砂仁 滑石五錢 硼砂 寒水石三錢 為末每一錢先抄入口

徐以清水咽下砂仁硼砂並能清骨硬

雄黃解毒丸 治纏喉急痺風痺

雄黃一兩 鮮金一錢 巴豆十四粒 醋糊為丸每服五分津嚥下

或用巴豆油煎紙捲火吹息帶烟刺入喉中出

紫血惡涎即愈此以熱攻熱熱則流通之義也

吳鶴皋曰纏喉急痺後治則死雄黃能破結氣鮮金能散

惡血巴豆能下稠涎丹溪生平不用厲劑此蓋不得已而

用者

仲景苦酒湯 治少陰病咽塞生瘡痛不能言語聲不出者

用半夏十四枚 雞子一枚 去黃內入半夏苦酒令滿置刀



環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不瘥更作此方有神効

普濟方咽塞生瘡乾嘔頭痛食不下法同上無半夏

普濟方乳蛾治咽塞生瘡喉痺乳蛾

白丁香个以砂糖和作三九以一九綿裹含嚥即時遂愈甚者不過三九極有奇効

又方燈草以鹹鹵浸透入雞子殼中封固煨存性研細加

梁上倒掛塵及青魚膽明礬銅青點咽喉生乳蛾有神効

清咽太平丸門治膈上有火早間咯血兩頰常赤咽喉

李氏醫鑑卷之二 咽喉

小利諸火上逆故

本草備要主治註釋 末後多應驗方

莽草葉煎湯熱含漱喉牛膝治喉欬冬花 南星 貝母

薄荷 荆芥 半夏皆治玄參本腎藥而治上焦火細辛

白梅 貝母 葱白喉痺雞蘇 黃芩並治龍膽草治咽

大青草 蛇床子 葵藿子 甜瓜蒂 皂莢 冰片

木通治喉痺咽燈草燒灰吹喉砂仁散咽喉牛蒡子利

山豆根治喉癰射干治喉痺咽痛為要藥古方殺精草

治陽明風馬勃治喉痺蓬砂治喉痺含之噴汁初覺喉中

之膽礬醋調吐痰白礬 百草霜喉咽青魚膽喉痛

喉痺將死者以烏魚膽點入即愈喉痺下咽立効大能

人商陸治喉外良咽喉卒腫食飲不通和敷腫上佳胡

制淚治咽喉柿乾與霜治喉五倍子要藥紫苑能開

延○吞脫紙燒存性蜜丸實大杏仁治喉痺火炎乘

仁潤利而下行冰片治積聚喉痺○咽喉不利上藥

黑牽牛錢同炒香去牽牛一半為末防風末和勻每

一錢水調服○喉痺咽痛以醋探吐之○咽喉腫痛百

藥煎去黑蓬砂甘草白礬分為細末每服一錢食後米飲調

李氏醫鑑卷之二 咽喉

細細緩緩叩嚥○咽喉腫痛白藥末一龍腦香二分生蜜

和丸大實大每含嚥一九○膽礬明礬等分為細末點患

處喉蛾立愈神効果驗厚也

附別本方

硫黃不二散 治毒發於咽喉肉腐爛疼痛湯水難入

硫黃一錢花錢一為細末凉水一大酒杯調服立効

開關散 治喉痺腫痛

蜂房灰 白蠟等分為末吹入喉內或用乳香煎服五

又方 白蠟等分白礬半生半燒等分為末每以一錢用竹

瀝加薑汁調灌得吐頑痰立効小兒加薄荷 一方用白梅和九綿裹含之

神奇極驗方

大路旁小便處或缸邊或石上溺黃刮起陰陽瓦焙乾用壁土喜喜巢五七將紋銀一塊喜巢包裹鉗夾在燈火上

燒少頃去銀存灰溺黃末錢一水片麝香各分一喜喜灰和勻

用磁餅藏固喉痺喉蛾等症立愈

諸骨哽及穀芒誤吞諸物

穀賊尸咽喉中此因誤吞穀芒戟刺癢痛用脂麻炒研白

李氏醫鑑

卷之二

咽喉

兼

湯調下一方白飴頻食効 諸骨哽威靈仙砂仁砂糖醋

煮服立効 蓬砂含化虎骨為末水骨哽喉中六七日不

得出取鯉魚鱗皮燒作屑以化服之即出未出再服 青

魚膽療骨螻蛄俗名治骨哽 貫仲化骨橄欖嚼汁

見核研末急流水調服如無急 千金方食髮成瘕喉中如

流水用飴順嚥小頃服下亦効 砂仁化銅錢磁石研末

有虫上下者白馬尿飲之佳 羊頭骨可消鐵積善堂方

針鐵誤吞銅鐵羊脰骨錢三為末米飲下

言一女子誤吞一針入腹諸醫不能治一人教令煮蠶豆

同其煮食之針自大便出今人有誤吞金銀物者用之

皆効定救急 勃濟注後用治諸毒物和疏云

之良方也 合胡桃食一二片即消

本草備要止渴生津主治註釋

人參生津天冬治虛麥冬治虛乾葛同木通化津

為水源肺熱 苦參 黑參 白木 黃精 五味子 木

清則津液化 瓜 烏梅生津 枝子治津 桑葉 枸杞 棗仁 花粉

瓜 蔓生

附外科正宗治法看法以及論方

夫喉痺難屬於肺然所致有不同者自由虛火寒火之分

緊喉慢喉之別又咽為心肝腎呼吸之門飲食聲音吐

納之道此關係一身害人迅速故曰走馬看咽喉不待少

頃也假如虛火者色淡微腫脈亦微細小便清白大便自

利此因思慮過多中氣不足脾氣不能中護虛火易致上

炎此恙先從咽嚥乾燥飲食妨碍咳吐痰涎呼吸不利斑

生苔蘚壘若蝦皮有毛草常刺喉中又如硬物噎于咽

下嘔吐酸水喉出甜涎甚則舌上白胎唇生響石聲音嘶

啞喘急多痰以上等症皆出于虛火元氣不足中來治此

不可誤投涼藥上痛者屬陰虛四物湯加黃柏知母桔梗

味勞子玄參牛後痛者屬陰虛四物湯加黃柏知母桔梗

玄參加服不効者必加姜附以為引導亦為佐治之法也

定火者過飲酒縱食膏粱疊疊重食飽食辛辣多致積

熱于中久則火動痰生發為咽腫甚者風痰上壅咽門閉

塞少頃湯水不入聲不出此為咽閉緊喉風也用藥不

及事先用針刺喉間發世毒血隨用桐油饒雞翎探吐稠

涎務使痰毒盡出盡則咽門得鬆湯藥可入諸聲得出乃止內

服清利利肺湯疎利餘毒如牙關緊閉難入必當尖刺少

商出血其用自開如針刺探吐無痰聲如鐵鏡鼻掀痰喘

真死候也又有喉癰喉痺乳蛾上腭癰等症喉門半塞半

開其病雖內而痛標當用金鎖匙吐出血涎利痛湯推

蕩積熱膿腫痛者開之損而痛者益之其患自安凡喉痺

不刺血喉風下倒痰癰不放膿喉痺乳蛾不刺灸針烙此

皆非法又有喉火勞瘦便咽痛者無法可治○少商穴有

手掌外側去爪甲角  
二分是穴稜針刺血

### 咽喉看法

初起紅色腫痛語聲清朗亦無表裏之症相兼者輕已成  
腫痛咽喉半閉半開咯血痰涎飲食稍進者順咽喉腫閉  
牙關緊閉言語不清痰壅氣急聲小者險咽喉閉痰涎  
壅塞口噤不開探吐不出聲喘者死時發之後毒結咽喉  
腫痛腐爛吐納不堪聲啞者重久嗽痰火  
虛陽上攻咳傷咽喉但見聲嘶面紅者死

### 治法

初起腫痛寒熱交作頭眩拘急者邪在表也宜發散初起  
腫痛發熱脈有力而便秘者邪在內也宜下之腫痛寒熱  
口乾作渴脈洪大而有力量者宜發表攻裏腫痛痰涎壅  
面紅口乾邪在上也宜探吐之痰涎壅塞氣急口噤先刺  
少商後行吐法已成脹痛咽喉塗塞湯水不入膿已成也  
宜急刺之腫痛微紅脈虛無力午後甚者屬陰虛宜滋陰

### 李氏醫鑑

卷之二

喉咽

主

除火腫痛色白略吐多涎上  
午甚者屬陽虛宜補中益氣

### 清咽利膈湯

治積熱咽喉腫痛痰涎壅盛及乳蛾喉痺喉

癰重舌木舌或胸膈不利煩躁飲冷大便秘結等症

連翹

黃芩

甘草

桔梗

荊芥

防風

山枝

薄荷

荷 金銀花

黃連

茅子

玄參

錢 各一

大黃朴硝

錢 各二

### 玄參解毒湯

治咽喉腫痛已經吐下飲食不利及餘腫不

消

玄參

山枝

甘草

黃芩

桔梗

葛根

生地

荆

芥 各一

加淡竹葉燈心各二十件

理中湯 治中氣不足虛火上攻以致咽間乾燥作痛吐酸

妨碍及脾胃不健等症

### 治喉烏龍散

治咽喉腫痛喉風喉癰乳蛾等症並効惟纏

喉喉風牙關緊閉者不可與虛火久病咽痛者不可與

猪牙皂角

七條去

皮弦 為粗末水一鍾煎五分入乳三匙冷服

即時非吐即瀉

### 金鎖匙

治喉痺纏喉風痰壅塞口噤不開湯水難入

焰硝

一兩

五錢 硼砂

五錢 片腦

一白蠟

錢 雄黃

錢 各另研為末

和勻以筒吹患處痰涎即出如痛腫仍不消急針患處去

### 李氏醫鑑

卷之二

四疾

主

### 惡血服煎藥

桐油錢 治喉風喉痺其症先兩日胸膈氣急呼吸短促

然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治

先用溫湯半碗加入桐油三四匙攪勻用硬雞翎蘸油探

入喉中連探四五次其痰湧出再探再吐以人甦聲高為

度後服清咽利膈之劑

神効吹喉散 治纏喉風閉塞及乳蛾喉痺重舌木舌等症

薄荷

殭蚕

青黛

朴硝

白礬

火硝

黃連

硼

砂 各五

上藥各為細末臘月初一日取雄猪膽七八个  
○ 倒出膽汁小生和上藥拌勻復灌膽液以線扎

頭贈外用青缸紙包裹將地掘一孔闊深一尺上用竹竿懸空橫釣上上用板鋪用土蓋蓋候至立春口取出掛風處陰乾去脂皮青紙磁罐密收每藥一兩加水片三分同研極細吹神効

水硼散 治咽喉口齒新久腫痛及久嗽痰火咽啞作痛

水片五分 玄明粉 硼砂各五錢 研極細吹搽患上甚者日五六次最効

治喉瘡喉痺等症經驗方

五倍子一個入明礬半滴入銀罐內濕紙蓋封其口緩火燒存性連倍子研極細加入兒茶硼砂青黛甘草各爲細末入水片一分吹極効

經驗方 治喉口腫痛不能進水

李氏醫鑑 卷之二 咽喉

用鼓提草搗汁和乳灌入鼻中立愈

又方 射干 山豆根 甘草 銀花 蘇薄荷葉 共研

細末用土牛膝根搗汁和丸如彈子大泡水含漱去涎

又方 杜牛膝根汁 糯米九粒煎汁和入嚥下立愈

喉中瘡胞經驗方 用手指甲括屑吹入瘡胞立消

方侍郎咽喉腫痛方

百藥煎去黑皮 硼砂 甘草 生白礬 等分爲細末每服

一錢食後米飲調細細呷嚥

聲音

肺屬金聲之所從出也有物質之則金不鳴燥濕除痰則金清而聲自開矣有久病聲嘶而啞者是肺氣已絕而損也難治○又有聲啞屬肺熱甚

清音喻化丸 治肺氣受傷聲音雌啞或久咳嗽傷聲致啞亦宜

訶子 真阿膠 天門冬鹽水炮炒 知母同上各五錢 麥門冬 白

茯苓 黃柏蜜炒 當歸 生地 熟地各一兩 人參三錢 烏梅

人乳 牛乳 梨汁各一碗共熬稠膏 共爲細末和入前藥和煉

蜜搗成丸如鷄頭實大每用一丸仰臥喻化日用三丸如

李氏醫鑑 卷之二 聲音

改作小丸每服一錢訶子煎湯或蘿蔔湯送下

甘桔湯 加訶子治失音加半夏治聲不出

出聲音方 訶子炮去核 木通各一兩 甘遂五錢 咬咀用水三升煎

至升半入生地汁一合再煎數沸放溫分六服食後日作

半料

六味地黃丸 治失音

訶子清音湯中風

本草備要主治註釋

薄荷治失音 木通治失音能清肺金 通草治失音淡通竅 馬勃治失音清

肺解 蠶 蟬 風火音 桔梗 半夏 荊芥 細辛  
 俱治 河子 則音開 不菖蒲 出聲 荊瀝 竹瀝 風失音  
 失音 則音開 不菖蒲 出聲 荊瀝 竹瀝 風失音  
 本草經疏 暴瘡忌宜 瘡音因瘡 瘡不語也

忌補 欬 升發 閉氣 辛燥 溫熱

宜降氣 發音聲 苦 甘寒 辛涼 鹹寒

蘇子 枇杷葉 貝母 桔梗 百部 竹瀝 梨汁

大冬 麥冬 甘草 薄荷 玄參 桑白皮 童便

儲氣

六腑氣儲血儲痰火儲濕儲食儲也六者之中以氣爲主氣行則諸散矣吞酸嘔吐由下痰火飲食不消由氣不運行丹溪曰氣升則食自降六腑不言風寒者風寒儲則爲熱也鬱者結聚而不得發越當升者不得升當降者不得降常變化者不得變化則所以傳化失常而病見矣氣者動則氣喘寸口沉滑熱儲者昏替便赤脉沉數血儲者四肢無力能食食儲者噎酸腹飽不能食寸口緊盛經曰本儲達之火儲發之土儲奪之金儲泄之木儲折之達之乃吐之令其條達也發之乃汗之令其疏散也奪之乃下之令其無壅滯也泄之乃滲泄解表利小便也折之謂制其衝逆也目門濟生羊肝丸後河間論解氣血諸儲藥味甚詳宜參看經曰儲爲燥淫燥乃陽明秋金之位金屬于肺又儲病多在中焦中焦脾胃也水穀之海五臟六腑之主四藏一有不平則中氣不得其和而先儲矣越鞠丸兼升降者將欲升之必先降之將欲降之必先升之

李氏醫鑑

卷之二

儲氣

內蒼木雄壯辛烈固胃強脾能徑入諸經疎泄陽明之濕通行敏瀟香附寬中快氣之藥下氣最速一升一降故儲散而平川芎足厥陰藥直達三焦上行頭目下行血海爲通陰陽血氣之使不但開中焦而已胃主行氣于三陽脾主行氣于二陰脾胃既布木穀之氣得行則陰陽藏府不受燥金之儲皆由胃氣而得通利矣或問丹溪曰脉訣云熱則生氣冷則生氣吾子引仲景之言而斥其非然則諸氣諸飲嘔吐吞酸反胃諸病將無寒症耶曰五藏各有火五志激之其火隨起若諸寒爲病必須身犯寒氣口食寒物非若諸大病自內作所以氣病寒者無一二入身以氣爲主氣盛則強虛則衰逆則病絕則死矣經曰怒則氣上恐則氣下喜則氣和憂則氣閉驚則氣亂思則氣結勞則氣耗此七情之氣也否附 音音茂月爲君隨症而加升降消導之藥 不明也

越鞠丸

統治六儲胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不消

杏附

醋炒 蒼朮 油浸 炒

川芎

神曲 枝子 黑等分 麴糊爲丸

如濕鬱加茯苓白芷火鬱加青礬炭鬱加南星半夏瓜蒌

海石血鬱加桃仁紅花氣鬱加木香枳榔食鬱加山楂砂

仁痰寒加萊菔莢又或春加防風夏加苦參冬加吳茱萸

所謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之也

解之謂也香附開氣鬱者木燥溫鬱川芎調血鬱者

七氣湯治七情氣鬱痰涎結聚咯不出嚥不下胸滿喘急

或咳或嘔或攻衝作痛七氣者寒熱喜怒憂思也七情

降故有痞滿喘咳衝痛之病令人氣結痰聚陰陽不得升

半夏姜汁炒厚朴姜汁炒茯苓錢四紫蘇錢二加姜棗煎

李氏醫鑑卷之二 胃 三

氣鬱則痰聚故散鬱必以行氣化痰為先氣行痰去則結鬱解而諸症自平矣

白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯治七情鬱結陰陽反戾

吐利交作

四七湯治七情氣鬱痰涎結聚虛冷上氣或心腹絞痛或

膨脹喘急

人參官桂半夏甘草五分加薑蔥心腹痛加延胡索

延胡索能行血中

氣鬱氣中血滯

李士材曰夫七情過極皆傷其氣丹溪以越鞠九主之而

此獨異者蓋鬱久則濁氣閉塞而清氣日薄矣故雖痛雖

膨而不用木香枳殼用人參以壯主之藏官桂以制謀慮

之官鬱久肝火必盛桂能平肝其性辛溫疏氣其貴湯名

四七丸以四味治七情也經云寒則氣收宜辛散之甘緩之此治氣虛寒鬱氣也

妙香散治鬱結則成鬱結

四磨湯治七情鬱結上氣喘急此方降中兼

人參烏藥沉香枳榔各磨濃汁七分合煎

健脾丸治脾氣鬱滯飲食不消

名舒肝健脾丸治脾氣鬱滯飲食不消

木香枳榔九散鬱破結

保和丸合越鞠丸扶脾開鬱

蘇子降氣湯散鬱和中

李氏醫鑑卷之二 胃 三

正氣天香散治一切諸氣氣上湊心胸攻築脇

肋刺痛

本草備要主治註釋

薑黃理血中之氣下氣破血川芎助清陽開諸鬱氣升則

使澤蘭辛散鬱蘭花葉解鬱艾葉溫中鬱金散肝乾葛散

升麻升陽鬱子開胃青黛散五藏益智仁能開鬱鬱結

草寇開鬱附片木香能升降諸氣治一切氣滯氣結甘松開諸鬱子

貝母辛散肺鬱心火降則肺夏桂枝散結氣有益母子順

氣寧功專散鬱解結

疏通之力

六

六

卷蘭子 行血散結 散中有補 三義 散一切  
 開白薇 散結 葱 陽通上下陰 藟子 泄下焦大 癰垂 散結 琥珀  
 志肉 並散 沉香 檀香 並治 醋 厚朴 訶子 同陳皮 則下

肩背胸膈 兼腹與少腹

經云西風生於秋病在肺肺在肩背又云肺病者喘咳逆  
 氣肩背痛汗出又云肺氣有餘則肩背痛風寒汗出虛則  
 肩背痛而寒少氣不足則肩背痛又云少陰司天熱淫所勝病  
 肩背痛不可回視此小腸氣鬱以風藥散之○常肩背一片  
 冷痛是有積也當消之○膀胱腎間冷氣攻衝背脊亦致  
 作痛○凡胸中滿心下滿者皆氣也腹中滿者或燥糞或  
 宿食青陽出上竅故上滿者乃氣也而非物濁陰出下竅  
 故下滿者是物也而非氣但是熱積惟冷結膀胱少腹滿  
 一症為寒有手足厥冷為可辨○痰滿亦有在上焦者○  
 胸膈逆滿由中氣不足作脹者宜補之而脹自除經所謂  
 勞因塞用也俗醫泥于作飽不敢用參不知少用反滋壅  
 多服則宜通補之正所以導之也○初庵曰脹滿症多不  
 同清補貴得其宜氣虛宜補氣血虛宜補血食積宜消導  
 痰滯宜行痰挾熱宜清熱濕盛宜利濕寒鬱者散寒怒鬱  
 者行氣蓄血者行血不宜專用行散藥然亦有服參者而

李氏醫鑑

卷之二

肩背胸膈

辛

反甚者以挾火挾食不能藥作脾虛氣弱治也○膈者肝  
 膽二經往來之道其火上冲則胃脘痛橫行則兩脇痛官  
 桂枝枝能橫行兩脇以開之而痛方止大抵痰入肝則脇  
 病痛青皮同枳殼肉桂川芎治左脇痛○戴氏曰房勞之  
 人胸膈多有隱痛此腎虛不能納氣氣虛不能生血之故  
 氣與血循水也盛則流通暢達弱則鮮有不阻滯壅塞者  
 所以作痛宜破固礙之類補腎歸脾之類補血若尋常  
 脇痛治則殆矣○李士材曰肝合于左脇故膈多屬于肝  
 然經筋所過挾邪而痛者自有多端不可執也且左右者  
 陰陽之道路也故肝主陰血而屬于左脇肺主陽氣而屬  
 于右脇左脇多怒傷或留血作痛右脇多痰積或氣鬱作  
 痛其間七情六淫之思飲食勞動之傷皆足以致之氣  
 聚血聚雖無關于血也○肩背風熱乘肺而痛者宜荊  
 芥防風牛蒡枳殼桔梗花柳黃芩○如短氣小便自遺乾  
 滿中流氣渴熱者當歸枯痛湯用羌活防風升麻乾  
 葛人參白朮當歸甘草澤瀉瀉肉桂知母黃芩茵陳苦參蒼  
 朮○痰飲者導痰湯腎氣逆上者沉香肉桂茯苓牛膝小

荷香川椒青鹽 傷寒少陽陽明合用小柴胡湯不大便者加枳殼若不因傷寒而胸膈痞滿熱結便結細辛川芎防風乾葛甘草益母草為胸膈的劑所以諸方皆用之胸膈而氣喘分氣紫蘇飲紫蘇桑皮五味桔梗草果腹皮茯苓陳皮甘草生薑食鹽煎服 怒傷肝氣柴胡疎肝散 柴胡陳皮川芎香附白芍枳殼甘草煎服 悲傷肝氣宜推氣散 薑黃枳殼桂心甘草為末薑棗湯送下○死血痛者日輕夜重或午後熱脈短澀桃仁承氣湯加白芥子紫甲青皮如跌傷胸膈亦宜上方 痰飲脈沉弦滑導痰湯加白芥子甚者控涎湯下之 食積胸膈痛必有一條扛起香砂枳殼白木神曲厚朴山查麥芽 結痰癖而痛者黃九雄黃一兩巴豆五錢去皮心研如泥入白麵二兩水九梧椰子大滾漿煮十二丸入冷漿湯沉冷即用冷漿下一丸一日十二時盡十二丸微利為度不必盡劑

李氏醫鑑

卷之二

胃脘痛

三

瓜蒌薤白白酒湯

治胸痺喘息咳嗽胸背痛短氣胸中者

分按喘息而咳嗽諸陽受氣于胸中轉行于背氣痺不行故胸背為痛而短氣

瓜蒌 薤白 三白酒

此上焦膈中藥也 膈中兩乳中膈

使之官喜樂出焉○喻嘉言曰胸中陽氣如離照當空曠然無外設地氣一上則室塞有加故知胸痺者陰氣上逆

之候也仲景微則薤白白酒以益其陽甚則用附子干姜以清其陰世醫不知胸痺為何病皆用草蔻木香訶子三

其胸中之陽亦相懸矣○本方加半夏名瓜蒌薤白半夏湯治胸痺不得臥心痛徹背不得臥故本方除白酒加枳

實厚朴桂枝名枳實薤白桂枝湯治胸痺氣結在胸膈

滿脇下逆搶心

木香順氣湯

治陰陽壅滯氣不宜通胸膈痞悶腹脹

六便不利胸膈痞悶者即胃受傷中氣不運不能升降濁便不利者陽不

陰不降也

木香 草蔻 益智仁 蒼朮 厚朴 青皮 陳皮

半夏 茯苓 澤瀉 升麻 柴胡 當歸 五公此皆氣

故重川芎歸以濡其血 共成溫脾消脹之功也

肥氣丸 治肝積在左脇下有頭足令人發咳痰瘕

不已

息責丸 治肺積在右脇下令人洒淅寒熱喘咳

李氏醫鑑 卷之二

肺癰 秋冬黃連 連減半

大黃附子湯 治脇下偏痛發熱脈弦緊此寒也以溫藥下

溫藥下其寒後 人罕識其指

大黃 細辛 附子 各二兩 附子一枚

左金丸 又名朱 治肝火燥盛左脇作痛

黃連 吳茱萸 水丸

肝火燥盛者肝之子是也肝火之子是也故用黃連瀉心清火為使使不迴金能制木則肝火自平矣吳茱萸辛熱能入肝以散肝氣故能引熱下行故以反佐一寒一熱者正治也 本方加炒蒼朮陳皮亦名吳茱萸連丸



治同本方用黃連一味吳茱萸浸一宿為丸名抑青丸大

瀉肝火治左脇痛

順氣導痰湯 治痰結胸滿喘咳上氣

橘紅 茯苓 半夏 枳實 木香

香附 二陳加胆星枳實各導痰湯治頑痰膠固

溫中化痰湯 二陳除甘草加干姜姜汁糊丸 治胸膈寒

痰不快 龍膽瀉肝湯 治脇痛 脇者肝胆之部

七氣湯 治胸滿喘急或咳或嘔或攻衝作痛

正氣天香散 治一切諸氣氣上凌心心胸攻築脇肋刺痛

李氏醫鑑 卷之二 胃脘痛

逍遙散 治胸脇痛 越鞠丸 治胸膈痞悶

當歸龍薈丸 治兩脇痛引少腹

桂苓甘木湯 治心下有痰飲胸脇支滿 痰飲積于厥陰心

茯苓 桂枝 白朮 甘草

干姜湯 治寒症胸腹脹滿 白朮 干姜良姜 各一兩

茱萸湯 治腹脇冷寒脹滿 吳茱萸 和米粥食之

川椒茶 治同前 細茶 川椒 同煎

丁香熟水 治同前 用丁香 搥碎入壺傾上滾水其

香儻然大能快脾利氣定痛辟寒

本草備要主治註釋

白朮 蒼朮 蘇枳 麥芽 甘草得茯苓則不滋滿而

除濕 桔梗 治胸膈刺痛白全 治胸膈半夏 下逆氣 川芎 治

胸膈 白芍 治胸膈 黃芩 治胸膈 枳實 治胸膈 黃芩 治胸膈

胸膈 牛黃子 治胸膈 薑黃 治胸膈 桂心 治胸膈 地骨皮 治胸膈

殼實 治胸膈 無積血心下不痞滿濁氣在上則 厚朴與

枳實大黃同用 實則清與橘皮蒼朮 同用則 枳實 大腹皮

丁香 均治 烏藥 能疏胸腹 吳茱萸 亦治服滿東垣曰濁陰

不可 花柳 葛子 能除 陳皮 利胸膈 青皮 治左脇 薑皮 治

李氏醫鑑 卷之二 胃脘痛

滿 百合 治心下 薤白 治胸膈 柴胡 治胸膈 薑子 治胸膈 鱉甲 治

胸膈 桂枝 治胸膈 風屬肝桂 青皮同枳殼肉桂川

芎 治心下 枳殼 治心下 枳殼 治心下 枳殼 治心下

八月 胃脘痛并虫噤心腹痛腸鳴雷鳴少腹

李氏醫書

心腹

大腹痛者多屬食積外邪達臍痛者屬痰火積熱臍下少腹痛者屬寒或瘀血或溺澀○痛居胃脘曰寒痛熱痛瀝痛痰痛氣痛血痛食痛蚊痛悸痛蓋心君不易受邪真心痛者手足青過腕節朝發夕死○凡心口一點痛俗言心氣痛非也乃胃脘有滯或有虫及因怒因寒而起以良姜酒洗七次香附醋洗七次焙研因寒者姜二錢附一錢寒怒兼者每一錢五分米飲加姜汁一匙鹽少許服○丹溪曰有食熱物及鬱怒致血留胃口作痛者宜加韭汁和五苓散爲丸空心荷香湯下○月溪曰治心痛當分新久若初起因寒因食宜當溫散久則鬱而成熱若用溫劑不助痛添病○古方用山枝爲君熱藥爲之向導則邪易伏此病雖日久不食不死若痛止恣食必再作也○古人治心痛恒用枝子此爲火氣上逆氣不得下者設也若虛寒者禁用縱常用者必妙透方用○陰毒腹痛陰症厥逆用葱白安遠臍上以緩火慰之○心下滿胸中滿少腹滿論載肩背胸脇門○小建中治腹痛者以木來尅土取白芍爲君土中瀉木也理中湯治腹痛者以水來侮土取干姜爲君土中瀉水也平胃散治腹痛自利者取蒼朮爲君瀉土

平胃散

半夏

名金不換止氣散治胃寒腹痛嘔吐本方

合二陳加藿香名除濕湯治傷濕腹痛身重足軟大便秘

寫本方一兩加桑白皮一兩名對金飲子治脾胃受濕腹

脹身重飲食不進肢痠膚腫本方除蒼朮加水香薷藿香

姜茯苓名厚朴溫中湯治脾胃虛寒心腹脹滿及火之客

寒犯胃時作疼痛。散以辛熱佐以苦甘。滲以

本氏醫鑑

卷之

心腹

四七湯 治虛冷上氣心腹絞痛或膨脹喘急

人參 官桂 半夏 甘草 五加皮 煨心腹 痛口疳 疔瘡

能行血中氣

附六一湯 治胃元痛寒因熱

用也

單黃連煎服

治傷瀉熱之物不得施化痞悶不安腹

腹痛積滯泄瀉

治胸腹積滯痞滿結痢一便不通

積散門  
治胸滿惡食嘔吐腹痛

脉黃白木湯大便 治膽有動氣少腹急痛

水香順氣湯方論見 治腹脇脹滿

逍遙散 治心腹膨脹

香蘇飲 加延胡索酒杯 治心中卒痛

腎着丸腰腎 治傷濕身重腹痛病在下焦

小建中湯虛損 治腹中急痛并裏急腹痛

五苓散 加非汁和丸空心茴香湯下 治腎氣上攻心痛

蜀痛散 治心腹上下及胃脘并婦人血氣痛至効

荔枝核煨存性 香附醋炒 爲末每服二錢鹽湯或米飲下

李氏醫鑑 卷之二

古方 治心腹痛

白芍錢四 甘草錢二 又用等分名芍藥甘草湯治同初起口腹

不從逆于肉裏白芍能行營氣甘草能飲逆

氣又痛爲肝木尅脾土白芍能伐肝故也

本草備要主治註釋

蕪荑 治心腹冷積癥痛和麩炒 桔梗 治腹痛腸鳴由

治陰毒 紫草 治心腹邪氣 蒲黃 祛心腹熱 同五靈脂 治心

氣一切 諸金 莢木 丹參 治心 莢本 治心腹中急痛

爲黃連 得黃芩厚朴 治腹 草薢 治客寒 木香 治九種

良姜 治胃脘 罌粟殼茯苓 治心腹 桂心 治腹內冷痛九種

訶子 治腹脹 威靈仙 治心腹 山查 治腹 甘松 治心腹卒

麥 治腹痛腸鳴 鵝虱 治蛇蟻心腹痛 山豆根 治腹 藟子 止

痛 白芥子 治痛氣行 薑 治寒 斤 治心下 地漿 治腹內熱

入腹 夜明砂 治血氣 香附 治一切 海螵蛸 治環臍 蜜 止心

以去急 厚朴 治冷 訶子得陳皮砂仁 治冷氣 丁香 治冷

乳香 治心 麝仁 治心腹 沉香 治心 吳茱萸 治陰毒 花柳 治

腹中痛又治 胡椒 治陰毒 核桃 治心腹 荔枝核 散毒氣巴

戟天 治小腹痛 胡荽 通小 茴香 治腹 生地 止心腹 赤芍

艾葉 川芎 當歸 治心 仙茅 治心腹冷 牛膝 治

李氏醫鑑 卷之二

腹痛 莢 治胃中熱瘀血 罌粟殼 治心 白芷 治腹內冷痛九種

此州之

李氏醫鑑卷之三

身證 四肢肩背并諸麻木

時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到入心則迷成癰癩入肺則寒痰為喘咳背脊冷入肝則筋痛筋乾喉寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引釣痛入皮肉則癢癢癰腫無不皆然此方並以控涎丹主之殊有奇効  
先受之濕則下先受之濕至兩相搏激注經絡流閉節入肌骨無處不到則無處不病風濕則微腫濕之為病者而不疼者于太陰則頭項腰脊痛着于太陰則肩背痛着于陰陽之經則一身盡痛惟着故痛而且重也  
治勝濕湯主之○此飲流入四肢令人肩背痠痛兩手罷軟候以爲風則非其治宜導痰湯加木香黃芩各五分輕者茯苓物湯各半貼和服  
遍身腫熱疼痛拘急足冷皆伏熱濕血血屬于心宜木通以通心裏則經絡流行也  
十疳瘰癧

李氏醫鑑

卷之三

身證

木氣血不足或有濕痰死血在胃中也○胸膈痛者氣鬱周身痛或關節痛遇陰寒即發者濕鬱也能食而四肢無力者血鬱也

甘神附子湯

治風濕相搏一身煩痛汗出惡風小便不利或身微腫

白朮

附子一枚 每服五錢姜五片棗一枚

茯苓丸

治痰停中脘兩臂疼痛 飲伏于內痰帶中脘

半夏曲

茯苓 枳壳 五錢 風化硝 二錢半 如一時未

竹葉中少時盛水置當風處即乾如苦硝制取亦可○論嘉言曰痰藥雖多此方甚効

控涎丹 一名妙應

治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引釣痛走身不定或手足冷痺氣脈不通此乃痰涎在胸膈上下誤認癰癧非也

下誤認癰癧非也

甘遂 心大戟 皮白芥子 等分爲末糊丸臨臥姜湯下五

七丸至十九丸痰猛加九丸此乃治痰之本也痰之本水也能泚藏府水濕甘遂能行經隧水濕直達水氣所結之處以攻決爲用白芥子能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也

滋燥養榮湯

治火燥肺金血虛外燥皮膚皺揭筋急

瓜枯或大便風秘

肺主皮毛肝主筋爪肝血不足風熱勝而金燥故外見皮毛枯槁肌膚燥癢內

李氏醫鑑

卷之三

身證

有筋急便秘之症

當歸 酒洗 二錢 生地 熟地 白芍 炒 黃芩 炒 秦艽 一錢 防風 五

甘草

分

加味二陳湯 治酒家手臂重痛麻木

陳皮 半夏 蒼朮 枳壳 片子 姜黃

羌活勝濕湯

治濕氣在表頭痛頭重或腰脊重痛或

一身盡痛微熱昏倦

當歸拈痛湯

治濕熱相搏肢節煩痛肩背沉重或

身疼痛

麻黃加木湯 治濕家身體煩痛宜發

麻黃 杏仁 甘遂 石膏 加白木

六君子湯 加麥冬 竹瀝 治四肢不舉脾主四肢加柴胡 芍藥

芍藥

十味人參散 治身體倦怠

五苓散 治身痛身重濕勝所致 合人參敗毒散名五積交加

散 治寒濕身體重痛

桂枝湯除甘草加黃耆三兩 治血痺身體不仁如風痺狀

六君子湯 加竹瀝 薑汁 治半身不遂在右者屬氣虛

李氏醫鑑 卷之三 身痛

升陽益胃湯脾胃 治體腫節痛濕盛而陰邪勝也

腎着湯腰腎 治傷濕身腫腹痛腰冷病在下焦

松節散 治一切筋變疼痛

扶神心木名黃松 節一兩 乳香一錢 石 每服二錢木瓜酒下乳香能舒筋

筋木瓜

麻黃白木湯大便 治身體面俱腫色黃麻木身重如山喘促

無力吐痰涎沫發熱時躁躁亡振寒

十棗湯攻裏 加減名三花神佑九翻胃 治壯實人風痰癰

熱肢體麻痺走注疼痛濕熱腫滿氣血壅滯不得宜通服

二九後轉加痛悶此痰涎壅塞 再加二九快利則止加參黃大瀉氣血之濕加輕粉無礙 不入以去痰積虛人不可輕用

本草備要主治註釋

丹參 治身痛 南星 治身痛 菴蘭子 治腰膝骨痛 天麻 通血脈

血不通身拘攣此 茵芋 上羌活 利關節 百節之痛若 防風 治

痛項強周 荊芥 治身痛 通血脈 細辛 治身痛 蒼耳子 治身痛

下行足膝外逆皮膚骨痛 薤白 治身痛 附子 治身痛

通身痠痛作浴湯佳 善發汗 薤白 治身痛 附子 治身痛

片子者能克入手 已能行十二經通脈理利九竅治水

木瓜 舒利乳香 能伸 白鮮皮 通關節治痰入 附子 治身痛

解 筋風濕 蛇床子 治腰痠體痛祛風燥 土茯苓 治身痛

氣阻滯筋 慈石 治腰弱周痺 石硫黃 治足寒 阿膠 治身痛

虎骨 追風健骨定痛頭風用頭骨手足風 原蠶砂 治風濕

節不隨皮膚頑痺腰脚冷痛各從其類也 扁柏葉 治風濕

炒熱烈患處亦良用治風炒黃浸酒 扁柏葉 治風濕

十二經八脈氣分生則上行胸膈外 仙茅 治風濕

桑葉 燥濕去風 枳實 枳殼 通利關節 治風濕

皮 療筋骨 嬰粟殼 治筋骨

諸痿 痿痺痛風 麻木 筋急 拘攣

朱丹溪曰今世風病大率與諸痿症混同論治古聖論風  
後條目不同治法亦異夫風病外感善行數變其病多實  
其皆感風寒濕熱聚而成其病多虛其皆感風寒濕熱聚  
不舉足痿舌強痰涎有聲皆屬于土悉是濕熱之病實  
諸痿論治大抵只宜補養若以外感風邪治之能免實  
虛虛之禍乎或曰內經治痿獨取陽明何也曰只諸痿生  
于肺熱一語已見大意金體燥而居上土氣畏火者也土  
性溫而居中主四肢長木者也嗜慾不節則水失所養火  
寡于畏而侮所不勝肺得火邪而熱矣肺受熱邪則金失  
所養木寡于畏而侮所不勝脾得木邪而傷矣脾熱則土  
能管攝一身脾傷則四肢不為人用而諸痿之病作矣  
南方則肺金清而東方不寔何脾傷之有補北方則心火  
降而肺金不虛何肺熱之有故陽明是則宗筋潤而束骨  
筋之病以陽明為本陽明主潤宗筋主束骨而利機關者  
李氏醫鑑 卷之三 痿痺 五

此陽明虛則宗筋弛緩故治痿獨取陽明經曰肺熱葉焦  
發為痿痺蓋肺者傳相之官治節出焉陽明濕熱上蒸于  
筋則肺熱葉焦氣無所主而失其治節故痿痺口筋骨緩  
緩足不任地曰痿風寒濕客于肌肉血脈曰痺其風氣勝  
者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺以冬遇此  
陰寒者為風痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脉痺以  
秋遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺痺在于骨則重在  
皮則寒痛者寒氣多也其寒者陽氣少陰氣多也其熱者  
陽氣多陰氣少也故為痺熱其多汗而濡者濕也陽氣少  
陰氣盛故汗出而濡也濕流關節痛而煩曰濕痺周  
身痠痺曰周痺由氣血不足七竅失其榮也丹主之準繩曰  
凡風痺偏枯未有不因氣血不足氣不周而病者也治之不用黃  
耆為君人參歸芍為臣臣防風桂枝為佐助滋潤竹瀝黃  
汁乳汁非汁之屬為佐而從維帶于烏附羌獨以潤而  
耗衛如此死者定醫殺之也風痺痺病多難愈故世俗每  
以風痺有痛風而不痛者則為不仁此氣血兩虛也

也 考 竊

加重矣 肝主筋血不足則筋痿故步履維艱也虎  
筋不束骨則弛長而痿二妙散為治痿要藥然亦有氣虛  
血虛脾虛虛火死血之不一宜隨症施治二妙散加牛  
膝為三妙散 思想無窮人房太甚發為筋痿我子龍骨  
桑螵蛸能治之 痛風當分新久新痛屬寒宜辛溫藥久  
痛屬熱宜清涼藥所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜  
順氣清痰搜風散濕滋養血去瘀為要 濕熱流于肢節之  
間腫痛濕熱清風散濕汗多屬風風濕清風散濕汗多屬  
指麻木亦是胃中有濕痰死血脾主四肢故也痛風有風  
熱風濕濕熱痰瘀血虛虛虛之異桂枝用引經 痺在  
于骨則體重在脉則血虛在筋則拘攣在肉則不仁在皮  
則寒 手足不隨人用曰風痺痺入經絡則麻痺痺入  
木為風三尺童子皆知之細核則有分別如坐久亦麻木  
純然亦麻木非有風邪乃氣不行也當補肺氣麻木自去  
矣胡庵曰因其氣虛故風邪入而踞之所以風為虛象氣  
虛是其本也 筋寒則急熱則弛然寒濕久留亦  
變為熱又有熱氣薰蒸水液不行久而成濕者蓋仁去濕  
李氏醫鑑 卷之三 痿痺 六

也 考 竊

要藥因寒因熱皆可也 熱勝則傷血血不營筋則要  
短而拘攣手足拘攣風燥其筋而血不濡也風寒濕三者  
在筋則拘攣 項背拘攣急風也腰沉重濕也營衛虛而風  
濕干之故或拘攣急或拘攣緩或拘攣重而舉動難也經曰  
營虛則不仁衛虛則不用不仁皮膚不仁痛痒也不用手  
足不為人用也 岐伯曰中風大法有因一日偏枯半身  
不遂也二曰風痺身無疼痛四肢不收也三曰風癱奄忽  
不知人也四曰風痺諸痺類風狀也 痺者血病行血軟  
目愈  
清燥湯 治肺金受濕熱之邪痿痺喘促胸滿少食色白毛  
敗頭眩體重身痛肢倦口渴便秘 火盛乾金肺失治節故  
體重也火上升肺故喘促肺主皮毛故色白毛敗濕熱填于  
膈中故胸滿重身痛明則食少上升于頭則眩在于身則  
體重流于四肢則身痛肺受火傷大氣不能下降勝於絕  
其化源故口渴便秘赤言曰燥與濕相反者也方名清燥

而以上湯為百勝非東  
垣其過人之識不及此

黃耆錢 蒼朮錢 白朮錢 陳皮 澤瀉五 人參 升麻三

茯苓 當歸 生地 麥冬 甘草 神麴 黃柏酒

猪苓 柴胡 黃連分 五味子九 每服五錢

黃豚丸 痞氣丸痞滿 除吳萸白朮砂仁人參乾姜川椒黃

芥茵陳加石菖蒲丁香附子苦楝延胡獨活全蝎淡鹽湯

下治腎積發於小腹上至心下若豚狀上下無時令人喘

咳骨痿

龍膽瀉肝湯兄耳 治筋痿陰汗肝主筋熱 一方除當歸

李氏醫鑑 卷之三 痿痺 七

生地木通澤瀉車前加人參五味天冬麥冬黃連知母亦

名龍膽瀉肝湯治筋痿急口苦爪枯

葛根丸 治筋痿不起肝主筋熱 則縱故痿

龍膽草 山枝炒 大黃酒 川芎 當歸酒 防風 等分蜜

九竹葉湯下

補肝湯 治陰汗如水陰冷如水脚痿無力

清暑益氣湯除白朮青皮麥冬五味加茯苓猪苓羌活防

風連翅知母柴胡

腎着湯腰腎門 治胞痺膀胱熱痛滴於小便上為清涕

風寒濕邪客于胞中氣不能化故水道不通足太陽上額

絡腦太陽經氣不得下行上入腦而流于鼻則為清涕

傳信方腰腎 治風壓頭痺腰膝疼痛

獨活湯風 治中風身輕痛項背拘急手足冷痺腰膝沉

重舉動難艱 黃耆蜜 當歸酒 赤芍酒 羌活 防風 片子姜黃酒 甘草

加姜黃煎

獨活寄生湯風寒 治肝腎虛熱風濕內攻腰膝作痛冷痺

無力屈伸不便腎水藏也虛則寒濕之氣乘之故腰膝作

重屈日能屈而不能伸者病在骨

李氏醫鑑 卷之三 痿痺 八

獨活 桑寄生如無真者以續斷代之 秦艽 防風 細辛 當歸

白芍酒 川芎酒 熟地 杜仲姜汁 牛膝 人參 茯

苓 甘艸 桂心 等分每服四錢 本方除獨活寄生

加羌活續斷名羌活續斷湯治同

上中下通用痛風方丹 痛風有寒有濕有熱有痰有血之

不同此為通治初起曰此即內經所謂行痺痛痺也經曰

黃柏酒 蒼朮酒 南星姜製 神曲炒 川芎 桃仁去皮 龍膽

艸行 防己行 白芷 羌活 威靈仙酒拌上 桂枝三錢 紅

花二錢 麵糊丸

升溪曰大法痛風用杏木南星川芎當歸白芷酒芍在上者加羌活靈仙杜仲在下者加牛膝防已木通黃柏薄桂能橫行手骨領南星若木諸藥至痛處

三痺湯 風寒 治氣血凝滯手足拘攣風寒濕三痺

人參 黃耆 茯苓 甘草 當歸 川芎 白芍 生

地 杜仲 川牛膝 川續斷 桂心 細辛 秦艽

川獨活 防風 等分加姜棗煎

喻嘉言曰此方參耆四物一派補藥內加防風秦艽以勝風濕桂心以勝寒細辛獨活以通腎氣凡治三氣裝虛而熱之藥多而養血補氣固本之藥少惟此方專以補氣為主而以治三氣之藥從之散藥得補藥以行其勢補正聖邪尤易于見功故喻氏取之

李氏醫鑑 卷之三 痺 九

史國公藥酒方 治中風語言蹇澀手足拘攣半身不遂

痿痺不仁 語言蹇澀風中舌本也半身不遂邪併于虛也手足拘攣風燥其筋而血不濡也痿痺不仁風

而兼濕頑 麻痺也

羌活 防風 白木 土當歸 酒洗 川牛膝 酒洗 川草薢 杜仲

斷系 松節 虎脰骨 炙 鱉甲 炙 晚蚕砂 炒 秦艽 蒼

耳子 四兩 枸杞 五兩 茄根 八兩 爲粗末絹袋盛浸無灰酒

三十斤煮熱退火毒服每日數次常令醺醺不斷

此足厥陰藥也防風羌活蒼耳秦艽凡於筋節風寒濕散血消腫能療寒痺亦散寒之品當歸杜仲牛膝補陰潤燥養血

血分之藥能益陰血而去肝風 濕去氣血則則百病俱除矣

防已黃耆湯 治諸風諸濕麻木身痛 論解

松節散 治一切筋攣疼痛

黃松節 治一切筋攣疼痛 乳香 一錢石器炒研每服二錢木瓜酒下

本草備要主治註釋

夏枯草 治瘰癧 蒼耳子 治痛 茜草 除風 姜黃 除風寒 薏仁 治

痺 土茯苓 利筋骨 治 麥冬 治痿痺手足 虎骨 治風痺 拘

羚羊角 祛風舒筋 蔓荊子 治拘攣 天麻 治四肢 仙茅 治

能行 秦艽 養血舒筋 理肢節 白蘚皮 通關節 利風 草薢

李氏醫鑑 卷之三 痺 十

治風寒濕 何首烏 養血祛風 麻黃 治麻木 浮羊藿 治四肢

痺 原蚕砂 治風濕爲疾肢節不隨 沉香 治冷風 車前子 治

浮麥 散血止痛 治風濕痺 姜汁和黃明膠 熨貼風 百沸湯

患風冷氣痺人以湯淋脚千膝用物厚 桑木火 拔引風寒

取桑木片扎成小把燃火吹息 桑葉 足去風痺 茵芋 治拘

攣患處內服祛風寒濕藥甚良 桑葉 足去風痺 茵芋 治拘

痛古方有 麻黃附子 治風 硫黃 治寒 天雄 治風寒濕痺 王

不留行 去風 陽起石 治接腰 急流木 風痺之 阿膠

風病 蠶魚 鯢魚 川山甲 今痺 風 海桐皮 治風

仁 治瘰癧 山黃肉 治風寒濕痺 地骨皮 治風濕 海桐皮 治風

仁 治瘰癧 山黃肉 治風寒濕痺 地骨皮 治風濕 海桐皮 治風



痺 枳實 去風 辛散 石南葉 風痺 皂莢 熱膏 貼一 吳萸 治血 丹

參 治諸痿痺手足 石斛 療風痺 蘭葉 消諸痺 東垣 艾實 濕

痺 五加皮 療筋骨之拘攣 腎得其養 則安水去 治濕熱痿痺腰

瓜黃栢 麥冬 生地 苡仁 石斛 虎脰 骨山藥 已下不能行動

同二木 草薢 石菖蒲 苡仁 白茯苓 甘菊花 防風 羌活 獨活

白蘚皮 石斛 治風寒 加皮 一味 釀酒飲之 治 勃脩 治痺 熱

李氏醫鑑 卷之三 寒庫

筋將急矣 勿謂也 曰 痺病不已 者 屬腎虛 痛有定處 屬死血

往來 小痛 屬痰 積聚 肢身 重 痺寒 便發 屬寒濕 或痛或止

屬濕熱 而 其 原 多 本 于 腎 虛 以 腰 脊 腎 之 府 也 李 士 材

曰 腎 有 兩 枚 皆 屬 於 水 初 無 水 火 之 別 仙 經 曰 兩 腎 一 根

無 兩 樣 中 間 一 點 是 陽 精 兩 腎 中 間 穴 名 命 門 相 火 所 居

也 一 陽 生 于 二 陰 之 間 所 以 成 乎 坎 而 位 乎 北 也 李 時

珍 曰 命 門 為 藏 精 系 胞 之 物 其 體 非 脂 非 肉 白 膜 裹 之 在

脊 骨 第 七 節 兩 腎 中 央 系 着 于 脊 下 通 兩 腎 上 通 心 肺 貫

腦 為 生 命 之 原 相 火 之 主 精 氣 之 府 人 物 皆 有 之 生 人 生

物 皆 由 此 出 內 經 所 謂 七 節 之 旁 中 有 小 心 是 也 以 相 火

能 代 心 君 行 事 故 曰 小 心 勿 卷 曰 男 女 嬌 嬌 皆 稟 此 命 火

以 結 胎 人 之 窮 通 壽 夭 皆 根 于 此 乃 先 天 無 形 之 火 所 以

主 云 為 諸 陽 事 蒸 精 賴 而 化 精 微 者 也 無 此 真 陽 之 火

則 神 機 息 生 氣 消 亡 矣 惟 附 子 肉 桂 能 入 腎 命 之 間 而

補 之 故 加 入 六 味 丸 中 為 補 火 之 劑 有 腎 虛 火 不 歸 經

大 熟 地 湯 日 亦 唇 裂 舌 上 生 刺 喉 如 烟 火 足 心 如 烙 蒸 沸

大 熟 地 按 之 微 弱 者 宜 十 全 大 補 湯 吞 八 味 丸 或 問 燥 熱

如 此 復 投 桂 附 不 以 火 濟 火 乎 曰 心 胞 相 火 附 于 命 門 男

以 藏 精 女 以 系 胞 因 嗜 慾 過 火 無 所 附 故 厥 而 上 炎 且

火 從 腎 出 是 水 中 之 火 也 火 可 以 水 折 水 中 之 火 不 可 以

水 折 桂 附 與 火 同 氣 而 味 辛 能 開 腠 理 致 津 液 通 氣 道 據

其 寓 宅 而 招 之 同 氣 相 求 火 必 下 降 矣 然 則 桂 附 者 固 治

陰虛者服多者死蓋恐陽而陰消也自此說行而世之治  
百無一生良可悲也蓋起房勞陰虛損陰虛火上炎咳嗽  
肺之品補腎之利使陽氣相生則病易愈矣世之用寒涼  
投參者以補陽反使陽火旺而金益受傷此不知先後之  
者也凡陽勝者不必為陽只補其陰以配陽使水火  
均平自無偏勝之患矣人之一身陽常有餘陰常不足  
人身水火原自均平偏者病也火偏多者精水不足必  
去火水偏多者精火不足必去水譬之天平此重則彼  
輕一邊重者只補足輕者之一邊決不鑿去法馬今之欲  
為水降火者豈法馬者也難經曰陽氣不足陰氣有餘當  
先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陰  
而後瀉其陽營衛  
通行此其要也

滋腎丸 又名通關 治腎虛蒸熱脚膝無力陰痿陰汗衝脈

李氏醫鑑 卷之三 腰膝腎 主

上衝而喘及下焦邪熱口不渴而小便秘腎中有水有大  
治故虛熱肝腎虛而濕熱壅于下焦故脚膝無力陰痿陰  
汗衝脈起于二陰之交而衝而上至胸水不制火故氣逆

黃柏 酒炒 二兩 知母 酒炒 二兩 桂 一 蜜丸

水不勝火法當壯水以制陽光黃柏苦寒微辛為膀胱相  
火補腎水不足入腎經血分如母辛苦寒滑上清肺金而  
降火下潤腎燥而滋陰入腎經氣分故二味每相須而行  
為補水之良劑肉桂辛熱假之反佐為少陰引經寒因熱  
也用

本方去桂加黃連名黃柏滋腎丸治上熱下冷水衰心煩  
上熱下冷陽 單黃柏一味名大補丸治腎膀胱虛熱氣虛  
極似陰也

四君子湯下血虛 腰股痛而足心熱為末姜汁酒調服名  
潛行散治痛風腰以下濕熱流注

六味地黃丸 加杜仲 妙 牛膝 酒 各 二 治腎虛腰膝痠痛

鄭相國方 治腰脚痠痛

被固紙 十兩 酒 核桃肉 二十兩 蜜調如粉每晨酒服一大

匙不能飲者熱水調忌 羊血 久服利益甚多 不獨下強腰

本方加杜仲 一斤 生薑炒蒜 兩 名青娥丸治腎虛腰痛再加

牛膝 酒 黃柏 酒 炒 川茸 薤 蜜丸治同本方加杜仲胡

蘆巴小茴香華蘼名喝起丸治小腸氣痛引腰

李氏醫鑑 卷之三 腰膝腎 主

黃柏 酒 炒 二兩 知母 酒 炒 二兩 桂 一 蜜丸

傳信方 治風濕頑痺腰膝疼痛

海桐皮 薤 各 一 牛膝 川茸 羌活 地骨皮 五

加皮 各 一 甘艸 五 生地 兩 酒 二斗 浸 此方不得增減早

天真丹 補下焦陽虛

牽牛 妙 佐沉香 杜仲 因紙 肉桂 兼施之妙

十全大補湯 加防風為君再加羌活附子杜仲牛膝名

大防風湯 治鶴膝風 五積交加散 治腰脚痠痛

仙茅大益丸 助命火益陽通明耳目補虛勞治失溺無子

心腹冷氣不能食 胃弱不能行 煖筋 相火盛者忌服

唐麥羅門始進此方 宜時時服之 多效 竹刀去皮切細 未泔浸去赤汁 止時服 忌食乾菜 九酒服 禁食牛乳 牛肉 許真若書云 甘能養肉 辛能養骨 苦能養氣 酸能養精 能養膚 和苦酒服之 必効也 傳云 十斤乳石不及一斤

本草備要主治註釋

五加皮 堅骨益精 黃柏 補腎水不足 腎虛燥非真能補

急食苦以堅之也 相火退而腎固 則無狂蕩之患矣 五加

皮同續斷杜仲牛膝莢肉巴戟固紙 治腎虛寒濕 蛇牀子

李氏醫鑑

卷之三

腰膝腎

主

久服令人駐顏令 孫真人金櫻子煎 去刺核煎似稀糖每

人子強陽補腎 血駐顏其功 水陸丹 益氣補真金櫻子去 芡實 甘瀉固腎

不可備述 去濕治腰膝痛 吳子野曰 人之食芡必枚啣而 沉香入

細痛之使華液流通 轉相灌溉 其功過于乳石也 沉香入

腎命門 葵其 補水 華 益精史信國云 若欲與陽先滋

精壯陽 白頭翁 苦堅 早蓮草 補腎益精 決明子 益腎 黑大豆 補

益陽起石 補右腎命門 鐘乳 益強陰 石硫黃 大熱純陽補命

阿膠 滋補 鹿茸 生精補髓 鹿角 滋補鹿一名班龍 西蜀進士

治海竭九轉靈丹 都漫說 惟有鹿茸 龜板 滋陰益腎

珠能補玉堂閣下穴 蓋指鹿茸 龜板 治腰膝痠

痛 龜鹿二仙膏 一陰一陽 肉從容 補命門相火不 榮燥

五味子 木 天冬 潤燥 麥冬 強陰 熟地 填髓 何首烏 滋精

今人 骨碎補 腎益母子 補知母 而滋陰 苦參 補陰 瑣陽 益

有子 巴戟 強陰 胡盧巴 壯元陽 菟絲子 腰膝痠軟 覆盆子

益腎 固精 起陽 接續 肌肉 女子 多孕 李士材曰 覆盆子

腎無燥熱之偏 固精無凝滯之害 金玉之品也 沙苑蒺

藜 補腎 淫羊藿 補命門 益精 益智仁 精 香附 益水 浸炒 補

香 補命門 地膚子 益精 石葦 氣 車前子 二歲 車前子 利

水 而固精 藏精 盛則有 栢子仁 潤腎 肉桂 氣厚 純陽 入

子 及五子衍宗丸 用之 栢子仁 潤腎 肉桂 氣厚 純陽 入

肝 補腎 命門 相火 之不足 兩腎 中間 先天 氣乃 真火

也 人非此火 不能 有生 無此 真陽 之火 則無 以蒸 精 而

化 精 微 脾 胃 衰 山黃 補腎 固精 栢子仁 潤腎 肉桂 氣厚 純陽 入

或 熬 膏 女貞子 補腎 蓮肉 補氣 蓮藕 益血 杜仲 補腎 強精

痛 牛蒡子 利腰膝 芡子 補腎 龍骨 益腎 固精 鱉甲 海

螺 均治 腰膝 桂心 暖腰 瑣陽 珍為 要品 芡實 去腰 膝 秦

皮 益腎 氣 今 海桐皮 治腰 膝 石南藥 苦養 腎 補內 傷 陰 寒

牛膝 治腰 膝 肉從容 治腰 膝 破固紙 治腰 膝 山茱萸 暖

寒 入 腎 腎 經 菴蘭子 治腰 膝 助陽 助陽 助陽 助陽 助陽 助陽

李氏醫鑑

卷之三

腰膝腎

主

化精微 脾胃衰 山黃 補腎 固精 栢子仁 潤腎 肉桂 氣厚 純陽 入

或熬膏 女貞子 補腎 蓮肉 補氣 蓮藕 益血 杜仲 補腎 強精

痛 牛蒡子 利腰膝 芡子 補腎 龍骨 益腎 固精 鱉甲 海

螺 均治 腰膝 桂心 暖腰 瑣陽 珍為 要品 芡實 去腰 膝 秦

皮 益腎 氣 今 海桐皮 治腰 膝 石南藥 苦養 腎 補內 傷 陰 寒

牛膝 治腰 膝 肉從容 治腰 膝 破固紙 治腰 膝 山茱萸 暖

寒 入 腎 腎 經 菴蘭子 治腰 膝 助陽 助陽 助陽 助陽 助陽 助陽

必用之藥 菴蘭子 治腰 膝 助陽 助陽 助陽 助陽 助陽 助陽



烏藥 木香 茴香 良姜 青蘘 枳殼 二川楝子

巴豆 七十 先以巴豆微打碎同川楝子 去麩及巴豆同

餘藥為末酒下一錢 上材日用巴豆炒藥此惟初起

山功散 治寒濕水疝陰囊腫脹大小便不利 藥如水晶註

不利濕鬱為 熱而脈秘也

黑牽牛 兩 茴香 炒 荔枝為末每一錢姜汁調下或加水香

牽牛 辛烈能通右腎命門走精隧行水泄濕兼通大腸風

秘蓄香辛熱溫散能煖丹出祛小腸冷氣同入下焦以泄

補核丸 治四種癰疔 腸癰卵癰水癰氣

李氏醫鑑 卷之三 疔 疔

橘核 川楝子 海藻 海帶 昆布 桃仁 延胡索

厚朴 枳實 木通 桂心 木香 錢 酒糊丸益湯或

酒下 通核木香入厥陰氣分而行氣桃仁延胡入厥陰血

行所以去濕官桂平用厥陰命門之火所以祛寒厚朴

枳實並能行結水而破宿血昆布藻帶鹹潤下而軟堅寒

行水以泄熱丹溪曰癰疔不痛非堅斷房事與厚味不

可若者未神曲由查白芷川芎枳實半夏皆要藥又宜隨

時月寒熱加減有熱加枝子

堅硬加朴枳秋冬加吳茱萸

疝氣方 治疝氣疼痛

吳茱萸 枳殼 枝子 唐菖子 俱炒 荔枝枝 等分

為水空心長流水下二錢

經驗方 治陰疝

大小茴 各一 為末 猪胞 一連尿入藥扎定酒煮爛為丸

每服五十丸

四逆湯 治寒 加 當歸 治男婦寒疝臍下冷引腰膝而痛

吳茱萸湯 治寒 加附子 治寒疝腰痛牽引舉九尺脉沉遲

喝起丸 治小腸氣 五積散 治冷秘寒疝

甘艸黑豆湯 治筋疝 前

甘艸 稍二 黑豆 半 升

逍遙散 治疝氣 責脉丸 治男子七疝

龍胆瀉肝湯 治陰腫陰痛 東垣無黃芩 龍膽瀉肝湯治

前陰熱痒臊臭 詳論見淋門

五苓散 治熱 加川楝子 治水疝

分清湯 治寒疝二便不通

羌活勝濕湯 治濕熱 除川芎加黃耆當歸 升陽除濕湯 治水疝

腫大陰汗不絕

左金丸 治肝火燥盛筋疝痞結 肝木過盛剋制脾

常歸生薑羊肉湯 治寒疝腹痛

經驗方 治囊風瘡痛痒 川椒七粒 慈頭七根 煎水

薰洗

本艸備要主治註釋

苗香

治小腸冷氣

胡盧巴

同苗香巴城川烏棟實

海藻

防風

苡仁

葶藶

治陰射干治瘰癧

白頭翁

五寶脂

牡蠣

均治風氣骨痛

五加皮

苦棟子

要藥

吳茱萸

治陰乾漆治瘰癧

皂莢

青皮

丹參

同澤瀉治赤芍

木賊

藥本

陰寒腫痛

甘遂

治疔商陸

杜仲

牀子

治陰痿

荷葉

煎湯薰乾莧菜

上昆布

李氏醫鑑

卷之三

疔

主治

疔

下濕

白附子

治陰下

脫髮

白攀

灰

收陰挺亦

鰻魚

治陰戶蝕瘡

蛇牀子

皮

治女子陰中腫痛

海螵蛸

治陰蝕

槐實

藥

主膀胱腎間冷

蛤粉

治疔氣

疔

案

趙氏曰

子一患陰丸一個腫如鴨卵發熱以濕熱症

治不効

附下疳

治不効

細思數日前有濕布風乾在坐下彼上岸始覺

以意逆之

孩兒茶

真珠

片腦

為末傳之

孩兒茶礪砂等分

為末敷之

真珠人中白黃柏青黛礪砂和水片

少加雞

內黃金賦粉

雞脆內黃皮

不落水者五枚焙存性枯礬錢研細

搽

治陰頭

燈神效

李氏醫鑑

卷之三

疔

脚

脚氣 脚眼腫痛 脚甲癢

脚氣自外感得者山嵐瘴氣或履濕熱之地自內得者故注于足濕熱分爭濕勝則脚腫熱勝則生熱濕性下流諸症者狀類傷寒亦有六經傳變但腫痛為異耳此病忌用補劑及淋洗以濕熱得補則劇也然亦不宜大瀉治之喜通而惡寒若脚氣冲心喘急不止嘔吐不休者死水凌火故也先痛而後腫者氣傷血也先腫而後痛者血傷氣也筋脉弛長痛腫者名濕脚氣宜利濕疎風腫痛者名乾脚氣即熱也宜養血潤燥風寒之異濕勝而為病或成水泡瘡或成赤腫亦有或如筋氣攻上引下均可用後當歸拈痛湯損益為治足傷寒濕為脚氣防已為主藥濕加苡仁蒼術木瓜木通熱加羌活風加羌活專煎痰加竹瀝南星痛加香附木香活加四物物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉瀉瀉連臂加威靈仙桂枝連服加胆艸又有足眼痛者

李氏醫鑑

卷之三

三

不與脚氣同論千金云有陰陽之分陰脚氣腫而不紅陽脚氣腫而紅者也士材曰脚氣之名前古未聞起于後世其源麻痺痛者經所謂痲厥也其中心者經所謂厥逆也其痿軟不收者經所謂痿厥也東垣曰脚氣實由水濕然亦有二焉一則南方卑濕經曰清濕襲虛則病起于下此自外而感者也北方常食牛乳又飲酒太過脾胃有傷不能運化水濕下流此自內而致者也楊大受云脚氣為痲症治宜宣通不使壅也壅既成者祛去惡血然後服藥○南方脚氣外感寒濕北方脚氣內傷濕熱此前人所未發者脚氣為痲疾皆當疎下然太過則損脾不及則病不去初發時一身盡痛便溺阻滯先以羌活獨活湯導之羌活獨活防已大黃當歸枳實芍藥川芎澤瀉茯苓半飲食不消心下痞悶開胃健脾先以陳皮白朮澤瀉茯苓半夏神曲麥芽枳實青皮干姜等藥中心火氣逆上也升氣九已上治心候即為水壅便溺不通即木通牛膝滑石香為末姜湯下已上治實養正升導氣下降其捷脚氣膝浮用甘松煎湯淋洗

當歸拈痛湯 治脚氣腫痛脚膝生瘡膿水不絕脉沉實緊

數動滑者

茵陳 苦參 妙知母 妙當歸 猪苓 澤瀉 空心服一

方加人參 羌活 防風 升麻 葛根 蒼木 白木

甘艸 黃芩

原文曰羌活透關節防風散留濕為君升麻味薄引而上行苦以發之白朮甘溫和平蒼術辛溫雄壯健脾燥濕為臣濕熱相合肢節煩痛苦參苦杏仁苦溫雄壯健脾燥濕為臣酒炒以為因用血壅不流則為痛當歸辛溫以散之參艸甘溫補養正氣使苦寒不傷脾胃治濕不利小便非其治也苓澤甘溫鹹平導其流飲為佐上下分消其濕使壅滯得以宣通也

李氏醫鑑

卷之三

脚

三

金匱風引湯 巢氏用治脚氣

大黃 干姜 龍骨 枝子 兩甘艸 牡蠣 滑石

寒水石 赤石脂 紫石英 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼

防已 治脚氣足腫痛憎寒壯熱

防已 木通 枳實 生地 白朮 蒼木 益

黃柏 甘艸稍 犀角 食前服熱加黃芩時令熱加石

膏肥人有痰加姜汁竹瀝或南星大便秘加桃仁紅花小

便赤澀或加牛膝以仁

烏藥順氣散 中風 加牛膝五加皮獨活治脚氣

四物湯 加羌活天麻 蜜丸名神應養真丹治血虛脚氣

紫雪 傷寒發 治脚氣

控涎丹 治脚氣 加栝郎木瓜松枝卷栢 治脚氣

補肝湯 治脚痿無力

六味地黃丸 治足跟作痛 五積散 治脚氣腫痛

人參敗毒散 治濕毒流注腫痛脚氣 氣下流

則腫

本艸備要主治註釋

胡盧巴 治寒濕 苡仁 龍胆艸 川烏 楝實 三奈

李氏醫鑑 卷之三

寒濕 曲香 治乾 大腹皮 木瓜 治脚氣 麥

冬 黃栢 石菖蒲 木通 仙茅 治冷痺 澤瀉 治脚

五加皮 治小兒脚 狗脊 石斛 治脚 苧麻子 氣風腫不

仁或煎湯 百沸湯 見慶門 髮脚氣 互易 原蚕砂 上茄根

魚洗 吳茱萸 香附 地骨皮 萆薢 赤小豆

食治脚氣 白芥子 治痺木 巴戟 夏枯艸 白蚯蚓

日脚氣必 海藻 治脚氣浮 枇杷葉 治脚氣 香薷 治脚氣

滑石 治脚 樟腦 治脚氣 瘡甲方 治脚氣 松葉 治脚氣

調傳 脚凍瘡方 白薇黃栢 茄根 松葉 治脚氣

案 有一宦遊京師病癰發熱不能履地眾以臆癰治

又案 一少年新娶得脚軟病且痛甚作脚氣治不効孫琳曰

能行六

補遺 桑枝煎治風氣脚氣

桑枝 升 細剉炒香水三升熬至二升一日服盡

脚



李氏醫鑑卷之四

李氏醫鑑

男 元冬周佐

元峯景燦

元夏雲生

元昂廷暉錄次

女 元旭子昭

元晶承曜

友人錫三王世龍恭訂

元晨西平

脾胃

李東垣曰胃乃脾之剛脾乃胃之柔飲食不節則胃先病脾無所稟而後病勞倦則脾先病不能為胃行氣而後病胃為十二經之源脾胃既虛十二經之邪不一而出假令不能食而肌肉削此本病也右關脈緩而弱本脾也或本李氏醫鑑

脈中兼見弦脈症中或見四肢清開淋瀝便難轉筋一二症此肝之脾胃病也當加風藥以瀉之脈中兼見洪大症中或見肌熱而赤煩熱肉消一二症此心之脾胃病也當加瀉心火之藥脈中兼見浮滑症中或見短氣氣上喘咳嗽痰皮溢一二症此肺之脾胃病也當加瀉肺及補氣之藥脈中兼見沉細症中或見善欠善恐一二症此腎之脾胃病也當加瀉腎水之浮及瀉陰火之藥所以言此者欲人知百病皆從脾胃生也處方者當從此法加時令藥人之一身無非藏府而藏府以脾胃為主然脾胃之化物寔由于水火二氣非脾胃之能也○補命火以強脾○經曰四時百病胃氣為本又曰得穀者昌絕穀者亡脾胃一虛百病不生○土為萬物之母脾土受傷則失其健運之職故飲食不消漸寒則嘔吐熱則濡泄飲食既少眾藏無以稟氣則虛靡日甚諸病叢生矣

補脾胃瀉陰火升陽湯 治飲食傷胃勞倦傷脾火邪乘之

而生大熱右關脈緩弱或弦或浮數右關緩弱脾虛也弦木尅土也浮數熱也東垣曰濕熱相合陽氣日虛不能上升脾胃之氣下流用腎是有秋冬而無春夏也惟瀉陰火伸陽氣用味薄氣藥升發則陰不病陽氣生矣

黃耆 蒼朮 甘艸 羌活 升麻 柴胡 黃連 酒炒

五黃芩 炒 人參 錢七 石膏 少許長夏微 每服三錢或五錢

此足太陰陽明少陽藥也柴胡升麻羌活助陽益胃以升清氣人參蒼朮黃芪甘艸益氣除濕以補脾胃黃連黃芩石膏涼心清

胃以瀉陰火 調中益氣湯 補中益氣除歸 木加水香蒼朮 治脾胃不調胸滿肢倦食

少短氣口不知味及食入反出

李氏醫鑑 卷之四 脾胃

參朮益胃湯 補中益氣加蒼朮倍分 半夏黃芩益智各三分 治內傷勞倦燥熱

短氣口渴無味大便溏黃 升陽順氣湯 補中益氣去白朮加 草薢神曲半夏黃芩 治飲食勞倦所傷滿

悶短氣不思食不知味時惡寒 保和丸 飲食 加白朮白芍去 半夏半子連翹 名小保和丸助脾進食

健脾丸 去山查麥芽加 名益氣健脾丸治脾虛食少本方 去 查麥芽陳皮加當歸川 名養營健脾丸治脾陰不足飲食

不為肌膚 血充然 本方 去人參山查麥芽加 半夏枝子黃連木九 名清火健脾

九治脾虛有火本方 去人參山查麥芽加 半夏枝子黃連木九 名和中健脾

音振即厚朴半夏甘草

子 52-61

九治胃虛飢不欲食再加人參名妙應九治胃虛不能食藏府

或結或瀉本方共山查加半夏青皮砂仁草蔻干姜炙甘草茯苓蒼朮澤瀉蒸餅丸名寬中

進食九補脾胃進飲食

胃風湯 治風冷乘虛客於腸胃食泄注下完穀不化又治

風虛能食牙關緊閉手足癱瘓肉瞤而腫名曰胃風手足抽掣動也

人參 白朮土炒 茯苓 當歸酒洗 芍藥酒炒 桂枝炒 等

分加粟米百餘粒煎

胃風者胃虛而風邪乘之也風屬肝木能剋脾土故用參

木茯苓以補脾氣而益衛當歸川芎以養肝血而調骨白

芍藥肝而能和脾肉桂散風而能平木故能止泄瀉而療

風濕也川芎肉桂入血而祛風此方名治風而寔非治

風乃補血和血益胃之藥

東垣胃氣湯升麻白芷一錢 麻黃二分 黃芩各五分 葛根各一錢 柴胡各一錢

活藥本蒼朮荊草薤黃栢當歸炙甘草各五分 加姜棗煎亦

治胃風症嘉言曰風入胃中何以反能食蓋風能生熱即

其熱以熱必隨風而解耳又曰必加竹瀝花粉石膏散

生地梨汁甘寒之藥入升麻葛根甘州為劑始為克當

問二藥補散不同而所治共一症何歟嘉言曰按風成

寒熱乃風入胃中而釀管衛之偏勝此方乃驅胃風使從

外解之藥若夫久風為食泄則風已入裏又當用人參為

君桂枝白朮為臣茯苓甘草為佐而祛風於內此表裏之

權衡內經之要旨也

升陽益胃湯 治脾胃虛弱怠惰嗜卧時值秋燥冷行濕熱

方退體重節痛口苦舌乾心不思食食不知味大便不調

小便頻數兼見肺病瀝浙惡寒慘慘不樂乃陽氣不升也

陽受氣於胸中經曰陽氣者若天與日清陽失位則濁陰

上干脾虛不運而怠惰嗜卧也體重節痛瀝浙而陰邪勝

也口苦舌乾陰火上炎也不嗜食不知味胃氣虛衰也大

便不調瀝浙也小便頻數膀胱有熱也瀝浙惡寒陽虛也

陽氣不舒也

黃芪二兩 人參 甘艸 半夏 一兩 白朮 羌活 獨活

防風五錢 以其秋旺陳皮四錢 白朮土炒 茯苓土炒 等

澤瀉勿用 柴胡三錢 黃連二錢 每三錢姜棗煎又補中益氣

李氏醫鑑 卷之四 脾胃

湯加妙麵黃芪亦名益胃升陽湯

六君子助陽益胃補脾胃之上藥也加黃者以補肺而固

衛芍藥以飲陰而調營羌活獨活防風柴胡以除濕而升

清陽茯苓澤瀉以瀉濕熱而降陽陰少佐黃連以退陰火

補中有散發中有收使氣足陽升自正旺而邪服矣東

垣曰此治肺之脾胃虛也何故秋旺用參木芍藥之類反

補脾為脾胃虛則肺俱受病故因時而補易為力也又曰

余病脾胃久衰一日體重肢節疼痛大便泄下小便便秘

因寒濕客邪自外入裏而甚暴若用淡滲以利之病縱即

已其降之又降復益其陰而重竭其陽也治以升陽之藥

是其宜耳羌活獨活柴胡升麻各一錢防風炙甘草各五

麥冬白朮散 治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉

人參 白朮 茯苓 甘草 山藥 扁豆 苡仁 炒蓮

肉 炒 陳皮 砂仁 桔梗 爲末每三錢漿湯或米飲

調服

治脾胃者補其虛除其濕行其滯調其氣而已人參白朮  
茯苓甘草山藥苡仁扁豆蓮肉皆補脾之藥也然茯苓山  
藥苡仁理脾而兼能滲濕砂仁陳皮調氣行滯之品也然  
合參朮苓艸梗胃而又能補中且入補藥則補桔梗苦甘  
入肺能載諸藥上浮又能通天氣於地道使氣 肺和則天  
得升降而益和且以保肺防燥藥之上借也 氣下降

枳朮丸 治痞除痰健脾進食

李東垣曰白朮甘溫健脾胃之元氣其苦味除胃中之濕  
後用枳實開通過於積實壯伐之藥一倍枳實苦寒泄胃

枳朮丸 治痞除痰健脾進食

五

治脾胃化胃中所傷是先補其虛而後化其傷則不峻矣  
荷葉中空色青形仰象震在人爲少陽胆生化之根蒂也  
飲食入胃當氣上行即少陽甲胆之氣也胃氣元氣發氣  
甲胆上升之氣一也食藥感此氣化胃氣何由不上升乎  
燒飯與白朮協力滋養發氣補 本方加 陳皮 名橘皮半枳  
令胃厚不至再傷其利廣矣

木丸健脾本方加一兩名木香枳朮丸 再加 名香砂枳朮

丸消飲食強脾胃如加干姜五錢兼治氣寒 再加 名木

香人參干姜枳朮丸開胃進食

二神丸 見泄 許學士曰有全不進食者服補脾藥皆不効  
治益腎氣壯其元氣衰則不能

化食如鼎釜之下無火物不能熟也

中滿分消湯 見瘧 原文曰或多食寒涼及脾胃久虛  
服門 之人胃中寒則服滿此湯主之

異功散 四君子加陳皮調理脾胃再加半夏名六君子治

氣虛有痰脾虛鼓脹 因塞用 再加 砂仁 名香砂六君子湯

治虛寒胃痛

健脾丸 治脾虛氣弱飲食不消

人參 白朮 二兩 陳皮 麥芽 炒一 山查 兩 枳實 兩 神麴

糊丸米飲下 脾胃者倉庫之官胃虛則不能容受故  
不嗜食脾虛則不能運化故有積滯

本草備要主治註釋

犀角 解一切毒時珍曰五藏六府皆稟氣于胃風邪熱毒  
足明胃藥也故能入胃 石膏 清胃 知母 清胃 大麻仁 治胃

解諸毒清胃中大熱 石膏 火 知母 火 大麻仁 熱

李氏醫鑑 卷之四 脾胃

六

華薛 治清胃家濕熱 秦艽 去腸胃 玄明粉 去胃中 白蘚皮

入脾胃 故能去濁分清 秦艽 之熱 玄明粉 之實熱 白蘚皮

除濕 肉桂 治脾虛惡食 丁香 治胃 藜蘆 治胃 良姜 散寒

干姜 除胃 花柳 治胡椒 煨胃快膈 肉豆蔻 煨胃 白豆蔻 煨

脾神 健脾胃 治 藜蘆 益胃除 蒜 健脾胃 白芥子 溫中 醋 開

神曲 紫蘇 開胃益 黃耆 壯脾 甘草 補脾胃 白木 燥脾 蒼

木 同上 能升 黃精 益脾 石斛 平胃 石菖蒲 開胃 半夏 和胃

我米 粳米 和糯米 補穀芽 助胃氣 白扁豆 脾藥也 苡

仁 胃也 薏苡 山藥 補脾 白芍 安胎 滑石 補脾 蘆甘石

溫 茯苓 枳子仁 助 枳實 枳殼 厚朴 厚朴 黃連

胡連 皆厚 謁子 開 辛夷 入肺胃氣分能助 檀香 引胃氣上

沉香 入脾 枇杷葉 和胃 圓眼 脾進子 厚腸胃 荷葉 助脾 茨

實 補 土 茯苓 健胃 使君子 健脾 大棗 發脾胃升 木香 脾和 防

風 能行 補脾 胃非 引用 不 荊芥 助脾 益 智仁 犯胃 治客寒 砂仁

和胃 藿香 荷香 胃 李 開胃 消食 蕪荑 和 趙妙 黃為

胃中 有虫 鯽魚 氣以 生故 其味甘 其氣溫 無毒 是以 能入

食即 作痛 孟詵 云 調中 益五 藏表 其益 脾和 胃之 神曲 開

功也 調胃 實腸 與 無 痰 諸 魚 之 中 惟 此 可 常 食 神 曲 開

健脾 消食 止泄 同 山 查 麥 芽 殺 芽 砂 仁 黑 芝 蔴 一 味 九 蒸

陳皮 草 果 薑 香 白 米 乾 葛 蓮 肉 等 用 効 九 能 健 脾 燥 濕 益 氣 延 年

飲食 中食 不思食

食填太陰 抑過肝胆之氣 不得上升 兩實相搏 故痛連胸  
膈 陽氣不舒 故手足逆冷 下焦隔絕 故尺脈不至 訶菴曰  
中食之症 有忽然逆厥 胃不能言 肢不能舉者 名曰食厥  
若作中風中氣治之 亦可立待 宜先以宣吐之 再行消食  
或曰食填太陰 胸中痞滿 兩寸脈當用事 今反尺脈不吐者 死  
其理安在 脾陽不生 獨陰不長 大之用在于地 下則萬  
物生 天地之用在于上 則萬物收藏 此乃天地交而萬  
物通也 故陽火之根本于地下 陰水之源本于天上 五藏  
土有形之物 物者陰也 陰者水也 食塞于上 是絕五藏之  
源 源絕則水不下流 八脈之絕 此其理也 元戎曰 治濕之  
病 亦能作痺 症口眼歪邪 半身不遂 舌強不正 渾身似中  
風 當瀉濕毒不可  
作風治之而汗也

燒盒探吐法 治傷食痛連胸膈痞悶不通手足厥冷尺脈

李氏醫錄

卷之四

七

全無 單用燒盒熱水調飲此法大勝用藥凡有此疾宜先  
用之三飲三吐訶菴曰 醃潤下而軟堅 能破積聚又  
能宣通 使不化之食從上而出  
則寒者通矣 亦本醫達之也

順氣消食化痰丸 治酒食生痰胸膈膨悶五更咳嗽 過飲  
濕多食辛熱油膩之物 皆能生痰壅于胸膈 故備悶五  
更咳嗽 由胃有食積 至此將火氣流入肺中 故咳嗽

半夏 製 胆星 青皮 陳皮 白 芩 子 用 蘇 子 者 妙 山 查 炒

麥芽 神曲 葛根 杏仁 去皮 香附 製 薑 汁 和 蒸 餅

糊丸 一方半夏南星各一斤 白礬皂角生薑各一斤 同  
煮至南星無白點為度 去皂角 切同曬乾用

痰由濕生 牛夏南星 所以燥濕 痰由氣升 蘇子 杏仁  
所以降氣 痰由氣滯 青皮 陳皮 香附 所以導滯 痰因酒  
食 葛根 神曲 所以消酒 查牙 所以化食 濕去食消  
則痰不生 氣順則痰散 止痰滯 既去 諸悶自除也

枳朮丸 健脾進食

白朮<sup>二兩</sup> 枳實<sup>一兩</sup> 為末荷葉包陳米飯煨乾為丸痞悶

加陳皮氣滯加木香傷食加麥芽神曲

工安道口勞倦飲食雖俱為內傷然勞倦傷誠不足矣飲食傷又當于不足之中分其有餘大飢餓不飲食者胃氣空虛此為不足而傷也飲食自倍腸胃乃傷者此不足之中兼有餘而傷也惟其不足故補益惟其有餘故消導亦有物滯氣傷消補兼行者亦有物滯氣不傷但須消導者亦有不必消導但須補益者枳朮丸之類雖曰消導固有補益之意若所滯之物非枳朮丸之力所能去者備急丸煮黃九瓜蒂散等藥古東垣亦未嘗委之而勿用也

本方加半夏一兩治脾濕停痰及傷冷食本方加橘皮一兩治飲食不消氣滯痞悶本方加神曲麥芽各一兩各藥

李氏醫鑑

卷之四

十

藥枳朮丸治內傷飲食或泄瀉本方加酒炒黃連黃芩大

黃炒神曲橘紅各一兩各三黃枳朮丸治傷肉食濕麵辛

熱味厚之物填塞悶亂不快本方加茯苓五錢乾姜七錢

名消飲丸治停飲胸滿嘔逆本方作湯名枳朮湯治水飲

心下堅大如盤也屬氣分之水

保和丸

傷食 治食積停飲腹滿泄瀉積滯惡食傷于飲食

滯于腸胃故有泄瀉惡食等症傷而未甚不欲攻以厲劑惟以平和之品消而化之故曰保和東垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以導其濕傷食者有形之物也輕則消化或損其氣重則方可吐下脈經云大腸有宿食寒像發熱有時如瘕瘕則消導重則下之當求之傷食門

山查<sup>三兩</sup> 神曲<sup>炒</sup> 茯苓 半夏<sup>一兩</sup> 陳皮 芩子<sup>微炒</sup> 連翹<sup>五錢</sup>

麴糊丸麥芽湯下或加入藥亦可積久必鬱為熱連翹

此內傷而氣未病者但當消導不須補益大安丸加白朮

治飲食不消 氣虛邪微

葛花解酲湯 專治酒積或嘔吐或泄瀉痞塞頭痛小便不

利酒大熱有毒又水所釀成故熱而

葛花 豆蔻 仁<sup>一錢</sup> 木香<sup>一分</sup> 青皮 陳皮 人參 白

朮<sup>炒</sup> 茯苓<sup>四分</sup> 干姜 猪苓 澤瀉<sup>三分</sup>

過飲無度濕熱之毒積于腸胃葛花獨入陽明令濕熱從

李氏醫鑑

卷之四

飲食

十

兼花食調氣溫中除痰瀉熱乃內外分消之劑飲多則中

氣鬱故又加參朮以補其氣也人參補氣又能解酒東

垣曰酒大熱有毒無形之物也傷之只當發汗次利小便

上下分消其濕氣或用酒藏丸大熱之藥下之或用大黃

牽牛下之是無形元氣受傷反損有形陰血陰血愈虛陽

氣散不及根根損一各雞距一名水蜜經霜黃赤而味

其其入酒酒化為水門外植此木者屋內釀酒多不佳

敬脾進食殺神丸

殺神丸 為末入姜汁盪少許和作餅焙乾入炙甘草砂仁

白朮<sup>各一兩</sup> 為末白湯點服或丸服

越鞠丸<sup>見前</sup> 治飲食不消

六一散 解酒食毒

縮脾飲

見胃

治暑月酒食所傷

二陳湯

加片于薑黃

治酒家手臂重痛麻木

李氏醫鑑

卷之四

飲食

十一

感冒 寒熱內外傷辨

瘟疫暑暈約畧

未附傳原

內經曰：卑下之地，春氣常在，故東南卑濕之區，氣氣柔，易傷風寒，俗稱感冒。受邪府淺之名也。由鼻而入，在于上，邪客于皮膚，故無六經形症，惟發熱頭痛而已。胸膈嘔氣，惡食而兼內傷也。東垣內傷外感辨，傷于飲食，勞役七情六慾，內傷傷于風寒暑濕，為外感內傷發熱時熱時止。外感發熱熱甚不汗，內傷惡寒得便解，外感惡寒雖厚衣烈火不除，內傷惡風不畏甚風，反畏隙風，外感惡風，反惡風，內傷頭痛，痛在頭，外感頭痛，連痛無休，直待表邪傳裏，方罷。內傷有濕，或不作渴，或心火乘肺，亦作渴。外感須二三日外，未熱傳裏，口方作渴。內傷則熱傷氣，四肢沉困無力，倦怠嗜臥。外感則風傷筋，寒傷骨，一身筋骨疼痛。內傷則短氣不足，以息。外感則喘壅氣盛，有餘。內傷則手心熱，外感則手背熱。天氣通于肺，鼻者肺之外候，外感傷寒，則鼻塞傷風，則流涕。然能飲食，口知味，腹中飽，二便如常。地氣通于脾，脾者脾之外候，內傷則腹中飽，口不知味，小便便黃赤，大便或閉或澀。左人迎脈主表，外感

李氏醫鑑

卷之四

感冒

十一

則人迎大于氣口。右氣口脈主裏，內傷則氣口大于人迎。內傷症屬不足，宜溫宜補，宜和。外感症屬有餘，宜汗宜吐。宜下。若內傷之症，誤作外感，妄發其表，重虛元氣，禍如反掌。故立補中益氣湯為主之。又有內傷外感兼病者，若內傷重者，宜補益為先，外感重者，宜發散為急。此湯惟上焦痰喘，中焦濕熱傷食，膈滿者，不宜服。李士材曰：虛人感冒，不任發散者，此方可以代之。東垣曰：肌熱者，表熱也。服此湯一二服，得微汗，則已。非正發汗，乃陰陽氣和，自然汗出也。準繩曰：凡四時傷寒，通宜補散。故丹溪治傷寒多用補中益氣湯。氣虛者，四君子加發散藥。血虛者，四物湯加發散藥。東垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻，藥本蒼木。海藏治濕無汗者，用神木湯。見時氣門。有汗者，用白木湯。治剛痺神木湯加羌活防風升麻。此皆仲景所謂辛苦之治。中陽脈弦細者，是也。明醫雜著云：發熱有數種，治各不同。仲景論傷寒傷風，此亦感也。故宜發表以解散之。此麻黃桂枝之義也。感于寒冷之月，即時發病，故用辛熱以勝寒。如春溫之月，則當發以辛涼之藥。夏暑之月，則當變以

李氏醫鑑

卷之四

治感寒

治感寒

李氏醫鑑

卷之四

治感寒

治感寒

治感寒

甘苦寒之劑又有冬溫此天時不正陽氣反用藥不可  
溫熱又有寒疫却在溫熱之時此陰氣反用藥不可寒  
涼又有瘟疫沿門盡境相似者此天地之疔氣當隨時令  
察氣運而治宜辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒若夫飲食  
勞倦為內傷元氣則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中  
益氣湯之論用甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣  
藥以補氣之不足也又有勞心好色內傷真陰陰虛血既傷  
則陽氣偏勝而變為火是謂陰虛火旺勞瘵之症故丹溪  
發陽有餘陰不足之論用四物加黃柏知母補其陰而火  
自降此用血藥以補血之不足者也又有夏月傷暑之病  
雖屬外感却類內傷東垣所謂清暑益氣湯是也又在外  
暑熱而過食冷物以傷其內或過取風涼以傷其外此則  
非暑傷人乃因暑而致之病治宜辛熱解表辛溫理中之  
藥即與傷寒治法相類者也外感之與內傷寒病之與熱  
病氣虛之與血虛如木炭相反治之若差則輕病必重重  
病必死矣醫者口讀傷寒書而不讀東垣書則內傷不明  
而殺人多矣東垣脾胃論深明飢飽勞役發熱等症俱是  
內傷悉類傷寒切戒汗下以為內傷多而外感少只須  
補不必發散如外感多內傷少溫補中少加發散以補中  
益氣為主如內傷兼寒者加麻黃兼風者加桂枝兼暑者  
加黃連兼濕者加羌活定萬世無疆之利此東垣特發陽  
虛發熱之一門也然陰虛發熱者十之六七亦類傷寒今  
人一見發熱則曰傷寒須用發散發散而變則曰傷寒之  
法已窮予嘗于陰虛發熱者見其大熱而赤口渴煩躁與  
六味地黃湯一大劑即愈如下部惡寒足冷上却渴煩躁  
極或飲而反吐即加肉桂五味甚則加附子冷飲以此法  
人多矣此丹溪發明陰虛發熱之外尚遺未盡之旨也  
凡傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯即百清湯或酸棗  
水探吐探吐汗出即已謂之曰感風寒而以熱湯探浴  
亦發散之一法故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之

三拗湯

治感冒風寒咳嗽鼻塞

麻黃湯

治感冒風寒咳嗽鼻塞

四逆湯

治感寒手足厥冷脉細欲死

惡食

香附 治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

香附

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

麻黃

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

寒無汗

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

食加消導

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

行則寒散

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

平胃散

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

夏人參

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

李氏醫鑑

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

寒內傷

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

傷寒頭痛

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

危活勝濕湯

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

四君子

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

白芍

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

外感之奇方

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

二妙散

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

蘇

治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶愛食

黃芪湯 黃芪 防風 白朮 等分 潔古用代桂枝湯治

春夏發熱有汗脈微弱惡風寒者惡風其加桂枝又用川

芎藭木羌活等分名川芎湯以代麻黃湯治秋冬發熱無

汗惡風寒者惡寒加麻黃

連理湯 治傷暑瀉而作渴 初覺口苦外感盛暑內傷生冷非此不可

人參 干姜 甘艸 白朮 白茯苓 黃連

防風通聖散 治一切風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所

傷氣血佛鬱表裏三焦俱寔憎寒壯熱頭目昏運目赤腫

痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽喉不利唾涕稠粘咳嗽上氣大

李氏醫鑑 卷之四 感冒

便秘結小便赤澀 憎寒壯熱邪在表也頭眩目赤風熱上攻也

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎 當歸 白

芍藥 白朮 山枝 炒大黃 酒黃芩 錢黃芩 石膏 桔梗

兩 甘艸 兩 滑石 兩 加生薑 葱白 煎白利去硝黃白汗去麻

黃加桂枝涎嗽加姜製半夏 此足太陽陽明表裏血氣

藥也防風荆芥薄荷麻黃輕浮升散解表散寒使風熱從

汗出而散之於上大黃芒硝破結通幽枝子滑石降火利

水使風熱從便出而泄之於下風淫於內肺胃受邪桔梗

石膏清肺瀉胃風之爲患肝木受之川芎歸芍和血補肝

黃芩清中上之火連翹散氣聚血凝甘艸緩峻而平 重川

滑石亦清六一白朮健脾而燥濕上下分消表裏交治 甘

利水瀉火之意 白朮健脾而燥濕上下分消表裏交治

汗不傷表下不傷裏也 本方再加人參補氣熟地益血

黃連黃柏除熱羌活獨活天麻細辛全蝎祛風蜜丸彈子

大每服一丸茶酒任下名祛風至寶丹 喻嘉言曰此中風

也 本方除大黃芒硝名雙解散 麻黃防風荆芥薄荷川芎

膏滑石以解裏復有當歸芍藥以和 血枯梗甘艸白朮以調氣故口雙解

九味羌活湯 治傷寒傷風憎寒壯熱頭痛身痛項

痛脊強嘔吐口渴太陽無汗及感冒四時不正之氣

神水散 見傷寒表門 治內傷生冷外感寒邪而無汗者 本方

除蒼朮加白朮姜片不用葱治前症有汗者 初發日神

海藏所製以代桂枝麻黃二湯者也嘉言曰此海藏得

意之方蓋不欲無識者輕以麻黃桂枝之熱傷人也

人參敗毒散 論詳前 治傷寒頭痛憎寒壯熱項強睛暗

鼻塞聲重風痰咳嗽及感冒時行疫癘等症

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼 桔

梗 茯苓 甘艸 每服一兩加安三片薄荷少許煎日

乾舌燥加黃芩 風寒在表則惡寒發熱頭痛項

惡肢湯 治傷寒初覺頭痛身熱脈洪便當服此 非其傷寒



慈白一鼓升煎服取汗出如無汗加乾葛三

邪初在表宜先服此以解散之免用麻黃湯者之多所顧忌用代麻黃者之多所紛更也本方去淡豉加生薑治同名連翹慈白湯

十神湯 治風寒兩感頭痛發熱惡寒無汗咳嗽鼻塞聲重

麻黃 葛根 升麻 川芎 白芷 紫蘇 甘艸 陳

皮 香附 赤芍 等分加姜慈白煎 諸藥以散表邪

而又加芍藥和陰氣於發汗之中加甘艸和陽氣于疎利之隊也升麻葛根若太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發病矣慎之

參蘇飲 治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽痰塞中焦眩暈

李氏醫鑑 卷之四 感冒 一七

噴煩傷風泄瀉及傷寒已汗發熱不止發熱頭痛外感也咳嗽痰壅嘔逆泄

瀉內傷也已汗而熱不止陰虛也

人參 紫蘇 乾葛 前胡 半夏 茯苓 七錢 橘紅

甘艸 枳壳 桔梗 杏仁 錢 每五錢加姜棗煎外感

多者去棗加慈白 肺中有火去人參加杏仁桑白皮瀉肺

此手足太陰藥也風寒宜解表故用蘇葛前胡勞傷宜補中故用參苓甘艸橘半除痰止咳根桔利膈克腸木香行氣破滯使內外俱和邪散矣元戎謂此方治一切發熱行發諸有風藥解表有氣藥和中則外感風寒內傷痰飲並可 本方去人參前胡加川芎柴胡姜棗煎名芎蘇飲用也

治傷風寒外有發熱惡寒內有咳嗽吐痰氣湧此或肺有實熱故去

參加葛為通陰陽血氣之使

五積散 治外感風寒內傷生冷身熱無汗頭痛身

痛項背拘急胸滿惡食嘔吐腹痛寒熱往來

藿香正氣散 元氣虛弱 治外感風寒內傷飲食嘔逆痞滿

熱內凝

藿香 前胡 大腹皮 陳皮 桔梗 紫蘇 甘艸

茯苓 半夏曲 白芷 白木 厚朴一方加木瓜傷食

消食

本草備要主治註釋

李氏醫鑑 卷之四 感冒 大

葛根 開腠發汗解肌退熱若太陽初病不可便服升葛

胡為足少陽胆表藥若病在太陽服之太早則引賊入

胡若病入陰經復服柴胡則重虛其表此味胎禍極多最

宜升麻 引邪自散手陽明風邪同葛根能發陽明之汗

氣之散而實其表柴胡引少陽之清氣上行升麻 羌活 氣

引陽明之清氣上行故補中益氣湯用為佐使 辛苦微溫

而散散肌表入風之邪利周身百節之痛獨活 氣緩善搜

為却亂反正之主藥小無不入大無不通 獨活 氣緩善搜

入足少陰氣分以理伏風 防風 散上焦風邪頭痛脊強

同細辛治本經傷風頭痛 防風 散上焦風邪頭痛脊強

行血脈助脾胃消食 白芷 散風除濕細辛 散風邪益肝

前胡 解風寒散邪熱 猪苓 散風除濕細辛 散風邪益肝

開毛孔夏紫蘇 香溫散寒 薄荷 氣而抑肺盛 木賊 解風

川禁用

升散 能發揚邪汗丹瀝曰浮萍 火鬱浮萍 發汗勝于麻黃紫背者良 蒼耳子 善發汗散風 足滑石 治上下表裏諸症 防已 通腰 巴戟 辛散 淡豆豉 得酒 散風下子 白芥子 散 肉桂 去管衛風寒 桂枝 解肌 散風下子 桔梗 散寒 半夏 發表 當歸 辛溫散 川芎 行氣通 散風下子 陰陽血 散利開節 秦九 辛散 香附 辛散行氣氣行 氣之使 澤蘭 散利開節 秦九 辛散 香附 辛散行氣氣行 蒼木 散風 杏仁 散寒 陳皮 調中快膈宜通 橘紅 兼能除 皮 達表發汗有汗 木通 通利九竅 吳茱萸 逐風寒 川椒 發 微藿香 治肺虛有寒正氣 發汗解肌和 蒜 達諸發 寒 表開 乾姜 逐寒邪而發表去藏府寒氣 去寒濕 寒 表下食 乾姜 陽通宜脈絡開五藏六府利四肢關節 地

李氏醫鑑 卷之四 感冒

骨皮 能除內熱 慈粥 治傷風鼻塞用糯米煮臨 蒼耳粥 治 痛不明及諸風鼻流涕用蒼 肉桂酒 治感寒身軀疼痛 子五錢取汁和冰三合煮食 用辛桂末二錢

諸熱 附解肌退熱 發熱因由及發熱不休詳見表 初卷曰而上熱身前熱一身盡熱而妄言妄見皆足陽 明肩背熱及足外廉腫後熱皆足太陽口熱舌乾中熱 而喉足下熱而痛皆足少陰肩熱項似拔耳前熱若寒 皆手太陽身熱膚痛手足少陰酒洩寒熱手太陽中熱 太陰少陰厥陰熱而筋縱不收陰痿足陽明厥陰又曰胃 居膈上胃熱則膈以上熱腸居膈下腸熱則膈以下熱肝 居膈下肝熱則膈以下熱肺居膈下肺熱則膈以下熱腎 居腰腎熱則腰亦熱可類推也 脾主肌肉故熱在肉分 輕按重按皆不熱不輕不重乃得之過夜尤甚者為脾熱 寒熱宜瀉黃散及調胃承氣虛熱宜補中益氣湯 肝 風木盛火生則發熱多在干寅卯木旺之時按之在肉 之下骨之上 輕手按至皮毛之下肌肉之上為肺熱以 肺主皮膚故也酒洩寒熱邪在膚腠也日中大甚熱在 血脈為心熱輕按即得重按全無是熱在皮毛日晡尤甚 為肺熱濕在經亦日晡發熱鼻寒○吳穀曰小柴胡為半 表半裏之劑太陽經之表熱陽明經之標熱皆不能解也

李氏醫鑑 卷之四 諸熱

升陽散火湯 治肌熱表熱四肢發熱骨髓中熱熱如火燎 酒之烙手此病多因血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽 氣于脾土並宜服此 脾主四肢四肢熱即五心煩熱也火 陰而肌膚筋骨皆為之熱矣若飲食填塞至陰則 清陽不得上行故不能傳化也經曰火鬱發之 柴胡 防風 葛根 升麻 羌活 獨活 人參 白芍 炙甘草 生甘草 每服五錢加姜棗煎 吳鶴皋曰經曰少陰天非此火不能生物人非此火不能 有生揚之則光運之則滅今為飲食抑遏則生道幾乎息 矣使清出上竅則濁陰自歸下竅而飲食傳化無抑遏之 患矣東垣聖手解胃治之必主升陽俗工知降而不知升

是藥其少火也。安其衛生耶。又曰古人用辛散必用酸收。故桂枝湯中亦用芍藥。猶兵家之節制也。  
本方除人參獨活。加慈白。名火鬱湯。治同。  
寒脈沉而數。火鬱無從散。故外寒。沉為在裏。沉而數。知為內熱也。

**瀉白散** 治肺火皮膚蒸熱。酒漸寒熱。日哺尤甚。喘嗽氣急。

**桑白皮** 地骨皮 錢一分 粳米 百粒 易老加黃連 肺主西方。李時珍曰。此瀉肺諸方之準繩也。瀉白散瀉肺經氣分之火。黃芩一物。湯丹溪清金丸。瀉肺經血分之火。清金丸即黃芩炒。

**三補丸** 治濕痰夜熱 黃連黃芩枝子等分 用粥瀉黃散 見三 治脾胃伏火以及諸熱 諸熱詳前

**白朮除濕湯** 治午後發熱。背惡風。四肢沉困。小便色黃。又治汗後發熱。午後發熱。熱在陰分。陽陷陰中也。背為陽。腹重濕勝而脾不運也。小便黃。濕兼熱也。汗後而熱不退。陽虛也。

**人參** 赤茯苓 甘艸 柴胡 五錢 白朮 兩 生地 地骨皮 知母 澤瀉 錢七 每服五錢。如有刺痛。加當歸 錢七 小便利。減

苓澤一半。陽陷陰中。熱在血分。故以生地滋其少陰。而以知母地骨瀉血中之伏火也。柴胡升陽以解其肌。陽陷陰中。故以柴胡提其陽。苓瀉利濕。兼清其熱。參朮甘艸益氣助脾。氣足陽升。虛熱自退。脾運而濕亦除矣。方名除濕。而治在退熱。欲熱從濕中而下降也。

李氏醫錄 卷之四 諸熱

**人參清肌散** 治午前潮熱。氣虛無汗。熱發午前。陽虛而陰

故無汗。經曰。陽氣有餘。為身熱。無汗。陰氣有餘。為多汗。身寒。陰陽有餘。則無汗。而身熱。陽虛。則有汗。而身寒。有餘。則生外熱。陰虛。則生內寒。皆此理也。則為實。非真陰真陽盛也。

**人參** 白朮 茯苓 甘艸 半夏 麴 當歸 赤芍

**柴胡** 乾葛 加姜棗煎

**四君子** 以補陽虛。歸芍以調陰血。半夏和胃而行痰。柴葛

升陽而退熱。蓋以甘溫瀉火。甘溫能退大熱。酸寒活血。辛甘

解肌。有汗宜實表。無汗宜解肌。此之無汗。不同於傷寒。故但解其肌熱。

而不必發出其汗也。前藥各加黃芩 錢五 每服三錢。加姜

李氏醫錄 卷之四 諸熱

**棗煎** 名入參散 治邪熱客於經絡。痰嗽煩熱。此邪熱

淺在經絡。未深入臟腑。雖用柴葛之輕。全藉參朮之力。以

達其邪。又恐邪入痰隨。用茯苓半夏。兼動其痰。合之當歸

赤芍。黃芩。并治其血中之熱。止用三錢。為劑。蓋方成

知約。庶敢用柴葛耳。此叔微一極苦心。特為發之。

**四君子湯** 加山藥 名六神散 治小兒表熱。去後又發熱者

世醫到此。盡不能曉。或再用涼藥。或再解表。或謂不治。此

表裏俱虛。氣不歸元。而陽浮於外。所以再熱。非熱症也。宜

用此湯。加粳米和其胃氣。則收陽歸內。而身涼矣。熱甚者

如升麻知母名銀白湯 四君子 加木香 藿香 乾葛 名七味白朮散

治虛熱作渴。

六君子 加柴胡黃芩 名十味人參散治虛熱潮熱身體倦怠

東垣治肺熱身如燦不可近煩躁引飲而晝盛者用一味

黃芩湯以瀉肺經氣盛之火片芩 一兩煎服 李士材曰余胃

吐痰腹食通服諸藥益劇偶思東垣

治肺熱煩渴依方而服次日全愈

參蘇飲 感冒 治一切發熱皆效合四物名茯苓補心湯治

虛熱尤効

本草備要主治註釋 傷寒及時氣天行諸熱見本門

人參得黃耆甘艸 退大熱東垣曰參黃甘艸退熱之聖藥

元氣而虛 五味子 麥冬 菊花 貝母 白芍 生地

李氏醫鑑 卷之四 諸熱

陰虛生內熱 丹皮 除發熱退無 地骨皮 治有汗之骨蒸

潮人所知也退外潮人所不知病或風寒散而未盡作

潮熱往來非柴胡所能治用地骨皮走表又走裏之藥消

其清游之邪服之無有不愈 大小蘗 退熱 乾葛 解肌退熱

者故治表裏無定之風邪 柴胡 退熱 地膚子 除虛

秦艸 治虛勞煩熱 前胡 除寒熱 及黃芩 地膚子 熱大

熱利小便此余龍胆艸 治骨間寒 木通 除煩退熱汗 通艸

底抽薪之意也 熟香薷 散皮膚 滑石 解 石膏 體重熱 茯苓 退熱脾虛野

熱香薷之蒸熱滑石 肌石 輕解肌 茯苓 退熱脾虛野

驚甲 補陰 地骨皮 同青蒿 有奇功 猪苓 退大熱大熱利小

花粉 退枝子皮 退表 竹瀝 退熱 胡荽 散四 穀芽 開胃和中

則中自溫氣使君子 收飲 菟絲子 治脾虛腎燥而生內

自下熱自除 使君子 虛熱 菟絲子 熱益陰清熱故治之

荷 治小兒驚 雞蘇 退邪 紫蘇 解 黃芩 除寒熱 胡黃連 治五

青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 熱丹熱 白芍 退熱 生地 發熱

李氏醫鑑 卷之四 諸熱

火

火者氣之不得其平者也。五臟六腑各得其平，則營衛中和，經脈調暢。何火之有一失，其常度則衝射搏擊而為火矣。故丹溪曰：氣有餘便是火也。有本經自病者，如忿怒生肝火，憂思生肺火，思慮生心火，疲勞生脾火，妄想勞生腎火。是也。有子母相尅者，如心火尅肺，肺金尅肝木，肝火尅脾土，脾土尅腎水，腎水尅心火。是也。有藏府相移者，如肺火移於心，心火移於脾，脾火移於胃，胃火移於肝，肝火移於膽，膽火移於腎，腎火移於膀胱，膀胱火移於三焦，三焦火移於大腸，大腸火移於小腸，小腸火移於心。是也。有移熱于胃，則服清心火，煩熱久必移熱于小腸，則淋瀝肝火，熱久必移熱于胆，則口苦。腎火遺精久必移熱于膀胱，則淋瀝水腫是也。又有他經相移者，有數經相合者，有火起于肝，腎虛火由勞損，寢火生于亢害，燥火本乎血虛。濕火因于濕熱，鬱火由于遏抑，又有無名之火，無經絡可尋，無脈症可辨，致有暴病暴死者，諸病之中，火病為多。不可以不察，當從其重而治之。腎水受傷，真陰失守，孤陽無輔，發為火病。朱二允曰：火在上則口燥，口赤，鼻乾，在中則心煩，呃嘔，在下則淋瀝，足腫，必藉木通，甘平之性。

李氏醫鑑

卷之四

火

五

諸經之火，火退則小便便利，則諸經火邪皆從小水而下降矣。若火宜木通，相火宜澤瀉，利水雖同，所用各別。心熱則火自生，煩熱則木自生，風火相搏，膠痰上壅，遂致中風不語。有以瀉為瀉者，大黃、芒硝、連枝、栝之類是也。有以散為瀉者，羌活、柴葛、升陽散火之類是也。有以滋為瀉者，地黃、天冬、元參、知母之類，壯水之主，以制陽光是也。有以補為瀉者，參耆、甘地、瀉火之聖藥是也。時珍曰：枸杞、地骨、甘寒平補，使精氣充足，而邪火自退。世人多用苦寒以寒運降上焦，知栝降下焦，致傷元氣，惜哉。又曰：如母佐黃柏、滋陰降火，有金水相生之義。黃柏無知母，猶水母之無蝦也。蓋黃柏能制命門勝陽陰中之火，如母能清肺金，滋腎水之化源。丹溪曰：君火者，人火也，心火也，可以水滅，可以直折黃連之屬，可以制之。相火者，天火也，之惟黃柏之屬，可以降之。切菴曰：火有虛火、實火、燥火、濕火、鬱火、相火之異。虛火宜補，是火宜瀉，燥火宜滋，潤鬱火宜升，發濕火由濕鬱為熱，多病附脈經所謂諸虛火，大皆屬于熱。諸病附脈經所謂諸虛火，大皆屬于熱。

李氏醫鑑

卷之四

五

相火寄于肝腎，乃龍雷之火，非若寒所流陰虛火。諸經之火，皆應于心，腎貫目，有陽火有陰火。有木中之火，有土中之火，有金中之火，有火中之火，有陽火者，天上日月之火，生丁寅而死于酉，陰火者，燈燭之火，生于酉而死于寅。此對待之火也。水中之火者，雷火也，即龍雷之火，無形而有聲，不焚草木，得雨而滅，蓋發見于春，春而伏于秋，秋而收，龍雷之火見者，以五月一陰生，水底冷，而天上熱，龍為陽物，故隨陽而上，升至冬一陽來復，故龍亦隨陽而下，伏雷亦收，人身肝腎中相火亦猶是也。平日不能節慾，以至命門火衰，腎中陰虛，龍火無藏身之位，故遊于上而不歸，是以上焦煩熱，咳嗽等症，善治者以溫腎之藥，八味丸從其性而引之，歸原使有秋冬陽伏之令，而龍歸大海，此至理也。奈何今之治陰虛火衰者，以知柏為君，而愈寒其腎，益速其斃，良可悲哉。若有陰虛火旺者，此腎水乾枯而火偏盛，宜補水以配火，亦不宜苦寒之品，以滅火壯水之主，以制陽光，正謂此也。如燈燭火亦陰火也，須以膏油養之，六味丸不得雜一滴寒水，得水即滅矣。獨有天上火入于人身，如河間所論六氣暑熱之病，及傷暑中暑之疾，可以涼水沃之，可以苦寒解之，其餘爐中火者，乃灰土中無焰之火，得木則焰見，濕則滅，須以灰培實，以溫燼補中益氣歸脾六君子理中，建中人身脾土中火，以甘溫養其火，而火自退，經曰：勞者溫之，損者溫之，甘能除大熱，溫能除大熱，此之謂也。空中之火，附于木中，以常有坎水滋養，故火不烈，見龍乾柴生火，燥原不可止，遇力窮方止，人身肝火內熾，鬱悶煩燥，須以辛涼之品發達之，逍遙散經曰：木鬱則達之，火鬱則發之，使之得達，其炎上之性，若以寒涼下之，則愈鬱矣。熱藥投之，則愈熾矣。金中火者，凡山中有金銀之礦，或五金埋匿之處，夜必有火光，此金鬱土中而不得越，故有光耀發見于外，人身皮毛空竅中自覺針刺蚊咬及諸頂如火炎者，此肺金氣虛，火乘虛而現，肺主皮毛，故也。補中益氣合生脈散經曰：東方木實，因西方金虛也。補北方之水，即所以瀉南方之火，雖曰治金中之火，而通治五行之火，無餘蘊矣。人火可以濕伏，可以水滅，可以直折黃連之屬，可以制之。相火者，龍火也，雷火也，得濕則消，遇水則熄，不知其性，而以水折之，以濕攻之，適足以先

焔燭天物窮方止矣議其性者以火逐之則焔灼自消惟  
 太陽一照火自消滅此得水則滅得火則滅之一驗也桂  
 陸與相火同氣直入腎中據其窟宅安得不引之而歸原  
 耶人皆曰滅火而予獨以桂附溫補天其之火以消陰翳  
 焔東爽  
 同焚也

黃連解毒湯 治一切大熱表裏俱盛狂躁煩心口燥咽乾

大熱乾嘔錯語不眠吐血衄血熱甚發斑毒即火邪是也

黃連 黃芩 黃栢 枝子 等分本方去枝子名栢皮

湯治三焦實熱用粥丸各三補丸治三焦有火二便閉結

及濕痰夜熱。經曰壯火食氣。少火生氣。故少火宜升。壯火

壯火降而少火升氣得升而血得養三焦皆受益矣。

卷之四

涼膈散 治心火上盛中焦躁實諸症。

紫雪  
現門

治一切火熱

治諸火方  
散入各門

本艸備要主治註釋

茯苓  
瀉火降  
肉桂  
補命門相火兩腎中先天  
祖氣人非此火不能生  
地骨

皮伏火 桑白皮火 黃柏相火 槐花之火 苦棟子大熱

火下行  
川椒  
門補火  
竹瀝  
火竹茹  
之燥  
淡竹葉  
寒

心火不真 凉心 降火 枇杷 胃降火 蓮子 而 婦心腎

君相火旺下焦火  
焦火得寒冬火而生  
人參薄肺火得茯苓補下

無根浮游之火

能引火  
南花 能益金水二藏  
清金  
寫肺火

瀉焦貝母 瀉心  
 瓜蒌 清上焦  
 天竺分寒降  
 夏古仲緩肝

白芍 瀉肝  
赤芍 瀉肝  
丹皮 瀉血中  
紫艸 入心包  
素生 能

血中  
白茅根  
除伏  
藍根  
寒降  
連翹  
苦入心  
故人少陰厥

柴胡 平用胆三  
焦相火  
前胡 下氣氣下  
則火降  
升麻 升發  
木賊 升散  
知母

火瀉腎命相火 黃芩 瀉中焦 實火 黃連 入心瀉火瀉 心實瀉脾也 龍胆艸 益

無補瀉邪熱卽所以補之也。青黛瀉肝散五大黃瀉一

伏火  
才通  
火  
澤瀉  
之火邪  
燈  
清肺熱  
瞿麥  
火  
山

五木 保金氣 身干 火 石膏 降火 滑石 火 犀角 瀉肝

夏更能引肺火下行之為滋陰降寒水升肝黃

降火甚速至駭云不火之聖藥也

亦禁少服不不火安君主

\_\_\_\_\_

1

1

潤燥

諸方收  
人各門

經曰諸清枯潤乾勁發揚皆屬於燥乃肺與大腸陽明燥  
金之氣也金為生水之源寒水生化之源絕不能耗潤周  
身營養百機故枯槁而不潤澤也或因汗下亡津或因房  
勞虛竭或因服金石或同濃酒厚味皆能助火而損  
真陰也燥在外則皮膚皴揭在內則津少煩渴在上則咽  
焦鼻乾在下則腸結便秘在肝則皮枯無力在脉則細  
澀而微皆陰血為大所傷也治宜甘寒滋潤之劑甘能生  
血寒能勝熱潤能去燥使金旺而木生則火平而燥退矣  
燥乃陽明秋金之化經曰金木者生之成終始又曰木  
位之下金氣承之蓋物之化從于生物之成從于殺造化  
之道生殺之氣猶權衡之不可輕重也生之重殺之輕則  
傷其分布之政不惟生氣不得升而收氣亦不得降經曰  
逆秋氣則太陰不收肺氣焦清蓋肺為生水之源上焦  
開發如霧露氣是之謂氣氣即水也火旺尅金則肺病  
而津液日枯又曰脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀  
胱脾虛則土弱不能生金肺無所資遂不能生水故外則  
皮毛枯槁內則二便閉結而為燥症宜滋肺和脾壯水養  
血

李氏醫錄

卷之四

潤燥

李

本艸備要主治註釋

玄明粉 潤燥 白石英 潤燥 食益 潤燥 阿膠 潤燥 栢子仁 潤燥 郁  
李仁 潤燥 治大腸氣滯 黃栢 潤燥 補腎 槐實 潤燥 肝 桃仁 潤燥 治血 牛  
蒡子 潤燥 治陽痿 肉苁蓉 潤燥 滋陰 知母 潤燥 下焦 細辛 潤燥 腎 燥水  
腎燥細辛之辛能行水氣以潤之腎燥者心亦燥停心下則  
大腸干水故燥也經口腎苦燥急食以潤之 甘蔗 潤燥  
利便 枳椇子 潤燥 柿乾 潤燥 杏仁 潤燥 桃仁 潤燥 大棗 潤燥 心  
胡桃 潤燥 肺 竹茹 潤燥 肺 竹瀝 潤燥 肺 杜仲 潤燥 肝 蜜蒙花 潤燥 肝 胡麻

潤五牛乳 潤腸 龜板 潤燥 黃精 潤燥 葳蕤 潤燥 天冬  
滋腎 麥冬 潤肺 欬冬花 潤肺 紫苑 潤肺 百部 潤肺 半夏 潤肺 花粉  
潤肺 瓜蒌 潤肺 貝母 潤肺 當歸 潤肺 川芎 潤肺 補肝 紅花 潤肺 薏根  
燥大黃 芒硝 玄明粉 潤燥 俱潤

李氏醫錄

卷之四

潤燥

李

濕熱

中濕似中風 頭重身痛 肢節不能轉側

有在天之濕雨露是也 在地者本乎氣故先中表之榮  
衛有在地之濕泥水是也 在地者本乎形故先傷肌肉筋  
骨血脉有飲食之濕酒水乳酪是也 胃為水穀之海故傷  
于脾胃有汗液之濕謂之自汗 水未經解汗者是也 有太  
陰脾土所化之濕不從外入者也 陽盛則火勝化為濕熱  
陰盛則水勝化為寒濕 其症發熱惡寒身重自汗筋骨疼  
痛小便便澀大便溏泄腹滿不能轉側 脾肉如泥按之  
不起 熱上壅則下不通下不通則熱上壅又濕鬱則  
為熱熱蒸更為濕濕熱亦熱氣壅塞水液不行久而成濕  
寒濕久留亦變為熱 經曰四時濕首如裹濕氣蒸于上  
故頭重又曰濕傷筋故大筋緩短小筋弛長緩短為拘攣  
長為痿濕勝則濡泄故大便溏泄大便秘結小便澀短為拘攣  
下受之故附腫諸濕腫滿皆屬脾土故腹脹肉如泥濕氣  
入腎腎主水水流濕各從其類故腰膝痛 濕為陰邪經  
曰地之濕氣感則害皮肉筋脈濕者土之氣土者火之子  
故濕每能生熱熱亦能生濕如夏熱則萬物潤澤也 濕

李氏醫鑑

卷之四

三

羌活勝濕湯

見頭

通治濕症如身重腰痛沉然經中有

寒也加酒防已 五附子 五 陽微汗出惡風故用黃耆炙  
而為表散 羌活勝濕湯之功用下之則濕散當變常法  
濕流關節非前藥所宜矣無礙不入惟風為能故凡關節  
之病非風藥不能到也小方除濁活變劑用芍甘坤加升

麻杏木名羌活除濕勞  
治風濕相傳一身盡痛

腎着湯

治傷濕身重腹痛腰冷不渴小便白利飲食

如故病屬下焦 腎主水濕性下流必舍于其所合而歸于  
故腰身重足若痺也此由身 宜明用治胞痺膀胱熱痛  
勞汗出衣裏冷濕久入得之 宜明用治胞痺膀胱熱痛  
清於小便上為清涕 風寒濕邪客于胞中氣  
乾姜 炮 茯苓 兩 甘草 炙 白朮 炒 有寒者加附子經心錄  
加肉桂澤瀉為杜仲牛膝治同 此腎病而皆用脾藥蓋土  
腰冷如坐水中非腎之精氣冷也故飲食如故便利不渴  
且與腸胃之府無預况腎藏乎故但用甘溫從陽淡滲行  
水之藥足矣勿過曰此乃 外感之濕邪非腎虛也

李氏醫鑑

卷之四

三

五苓散加羌活名元戎五苓散治中焦積熱本方加 石膏滑

石桂苓甘露飲以清六府之熱本方加蒼木名蒼桂五苓

散治寒熱

猪苓湯

利濕瀉熱

通治諸濕熱口渴溺赤

吳鶴皋曰以

又加阿膠以存津液

黃九

治中焦積熱等症

黃九

治中外諸熱

黃連

黃芩

大黃

石膏

淡豉

麻黃

甘桔湯

加芥通咽

名如聖湯治上焦風熱

宋仁

小方



加運通薄荷竹 各桔梗湯治上焦風熱

藿香正氣散 治上焦壅熱

藿香治上焦壅熱能理脾肺之  
正氣正氣通暢則邪逆自除

本草備要主治註釋

石菖蒲 半夏 艾 蓬萊 秦艽 茵芋 防風 均為勝濕

藥本 下 羌活 治風濕 獨活 治濕 白芷 細辛 散風 木瓜

厚朴 木賊 浮萍 蒼耳子 風濕 木通 黃連 苦參

俱燥 龍胆 艸 去下焦 甘遂 能瀉腎經及 大戟 瀉藏府 防已

澤瀉 車前子 濕熱 附子 引溫安藥達下焦 草薢 蛇

李氏醫鑑

卷之四

雷

牀子 白菴 艸 菴 金銀花 扁豆 赤小豆 胡麻

苡仁 蒜 俱去 寒濕 干姜 燥脾 白礬 兒茶 海螵蛸 祛果

牡蠣 原蚕砂 茯苓 去濕 松節 燥血中 栢子仁 桑葉

猪苓 黃柏 五加皮 海桐皮 蕪荑 皂莢 花

椒 蒼木 白朮 俱去 黃芩 商陸 白蘚皮 甜瓜蒂

椿樗皮 榆白皮 木瓜 俱去 滑石 為湯熱除濕之要

竅不獨小便上開腠理而發表是除上中之濕熱下利便

溺而行水是除中下之濕熱去則三焦寧而表裏和濕

去則關門通而陰陽利矣河間云元（燥可去濕於白皮

散通治上下表裏諸病蓋是此意（赤小豆之類是也

滑石為至燥之劑蓋皆以行水之藥為燥而不以燥熱之

藥為燥也五苓湯濕勝故用桂枝水指苓為熱勝故用滑石

葦莢 治陽明 青箱 除風 蓬砂 去上焦 辛夷 治風 蕤仁 消風

槐寔 珠導 風熱 竹茹 去上焦 淡竹葉 除上焦 甘菊 去風 荆芥

白芷 細辛 麻黃 槐花 穀精 艸 俱除 風熱

李氏醫鑑

卷之四

雷



李氏醫鑑

卷之四

嘔隔反胃

李

茯苓枳殼竹瀝白明粉姜汁為丸如大便燥結塊如羊屎  
自製潤腸利膈丸當歸枳殼木香俱即人參大黃滴木為  
丸并服牛乳人乳梨汁松仁脈緊而乳緊則為寒乳則為  
虛虛寒相搏脈為陰結而逆其人則嘔吐噎膈皆屬干  
胃但以氣血多少為異耳○嘔者陽明也陽明多血多氣  
故有聲有物氣血俱病也逆者散之故以生薑為主吐  
者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也以橘紅  
主之噎膈白少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也  
以半夏主之三者皆因脾虛或寒氣客胃飲食所傷以丁  
香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類分其經絡察其虛實不  
可混也○邪在上脘之陽則氣停而水積故飲之清濁濕  
亂則為痰為飲為涎為嘔變而為嘔邪在下脘之陰則血  
滯而穀不消故食之清濁不分則為噎塞為痞滿為痛為  
脹變而為吐邪在中脘之氣交者盡有二脘之病○嘔從  
氣病法天之陽動而有聲與飲俱出猶雷震必雨注也○  
吐從血病法地之陰靜而無聲與食俱出象萬物之于地  
○嘔吐則氣血俱病法飲食之氣交飲食皆出○然上脘  
非不吐食也設陽中之陰亦病則食入即吐非若中脘之

食已而吐下脘之食久而吐也○下脘非不嘔也設陰中  
之陽亦病則吐與嘔齊作然嘔少干吐不若上脘之嘔多  
于吐也○上脘食利久則吐生薑半夏湯生薑半夏各一  
錢中脘食已即吐橘紅半夏湯陳皮半夏生薑下脘食久  
則吐為反胃脈沉而無力理中湯脈滑而實半夏生薑大  
黃湯下之○仲景治嘔穀不得下半夏一升生薑八兩茯  
苓四兩生薑半夏之辛但治上焦氣擁表實若胃虛者惟  
宜益胃推蕩穀氣而已用參朮忌用辛瀉故服小半夏湯  
不愈者服大半夏立愈即泔瀾水也半夏二升人參三兩  
白蜜一升水一斗三升和蜜揚二百四十遍煮藥取三升  
三次服寒吐者喜熱惡冷肢冷脈細而滑用理中湯水  
服之冷遇冷相入不致吐出如用理中湯到口即吐去白  
木甘神之聖加沉香丁香立止○熱吐者喜冷惡熱煩渴  
小便赤澀脈洪而數二陳湯加山枝黃連竹茹枇杷葉乾  
葛姜汁蘆根汁怒中飲食嘔吐胸滿膈脹悶格不通二陳  
湯加青皮木香木效丁香沉香木香砂仁藿香厚朴藿香  
陳皮半夏神曲姜棗服○中脘素有痰積遇寒即發丁香  
豆蔻砂仁干姜陳皮半夏加姜汁白芥汁至盡許○痰滿

李氏醫鑑

卷之四

嘔隔反胃

李

弱喉粥藥到口即吐先生姜湯下養正丹俟藥可進則  
以二陳加枳實砂仁桔梗厚朴姜汁服之虛者加人參本  
因中寒用熱藥太過以致嘔逆二陳加白芷藿香沉香因七  
情而得者理中加木香沉香烏藥○陰虛而龍雷之火亢  
逆宜姜汁炒熟地加按即黃柏沉香導之使下○脾胃久  
傷含原空虛因而嘔吐宜焦米神曲陳皮人參姜棗和之  
則自止○氣者身熱骨痛食入則先嘔而後瀉此上焦傷  
風閉其腠理經氣失道邪氣內鬱麥冬湯主之麥冬蘆根  
竹茹人參陳皮白木茯苓甘神威靈生薑○走哺者下焦  
虛熱便不通氣逆嘔吐人參湯主之參白木陳皮茯苓  
苓石香交諸苓威靈知母蘆根汁○食已暴吐脈浮而洪  
此上焦火逆也宜桔梗枳殼陳皮厚朴木香枳白芍補之○下  
夏茯苓氣降則火自清吐漸止加人參白芍補之○下  
問上脘亦因火在上焦宜桔梗陳皮厚朴木香枳白芍補之○下  
之○乾嘔宜橘紅煎湯入甘蔗漿生薑汁細細呷之○惡  
心心中大欲吐不吐多屬胃虛宜半夏茯苓陳皮白木  
生薑○仲景云欲吐者不可下又用大黃治食已即吐何  
也曰欲吐者病在上因而越之可也逆之使下則必憤鬱

而益甚若既吐矣當吐折之使其下行故用大黃丹溪云  
凡病吐者切不可下近于因矣○嘔苦邪在胆經胆木善  
上乘于胃土則逆而嘔胆汁故苦也宜吳茱萸黃連生薑  
黃芩茯苓○吐酸內經云諸嘔上酸皆屬于熱東垣又以  
為寒何也若胃中濕氣鬱而成酸則濕中生熱故從木化  
而為酸味法當清之若久而不化則肝木且盛胃土日衰  
經云木欲定金當平之辛為肺經之味故辛可勝酸辛則  
必熱辛以制東方之寇熱以扶中土之衰倘濁氣不降而  
日以寒藥投之非其治矣○吐酸一症大抵宿食滯于胃  
而胃散加香砂查曲若停飲所致若木半夏茯苓陳皮  
最効  
肥清水渴欲飲水入即吐名曰水逆五苓散主之赤石  
脂湯歸脾方寸七漸益至三七服盡一斤終身不吐痰水  
亦可終身無病○引涎沫六君加益智生薑或以半夏  
與干姜等分為散○吐膿仲景云家雖有痼疾不必治  
膿盡自愈或地黃丸煎服胃弱黃者三錢白木三錢  
麥根一兩○嘔蟲與吐蛇為胃中冷理中湯加川蜀椒即  
黃連烏梅就見若則安見椒則伏見酸則不能咬也○反

胃火衰微胃寒脾弱不能消穀朝食則暮吐暮食則朝吐或飲食入胃既下而復出者此胃之虛也宜理中湯為主甚者加附子若脈微者非熱不殺穀乃火性上炎多升少降應與異功散加黃連沉香當歸生地此症至口吐白沫者如羊大便為危急必與養氣以培其陽益血以滋其陰則金無畏火之炎腎有生木之漸脾胃健運飲食消磨矣○咽喉閉塞胸膈滿悶用香砂枳實以開痰結滯然破氣過多中氣因而不運當異功散加香砂使氣旺則能健運○李時珍治反胃久不愈者用香砂枳實小龍九漸次加之開胃自透宜入參利氣九木香枳實小龍九當歸生地人參甘肅大黃水煎然服通利之劑過多血液耗竭轉加閉結宜用杏仁去皮尖炒四兩枳實四兩時時食之淨其痰涎然後用蘇九半夏曲二兩枳實一兩牙皂炙玄明粉白茯苓枳實各一錢竹瀝薑汁為丸大發不滯者代抵當湯作丸如芥子大每服三錢去枕仰臥細細嚥

李氏醫鑑

卷之四

噎膈反胃

李

噎之有蟲聚而反胃者宜枳實黃連牛大黃丸調治得宜反胃新愈切不可便與粥飯每日用人參一兩陳皮三錢陳米炒魚三錢煎湯細啜之可以小試陳米飲若舍陳米固不宜聚貯米穀往往食早者多不可救矣

麻仁散子 治噎膈血少閉結

芝蔴去壳真蘇子 二味細研水淘取汁數碗再入白米

亦治老人風秘 多少得宜煮成粥飲服之大便秘結如

橘皮麻仁丸 治同上

橘皮 杏仁 麻仁 各三 郁李仁 五 右以橘皮為末三

仁俱搗將棗煮取肉同烏和丸每服四五十九枳實湯下

人參利膈丸 治噎膈翻胃

人參 當歸 甘艸 枳實 藿香 各一 木香 枳郎 各  
大黃 厚朴 姜汁 酒水九每服五十九溫水下  
三白酒 治噎膈翻胃 養血 依痰  
大酒 白糖 白蘿下 生梨 各一 將梨下搗汁併糖  
入酒內封固罈口三日後徐徐飲之

延真膏 養胃寬中治噎膈翻胃有奇功 補中  
人參 四兩 白朮 白茯苓 山藥 枸杞 蓮肉 各二 何首烏  
三兩 用竹 山萸肉 二兩 肉蓯蓉 五兩 當歸 二兩 生地 熟  
刀刮去皮 麥冬 各六兩 俱 志肉 去心 二兩 甘草 汁浸一  
地 天冬 麥冬 用浸一宿 志肉 去心 二兩 甘草 汁浸一

李氏醫鑑

卷之四

噎膈反胃

李

右藥末藥汁加白蜜 一斤 和勻入罈內以著皮封固入鍋  
內水煮一宿成膏每服半酒鐘 注石山曰翻胃與噎膈相  
他方 酒勝于

韭汁牛乳飲 治胃腕有死血乾燥枯槁食下作痛翻胃便  
秘 韭萊汁 別木連 牛乳等分時時呷之有痰阻者加羊

汁本方去牛乳加陳酒治血膈 韭汁 清瘀血

韭汁辛溫益胃消瘀牛乳甘溫潤燥養血瘀去則胃無阻

血潤則大腸通而食得下矣

四物湯 加橘紅 紅花 酒 桃仁 留 蟬屎 防其 治噎膈翻胃

秘結

秘方 治噎膈

童便 牛羊乳 韭汁 竹瀝

蜜姜 燉去甘蔗汁 解毒

氣虛加四君子 血虛加四物

胡荽升 治反胃氣結

烏骨雞

一隻 胡荽入雞腹縫之 熱食漸盡再一隻妙甚

効

十煎湯

攻裏

除大棗加大黃 黑丑 輕粉 名三花神

佑九

治壯寔人積痰翻胃 服法見

李氏醫鑑

卷之四

四

代類旋覆湯

呃逆

周揚俊曰 此湯予每借之以治反胃氣逆不降者神効

七氣湯

鬱門後

治七情鬱結痞滿噎塞

人參養胃湯

五膈寬中散 三一承氣湯 均治噎

木艸備要主治註釋

非汁

散竹瀝

姜汁 治噎 痰童便 降人乳牛羊乳 潤燥 補血 蘆根 止

茅根汁

血甘蔗汁

和諸汁頓服亦佳 確砂 治噎 或加燒酒米醋白蜜

細細緩緩溫服

姜汁

治噎 確砂 治噎 或加燒酒米醋白蜜

草薹

治吐逆反胃

白芥子 治反胃 吳茱 治胃冷 桂心

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

百神霜 治噎

白水牛 喉 除雨

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

治噎 訶子 治氣 蓬砂 治噎

清微痛右脈其清開脈沉此瘀血在胃脘之下氣鬱而  
成淡微寒食道也以韭汁半盞細細冷呷盡斤而愈  
有人血耗便若羊屎病反胃半午脈微而不勻不大便  
者八九日先與甘蔗汁煎六君子湯加附子大黃與之  
何便潤令  
以乳服之

附外科正宗方

五膈綱胃散 治五膈食不下嘔呃痰多咽喉噎塞胸膈滿  
痛

人參七分 桔梗一分 沉香一分 半夏二錢 白朮一錢 甘艸五分  
白豆蔻五分 枳殼二錢 枳實二錢 草澄茄五分 枇杷葉一錢 木香五分  
加姜七分 陳老倉米一撮 煎至一鍾食前一服食後一  
服

李氏醫鑑

卷之四

五

服臨卧一服

五膈散 治胸膈痞悶諸氣倍聚脇肋脹滿痰逆惡心不進  
飲食

枳殼五分 青皮五分 大腹子五分 半夏曲五分 木香二錢 南星二錢  
炮一錢 麥芽一錢 干姜一錢 草果仁一錢 白朮一錢 加姜一錢  
七片空心少服食後多服

瓜蒌實丸 治胸膈痞滿胸脇作疼喘急煩悶五膈五噎翻  
胃服之皆効

瓜蒌仁易 枳殼易 半夏易 枳梗易 共為細

禾用濃姜汁煮神曲糊丸每服五七十丸食後姜湯下且  
三服

東坡家藏仙方

卑用藍錠白湯化下收次効凡用藥內必用藍錠或青黛  
亦佳此病多用藥華反燥津液恐未合  
宜惟有四物 陳四君子加減用

太倉丸 治翻胃及飲食不進脾胃弱者尤宜服之

白豆蔻砂仁 陳倉米一升 黃土炒 為細末用生

姜自然汁合和為丸每服一百丸食後姜湯下

又方 用真阿膠錢五 取大路邊行人拋下乾糞炒存性作末

李氏醫鑑

卷之四

五

五錢同阿膠末和勻五更初以姜片蘸食能起死回生

又方 以手巾裹枳頭糠時時拭齒治卒噎膈或括下枳頭  
糠口內含之或煎湯細細呷嚥下効

李氏醫鑑卷之五

暑喝

音調

暑為陽邪心屬離火故暑入心從其類也

暑為陽邪心屬離火故暑入心從其類也... 暑喝者暑邪入心也... 暑邪入心則心火熾盛...

為症不一彼為寒邪傷形此則暑熱傷氣... 暑熱傷氣者元氣虛也... 暑熱傷形者...

濕皆地之氣氣濕所以中足經暑乃天之氣係清邪... 所以中足少陰心經其病與傷寒同...

則為邪在中焦則吐瀉兼作此濕霍亂症輕易治又有心... 腹脹痛不得吐瀉者此名乾霍亂...

四味香薷飲 治一切感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重自汗

肢倦或煩渴或吐瀉 暑為陽邪故蒸熱暑必兼濕故自汗

利上蒸于頭則重而 痛暑能傷氣故倦怠

香薷兩厚朴姜汁扁豆炒五黃連三錢 冷服香薷辛熱

經所開治濕以清涼 山行之也熱服作瀉

本方除扁豆名黃連香薷飲治中暑熱盛口渴心煩下

鮮血本方除黃連名三物香薷飲治傷暑嘔逆泄瀉再加

茯苓甘艸名五物香薷飲治中暑再加木瓜名六味香

薷飲治中暑濕盛熱盛則加黃連以清心火濕再加人參

黃耆白朮陳皮名十味香薷飲治暑濕內傷頭重吐利身

倦神昏此方感而兼內傷之症故用香薷三物香薷飲加

羌活防風治中暑兼中風僵仆搐搦或再加黃耆白芍

得病手足搐搦如三物香薷飲加乾葛名香薷葛根湯治

暑月傷風咳嗽治傷暑泄瀉本方加茯苓治瘧瘧不寒

李氏醫鑑

日神膏當責之暑邪暑先本方用香薷扁豆厚朴木瓜甘

艸加香附陳皮蒼朮名三香散蓋合香薷飲香治外感內

傷身熱腹脹

清暑益氣湯治長夏濕熱炎蒸四肢困倦精神減少胸滿

氣促身熱心煩口渴惡食自汗身重肢體痠痛小便赤澀

大便溏黃而脈虛者皆濕熱人脾土受傷故肢倦則泄瀉

在上則生腫脹故胸滿惡食皆先入心汗為心液故自汗

濕盛故身痛身重寒傷形表邪外盛故脈大而而餘暑傷

氣元氣耗傷故脈虛而不足黃耆人參白朮蒼朮神麴青皮陳皮白甘

神麥冬五味當歸酒黃柏酒澤瀉升麻葛根

姜棗煎東垣曰脾虛肺氣先絕故用黃耆開脾理止汗

以人參補之陽旺自能生陰血也東垣當歸酒黃柏酒

栝以救腎水蓋甘寒瀉火火滅則心氣得平而安也心火

乘脾故用炙甘草瀉火而補脾少用熟地滋陰也中滿者去之

若腹中急痛急痛者却宜多用炙甘草去人參為清濁相干

故以栝皮理之長夏濕勝故加三木澤瀉上下分消其濕

熱也濕勝則食不化妙藥辛甘青皮辛溫消食快氣五味

麥冬人參甘微酸寒瀉火熱而益肺氣救庚金也腎實曰

李氏醫鑑

有傷暑吐衄者暑傷心虛不能生血不宜過用寒涼以

瀉心宜酌量益氣加丹皮生地犀角之類蓋暑傷心

亦傷氣其脈必虛以參耆補氣使能攝血斯無弊也

本方除青皮澤瀉乾葛名黃耆人參湯東垣治暑傷元氣佳

夏倦怠胸滿自汗時作頭痛時痛時止本方除白朮黃

麥冬五味加茯苓枳殼柴胡羌活防風連翹知母各補肝

湯治陰汗如水陰冷如水脚痿無力

生脈散治熱傷元氣氣短倦怠口渴多汗肺虛而咳肺主

熱傷肺故氣短金為火制不能生水故口渴氣少故倦怠

肺主皮毛虛故汗出虛火乘肺故痰涎壅盛曰津乾庚大腸

所主三代之時為庚金受囚若亡津液汗大泄濕熱亢甚

燥金受囚風木無制故風濕相搏骨節煩痛一身盡痛也

人參麥冬分五味子七肺主氣肺氣旺則四藏之氣皆旺虛故脈絕氣短也心主



消暑丸 治伏暑煩渴發熱頭痛脾胃不利

半夏一斤醋五 茯苓 甘艸半斤 姜汁糊丸勿見生水熱

湯下有痰生姜湯下長夏炎熱濕土司令故暑必兼濕症  
氣不得通化此方不治其暑而治其濕用半夏茯苓行水  
之藥少佐甘艸以和其中半夏用醋者醋能開胃散水  
飲熱解毒也使暑濕二氣俱從小便下降則脾胃和而煩  
渴自止矣局方取此名為消暑丸意甚深遠傷暑而發熱  
頭痛者服此尤良

五苓散見濕 治暑毒入心發熱大渴小便不利及暑濕

搏自汗身重渴者去桂加黃連朱丹溪謂傷暑每發暑病  
氣汗為心液汗多必致亡陽惟用香薷飲五苓散利水之  
藥使暑氣從小腸膀胱下降則病易愈而元氣無損矣

本方合黃連香薷飲名香薷湯治傷暑泄瀉加姜薑煎水

方合平胃散名胃苓湯治中暑傷濕停飲夾食腹痛泄瀉

桂苓甘露飲 治中暑受濕引飲過多腹脹便赤兩桂茯苓等分蜜丸

滑石四兩 石膏寒水石 甘艸各二兩 白木茯苓澤瀉各一兩 猪苓

肉桂各五錢 每服五錢 張子和去猪苓減三石一半加入

參乾葛各一兩 藿香五錢 木香一分 各桂苓甘露飲每服三錢

治伏暑煩渴脈虛水逆渴欲飲水水入即吐名水逆

人參白虎湯見火 本方加入人參三兩 治太陽中暈身熱汗出

惡寒足冷脈微而渴身熱惡寒在表足冷脈微又不可表 本方加人參

白虎加蒼朮湯治濕溫脈沉細者沉細屬濕先受暑後受

症脈冷腹滿頭痛身痛多汗而渴而東垣曰動而傷暑火  
熱傷氣辛溫之人多得之宜白虎湯而動而傷暑濕勝  
身重安樂之人多得之宜白虎湯而動而傷暑濕勝  
加柴胡黃芩半夏名柴胡石膏湯治暑嗽喘渴  
竹葉石膏湯方見大門 治傷暑發渴脈虛

六一散 治傷寒中暑表裏俱熱煩躁口渴小便不通瀉

熱瘧霍亂吐瀉解酒食毒暑熱皆陽邪在表則發熱在裏則瀉痢霍亂發症在上則瀉  
在下則便閉或熱瀉

滑石六兩 甘艸一兩 冷水或燈心湯下丹溪曰瀉瀉瀉

本方加辰砂少許清 名益元散加薄荷少許清 名雞蘇散

加青黛少許清 名碧玉散治同

獨聖散 治太陽中暈身重痛而脈微弱夏月傷冷水水瀉

出之陽反中入內故身熱重痛以瓜蒂搗去胸中之水則皮中之水自行

乾霍亂吐方 治乾霍亂欲吐不得吐欲瀉不得瀉腹中太

痛者 燒盆 熱重便三飲而三吐之 吐瀉不得邪結

中焦醎能軟堅可破頑痰宿食炒之則苦故能涌吐重便

本人身下降之氣引火下行乃其舊路味又醎寒故瀉火

甚速。此由脾上鬱極而不暢發以直涌于上。潮沙下下。則致火熱內擾陰陽不交而然。中通矣。方極簡易而有回生之功。不可忽視。陰之不調也。陰既不通。血亦不行。兼用行血藥也。

二氣丹 治伏暑傷冷。二氣交錯中脘痞結。或嘔或瀉。霍亂。

硝石 硫黃等分。末。石器炒成砂。再研。糯米糊丸。梧子大。每服四十九。井水下。

霍香正氣散 治傷冷傷濕中暑霍亂吐瀉。宜增減用。

六和湯 治夏月飲食不調。內傷生冷。外傷暑氣。寒熱。

李氏醫錄 卷之五 七

交作霍亂吐瀉。及伏暑煩悶倦怠。暗臥。口渴便赤。暑濕燥火之六氣。夏月感之為多。故用諸藥。匡正脾胃。以拒諸邪。

砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜 人

參 白朮 赤茯苓 甘艸 加姜棗煎傷暑。加香薷傷

冷。加紫蘇。一方無白朮。一方有蒼朮。

七氣湯 治陰陽反戾。吐利交作。寒熱眩暈。痞滿噎

塞。

縮脾飲 理脾 清暑氣。除煩渴。止吐瀉。霍亂。及暑月酒食所

傷。

砂仁 草薢 烏梅 甘艸 扁豆 乾葛

理中湯 治霍亂若陰寒所致者。宜此湯。

大劑散 治胃暑伏熱。引飲過多。脾胃受濕。水穀不分。

清濁相干。陰陽氣逆。霍亂吐瀉。藏府不調。

乾姜 桂 杏仁 甘艸 等分。先將甘艸用白砂炒。

次入姜杏炒過去。砂合桂為末。每服二錢。夏月過于飲冷。

伸越故氣逆而霍亂吐瀉也。脾胃喜燥而惡濕。暑濕而惡

寒。桂散寒。燥濕。杏仁利氣。調脾胃。皆辛甘發散之藥。升伏

陽于陰中。亦從治之法也。如傷暑無寒症者。不可執泥。

中傷暑。陽外陰內。故多用暖劑。如大劑散香薷飲之。類

大非辛熱。逆氣故亦治之。然有陰陽二症。寒熱不同。治

當審慎。此方非治暑。乃治暑月飲冷受傷之脾胃耳。

李氏醫錄 卷之五

霍亂絞腸沙 以針刺其手指近甲處二分半。諸出血即安。

仍先自兩臂將下。令惡血。終于指頭後刺之。刺音七。

積聚癥瘕瘕

諸積聚一伏梁

易門 瘕瘕 瘕瘕

積聚者，病名也。各異其類，有積、有聚、有瘕、有癥。常虛者，注也。流注上下六府，所成或聚或散，或聚或散也。亦猶積也。腹中有塊，按之應手，或散或聚，或聚或散也。堅硬者，時無有塊之所，因氣不聚，或聚而散，或散而聚。欲知其物何所，依附腸胃，迴曲折之處，暫為棲聚，久成癥瘕。用隔津液，蒸氣藏府，獨動其根，故為癥瘕。積聚，患在心腹，多見于男子。瘕瘕之疾，患在腸胃，多見于女子。婦人有塊，多是死血，凝于血海，驗症可決治之。之法，養正自除。驟用下藥，徒損其氣，化癥開鬱，和中行氣。積久成癥，食聚多是氣，陰堅而不移，各積推移不定，或痰或食。古曰：養正，積自除。初卷曰：壯人無積，虛人則有之。皆由脾胃虛弱，氣血兩衰，四時有感，皆能成積。若速以磨堅破結之藥治之，病似去而人已衰矣。故善治者，當先補虛，使血氣壯，積自消。如滿座皆君子，則小人自無容地而退矣。夫不問何病，先調其中，使善飲食，是其本也。血凝氣聚，李氏醫鑑

李氏醫鑑

卷之五

積聚癥瘕

九

散聚湯 治積聚癥瘕

陳皮 半夏 茯苓 甘艸 厚朴 枳實 杏仁 附子 吳萸 桂 川芎 川歸 枳殼

大七氣湯 治積聚癥瘕

青皮 陳皮 藿香 甘艸 香附 益智 肉桂 三稜 莪朮

阿魏丸

阿魏 二錢 青皮 莪朮 茴香 胡椒 各一兩 丁皮 白芷 砂仁 肉桂 川芎 各五錢 醋阿魏打糊為丸 硃砂為衣

淡薑姜湯下

三聖膏

未化石灰半斤為丸，瓦器炒微紅，提出候熱稍減，入大黃

李氏醫鑑

卷之五

積聚癥瘕

一

末一兩，再炒熱，提出入桂心末五錢，再炒，入米醋熬成膏，攤貼患處。

琥珀膏

大黃 二兩 朴硝 一兩 麝香 一錢 用蒜搗膏，攤貼外以油紙覆縛

千金硝石丸

大黃 八兩 硝石 六兩 人參 甘艸 各三兩 用三年苦酒三升置

器中，以竹片作準，每入一升，作一刻，先入大黃末，不佳手攪，微沸盡一刻，乃下餘藥，又盡一刻，微熬為丸，梧桐子大，每服三十丸，服後下糞如雞肝，米泔亦黑等物，用粥飲調。

理

痞氣丸

本方除吳茱萸白朮茯苓澤瀉茵陳花柳砂

仁加石菖蒲茯苓神丹參紅豆名伏梁丸

心本方除吳茱萸砂仁桂朮黃芩澤瀉加柴胡莪朮皂角尾

布甘艸名肥氣丸

木砂仁黃芩茵陳澤瀉加紫苑桔梗天冬白菴陳皮青皮

三稜名息黃丸

本方除吳茱萸白朮砂仁人參干姜川椒黃芩茵陳加菖蒲

丁香附子苦棟延胡獨活金蠅名奔豚丸

于小腹上至心下若豚狀上下無時令人喘咳骨疼此

丹皮散

丹皮

五積散

玉屑無憂散

本草備要主治註釋

三稜莪朮

木大黃

木大黃

桂心

堅壯

結

疝

疝

仁

馬尿

痞滿 結胸 難病與傷寒辯論

初卷曰痞滿因陰伏陽氣而不運而成處心下位中央  
與寒痞滿皆土病也與脹滿有輕重之分痞惟內覺滿悶  
脹滿則外有脹急之形也前人皆指誤下所致蓋傷寒之  
病由于誤下則裏氣虛表邪乘虛入于心下若雜病亦有  
中氣虛衰不能運化積微而成痞者有飲食積滯不能施  
化而成痞者有濕熱太甚上米心下而成痞者古方用苓  
連枳實之苦以泄之厚朴半夏生薑之辛以散之參白  
朮之甘苦溫以補之茯苓澤瀉之淡以滲之惟宜上下分  
消其氣果有內實之症庶可畧施疎導世人苦于痞塞喜  
用利藥暫時通快藥盡滋甚皆不察下多亡陰之意也東  
垣曰酒積熱利上之藥過亦作痞傷蓋下多亡陰陰者脾  
胃水穀之陰也胸中之氣因虛下陷于心之分野故致心  
下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則病益甚  
其而復下之氣愈下降必變為中滿膨脹非其治也初  
日脾無積血心下不痞故須兼血藥傷寒心下滿鞭而  
痛者為結胸為實鞭滿而不痛者為痞為虛經曰陽明  
李氏醫鑑 卷之五 痞滿結胸

人下後復發汗心下痞惡寒者表未解也當先解表乃可  
攻痞解表桂枝湯攻裏大黃黃連瀉心湯病發于陽而  
反下之則結胸乃邪熱陷入血分亦在上脘故大陷胸湯  
在氣分只用小陷胸湯經曰心下痞按之濡關脈浮者  
大黃黃連瀉心湯大抵諸痞皆熱故攻之多寒則此加附  
子恐三黃重損其陽非補虛也或下後復汗或下後陽虛  
故惡寒汗出嘉言曰此邪熱既盛與陽復虛之症故于  
三黃加附子汁共成領痞之功諸痞心下痞皆治傷寒痞  
滿在心胸不在胃也若難病痞滿有寒熱虛實之不同保  
命集云脾不能行氣下四藏結而不散則為痞傷寒之  
痞從外而之內故宜苦泄難病之痞從內而之外故宜辛  
散初卷曰有用寒藥而治熱痞大黃黃連之類也有陰  
陽不和而痞用寒熱藥者大黃黃連加附子之類也有陰  
盛陽虛而痞用辛熱多而寒藥少者半夏生薑甘艸細辛  
之類也經曰本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解口  
渴而煩躁小便不利者五苓散主之此有停飲故也經  
曰太陰所致為瀉飲痞隔皆陰勝陽也受病之藏心與脾

也因而鬱結而為痞者有火與濕也蓋心陽火也主血脾陰  
土也主濕凡傷其陽則火拂鬱而無裨傷其陰則土蕸寒  
而濕滯陽陽之分施治之法不可同也凡治痞症宜理  
脾胃而導血藥世有用氣藥治痞而不効者蓋未明此理  
也用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃之濕  
熱非瀉心也胃之上脘在心故曰瀉心

痞氣丸 治痞積在於胃脘大如盤久不愈令人四肢不收

黃連 厚朴 錢五 吳茱萸 錢三 白朮 黃芩 錢二 茵陳 錢二 干姜 錢二

砂仁 半人參 茯苓 澤瀉 錢一 川烏 炮 川椒 分 桂 巴

豆霜 分 蜜丸燈草湯下

枳實消痞丸 治心下虛痞惡食懶倦右關脈弦 脾虛不

滿惡食脾土四肢虛故懶倦右關  
屬脾脈弦者脾虛而木來侮之也

李氏醫鑑 卷之五 痞滿結胸

枳實 炒黃連 五錢 厚朴 姜汁炒 四錢 半夏曲 麥芽 炒 人參

白朮 炒 茯苓 錢三 干姜 錢二 蒸餅糊丸

枳實苦酸行氣破血脾無積血心下不痞黃連苦寒瀉熱  
開鬱並治痞之君藥干姜去瘀血而通關開五藏六府四  
肢關節朴芽夏皆所以散而瀉之也參朮苓艸溫補健運  
而痞自化既以助散瀉之力又以固本使不傷真氣也

平胃散 治脾有停濕痰飲痞隔宿食不消 脾濕太過木邪

之脾虛不能健運故  
有痰食壅滯

蒼朮 厚朴 橘紅 甘艸 錢一 加姜棗煎

枳木湯 枳一 治水飲心下堅大如盤邊如旋盤 心下上焦

枳木丸 枳一 治痞除痰健脾進食 消痞除痰消也 痞悶加

枳木丸 枳一 治痞除痰健脾進食 消痞除痰消也 痞悶加



腎者腎之關也。門不利故水聚而從其類也。故水聚下  
為腫。大腹上為喘。不得臥者。標本俱病。故肺為喘  
腎為水腫。肺為逆不得臥。腎為水腫。而用純補之  
藥。不益脹滿。曰肺氣既虛。不可復行其氣。腎水既  
可復利。其水純補之劑。初覺不快。過時藥力得行。漸有條  
理矣。此即塞因塞用之義也。丹溪曰。治水腫宜清心火  
補脾土。火退則肺氣下降。而水道通。脾旺則運化行。而清  
濁分。其清者復回為氣。為血。為津液。濁者為汗。為溺。而分  
消矣。劉宗素曰。治水以塞脾為先。不但陰水為然。陰水者  
少陰腎中之真陽衰微。不能封閉。而泛溢無制耳。經曰。三  
焦者。決瀆之官。水道出焉。上焦不治。水溢高原。中焦不治  
水停中脘。下焦不治。水蓄膀胱。又曰。三焦病者。腹氣滿。小  
腹尤堅。不得小便。窘急。溢則水留。則為腫。下焦少陽經氣  
實。相火之化。相火有其經。無其府。游行于五者之間。故  
曰。少陽為游。其經脈上布膈中。絡心包。下出委陽。絡膀胱  
也。若非上佐天施。下佐地生。與手厥陰相表裏。以行諸經  
者。手厥陰經受邪。則下焦之火氣鬱矣。鬱則水精不得四  
布。而水聚矣。火鬱之久。必發。則以衝脈之屬大者。同逆而  
下。為十二經脈之海。其下者。出而滲諸陽。滲諸陰。其  
下者。為少陽。下足。滲三陰。滲諸絡。由是水從失滲。上積于  
肺。而為喘。不得臥。散于陰絡。而為腫。隨五藏之虛者  
入。而聚之。為五藏之脹。皆相火之為。其水而生病者也。非  
相火則水不溢。而止為積水。劉宗素曰。諸腹脹大。皆由于  
熱。諸病附腫。皆屬于火。傳而為水。其是之謂歟。丹溪曰。  
脾具坤靜之德。而有乾健之運。故能使心肺之陽降。肝腎  
之陰升。而成天地之泰。是為平人。今也七情內傷。六淫外  
感。飲食失節。房勞致損。脾土之陰受傷。轉運之官失職。故  
陽升陰降。而成天地不交之否。清濁相混。以致壅塞。而  
為熱。熱留為濕。濕熱相生。遂成脹滿。經曰。鼓脹是也。以其  
外雖堅滿。中空無物。有似于鼓。以其膠固難治。又名曰蠱。  
若蟲之侵蝕。而有蠱之義。宜補其脾。又須養肺。金以制  
木。使脾無賊邪之患。滋腎陰以制火。使肺得清化之令。却  
鹹味。斷妄想。無有不安。醫者急于取効。病者苦于服藥。膏  
丹利藥。以求通快。不知真得一日半。  
其脈愈甚。而病邪甚矣。元氣傷矣。可憐之甚。

李氏醫鑑

卷之五

腫滿

大

越婢湯 治風水惡風一身悉腫脈浮不渴自汗出無

大熱者 經曰肝腎并沉為石水并浮為風水水在皮膚故

熱者熱未 熱者熱未 熱者熱未

麻黃 兩石膏 兩生薑 兩甘草 兩大棗 十二枚 惡風者加附

子此足太陽藥也風水在肌膚之間用麻黃之辛熱以瀉

肺石膏之甘寒以清胃 肺主通調水道 胃主分別水穀 甘

從毛孔中出又以姜棗為使調和榮衛不使其太發散耗

津液也 胃為十二經之主脾治水穀為卑若婢經曰脾

行津液外壅一名 越婢湯即此義也

李氏醫鑑 卷之五 腫滿 大

五皮飲 皮南 治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫 脾虛不

故傳化失常腎水泛溢反漬脾土壅塞經絡故

五加皮 地骨皮 茯苓皮 大腹皮 生薑皮 一方

五加易陳皮羅氏五加易桑白皮治病後脾肺氣虛而致

腫滿 五加祛風勝濕地骨皮退熱補虛生薑辛散助陽以水

之中猶寓調補之意皆用皮 皆水溢皮膚以皮行皮也

麥門冬湯 上焦 治水溢高原肢體皆腫

麥門冬 五十枚 梗米 五十粒

吳鶴皋曰肺非無為也飲食入胃游溢精氣上輸于脾脾

之令以致水溢高原注于皮膚而為水腫者此其源也  
導水皆不能愈故用麥冬清肺開其下降之源梗水  
培乎生金之母此治病必求其本也或問此症何以  
之曰肢體皆腫少腹不急初起便有喘滿此其候也

防已黃耆湯

風木

治風水脈浮身重汗出惡風解見及諸

風諸濕麻木身痛

防已

黃耆一白木七錢

甘草五錢

每服五錢加姜棗

煎腹痛加白芍喘加麻黃有寒加細辛氣上衝加桂枝熱

腫加黃芩寒多掣痛加姜桂濕盛加茯苓蒼朮氣滿堅痛

加陳皮枳殼蘇葉

本方白木姜棗加茯苓

為桂枝名防已茯苓湯

金匱

治水

丘醫鑑

宋之王

通病

長

治

江皮膚四肢重痛而動名皮水

防已行經絡茯苓善澤泄

胡菴曰五水脈浮惡風骨節疼痛名風水脈浮附腫按之

沒指其腹如鼓不惡風不渴名皮水當發其汗又云惡寒

不渴名風水不惡寒而渴名皮水假令皮水不渴亦當發

汗脈沉遲自喘名正水脈沉腹滿不喘水積胞中堅滿如

石名石水脈沉遲發熱胸

滿身腫汗如柏汁名黃汗

中滿分消丸

熱脹

治中滿鼓脹水脹熱脹

不通利為氣脹血不通利為血脹但氣分心下堅大而病

發于上血分血結胞門而病發于下氣血不通則水亦不

通而尿少尿少則水積而為水脹濕熱相生則為熱脹

金匱曰病有血分水分何也師曰經水前斷後病水名曰

血分此為難治先病水後經水斷名曰水分

此病易治水去其經當自下水分即氣分也

厚朴

枳實

黃連

黃芩

半夏

陳皮

知母

砂仁

茯苓

砂仁

乾姜

姜黃

人參

白木

錢

澤瀉

猪苓

蒸餅

九焙

熟服

寒因熱用東垣立中

消渴治寒脹二

者詳而用之

此足太陰陽明藥也厚朴枳實行氣而且散滿二藥兼能

破宿血苓連瀉熱而消痞姜黃砂仁煖胃而快脾干姜益

陽而燥濕陳皮理氣而和中半夏行水而消痰知母治陽

明獨勝之火潤腎滋陰苓瀉瀉脾腎妄行之水并清降濁

少加參朮木芍以補脾胃使氣運則脹消也胡菴曰此方

乃合六君四苓瀉心二陳平胃而為一方者但分兩有參

主客之異矣

中滿分消湯

寒脹

治中滿寒脹寒疝二便不通四肢厥冷

食入反出腹中寒心中痞下虛陰躁奔豚不收

李氏醫鑑

卷之五

腫滿蠱脹

及脾胃久虛之人胃中寒則脹

滿或藏寒生滿病此湯主之

川烏 干姜 畢澄茄 生薑 黃連 人參 當歸

澤瀉 青皮 麻黃 柴胡 吳茱萸 艸薏仁 厚朴

黃耆 黃柏 益智仁 木香 半夏 茯苓 升麻

熱服

李東垣曰中滿治法當開鬼門潔淨府門開鬼門者發汗也

潔淨府者利小便也中滿者瀉之于內謂脾胃有病令上

下分消其濕下焦如瀉氣血自然分化如或大

實大瀉大小便不利者從權以寒熱藥下之

大橘皮湯

治濕熱內攻心腹脹滿小便不利大便滑瀉及

水腫等症

小水併入大腸故小便不利而大便滑泄



滑石六分 甘草一兩 赤茯苓一錢 猪苓一錢 澤瀉一錢 白朮一錢 桂枝五分

皮水香 栝郎分 加姜煎每服五錢

赤茯苓 澤瀉 白朮 補脾肉 桂枝 化氣 此五苓散也 滑石 清熱利濕 栝郎 潤火調中 此六一散也 濕熱內甚 故加栝郎 峻下之藥 陳皮 木香 行氣之品 使氣行則水行 以通小便而寬大便也

金液丹 治腹滿如斗 肢體厥逆 危急之症

李士材曰 壬子之秋 應試北氣 值孝廉張抱赤 久荒于色 腹滿如斗 參湯送金匱腎氣丸 小便頻利 溺亦稍減 旬日而腹滿如故 肢體厥逆 雖投前丸 竟無益也 全家哀號 惟治終事 抱赤泣而告曰 若可救我 當終其身 父事之余 曰 即不敢保萬全 然金液丹至數十粒 尚有生理 抱赤連服百粒 小便通利 滿消食進 更以補中八味並進 遂獲全安 詢卷曰 疏黃非治滿之味 只因元陽將絕 而參附無功 藉其純陽之精 今陰寒之滯 見水清耳 觀賢上聲

李氏醫鑑 卷之五 腫滿壅脹

加味腎氣丸 治脾腎大虛 肚腹脹大 四肢浮腫 喘急

痰盛小便不利 大便溏黃 已成蠱症

熟地四兩 茯苓三兩 山藥三兩 丹皮一兩 山黃肉一兩 酒洗 澤瀉一兩 川牛膝一兩

滕車前子 炒肉桂 兩附子 五錢 蜜丸

經曰 腎者胃之關也 開門不利 故聚水而從其類也 上下溢于皮膚 故為附腫 前陰利水 後陰利穀 故曰胃之關也 人之一身 無非藏府而藏府以脾胃為主 然脾胃之化物 寔由于水火二氣 非脾胃之能也 火盛則脾胃燥 水盛則脾胃濕 皆不能化物而生諸病 水腫之病 蓋水盛而火不化也 導水補火 使二氣和平 則病去矣 土為萬物之母 脾虛則土不能制水 而淫溢水為萬物之源 天一生水也 腎虛則水不安其位 而妄行以致汎溢 皮膚肢體之間 因而攻之 虛虛之禍 不待言矣 經曰 厚盛盛母 虛虛母 人溺狀 桂附八味 九滋真陰 而能行水 地黃茯苓澤瀉 桂

附者能行水 補命火 因以強脾 桂附補命火 土強則能防水 陽能化陰 陰化則便溺通 加車

而不走氣 加牛黃益肝腎 藉以下行 故使水道通而腫脹已又無也 其元也 嘉言曰 此方濟生以附子為君 此

新甫重訂 以茯苓為君 然腎之關門不開 必以附子開之 陽

蒸動腎氣 其開始開胃中積水 始下以陽主開 故也 開

即不用茯苓 牛黃車前而水自下 開即車前茯苓 開

至無氣 神莫之如何矣 用方者 將吾附子 乎君 矣 矣

舟車丸 治一切水腫 陽水腫脹 治水腫水脹 形氣俱實

腫脹者 水道壅遏也 形氣俱實 口渴而赤 氣粗 腹大 小便

便秘也 陽水先腫上體 背手轉手三陽經 陰水先腫

下體 腰腹腫脹 足三陰經 腫脹脾肝腫則陽氣滯行

如單脹而不腫者 名蠱脹 為木橫剋土 難治 腫脹痞黑 則

傷肝 缺盆平則傷心 臍突出則傷脾 足心平則傷腎 背平

則傷肺 皆不可治 腹身熱脈大者是逆也 緣死不救

則傷脾 皆不可治 腹身熱脈大者是逆也 緣死不救

橘紅一兩 木香五錢 輕粉錢 水丸 非寔症不

本方減大戟 芫花 青皮 陳皮 木香 加芒硝 郁李仁 齊川

散姜湯下五分 治同

疏鑿飲子 治遍身水腫 喘呼口渴 大小便秘 上症濕熱

也 此為陽水 陽水見陽症 脈必沉數 陰水見陰症 脈必

流遲 上下表裏內外分消 亦循神禹疏江壅河之意也

白木土 茯苓 甘艸 厚朴 姜 大腹子 草豆蔻 木香

木瓜 附子 黑姜 加姜棗煎

脾虛故以白木苓草補之脾寒故以姜附草蔻溫之脾濕故以大腹茯苓利之脾滯故以木香厚朴導之然土之不足由于木之有餘木瓜酸溫能于土中瀉木兼能行水與木香同為平肝之品使木不尅土而肝和則土能制水而脾實矣經曰濕勝則地泥為水正所以實土也

伐木丸

蒼朮 二斤米 黃酒 麴 四兩 絳礬 一片醋并晒干入餅

本艸備要主治註釋

香薷 一斤 加白木末 兩 丸如桐子 大米飲送下 治通身水

李氏醫鑑 卷之五 腫滿壅脹

腫煩著神功 商陸 治水腫脹滿取白花搗貼臍腹尿白

治蠱脹素問心腹脹且食不能暮食名為蠱脹治之以雞屎一劑知二劑已王太僕註云本艸雞屎並治蠱脹但能利小便蓋此病皆生于濕熱濕熱脹滿則小便不利雞屎能通利下泄則濕熱從小便而出其病自愈故曰治濕熱不利小便非治也普濟方治且食不能暮食用臘月乾雞屎白半斤袋盛以酒醋一斗漬七日溫服三杯日三或為末服二錢亦得積善堂經驗方治一切腹肚四肢腫脹不拘鼓脹氣脹水脹等用乾雞屎一升炒黃以酒焙二碗煮一碗濾汁飲之少頃腹中氣大轉動

利下即日脚下一皮皺消也宋書隔日再作葶藶經疏云去猪肚內線縫砂器煮糜食知母消浮腫小便五味子紫

之勿入為治腹滿脹大 知母 消浮腫小便 五味子 紫

艸 麻黃 治水 赤小豆 氣 金銀花 主寒熱 蛤粉 消浮腫

旋覆花 治大腹水腫 昆布 澤蘭 同 蘭花葉 利 白茅根

虛者慎用

清火 威靈仙 治浮腫 苦參 逐水 大黃 治水腫 牽牛 治水腫 甘遂 大

戟 有以甘遂木敷腫處濃煎酒瀉 通艸 苡仁 生姜

均消腫 姜皮 和脾行水 甜瓜蒂 治皮膚 滑石 陽起石

治水 鯉魚 烏魚 鯽魚 桑白皮 桑葚 均利水 猪苓

腫 檳榔 大腹皮 巴豆 防已 木瓜 茯苓 冬

葵子 郁李仁 枳實 黃芩 黃柏 木香 香附

木通 車前子 瞿麥 楮實 並治花柳 治水腫子能

金砂 肺滿 芫花 治腹滿 白頭蚯蚓 腹 大蒜 敷臍能達

皂礬 服亦名絳礬入而分伐用木煨 茯苓皮 專能行水治

李氏醫鑑 卷之五 治水腫

榆白皮 治肺白合 治浮腫 益母 坤丹并並 續隨子 治水腫

毒傷人不得過用服後瀉多以致同粥食仰 王不留行 研

止去壳取白色者研細紙包臍去油取霜用 熟食之效 珍珠 甘味亦能益脾氣寒能除熱堅 蓖麻子

治水癰浮腫研服當下 黃水壯人只可五粒

佳附八味丸 加車前牛膝名腎氣丸 治蠱脹

疽黃汗

疽有五黃疽殺疽酒疽汗疽女勞疽此蓋蓄血發黃不  
專於濕熱者也女勞病必屬腎虛亦不可以濕熱例治當  
用四物知柏壯其本矣不培其氣隨症而加利濕之藥  
脾胃有濕熱則發黃黃之黃色也其甚者身如橘色汗  
出染衣正黃如柏亦有黃如黃者身黃黃而色暗大抵  
治以茵陳為主陽黃加人黃枝子陰黃加附子干姜各隨  
寒熱治之古法以茵陳同生姜揚爛于胸前四肢口口擦  
之○脈沉渴飲水小便不利背發黃脈沉乃陽明有熱  
喜自汗汗出入水熱鬱身腫發熱不渴名黃疸脈弦數乃  
失飢發熱大食傷胃食則腹滿名穀疸數為熱熱則大食  
面目悉如金色名黃疸陽明病脈浮者食難用飽飽則發  
煩頭眩者必小便難欲作投疸脈沉弦或緊細因飲酒百  
脈熱當風入木懷懷心煩足熱名酒疸其脈浮欲嘔者先  
吐之乾弦者先下之脈浮緊乃大熱交接入水腎氣虛流  
濕于脾額黑日嘔熱小腹急足下熱大便黑時時黃名女勞  
李氏醫鑑

卷之五

疽黃

治

疽腹如水狀不治脈寸尺近掌無脈口鼻冷不治其病身  
熱一身盡痛發黃便澀因內熱入水濕熱內鬱衝發胃  
氣痛雖有五皆濕熱也治諸黃但利其小便愈  
治以收濕利小便清熱或汗之五苓茵陳連類

小半夏湯

治黃胆

半夏 升 生 姜 升

猪膏髮煎

治諸黃令病從小便出

猪脂

升 酒 五

加亂髮煎髮消藥成

猪苓湯

治濕熱黃疸口渴渴赤 註見 濕門

猪苓

茯苓 澤瀉 滑石 阿膠 各一

小建中湯

祛寒

治虛勞黃疸小便利而色白者是無熱也

理中湯

祛寒

加茵陳 治陰黃 逍遙散 治黃疸

木香

治脾濕黃疸

枝子

淡枝湯加大黃 治酒疸發黃心中懊憹或熱痛

茵陳

去 莖

大黃

兩 半

山枝

明者

豆豉

煎湯下

五苓散

熱加 參

湯加

粉

便滯

加 葶

素熱

加 黃

茵陳蒿湯

治黃疸寒熱不食頭眩心胸痞

滑石

石 膏 丸

治女勞疸

滑石

石 膏

初末

粥飲下

名公經驗方

耳朶

即 天

煎酒

空 心 服 三 早

木香

錢 五 分

磨酒

服 三 早

李氏醫鑑

卷之五

疽黃

人參

一 錢

磨酒

服 三 早

俱用耳朶

煎酒

服

附五水

五水在五藏皮膚

黃汗

五水

者風水皮水正水石水黃汗石水者水積胞中堅滿如石黃汗者汗如柏汁久不止必致癰腫

本州備要主治註釋

茵陳

治發黃驅濕熱

白蘚皮

諸 黃

花 粉

茜 艸

紫 艸

白茅根

秦 朮

黃 芩

苦 參

龍 胆 艸

大 青 艸

大

黃 扁 豆

甜 瓜 蒂

但 治

木 通

治 脾 疸 好 眠 心 為 脾 醋

母 心 熱 清 脾 熱 亦 清 醋

鯉 魚

白 礬

芒 硝

葶 藶

白 茯苓

車 前 子

但 治

黃 疸

花 根

治 酒 疸 身

滑 石

治 黃 疸

連 錢 艸

一名 蝦 蟬 艸 一名 九

連 錢 艸

一名 蝦 蟬 艸 一名 九

連 錢 艸

許依酒疸非黃連枝子前連錢艸服法虛者加

之良首宿此不愈黃連枝子前連錢艸服法虛者加

人參竹瀝者加紅曲橘紅殺麥蘖山查瘀血加琥珀丹皮

紅曲紅花桃仁桂枝刺索黃五靈脂並元氣壯實者服前

藥寒血不行加熟黃菜莖晒乾食之可治諸黃

大黃虛者須用經疏曰方書所載五疸酒食大飽後過飽女勞失治而成

然其症必由濕熱為脾及飲食停滯又有瘀血發黃一症

方書未載分別一候則藥不對症多致不效慎之慎之

枝子加黃耆湯小建中治黃汗發熱兩脰自冷身痛身重

腰上有汗腰下無汗小便不利此陽通而陰不通上下痞

疸黃

三消

三消之病其症有三一消也渴而多飲為消熱謂之上  
消心移熱于肺肺為清源是也皆發口渴更如乾多食  
苦飢為胃熱謂之中消消成為消中是也口乾多食  
尿赤渴而小便數有膏為腎熱而水消謂之下消是也煩  
渴引飲耳輪乾焦經曰二陽結謂之消一陽者陽明也手  
陽明大腸主津病消則目黃口乾是津不足也足陽明胃  
主血熱則消發苦飢是血中伏火血不足也木傳能食者  
必發煩渴不能食者必傳中滿鼓脹皆不治之症氣分渴  
者喜飲冷水宜寒冷滲劑以清其熱血分渴者喜飲熱水  
宜甘溫滲劑以滋其陰上輕中重下危如上下中平則不傳  
下腎消小便甜者為重水生于甘而死于酸小便本鹹而  
反比是生氣泄脾氣陷下入腎中為土剋水也腎消者腎  
水衰竭龍雷之火不安其位上于肺消渴引飲飲入于胃  
下無火化直入膀胱故飲一溲一也用桂附辛熱引真火  
歸元地黃純陰壯真水滋腎下消要劑

李氏醫鑑 卷之五 三消 天

消渴方 治渴症胃熱善消水穀

黃連 天花粉 生地汁 藕汁 牛乳 將黃連花粉

為末調服或加姜汁蜂蜜為膏噲化

地黃飲子 治消渴煩躁咽乾面赤咽乾腎火上炎也面赤

人參 黃耆蜜炙 生地 熟地 天冬 麥冬 枇杷葉蜜炙

石斛 澤瀉 枳殼甘草等分每服三錢

喻嘉言曰此方生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疎導

二府瀉膀胱之火使小腑清利則心火下降大府流暢則

寬大腸之氣

肺經潤澤宿垢既除其渴自止矣人參白虎湯治渴症  
分歸熱竹葉黃耆湯氣血躁熱宜辨症而用之

竹葉黃耆湯 治氣血躁熱

淡竹葉 生地各二錢 當歸 川芎 白芍 麥冬 黃芩

人參 黃耆 甘艸 半夏 石膏一錢

白茯苓 治腎消兩腿漸細腰脚無力此因中消之後

腎脂令腎枯燥致此疾初起白腎消印下消乃上消中  
消之傳變飲一漫二漫如膏油肺主氣肺無病則氣能宣  
束津液其精微者榮養筋骨血脉餘者為涕肺病  
一則津液無氣管攝而精微者亦隨漫下如膏油也

茯苓 黃連 花粉 葦薈 熟地 覆盆子 人參

李氏醫鑑 卷之五 三消

玄參 兩 石斛 蛇牀子七錢 雞胥三十具 青皮 鴨 蜜丸

磁石湯送下嘉言曰友人病消渴後渴少止反加燥急足

黃連犀角治心母乃倒乎予曰腎者胃之關也胃之下傳  
于腎則關門大開心之陽火得以直降于腎心火灼腎燥  
不能需子用犀角黃連對治其下降之陽火寧為倒乎服  
之果効再服六味地黃丸加犀角而明澤病起矣東坡

集云渴類 臣病消渴口飲水數斗飯亦倍進小便頻數  
服消渴藥日甚張敬取麝香當門子以酒濡濕作十許丸  
煉狗子煎湯服之遂愈問其故曰消渴消中皆脾弱腎  
敗土不制水而成今酒臣脾脈極熱腎脈不衰當由酒果  
過度積熱在脾所以多食多飲多渴不得不多非消渴也  
諸香散酒果棘枸能化酒為水故假二物去其酒果之毒  
也凡用藥須用

當門子尤妙

瀉黃散 治脾胃伏火煩渴易飢熱在肌內脾熱故煩渴易

防風兩 藿香七錢 山枝炒黑 石膏五錢 甘艸二錢 為末微炒香粉  
錢乙瀉黃散白芷防風升麻枳 石斛一錢 半夏一錢 甘艸七錢

治前

加味腎氣丸腫滿 治消渴飲一漫一

消渴殺蟲方 治消渴有蟲

苦楝根取新白皮一握切 空心服雖困頓不妨取下虫三  
乃止消渴一症有有虫耗其津液而成者蓋飲醇食炙積  
成胃熱而熱又生濕濕熱生虫理固有之臨症宜諦審也

三黃丸見頭 治消渴麻痺山于火

蓮子清心飲見淋 治火盛冠金口苦咽乾漸成消渴

李氏醫鑑 卷之五 三消

伏菟丸遺濁 治強中消渴渴症下消者名強中

龍腦雞蘇丸口 治消渴 六味地黃丸 治消渴

七味白朮散四君子加木香藿香乾 治消渴不能食

調胃承氣湯攻裏 治渴症中消善食而漫

大黃甘艸湯 治上中下三焦消渴

甘艸二兩 黑豆半升 大黃

五苓散表裏 治脉浮小便不利微熱消渴功端滋燥導飲

生津故亦為消症良方

本州備要主治註釋

蘭葉

為清湯良藥經曰穀食肥甘傳

澤瀉湯

治

黃柏

地骨皮 荆瀝 竹瀝 麥精

並治

知母

萊豆

天冬 欬冬花 露水 羊乳 人乳 蛤蜊

蛤粉

並治

桑甚

代茶止

胡黃連

治三

蚕繭

止清湯

子

則湯止

碗豆

煮食治

枇杷葉

治清

烏甘錫

治清

氏醫錄

卷之五

三消

至

蟲

關尹子曰人之一身內包饒婦外蒸燠萬物有依人身  
以為命者是吾身一小天地也饒婦為人所常有之虫倘  
寒浸火通則不安其位亦能為病若飲食不慎血氣虛衰  
又能變生諸虫不可名狀如癰疽瘰癧勞瘵傳尸之類至  
于殺身滅門虫之為患若斯其酷也是以先賢以法殺之  
苟人不殺虫出且必殺人矣吳鵠早曰古方殺虫如雷丸  
貫仲乾漆蠟座百部鉛灰之類皆其所常用者也加附  
子干姜者壯正氣也加苦參黃連者出得苦而伏也加烏  
梅訶子者虫得酸而軟也加桑葉瓜蒂者欲其帶虫出  
也加荒花黑丑者欲其虫下也用雄黃川椒蛇牀樟腦  
水銀振即者治瘡疥之虫也用胡桐淚黃芩子垂子蟾酥  
者治鱗齒之虫也用川槿皮海桐皮者治風蟻之虫也用  
青楊子覆盆葉者治九竅腐蝕之虫也用敗鼓  
心楊符板虎黃龍瓜鵲骨者驅勞瘵之虫也

李氏醫鑑

卷之五

至

烏梅

細辛

桂枝

人參

附子

黃柏

連

乾姜

十川椒

當歸

苦酒

醋

浸烏梅

一宿

去核

蒸熟和

藥

集效丸

治

瘰癧

腹痛

作止

有時

或

嘔吐

則止

也氣

嘔吐

往來

者

虫不安

于胃也

大黃

炒

鶴虱

枳

訶子

皮

蘇

木香

乾姜

炮

附子

蜜丸

食前

烏梅湯

下

婦人

醋湯下

雄郎丸

治

腹痛

胃痛

乾痛

有時

乾痛者

不吐

不瀉而但痛

也有時者

淡食而飢則痛

厚味而飽則

否此為虫也

雄黃 枳郎 白礬 等分飯丸每五分食遠服

化蟲丸 治腸胃諸蟲為患 腸胃之中無物不容所以發生

虫之物或濕熱蒸鬱而成亦因

物必先腐而後虫生之義也

鶴虱 胡粉 苦棟根 東引未 使君子 錢

枯礬 五分 為末亦可麴糊作丸量人大小服之一歲兒

可 五分數藥皆殺虫之品也卑用尚可

理中安蛇丸 治胃寒吐蛇 蛇得甘則動得酸則止

白朮 二兩 人參 干姜 茯苓 川椒 烏梅

使君子丸 治蟲脹腹痛及食勞發黃喜食茶米炭土等物

李氏醫鑑 卷之五

飲食停滯濕熱蒸鬱則生諸虫至脹滿嘔痛或

發黃身腫喜食生米茶葉土炭者虫之所嗜也

使君子 去壳 南星 枳郎 一合炒 如喜食生米用麥芽一

炒喜食炭土用炭土炒取藥

為末蜜丸每晨砂糖水下

吐蛇方 枳郎 川椒 枳郎 黃連 烏梅

安蟲散 治蟲動心痛

胡粉 枳郎 川棟子 去核 鶴虱 各二

本州備要主治註釋 石菖蒲 生地 枳郎 連翹

苦參 牽牛 艾葉 並殺 黃連 黃栢 安 核桃 榧 百

部 殺 槐花 貫衆 水片 並殺 鶴虱 厚朴 並殺 杏

仁 白果 杜牛膝 皂莢 皂角 刺 大風子 吳萸

扁柏 五靈脂 並殺 馬齒莧 殺諸虫及 烏藥 治小兒蛇虫

去寸白虫

腹中虫

哮喘

表邪壅盛陽氣不得宣發故逆而作喘哮喘由風寒客于背俞復感于寒而作針經曰胃絡不和喘出于陽明之上逆與元耗失喘出于腎氣之上逆又曰水濕泛溢為喘滿胸有膠固之痰喘有非時之喘則令人哮喘由寒束于表陽氣併于胸中不得泄越故胸熱氣逆喘而喘外感之有餘也氣促為喘肺虛而不足也肺為心之故喘感風寒而喘嗽者當求散寒宣氣逆而喘嗽者當清降宜二陳及蘇子降氣湯水氣逆而喘嗽者宜小青龙半夏茯苓湯氣虛病久而喘嗽者宜人參五味以上出醫方集解丹溪曰實喘氣實肺盛呼吸不利肺窠壅滯有寸脈沉實宜瀉肺虛喘由腎虛呼吸氣短兩脇脹滿左寸脈大而虛宜補腎邪喘由肺感寒邪伏于肺經關竅不通呼吸不利右寸脈沉而緊亦有六部俱伏者發散則身熱而喘定三四狀虛實肺實者肺必脹上氣喘逆咽中塞如與喘狀自汗虛者必咽乾無津少氣不足以息也江石山曰喘之為病肺氣壅塞氣逆逆汗喘爭亂激喘促連聲不能

李氏醫鑑

卷之五

哮喘

哮喘

布息有痰有火陰虛氣虛四者之間各宜別區痰火壅盛五虎先投降氣九寶去桂為優喘痰甚者權而夜坐于絳求之一服能臥加以導痰合之尤可陰虛腎虛氣逆上奔安腎八味溫補下元肺氣虛弱人參五味久喘不除人參理肺其哮喘者氣促有聲如木鋸聲似水雞聲或因食酸滲傷肺竅積聚痰涎幸不易治紫金青金或白果湯亦參有法在

五虎湯 細茶 杏仁 甘艸 石膏 麻黃

干縉湯 南星 甘艸 半夏 生薑 皂莢 丹溪方有陳皮茯苓枳殼

人參理肺湯 人參 杏仁 當歸 黨參 木香

白果定喘湯 白果 三十一枚 煨黃 半夏 麻黃 三錢 蘇子 二錢 黃芩 一錢 五分

甘艸 一錢 杏仁 錢半 桑白皮 二錢 款冬花 三錢 加姜煎

紫金丹 精猪肉 二斤 細切 白芷 一兩 分作六分 抵湯煎包烘乾

于無人處炭火煨令烟盡 上二宿取出為末湯浸蒸餅丸如紫豆大 大人服廿九小兒十粒茶下

青金丸 雞下子 淘淨蒸熟晒乾為末姜汁浸蒸餅丸九口津液下

丹溪主方 治喘年深時有作止雄猪肚 治如食法人吞

仁 四五兩 線縫醋三碗煮乾取出先食肚

虛方 治氣虛 參 藥 麥冬 地骨皮

治陰虛有痰 四物 連 枳壳 半夏

瀉白散 諸熱 治陰氣在下陽氣在上欬喘嘔逆氣急

神秘方 治水氣逆行乘肺肺水而浮使氣不得通流脉沉

李氏醫鑑 卷之五 哮喘

大令人不得卧卧則喘

紫蘇 陳皮 桑白皮 人參 生薑 五錢 木香 五錢 茯苓 五錢

治哮喘積丹 鷄子 畧敲勿損膜浸尿器缸桶內四五日夜吃

四磨湯 治七情氣逆上氣喘急妨悶不食 氣結憂愁不已

氣多厥逆重則厥仆 輕 枳殼 沉香 烏藥 人參 等

分濃磨煎三四沸溫服 恐傷其氣也大實者仍宜枳壳

三子養親湯 治老人氣實痰盛喘滿懶食 痰不自動因

餘便是火氣上湧故喘痰火塞胸故懶食土材曰治病先

攻其甚者若氣塞而喘則氣反為本痰反為標矣是在智者

神而明也若氣虛者非所宜矣



七氣湯 治胸滿喘急 蘇子降氣湯

四七湯 治膨脹喘急 五苓散 治水寒射肺而喘

滋腎丸 治衝脉上衝而喘 衝脉起于二陰之交直衝

麻黃湯 治哮喘 散寒利肺初菴曰哮喘雖服

麻黃白木湯 治喘促無力吐痰沫 氣喘促為

本艸備要主治註釋

天冬 治喘 馬兜鈴 治喘 白茅根 治喘 欬冬 治喘 山豆根 治喘

前胡 治喘 麻黃 治喘 葶子 治喘 杏仁 治喘 山豆根 治喘

李氏醫鑑 卷之五 喘

品子 治喘 紫蘇 治喘 井子辛溫寬中 阿膠 治喘 蛤蚧 治喘 桑白皮 治喘

食益 治喘 龍骨 治喘 鯉魚 治喘 蛤蚧 治喘 桑白皮 治喘

菓子 治喘 訶子 治喘 榆白皮 治喘 皂莢 治喘 花柳子 治喘

白果 治喘 五味子 治喘 葶藶子 治喘 結聚肺家水氣急滿非此莫

療但不敢多用酒炒 或糯米拌炒熟去米

喘逆 喘逆吐 呃 音喘 不 喘 一 喘 切 入 喘 音 喘

今從 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

此皆 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

胃虛 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

其苦 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

○有 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

因寒 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

亦多 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

中焦 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

其聲 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

病深 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

李氏醫鑑 卷之五 喘

而不得 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

可與 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

發得 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

乾物 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

聲此 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

大補 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

丁香 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

柿蒂 喘逆 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐 喘逆吐

可用者蓋從治之法也。以熱或熱者曰從以寒或寒者曰從陰氣因胃為養主高則木其相火  
沖清道而上作呃逆謂之噎古人治陰呃用桂附干姜  
吳茱萸丁香香薷香附辛熱藥多有收斂者治陽呃用橘紅  
竹茹湯呃逆本由陰氣已虛陽火暴甚而沖而上出于胃  
入于肺而作聲東垣用涼藥者所以瀉熱降火也若陰症  
呃逆以陰氣先消陽火亦竭浮于胸中亦欲散也故不用  
寒藥而反以溫藥養胃留其陽氣胃氣一和陽生則陰長  
之說也或問治陽呃者何以不用知柏吳鶴皋曰此少陽  
虛證非寒邪也故用柿蒂竹茹之味薄者主之若知柏味  
厚則益盛其中氣  
否塞不益盛乎

本方除人參生薑亦名丁香柿蒂湯治同本方除參姜加  
竹茹橘紅名橘紅竹茹湯寶鑑去人參加青皮陳皮三因  
去人參加良姜甘艸名丁香散治同

李氏醫鑑 卷之五 呃逆嘔吐 完

橘皮竹茹湯 治久病虛羸呃逆不止胃寒胃熱停痰積飲皆作呃此為虛火上

通而 乾嘔亦治吐利後胃虛呃逆胃火上冲肝脾之火助之肺金之氣不得下降故嘔

橘紅 竹茹 人參 甘艸 半夏 麥冬 赤茯苓

枇杷葉 加姜棗煎胃寒去竹茹麥冬加丁香寔火去人

參 金匱橘皮竹茹湯橘皮二升竹茹二升人參兩甘艸兩生

姜斤大棗三十枚 治噦逆吐利後胃虛

炙甘艸湯肺痿 治呃逆 麥門冬湯喉 降火止呃逆

訓菴曰昔有人病後患呃逆不止聲聞鄰家或令取刀豆

子燒存性為末白湯調服二錢即止此即下氣歸元之驗也  
小半夏加茯苓湯 治卒嘔吐心下痞鞭膈間有水眩悸水

上逆則中水停膈間則病上 半夏生薑行水氣而散逆氣能止嘔吐茯苓寧心氣而泄

腎邪能利小便火因水而下行則悸眩止而病消矣本方

除茯苓名小半夏湯治支飲嘔吐不渴嘔家本渴渴者為

下有支飲故也小半夏湯主之嘔吐 津液去必渴不可因渴而遂以為熱

東垣曰辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣逆表實之病

若胃氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣

而已勿作表實用辛藥瀉之故服小半夏湯

不愈者服大半夏湯立愈此仲景心法也

二陳湯加黃連枝子 膈上熱痰令人嘔吐單用陳皮生薑名

橘皮湯治乾嘔噦及手足厥者單用半夏生薑汁名生薑汁

夏湯治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中憤憤然無奈

何者本方去陳皮甘艸再加生薑治水氣嘔惡

黃芩湯和解 加半夏半 生薑二 治胆府發欬嘔苦水如胆汁

十聚湯小青龍湯主水氣乾嘔桂枝湯主太陽汗出乾嘔

姜附湯主少陰下利乾 吳茱萸湯主厥陰吐涎沫作嘔

氣逆也半夏生薑以散逆氣千金曰生薑嘔家聖藥是散

其逆氣也嘔家用半夏以去其水水去則嘔止是下其痰

也飲 逍遙散 治嘔吐 六一散 姜湯下治嘔吐

五苓散 治嘔逆 濕勝則脾不運水 停心下則嘔逆

猪苓散 治嘔吐思飲水者

本艸備要主治註釋

五味子 止嘔 半夏 止嘔 柴胡 治嘔 前胡 治嘔 麥冬 治嘔 火土

益智仁 治嘔 附子 治嘔 滑石 治嘔 干姜 治嘔 茯苓 治嘔 澤瀉 治嘔

香薷 治嘔 枝子 治嘔 枳殼 治嘔 厚朴 治嘔 訶子 治嘔 槐實 治嘔

吳茱萸 治嘔 花柳 治嘔 淡竹葉 治嘔 甘蔗 治嘔

威竹茹 治嘔 枇杷葉 治嘔 白茅根 治嘔

李氏醫鑑卷之五終

李氏醫鑑卷之六

吐酸吞酸 嘈雜 醋心

吞酸一症大抵宿食停于胃脘平胃散加木香砂仁神曲山查若停飲所致者木半夏茯苓陳皮最効俗名醋心是也亦有吐酸者宜降火清痰加吳茱萸作引導吐由于痰火東垣曰病後諸嘔吐酸皆屬其心火令牙酸不能相對以木半夏熱劑療之必減若以病後作熱攻之誤矣或問吞酸素問以爲熱藥垣以爲寒何也丹溪曰吐酸與吞酸不同吐酸吐出酸水如醋平時產液隨上升之氣鬱而成積濕中生熱故酸水化而作酸味非熱而何其有鬱之久伏于腸胃之間咯不得上嚥不得則本得風寒則內熱愈鬱而酸愈劇心腹表溫痰涎壅閉或得香熱湯丸津液得行亦可暫解非寒而何素問吳茱萸製炒隨時令送爲佐使若木茯苓爲輔湯浸蒸餅爲丸吞之仍效楊

左金丸 治肝火燥盛左脇作痛吞酸吐酸

本方加炒蒼朮陳皮亦名茱萸丸治同 黃連 醋心

三聖丸 治痰火嘈雜心懸如饑

陳皮半夏黃連 姜湯下

茱萸六一散 治濕熱吞酸 滑石 茱萸

二陳湯 加黃連枝子 嘈雜

平胃散 加麥芽 宿食 酸受氣

枳桔湯 治嘔氣吐酸或欬



在者  
若山能  
吐之左  
下者常  
不能破  
其解而

于經絡則為痰飲令人沉重注痛或作水腫完花大戟  
逐逐水去濕直達水飲實處之處徐徐用之取功甚捷  
入心則速成顛癲喘咳等症並以控涎丹主之亦有奇功  
此乃治痰之本也痰之本水也濕也得氣與火則結為痰大  
戟能泄肺水濕甘遂能行經絡水濕自能散皮裏膜  
外痰氣升溪日痰在脇下及皮裏膜外非此不能運行

二陳湯 治一切痰飲為病咳嗽脹滿嘔吐惡心煩悶心悸

半夏 二錢 陳皮 白茯苓 甘草 五分 加薑煎 痰能制半夏之  
其陳久則無燥散 治痰通用二陳風痰加 皂角竹瀝 寒痰

加半夏 火痰加 石膏 濕痰加 蒼朮 燥痰加 杏仁 食痰加 山

神曲 老痰加 石芒硝 氣痰加 枳殼 脇痰加 白芥子 四肢

痰加 枳實 海 氣痰加 枳殼 脇痰加 白芥子 四肢

痰加 枳實 海 氣痰加 枳殼 脇痰加 白芥子 四肢

李氏醫鑑 卷之六 痰飲 四

或曰有痰而渴宜去半夏代以貝母瓜蒌梔梔曰渴而喜  
飲水者易之渴而不能飲水者雖渴猶宜半夏也此濕為  
本熱為標濕極而兼勝已之化非真象也胡蒼曰貝母寒  
潤主肺家燥痰半夏溫燥上脾家濕痰雖俱化痰而寒溫  
燥潤各異脫或快施貽害匪淺用者慎之 有血不足陰  
火上逆肺受火傷虛清之令不得下行由是津液渾濁生  
痰不生血者名燥痰常用潤劑如地黃門冬枸杞之類滋  
陰降火而痰自清若投二陳立見危殆有痰飲流八四肢  
肩背痠痛手足罷軟誤以為風則非其治宜導痰湯加木  
香薑黃大凡痰飲變生諸症當以治飲為先飲清則諸症  
自愈如頭風肩痠骨痛投以風藥不効投以痰藥見功又  
如眼赤羞明與之涼藥不瘳俾以痰劑獲愈如此之類不  
一而足有人坐處吐痰滿地不甚稠粘只是沫多此氣虛  
不能攝涎不可用利藥宜六君子加益智仁一錢以攝之

本方加 人參 名六君子湯治氣虛有痰本方加 黃 治熱痰

本方 加黃連枝 膈上熱痰本方 加砂仁 痰利氣本方 加南

實 導痰湯治頑痰膠固非二陳所能除者 夏加枳實以助半  
高時時 壁之功

礞石滾痰丸 治實熱老痰怪症百病 風木太過耗制肝  
成痰壅塞上中二焦迴腸胃曲折之愈謂之老痰變  
生百病不可測識非尋常藥餌所能療也此丸主之

青礞石 一兩 沉香 五錢 大黃 酒 黃芩 八兩 右將礞石打碎用煆

硝一兩同入瓦罐益泥固濟晒乾火煆石色如金為度研

末和薑水丸量人虛實服之姜湯送下服後仰臥少頃

不可飲水行動

礞石剝悍之性能攻陳積伏歷之痰大黃蕩熱去實以開

李氏醫鑑 卷之六 痰飲 五

下行之路黃芩瀉肺涼心以平上僭之火沉香能升降諸

氣上至天而下至泉以導諸藥為使也然乃峻劑非實體

者不可輕投 王隱君曰痰症古今未詳方書雖有五飲諸

運耳鳴或口眼蠕動脅癢耳輪痛癢或四肢遊風腫硬似

疼非疼或為齒齦痛牙齦浮而痛癢或受氣吞酸心下

嘈雜或痛或成或咽嗝不利咯之不出嘔之不下其痰似

墨有如被絮桃膠蛻肉之狀或心下如停水鐵心氣冷痛

或夢寐奇怪之狀或足腕痠軟腰背骨節卒痛或四肢筋

骨疼痛難以名狀並無常處以致手足麻木痛狀若風濕或

脊上一條如線之寒起者或渾身骨痛如以芒刺者或胸

腹間如有二氣交紐噎息煩悶如有烟火上衝頭面烘熱

或為失志癲癇或中風癱瘓或勞瘵在莖之疾或風毒脚

燥咽乾大便閉結面如枯骨毛髮焦落人則因此月水不通若能逐去敗痰自然服領有効余川滾痰丸以愈諸疾不可勝數特相傳于世云

本方加玄明粉一兩硃砂為衣治同本方減大黃黃芩各六兩加橘紅半夏各二兩甘草一兩竹瀝姜汁為丸名竹瀝達痰丸治同力稍和緩

神木丸

蒼朮一兩大棗五十枚黑油麻半兩水二盞研濾汁和丸丹溪

曰實脾土燥脾濕是治痰之本

清氣化痰丸 治熱痰 註在前

半夏製膽星半兩橘紅 枳實炒杏仁去皮瓜蒌仁油黃芩

酒炒此治痰火之通劑也氣能發火火能發痰半夏南星以燥濕氣黃芩瓜蒌以平熱氣陳皮以順氣杏仁以降逆氣只實以破積氣茯苓以行水氣水濕火熱皆生痰之本也蓋氣之元而為火猶民之反而為賊賊平則還為良民而復其業矣火退則還為正氣而安其位矣故化痰必以清氣為先也

三仙丸 痰治中脘氣滯痰涎不利 切卷曰氣滯不通為痰痰走注攻刺亦曰氣痰

南星麴 半夏麴四兩香附二兩糊丸薑湯下 此方與局方

茯苓丸皆行痰而兼用氣藥即嚴氏氣順則痰自下之意然紫蘇枳殼肺氣藥也厚朴脾胃氣藥也香附肝氣藥也隨氣而用不可不分又曰嚴氏以人之七情鬱結氣滯生痰氣道通利痰自降下又有原有積痰其氣因痰而結滯者必先逐去痰結則氣自行豈可尚生一說

七氣湯門 治七情氣鬱痰涎結聚咯不出嚥不下胸滿喘急或咳或嘔或攻衝作痛

許學士神木散 治水飲結成癖囊

蒼朮一兩芝麻五錢棗五十枚取肉搗丸 水飲結成癖囊非蒼朮之加芝麻者潤其燥也用

十棗湯門 本方各五錢加黃柏三兩酒炒大黃半兩 粥丸名

小胃丹丹 治胸膈腸胃熱痰濕痰

澤瀉湯 治心下支飲常苦眩冒 澤瀉五兩白朮二兩

潤下丸 治膈中痰飲

橘紅八兩甘草二兩蒸餅糊丸 或將橘紅鹽水煮爛晒

散姜湯下濕勝加星夏火盛加苓連此二方治一切痰氣極効時珍曰世醫徒知半夏南星之屬何足語此哉然虛人禁用丹溪曰治痰用利氣藥過多則脾虛痰易生而反多又曰胃氣亦賴痰以養不可攻盡攻盡則虛而愈劇

化痰健脾丸 治內傷挾痰

人參 白朮兩陳皮 枳殼 半夏 胆星 蛤粉 茯苓 神麴糊丸

秘方治痰火 用枸骨葉煮飲治痰火甚驗 蓋痰未有不因平肺煎熬津液而成此藥直入足少陰經補養陰氣則痰火自消如釜底抽薪之意也

六味地黃丸 治水泛 張仲景曰氣虛有痰宜腎氣丸補而逐

人參 清痰水氣旺  
則痰行水消

本草備要主治註釋

蒼朮 實脾土燥脾濕 前胡 治風痰性陰而哮喘功治下氣

火火則熱地 滋腎水化痰 石菖蒲 開竅除痰乾生地 除痰欬花

生痰 熟地 之妙品也 白前 下天南星 治痰 貝母 潤心肺

紫苑 治痰 桔梗 治痰 蘭花葉 清痰 威靈仙 治濕痰 天麻

天花粉 潤燥 澤蘭 除痰 知母 清痰 黃芩 升痰 蛤粉 治痰

氣 細辛 破痰 紫蘇 井子 清痰 黃芩 升痰 蛤粉 治痰

日痰因火動 葶蘆 除痰 芫花 治痰 澤瀉 治痰 蛤粉 治痰

當先降火 麥芽 除痰 芒硝 治痰 砂仁 祛痰 華菱 祛痰 甘草 治痰

老痰頑 麥芽 除痰 芒硝 治痰 砂仁 祛痰 華菱 祛痰 甘草 治痰

痰虛痰 麥芽 除痰 芒硝 治痰 砂仁 祛痰 華菱 祛痰 甘草 治痰

李氏醫鑑 卷之六 痰飲

利射干 行太陰厥 神曲 化痰 葶 逐停 生薑干姜黑姜 集治

甜瓜蒂 吐風熱 浮石 除痰 蓬砂 祛痰 慈石 為利痰 兒

茶化痰 五靈脂 化痰 牛黃 利痰 礞石 化痰 雄黃 化痰 白

礞石 化痰 阿膠 化痰 牡蠣 化痰 珍珠 化痰 僵蚕 化痰 因以治風

能散相火 五倍子 化痰 喻之 人中黃 清痰 茯苓 治痰 中痰

逆結之痰 厚朴 化痰 訶子 化痰 枳實 化痰 枳殼 化痰 枳實 化痰

致 枳實 化痰 厚朴 化痰 訶子 化痰 枳實 化痰 枳殼 化痰 枳實 化痰

人中白 化痰 半夏 化痰 瓜蒌仁 化痰 寒潤下能清上焦 胡椒 下

白梅 治痰 山查 柿并霜 並化痰 海藻 治痰 枇杷葉

姜汁炙降氣 旋覆花 治痰 天冬 清痰 白木 清痰

下則火降痰消 天冬 清痰 白木 清痰

助元清腎痰 麥冬清心降火 天冬清痰 白木清痰

藥化痰 蚶殼 丹溪用以治痰 鬱金末 加韭汁姜汁

治痰中 鬱金末 加韭汁姜汁

李氏醫鑑 卷之六 痰飲

九

子 52-107

咳嗽

自聲無痰曰咳。蓋傷于肺氣有痰。則聲曰嗽。蓋動于脾濕也。言有痰曰咳。或因大因風。因寒。因濕。因火。因食。皆宜分症主治。大法治嗽。當以治痰爲先。而治痰又以順氣爲主。宜以半夏。南星。蘇子。其痰稠。紅利。其氣肺虛。加溫飲之。味肺實。加涼瀉之劑。凡感風寒而咳嗽者。皆長散痰。氣逆而咳者。當清痰。宜陳皮。蘇子。降氣湯水。和逆而咳者。宜小蘇。龍半。夏。茯苓。湯。氣虛病久而咳者。宜人參。五味。午。前。嗽。多。屬。胃。火。宜。知。母。石。膏。本。連。知。母。午。後。嗽。及。日。晝。夜。重。者。多。屬。陰。虛。宜。麥。冬。五。味。知。母。四。物。五。更。嗽。者。由。胃。有。食。積。至。此。時。火。氣。流。入。肺。中。宜。順。氣。消。食。化。痰。黃。芩。咳。嗽。乃。火。浮。入。肺。中。不。宜。用。涼。藥。宜。五。倍。五。味。飲。而。降。之。此。二。味。能。降。火。止。嗽。咳。嗽。不。得。眠。者。左。不。得。眠。者。肝。肺。宜。清。肝。右。不。得。眠。者。肺。脾。宜。清。肺。咳。嗽。脈。浮。爲。客。邪。宜。發。散。脈。實。爲。內。熱。宜。清。利。脈。濡。散。爲。肺。虛。宜。溫。補。久。嗽。難。解。外。以。致。肺。胃。俱。虛。飲。食。不。進。宜。溫。中。助。胃。兼。治。嗽。藥。仁。赤。血。指。曰。肺。出。氣。也。腎。納。氣。也。肺。爲。氣。主。

李氏醫鑑

卷之六

咳嗽

十

腎爲氣本。凡咳嗽。暴重。自覺氣從臍下逆起者。此腎虛不。能納氣歸元。當用地黃丸。安腎九。切。從。事。于。肺。此。虛。則。補。子。之。義。也。腎。實。口。五。行。推。腎。肺。二。藏。母。病。而。子。受。邪。何。則。肺。主。氣。肺。有。熱。氣。得。熱。而。上。蒸。不。能。下。生。于。腎。而。腎。受。傷。火。陰。傷。則。肺。益。病。蓋。母。藏。子。宮。子。隱。母。胎。凡。人。肺。金。之。氣。夜。臥。則。歸。藏。于。腎。水。之。中。因。肺。受。心。火。之。邪。欲。下。避。水。中。而。腎。水。乾。枯。火。無。可。容。之。地。因。是。復。上。而。爲。病。矣。久。嗽。肺。必。虛。肺。虛。不。能。生。腎。水。不。制。火。虛。火。上。炎。而。咳。嗽。也。李。士。材。曰。百。合。固。金。湯。此。方。殊。有。卓。見。然。上。爲。金。母。清。金。之。後。意。宜。顧。母。否。則。金。終。不。可。足。也。肺。受。火。傷。則。氣。逆。而。爲。咳。脾。有。停。濕。則。生。痰。而。作。嗽。病。有。五。藏。六。府。之。殊。而。其。要。皆。小。于。肺。以。肺。爲。五。藏。華。蓋。下。通。膀。胱。外。達。皮。毛。爲。氣。之。主。而。出。聲。也。素。問。曰。肺。之。能。令。人。欬。何。也。曰。五。藏。六。府。皆。令。人。欬。非。獨。肺。也。皮。毛。者。肺。之。合。也。皮。毛。先。受。邪。氣。邪。氣。以。從。其。合。也。五。藏。各。以。其。時。受。病。非。其。時。各。傳。以。與。之。有。自。外。得。者。肺。主。皮。毛。風。寒。暑。濕。之。邪。自。皮。毛。入。內。傳。藏。府。而。爲。欬。也。有。自。內。發。者。七。情。飢。飽。內。有。所。傷。則。邪。氣。上。逆。肺。爲。氣。出。入。之。道。故。五。藏。之。邪。上。蒸。于。肺。而。爲。欬。也。然。

風寒暑濕。有不爲欬者。蓋所感者重。不爲手。足。已。經。傷。藏。而。本。氣。未。傳。入。肺。所。以。傷。寒。中。有。以。有。嗽。爲。輕。而。七。情。飢。飽。之。欬。必。久。而。後。發。也。有。一。咳。而。不。出。者。脾。濕。勝。而。痰。涎。壅。滯。宜。半。夏。南。星。皂。角。之。屬。燥。其。脾。若。利。氣。之。利。所。當。忌。也。有。連。咳。數。聲。而。痰。不。出。者。肺。燥。勝。而。痰。滿。也。宜。用。紫。蘇。杏。仁。之。屬。利。其。肺。若。燥。脾。之。類。所。當。忌。也。久。嗽。有。痰。者。燥。脾。化。痰。無。痰。者。清。金。降。火。蓋。外。感。久。則。鬱。熱。內。傷。久。則。火。炎。俱。要。開。鬱。潤。燥。其。七。情。氣。逆。者。順。氣。爲。先。停。水。宿。食。者。分。導。爲。要。氣。血。虛。者。補。之。欬。之。不。宜。妄。用。清。劑。從。正。日。久。病。咳。嗽。遲。潮。于。上。形。癰。不。可。攻。者。以。硃。砂。水。銀。沉。香。黃。丹。寒。水。石。蛤。粉。之。類。以。墜。之。醫。賈。曰。咳。嗽。吐。血。未。必。虛。也。服。四。物。知。母。黃。柏。之。類。不。已。則。癰。成。矣。凡。陰。虛。勞。嗽。通。用。款。冬。紫。苑。百。部。百。合。沙。參。生。地。麥。冬。五。味。知。母。柏。苓。均。內。熱。骨。蒸。加。丹。皮。地。骨。嗽。而。復。瀉。者。乃。肺。移。熱。于。大。腸。蓋。府。俱。病。嗽。而。發。熱。不。止。爲。陰。虛。火。炎。皆。難。治。有。乾。咳。者。任。爲。難。治。此。係。火。鬱。之。症。乃。痰。鬱。其。火。邪。在。肺。中。用。道。通。散。以。開。之。下。用。補。陰。之。劑。可。愈。桔。梗。治。乾。咳。火。鬱。○。咳。嗽。成。

李氏醫鑑

卷之六

咳嗽

十

風者。身。寒。聲。重。傷。冷。者。悽。清。怯。寒。痰。熱。爲。焦。煩。受。濕。爲。纏。白。唾。之。稀。稠。從。可。知。也。清。稀。爲。虛。水。泛。爲。痰。是。無。火。之。痰。稠。而。濁。或。帶。黃。乃。陰。虛。是。有。火。之。痰。

清肺飲 治痰濕氣逆而咳嗽

杏仁 貝母 茯苓 桔梗 甘草 五味子 橘紅

五加藤 煎食遠服若春時傷風咳嗽鼻流清涕宜清解加

防風 薄荷 夏多火熱宜清降加 桑白皮 麥冬 黃

紫蘇 炒 芥 冬多風寒宜解表行痰加 麻

宜清熱利濕加 蒼朮 桑白皮 冬多風寒宜解表行痰加 麻

桂枝 干姜 生火嗽加 青黛 瓜 食積痰加 香附 山 濕痰 除 貝

姜 半 夏 防 風 火 嗽 加 蔓 菁 石 食 積 痰 加 查 枳 實 濕 痰 除 貝

半 夏 燥 痰 加 瓜 蔓 菁 午 前 嗽 屬 胃 火 宜 清 胃 加 石 膏 午 後

南 星 燥 痰 加 母 天 冬 午 前 嗽 屬 胃 火 宜 清 胃 加 石 膏 午 後



嗽屬陰虛宜滋陰降火加竹瀝地知栢二冬黃昏嗽爲火

浮于肺不可用涼藥宜五倍五味河勞嗽見血多是肺受

熱邪宜加母芍阿膠天冬知久嗽肺虛如肺熱去人參用

沙參可也

此手太陰之藥治嗽之通劑也杏仁解肌表寒降氣潤燥  
貝母清火散結潤肺化痰五味飲肺而寧嗽痰除濕而  
理脾橘紅行氣甘草和中桔梗清肺

金沸草散 治肺經傷風頭目昏痛咳嗽多痰風盛則氣壅

故昏

旋覆花即金沸草前胡 細辛 荆芥錢赤茯苓六分半夏五分甘

李氏醫鑑 卷之六 咳嗽 主

草炙三加姜棗煎局方加麻黃赤芍無茯苓細辛如滿悶

加枳壳桔梗有熱加柴胡黃芩頭痛加川芎

百合固金湯 治肺傷咽痛喘咳痰血肺金受傷則腎水之

上炎故咽痛火上薰肺故

生地二錢熟地三錢麥冬半錢百合 白芍炒當歸 貝母 生

甘草一錢玄參 桔梗八分

諸藥皆以甘寒培元清本不

欲以苦寒傷生發之氣也

補肺湯 治肺虛咳嗽此治肺虛咳嗽苦實火咳嗽者忌用

人參 黃耆蜜五味子炒紫苑錢桑白皮蜜熟地二錢入蜜

少許和服方內用熟地者補水以制相火其痰自除且亦

生而嗽

補肺阿膠散 治肺虛有火嗽無津液而氣哽者火盛則津

氣

阿膠蛤粉炒馬兜鈴焙甘草炙牛蒡子炒香杏仁去皮尖

糯米

此手太陰藥也馬兜鈴清熱降火象肺故牛蒡子利膈滑痰

潤肺解熱阿膠清肺滋腎益血補陰火退而嗽寧李時珍

故治火嗽阿膠散用兜鈴非取其補肺取其清熱降氣而肺自安也

李氏醫鑑 卷之六 咳嗽 主

所以補之也若喘一于補

小柴胡湯 加桔梗治春嗽本方加青黛姜治熱嗽

黃芩加半夏生薑湯 治胆府發欬嘔苦水如胆汁胃氣逆

黃芩三兩白芍 甘草二兩大棗十二枚半夏半升生薑二兩

逍遙散 治咳嗽潮熱口渴便秘骨蒸潮熱肝血虛也肝火

往來寒熱火盛燥金不

瓊玉膏 治乾咳嗽有聲無痰謂之乾咳脾中有濕則生痰

津枯故乾咳

地黃四兩茯苓十二兩人參六兩白蜜二兩先將地黃蒸汁去渣

入蜜煉稠再將參苓細末和入磁罐封水煮半日白湯化服  
服臘仙加沉香琥珀五錢自云奇妙琥珀降肺寧心沉香升降諸氣

瀉白散方見諸熱門 治肺火皮膚蒸熱瀝漸寒熱喘氣急

桑白皮甘肅元氣之不足辛瀉肺氣之有餘除痰止咳性善行水瀉火故能除痰痰除則嗽止地骨皮寒瀉肺中之伏火甘草糯米補益脾胃以補肺並能瀉熱從小便出瀉白散瀉肺經氣分之火黃芩一物湯片後清金九瀉肺經血分之火清金九即本方加人參五味茯苓加減瀉白散黃芩炒為末水丸

治咳嗽嘔吐喘急本方加知母黃芩桔梗加減瀉白散治咳而氣喘煩熱口渴胸膈不利

桑白皮等汁十味煎 治氣嗽經久將成肺痿乍寒乍熱唾

李氏醫錄 卷之六

涕稠粘喘息氣上唇口焦乾亦有吐血者漸覺瘦悴小便赤少色敗毛聳此亦成蒸尸

桑白皮升一地骨皮三升二味合生地汁五升生麥冬汁二升

葛根汁竹瀝三升生薑汁白蜜棗膏一升酥三合以麥

冬生地葛根竹瀝姜汁和煎減半再納桑皮地骨汁和煎

三分減一再入酥蜜棗膏攪勿停手煎如飴饒夜臥時取

一胡桃大含之稍加至錫子大或晝日九服亦可

百花膏治咳嗽不已痰中有血虛人尤宜

百合 欬冬花 等分蜜丸龍眼大食後臨臥姜湯下或

喻化加紫苑百部烏梅名加味百花膏治同煎服亦可  
欬冬瀉熱下氣清血除痰百合潤肺寧心補中益氣並為理嗽要藥

紫苑湯久 治肺傷氣極勞熱久嗽吐血氣極六極之一也肺主氣

元氣虛則陰火盛壯火食氣故成氣極火炎肺系故久嗽不已則通血上行

紫苑 阿膠 知母 貝母 桔梗 人參 茯苓 甘

草五五味子十二食後服一方加

勞而久嗽肺虛可知即有熱症皆虛火也海藏以保肺為君故用紫苑阿膠潤肺而虛有痰止咳以清火為臣故用知母貝母潤燥清痰以參苓為佐者扶土所以生金以甘桔為使者載藥上行脾肺五味滋腎家不足之水收肺寧之金

李氏醫錄 卷之六 咳

生脉散 加黃耆甘草桔梗治脉虛欬則心痛喉中介介或

腫本方加甘草五味子湯蒸餅為丸治肺虛少氣咳嗽

白汗

蘇子降氣湯見吐血門 治虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛咳嗽

三子養親湯 治老人痰嗽喘滿懶食

龍腦雞蘇丸見口門 治肺有鬱熱咳嗽吐血謂卷曰此為熱而肺虛者設故

少佐參耆也嘉言曰氣血二分之熱兩解此丸宜常服之

治久嗽方 白蜜一斤生薑二斤先秤銅銚知斤兩訖納蜜姜

汁微火焚令姜汁盡惟有蜜在則止每含如棗大九日三

服時宜忌陰分嗽者多屬陰虛常用知

膏歸龍膏九傷寒變治肝移熱于肺而咳嗽

五苓散 治水寒射肺咳嗽 防風通聖散感冒治咳嗽上

蔡九扶麻湯虛勞治或寒或熱成勞咳嗽聲不出體虛

自汗四肢倦怠 此方表裏交治氣血

唐鄭相國方 治虛寒咳嗽

破固紙兩酒胡桃肉二十兩蜜調如飴每晨酒服一

大匙不能飲者熱水調忌羊血久服利益甚多不獨療嗽

而已

李氏醫鑑 卷之六 咳嗽

六味地黃丸 治發熱咳嗽腎虛則移熱于肺而咳嗽按之

本方加五味三名都氣丸治勞嗽益肺之元

人參散諸熱治痰嗽煩熱 甘桔湯喉痺治乾咳無痰火

順氣消食化痰丸飲食治五更咳嗽

二陳湯加枳實瓜蒌治食積痰嗽發熱 本方加南星枳

香 名順氣導痰湯 治痰結胸滿喘咳上氣

茯苓甘草湯 治膀胱府咳嗽則遺尿

茯苓 桂枝二 甘草一 姜二片

五苓散 各三澤瀉五桂二 治冬時寒嗽如瘧狀

息貫丸嗽治肺積在右脇下令人灑淅寒熱喘咳發肺癰

連減半

治久嗽方 欬冬花一兩蜜拌潤入茶壺中以麵固其蓋勿

按 治久嗽方 欬冬花一兩蜜拌潤入茶壺中以麵固其蓋勿

治久嗽方 欬冬花一兩蜜拌潤入茶壺中以麵固其蓋勿

治久嗽方 欬冬花一兩蜜拌潤入茶壺中以麵固其蓋勿

治久嗽方 欬冬花一兩蜜拌潤入茶壺中以麵固其蓋勿

治久嗽方 欬冬花一兩蜜拌潤入茶壺中以麵固其蓋勿

李氏醫鑑 卷之六

本草備要主治註釋

細辛 治咳嗽 前胡 治咳嗽 紫蘇并子 治痰 薄荷 治痰 知母 定

黃芩 治火嗽 麻黃 治嗽逆上氣風寒鬱于肺 經曰諸氣順則肺平

茯苓 治嗽 砂仁 治嗽 牛蒡子 治嗽 山豆根 治熱 罌粟壳 治久

一 蘿菔 治嗽 百合 治嗽 清熱止嗽久嗽之人肺氣必虛宜用

餘糧 治嗽 浮石 治嗽 蓬砂 治嗽 白石英 治嗽 逆上 胆礬 伏

龍肝 治嗽 白毛烏骨鴨 治嗽 露水 治嗽 肺之藥 阿膠 治嗽 勞 獺肝

止 龜板 治久 牡蠣 治久 秋石 茯苓 治逆 肉桂 治逆 逆結氣

不歸元能引 地骨皮 治嗽 白前 治逆滿 訶子 治逆滿 訶子 治逆滿 訶子 治逆滿

欬之相壳 治久沙參 牛膝 止久嗽引 五味子 寧久嗽表

服天冬 麥冬 潤肺 欬冬花 施治木草 日隆冬獨秀先

春開敷得腎之體先肝之用故為理嗽溫肺之最夫低欬

必因寒寒為冬氣入肺為逆秋冬非肺家當藥乃使肺邪

從腎順流 紫苑 辛溫潤肺專治血痰 百部 治肺熱 桔梗 散

而出也 寒邪瀉上焦火 馬兜鈴 寒能清肺熱 半夏 治咳 貝母 治咳

又治乾咳無痰 瓜蒌子 為治嗽要藥肺受火通失 當歸 治咳 白芍 治

逆 枇杷葉 治熱 白果 嗽 柿乾 潤肺寧嗽 木瓜 治肺 陳皮

統治百病 烏梅 治久 杏仁 治嗽逆上氣肺 淡竹葉 治咳 桑

嗽家所需 白皮 肺氣虛及風寒作嗽者慎用 梨 汁煉蜜消痰止咳 白

白皮 治肺熱 白芥子 同蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子

除榆白皮 治咳 髮主咳

除榆白皮 治咳 髮主咳

咳血吐血唾血咯血溺血下血以及諸血 詳論

○卷末另有統論統

咳者有聲無物嗽者有物無聲肺為華蓋至清之藏有火

則咳有痰則嗽其主氣氣逆為咳腎主水水乏為痰腎

上入肺肺燥則嗽其支者從肺絡心屬肺中故病則俱病也

涎唾中少血散漫者此肺絡受熱傷之血也若咳出白沫痰

紅痰痰中帶血者此肺絡受熱傷之血也若咳出白沫痰

紅色則內傷肺經受熱或血絲絡腎經鼻衄出血咳出痰

內有血屬肺經吐血或血成盆成碗者屬胃經陽明多血

多氣故也自兩脇逆上吐血者屬肝經肝火舌血謂之舌

經下血屬大腸經牙宣出血屬胃腎虛火舌血謂之舌

汗孔出血謂之肌衄出千心與肝也又驚而動血者屬心

怒而動血屬肝肝受而動血者屬肺思而動血者屬脾勞而

動血者屬腎腎吐血者血隨吐出血者隨咳咯出或帶血

經出腎經咳出血者血隨咳出血者隨咳咯出或帶血

為先氣行則血自歸經治虛火之血養正為先氣壯則血

能攝血枝子最能清胃脫之血倘誤用之則害必矣升

日治血不可單行單止不可純用寒涼心肝火旺逼血

上行則吐血肺火盛則衄血血生于心統于脾宜布于

肺肺則歸經熱則火行火傷肺絡血隨咳出或帶痰中為

咳血吐血者多者為吐血肺主皮毛故熱如火燎喉不容

不一死服寒涼者百不一生小便性溫不寒飲之入胃隨

上焦清熱下焦利便如狂○摘玄云試血法吐水而  
者此血也沉者肝血也半浮沉者心血也各隨所見以  
未日服之佳

清咽太平丸 治膈上有火早間咯血兩頰常赤咽喉不清

肺屬金肅清之藏也木火焚灼肺金受刑故咯血早間寅  
卯本旺生火之時兩頰肺肝之部也十二經脈惟足太陽  
在表不願咽餘皆上循喉嚨盡能作病而  
君相二火尤甚諸火上逆故咽喉不清

薄荷十川芎 防風 犀角 柿霜 甘草 兩桔梗 兩蜜

丸

麻黃人參芍藥湯 治吐血外感寒邪內虛蘊熱

胃虛與補藥愈後繼居曠室臥熱炕咳而吐血東垣謂  
此大虛弱客居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒

過渡熱火邪不得舒伸故血出干口當補表之陽氣裏之  
虛熱因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與  
之達或動血却與麻黃湯立愈

桂枝 五分 補麻黃 去外黃耆 實表 甘草 炙補 白芍 安大陰  
人參 補元氣 麥冬 保肺氣 五味子 五粒 安當歸 和血養  
而實表 各三分 肺氣 當歸 血五分 熱

服綱目曰觀此一方足以爲萬世之模範矣蓋取仲景麻

黃湯與補劑各半服之但凡虛人服仲景方者當以此爲

則也

三黃瀉心湯 治心下痞熱心氣不足吐血衄血

衄何以不補心而反瀉心升溪曰少陰不足亢陽無輔致  
陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不足脾肝各

受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主所  
者心之母血之舍也肺肝火退則血歸經而自安矣  
宗與曰以苦瀉其熱就以其苦補其心蓋一舉而兩得之矣  
吳鶴皋曰治病必求其本陽邪上竅出血則熱爲本血爲  
標能去其熱則血不治而自歸經矣 土材曰古人用大  
黃治虛勞吐血意甚深微蓋濁陰不降則清陽不升瘀血  
不去則新血不生也 誠菴曰此乃傷寒外感陽熱而吐  
血故用三黃寒瀉之劑若虛寒內傷吐衄而誤服此則殺  
人矣 楊仁齋曰血遇熱則宜流故止血多用涼藥然亦  
有氣虛血寒氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走是矣  
法當溫中使血自歸經宜理中湯加木  
香七氣湯加川芎或甘草干姜湯甚效

黃連 黃芩 黃連 黃芩 黃連 黃芩 黃連 黃芩 黃連 黃芩

石膏湯 表裏 本方水丸名三黃金花丸治吐血衄本方加火

黃名枝子金丸去 枝子加 大金花丸治暑同 傷暑同

李氏醫鑑 卷之六 咳吐血

者皆傷心虛不能生血不宜過用寒涼以瀉心宜清若  
益氣加丹皮生地犀角之類蓋若傷心亦傷氣其脉必虛  
斯無弊也

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

喘嗽嘔血或大便秘利 肺爲氣主肺虛火盛故氣高痰湧  
或喘或嗽甚則嘔血也火炎津枯

欲便 蘇子 半夏 前胡 厚朴 梔子 當歸 甘草

久肉桂 分 加姜棗一方無桂有沉香 沉香能升降諸氣  
溫而不燥切卷曰

咳血方 治咳嗽痰血

青黛 瓜蒌仁 去海石 山枝 訶子肉等分爲末蜜丸

冷化嗽甚加杏仁

還元水 飲自已渴 治咳血吐血陰虛久嗽火蒸如燎

童便 取十二歲無病童子不茹葷辛清微如水者去頭尾

冬則用湯溫之或加藕汁阿膠有痰加姜汁 童便酸寒降火滋陰潤肺

散寒功効如神

獨聖散 治多年咳血紅痰白痰為末每服三錢臨臥糯米

湯下

李氏醫鑑 卷之六 咳吐血

栝葉湯 治吐血不止氣血虛寒

栝葉十姜各 三兩三把 馬糞汁 一合煎服 馬屑午為雞假之以降心火

四物湯用生熟二地加黃耆丹皮升麻柴胡名三黃補血湯

治亡血血虛六脉俱大按之空虛 諸藥涼血補氣升陽陽生則陰自長也

龍腦錫蘇丸 見口 治吐血咳嗽

犀角地黃湯 涼血變現門 治陰虛火動吐血咯血因怒致血

加味 見傷寒變現門 醫貫曰此湯乃陰虛之症借

節菴加味犀角地黃湯 見傷寒變現 治同

參蘇飲 感月 合四物名供冬補心湯尤能治虛熱吐血

痰中帶血方 鬱金末加薑汁姜汁竹瀝童便服極効

本草備要主治註釋 統治諸血另詳理血門末

澤蘭 一名孩兒菊治吐血 艾葉 大小薊 地榆頭 並治

鬱金 並治吐血 荊芥 雞蘇 黃芩 俱治吐血 青黛 治吐血

虛火炎 者忌用 車前草 香附 治吐血 白芍 此主之故知太陰藥也

薏仁 治咳血膿血以肺蘊薏仁末服 葱 韭 干姜炮黑 止吐血 滑石

代赭石 青鹽 伏龍肝 阿膠 並治吐血 犀角 治吐血 骨

蛤蚧 治咯血氣血兩虛者宜之 童便 輪迴酒 止吐血 扁栝葉 酒

嫩枝 地骨皮 桑白皮 治肺熱吐血 棕 燒炭不可太過

李氏醫鑑 卷之六 咳吐血

茹 淡竹葉 乾柿 治咯血 藕節 荷葉蒂 蒜 搗汁服主

白膠 療吐血 瓜蒌子 炒香酒服止吐血 天冬 麥冬 款冬花 治吐血

紫苑 善干達下使氣化及于州都小便自利人所不知士

材曰辛而不燥潤而不寒補而不滯非多用獨用不能速効誠金玉君子

肺癰肺癰 過飲唾涕腥臭似癰瘻方

肺者五臟之華蓋也處于胸中主氣候在皮毛勞傷血氣  
肺理虛而風邪乘之內感于肺汗出惡風咳嗽短氣鼻塞  
項強胸膈脹滿久不瘳則成肺癰傷皮毛熱傷血脈  
風熱相搏氣血稽留結于肺則成肺癰多唾涎沫而無  
膿者肺癰也口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫咳吐膿  
血胸中隱痛者肺癰也痰為正氣虛癰為邪氣實肺癰如  
咳久聲啞聲嘶咯血此屬陰虛火熱甚也吐涎沫而不效  
不渴必遺尿小便數以上虛不能制下此肺中冷也必眩  
多涎唾用炙甘草湯以溫之肺癰涎唾多心中溫溫液  
液者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同故  
肺癰有寒熱之異有從火熱傷肺而得之者有從肺氣虛  
寒而得之者○治癰宜養血補氣保肺清火治癰宜瀉熱  
豁痰開提升散癰為邪實痰為正虛痰重而癰稍輕宜  
審察不可誤治肺癰者熱之所過血為之凝滯高結  
吐如米粥始萌  
可救服成難治

李氏醫鑑

卷之六

肺癰肺癰

音

秦艽扶羸湯

治肺癰

治肺癰

紫菀湯

治肺癰變肺癰

紫菀

洗淨

阿膠

知母

貝母

錢

桔梗

人參

茯苓

甘草

分五

五味子

食後服

一方加蓮肉

炙甘草湯

治肺癰咳唾多心中溫溫液液者

肺氣虛則成

痰胃中津液

之上俱者悉從燥熱

化為涎沫故濁唾多

甘草

炙

生薑

桂枝

人參

阿膠

蛤粉

炒

生地

一斤

冬心

麻仁

斤

大棗

水酒各半煎內阿膠烱化服

聖濟經云津液散為枯五藏痿弱營衛涸流濕劑所以潤

之嘉言曰此仲景傷寒門中之聖方也千金翼云  
取在于益肺氣之虛潤肺金之燥至于桂枝辛熱似有不  
宜不知桂枝能通營衛致津液則肺氣能轉輸涎沫以漸  
而下尤  
為要

甘桔湯

治肺癰吐膿

甘草

兩

桔梗

兩

或等分

失音加

訶子聲不出加半夏上氣加陳皮涎嗽加知母咳渴加五

酒毒

乾

少氣加人

參

吐膿加

紫菀

肺癰加

阿膠

咳而胸滿振

特出濁唾腥臭為肺癰此湯上之

嘉言曰此上提之法

又當引之從胃入腸此法不中用矣五藏之尊心雖為王

而肺居其上為華蓋下覆四藏合天地之德通達風氣性

愛溫而惡寒惡寒亦惡熱心火更炎上蒸其肺金被火傷

李氏醫鑑

卷之六

肺癰肺癰

重

則葉萎倚着于肝肝發瘁則嗽因心肺虛弱不能傳陽于

下焦遂至正陽俱躋變成嗽矣肺主皮毛遇寒則慄而栗

名甘草湯治同本方加防風名桔梗防風湯治同又方桔

梗桑白皮貝母瓜蒌當歸枳殼杏仁防已一方防風各五

分黃耆杏仁百合甘草各三加萎煎亦名桔梗湯治肺

癰吐膿噎乾多渴如大便閉加大黃小便赤加木通

皂莢丸治肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不臥

皂莢刮去皮為末蜜丸以棗膏和湯服三九嘉言曰火

聚于肺表之裏之溫之曾不少應堅而不可攻者令

而少之也

千金方用桂枝湯去白芍加皂角名桂枝去芍藥加皂角湯

治肺痿吐沫

本香板耶九門見病

治肺痿喘嗽

聖散血門

治肺痿咯血紅痰

桑白皮等汁十味煎門咳嗽

治久嗽成肺癰唾涎成膿出無

少多

息實九門胸膈

治喘嗽肺癰

加減瀉白散

治過飲傷肺氣出腥臭唾涕稠粘嗑喉不利

李氏醫鑑

卷之六

肺痿肺癰

矣

口苦乾燥

桑白皮 地骨皮 黃芩 知母 麥冬 五味 桔梗

原文曰桑皮地骨味苦微寒降肺中伏火而補氣為君黃芩知母苦寒治氣出腥臭清肺利氣為臣五味酸溫以收肺氣麥冬苦寒治唾涕稠粘稠口苦乾燥為佐桔梗辛溫輕浮治痰逆利咽膈為使也

本草備要主治註釋

天冬 肺痿 麥冬 治肺痿 欬冬花 治肺痿 紫苑 治喘吐 旋

覆花 治吐如 桔梗 治肺 白前 治肺氣 馬兜鈴 能清熱降肺 雞蘇治

則肺 白及 治肺 貝母 治肺痿 升麻 治肺痿 雞蘇治

痰 痰 治肺 山豆根 去大腸肺之風熱 苡仁 治肺痿肺癰 肺

猪肺龍苡 仁末服 白石英 治肺痿 阿膠 治肺痿 蛤蚧 治肺 竹茹 治肺

李氏醫鑑

卷之六

肺痿肺癰



李氏醫鑑卷之七

發源昌期李文來彙輯

友人錫三王世寵參訂

元象賓子

男 元冬周佐 元峯景賦

元夏雲生 元昂廷暉錄

姪 元旭子昭 元鼎承曜

元展西平

瘧

瘧有中暑者有三陰者其症各殊同傷寒也在太陽謂之寒瘧治多汗之在陽明謂之熱瘧治多下之在少陰謂之風瘧宜和之此三陽受病謂之暴瘧發在夏至後暑前此傷之度者也在此三陰經總謂之溫瘧當從太陰經

李氏醫鑑卷之七

論之發在處暑後至前此傷之重者遠而為瘧者老也居西方宜暑藥瘧之凡瘧須分陰陽氣虛虛陽虛虛陰陽虛陰陽虛發於春夏屬陽發於秋冬屬陰自下至已屬陽自午至亥屬陰邪從自下為陽與邪並行故一日發邪深在發而陰虛連膜原不能與衛氣並行故間日發或三四日發而外邪伏於半表半裏適在少陽所主之界入與陰爭陽勝則熱出與陽爭陰勝則寒若純熱無汗為瘧瘧溫瘧絕寒無熱為瘧瘧要皆自少陽而造其極偏補偏救敵亦必返還少陽之界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成其為瘧矣脈緩而遲即久瘧正虛而弦之一字宜慎微之也○詎庵曰瘧之不離少陽猶效之不離於肺故經曰五藏六府皆令人瘧然必傳以與肺也○瘧有經者瘧瘧寒瘧食瘧思瘧之別須分陰陽虛實不可概論○瘧子厚曰世醫以瘧為脾寒者歸之脾治之不可不誤也○劉宗厚曰瘧瘧伏陰在內人或納涼深浴寒客肌肉之間或饑飽勞役內傷而病作肌肉為脾發則惡寒戰慄乃謂之脾寒耳蓋由風

李氏醫鑑卷之七

寒濕暑濕邪鬱於腠理夏時毛竅疎通而不為病至伏氣鬱之瘧未邪不從發越故進退不已往來寒熱勢如焚瘧人之瘧所以名瘧者四時之傷寒也十二經皆能為瘧古方多兼理內傷取助由脾胃和精氣通陰陽和解諸邪悉散並非脾病也世用發表解肌溫經散寒等法亦未嘗執于燥脾與劫劑也○詎庵曰瘧瘧寒瘧食瘧思瘧受傷者定多故仲景小柴胡湯入參半夏姜棗作脾胃胃藥其治少陽獨柴胡一味而已嚴氏宗之故以小柴胡減而止清脾飲是明從脾胃論治矣劉氏之論亦上脾胃內傷乃不取番子和之案以為非脾病恐不然也又古方用枳實芍藥散治鬼瘧蓋難病多有快鬼症者何獨于瘧必云無也○清脾飲即小柴胡加減從濕脾諸方而一變也虛者忌用○吳鶴皋曰清脾非清涼之謂乃劫去其邪而脾部為之一清也劉宗厚因草果之熱而護焉是未達醫用和氏之清矣○小柴胡湯本陰陽兩停之方可寒寒熱以為進退○此方加姜桂則進而從陽其加參連以退而從陰可以類推○傷寒餘熱未盡重感六淫之氣變

在氣血入生委室同前荷無行血之品何以收十全之功  
理○魯命集云瘧夜發者乃邪氣深遠而入血分爲陰經  
有邪宜加桂仁于桂麻湯中發散血中之風寒○晝發屬  
陽在表屬陰○瘧久不愈爲瘧瘵多成癰于左脇之下名  
曰瘵母乃用之積也瘵屬少陽則經脈與肝相表裏久瘵  
屬在血分血亦肝所主也當以蠶甲爲君隨症虛實而施  
佐使之藥○時珍曰常山蜀漆切痰瘵瘵須在  
發散表邪及夜發必提出陽分之後方可用之

四獸飲 三因和四獸 治五藏氣虛七情兼併結聚痰飲與  
衛氣相搏發爲瘧疾亦治瘧瘵 六君子 加烏梅神果

麻黃杏仁石膏甘艸湯 麻黃湯 除桂枝 治溫瘧先熱後寒  
人參敗毒散 治風瘧鬼瘧

桂枝羌活湯 治瘧發在處暑前頭項痛脈浮有汗惡風

李氏醫鑑 卷之七

桂枝 羌活 防風 甘艸 等分每服五錢迎其發而

服之如吐加 半夏 無汗 桂枝易 麻黃防風湯 二湯機要

表通用之劑 此足太陽藥也瘧分六經故微仲景傷寒  
例以防風羌活散太陽之邪而以桂枝麻黃分主有汗

汗也 河間曰瘧發寒熱大作此太陽陽明合病汗出不  
止知熱也陽盛陰虛之症不治必傳入陰經桂枝芍藥

湯主之桂枝三錢芍藥黃耆知母石膏各一兩如寒熱  
大者桂枝黃芩湯和之小柴胡湯加桂枝知母石膏外邪

已罷內邪未已大柴  
胡大承氣等下之

常山散 治吐瘧瘵

兒角 白礬 常山 甘艸 爲末溫水調下五分探吐

小柴胡合平胃散名柴平湯 治濕瘧身重身痛 本方

夏加常山 名柴胡飲子治瘧疾 喻嘉言曰于和法中本方

白芍大黃 治瘧瘵 遇勞 本方 去半夏人參姜棗加治瘧瘵小

柴胡 麻黃 節 澤瀉 各三 病有三在表在裏及在半

邪正分爭併于表則在表併于裏則在裏未有併則在  
半表半裏麻黃之辛能散表邪由汗而泄澤瀉之酸能引  
裏邪由溺而泄柴胡升陽居表裏之間而和解之此但可  
以治實瘧虛者當辨其氣血而加補劑盡發屬氣虛夜發  
屬血

滑脾飲 治瘧疾熱多寒少口苦噎乾小便赤澀脈弦數

李氏醫鑑 卷之七

陽勝也口苦噎乾肝胆火也熱盛故便赤瘧邪居  
于半表半裏屬少陽甲胆之分肝胆屬木故脈弦

青皮 厚朴 炒 柴胡 黃芩 炒 半夏 炒 茯苓 白朮 炒

甘艸 草果加姜棗煎一方加檳榔大渴加 麥冬 瘧不止

加酒炒常山 錢 烏梅 二個常山切剉煎截

瘧爲肝胆之邪然多因脾胃受傷而起脾胃屬土土重感于  
濕濕生熱熱生瘧故見前症脾胃既受病木又尅之故用青

皮柴胡以破滯而伐肝半夏厚朴以行痰而平胃茯苓用  
以滲濕黃芩用以清熱艸果辛熱能散太陰之積寒除瘵

而散痞且清膏粱之痰蓋先去其害  
脾者而以白朮甘艸調而補之也

不換金正氣散 治瘧疫濕瘧平胃散加 藿香 再加 人參 茯苓

生薑 名參養胃湯 見 治飲食傷脾發爲瘧瘵 老瘵

馬梅 名參養胃湯 見 治飲食傷脾發爲瘧瘵 老瘵

子 52-118

常山飲 瘧久不已者用此截之 初起不宜禁藥即邪氣未盡發生他症久發則截之

常山 燒酒炒 二錢 艸果 檳榔 知母 貝母 烏梅 姜片

張一牛酒半水煎露一宿日未出時而東空溫服渣用

酒浸煎待瘧將發時先服一方 有良效甘 神無煩 一方加 川山甲

古云無痰不作瘧常山引吐行水祛老痰積飲檳榔下氣

破積能消食行痰陰陽不心則瘧作知母滋陰能治陽明

獨勝之火艸果辛熱能治太陰獨勝之寒貝母清火散結

瀉熱除痰烏梅酸飲滴收生津退熱 飲陰故 合為截瘧之

劑也 趙以德曰常究本艸知母艸果常山甘艸烏梅檳榔 川山甲皆云治瘧集以成方者為知母性寒入足陽

李氏醫鑑 卷之七 瘧 五

明治獨勝之熱使退就太陰艸果溫燥治足太陰獨勝之

寒使退就陽明二經和則無陰陽交錯之變是為君藥常

山主寒熱瘧吐胸中痰結是為臣藥甘艸和諸藥烏梅去

痰檳榔除痰破滯氣是為佐藥川山甲穴山而居遇水

而入則是出入陰陽貫穿經絡于營分以破暑

結之邪為使藥也惟脾胃有鬱疾者用之收効

截瘧七寶飲 治實瘧久發不止寸口脈弦滑浮大者 茲為 肝風

滑為痰浮為在表大為陽 不問見瘧食瘧並皆治之

若脈沉濡微細者禁用 常山 艸果 檳榔 青皮 厚朴 陳皮 甘艸

等分用酒水各一鍾煎熟絲綿蓋之露一宿于當發之早

而東溫服 藥正發時不可服藥者 服藥反能助寒助熱 此皆溫散行痰之品加

甘艸者取其入胃佐常山以吐痰也 王機微義曰方乃 溫脾燥烈之藥蓋作

肥寒治也用之亦効者值病入陰陽相傾脾氣鬱結濁液

凝痰閉塞中脘因得燥熱亦以暫開所以氣通而疾止若

手氣虛弱內有鬱火之人復 用燥熱愈劫愈虛答將誰執

驚甲飲 治瘧久不愈腹中結塊名曰瘕塊 瘧久不愈為 瘕瘕証見前

驚甲 醋 白木 黃耆 川芎 白芍 枳殼 艸果 厚

朴 陳皮 甘艸 等分姜片三棗一枚烏梅少煎 久瘧必由 補脾氣黃耆補肺氣使氣足運脾方能磨積也川芎補肝

而行血中氣帶白芍助脾而散肝經火邪二藥並和厥陰

營氣營血調則陰陽和檳榔下氣而攻積艸果緩目而祛

寒厚朴破血而散滿陳皮理氣而消痰甘艸和中而補土

驚甲醋平屬陰色青入肝能益陰 補虛消熱散結故為瘕瘕之君藥也

木香枳殼九 治食瘕 五積散 衣裏 治寒瘕惡熱無汗

李氏醫鑑 卷之七 瘧 六

桂枝白虎湯 傷寒 治溫瘧但熱無寒骨節疼痛時嘔

茵陳九 時行 治黃病瘕瘕 六一散 治熱瘕 但熱 五苓散

治痰飲濕瘕 合小柴胡湯名柴苓湯 治瘕疾熱多寒少

保和丸 治食瘕下痢 桃仁承氣湯 攻裏 治瘕疾實熱夜

發熱入血分則夜發 稀涎散 中風 加藜蘆常山甘艸各常

山散吐痰瘕 經驗方 常山 枳殼 葛蒲 各一 酒煎露一宿空心服 忌

十日 經驗方 統治諸瘕並瘕瘕廣內尤効



度滯下若愈癰亦隨止即不止其熱必輕 凡勞瘵病人陰不足或作勞或房勞病發于陰或間日一發或三日一發此則為病深須以豬甲牛膝何首烏為君橋皮為佐發于夜而便燥者加當歸脾胃弱者勿加佐以姜皮熱甚勿入大劑與之便瘥 凡瘥疾多熱久不解者其人必本陰虛法當益陰除熱非驚甲牛膝不能除也多寒而久不解者其人必本陽虛非人參白朮不能除 暑熱濕之邪內伏口藥不效者用獨雄九粒愈 病人虛者以人參姜皮各兩許濃煎露一宿五更溫服有痰者宜加木橋皮各四錢貧人或用人參一兩或用麻黃一兩同姜皮煎服其多用其力可代人參 足小陰經屬腎其症寒熱俱甚腰痠脊脹口渴渴寒從下起小便短赤宜先服人參白朮湯加桂枝以祛暑邪後用驚用四五錢牛膝兩許熱甚者加知母麥冬各四五錢寒甚者加桂枝錢許嘔則兼加姜皮三四錢如熱甚而嘔者去桂枝姜皮加竹茹三錢人參橋皮各三四錢用牛膝桂枝者肝腎同一治故也

二木柴葛湯 諸瘥必用神方

李氏醫鑑

卷之七

瘥

九

白朮 蒼朮 柴胡 陳皮 各七  
煎八分服 日一發及午前發者邪在陽分加 枯芩伏  
甚口渴加 石膏知 母麥冬 間日或三四日發或午後及夜發者邪  
在陰分加四物湯酒炒 黃耆 提起陽分方以截之脉虛神  
倦加人參 傷食者加 神曲麥芽 瘥多加 生薑 要止截加 枳  
常山 烏梅  
飲食者必惡食加山查傷肉食者加黃連紅曲傷谷食者  
加枳實脾果各七分為麵食者加李子杏仁積消即已

滯下 俗名 附脫肛 脫肛詳論并方

喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼以解表次用苦寒以清裏裏安後重宜下腹痛宜和辛涼以解除濕脈弦宜去風風濕內結宜汗身冷自汗宜溫身熱宜重劑以竭之下痢赤屬血分白屬氣分載氏曰俗謂赤熱白寒者非也通作濕熱處治但有新久虛實之分下痢後重者氣滯也通作濕熱處治但有新久虛實之分小便後重者用通利藥而周効重加升麻而後下降有升大物必上行而後下降經曰地氣上為雲天氣下為雨天地不交則萬物不通也○丹溪曰氣升則水自降○裏急後重則虛詳論見後黃芩芍藥湯後○原病式曰或言下痢白為寒者非也寒則不能消穀何由反化為膿也燥鬱為白為肺金也世謂皆兼下濕濕熱甚于腸胃之內致氣液不得宣通使煩渴不止也下痢赤白俗言寒熱相兼其說尤誤寒熱與氣液能俱甚于腸胃而同為痢乎各隨五臟之部而見其色其本則一出于熱但分淺深而已或曰何故服辛熱之藥亦有愈者曰為能開發鬱結使氣液宣通

李氏醫鑑

卷之七

滯下

十

流濕間燥氣和而已莫若用辛涼苦寒之藥微加辛熱佐之如錢氏香連丸之類是也○大法治痢以甘芍和中止腹痛熱痛加芍連寒痛加姜桂以木香檳榔行氣除後重氣分如枳殼滑石寬腸血分加當歸桃仁和血以秦艽子祛風黃芩黃連清熱毒以白朮陳皮調胃扶苓澤瀉參湯枳實人黃破積驅吐加石薑汁氣虛加參木黃耆血虛加芍歸阿膠黑姜相藥痢已後重不解去枳榔換條芩加升麻提之○丹溪曰初下痢腹痛不可用參木然氣虛胃弱者可用初得之亦可用人參調胃承氣下之看其氣血病然後加減用藥皆治葉先生滯下後甚過追正合承氣症但氣口虛形雖瘦而黃白此必平昔過食傷胃氣弱忍二三日辛苦遂與參木陳芍藥十餘帖至三日後胃氣稍充與承氣二帖而安荷不先補完胃氣之傷而遽行承氣能免後患乎此後下先補倒之變者○保命集曰厥逆瀉痢不止脈沉遲手足厥逆瀉血稠粘此為難治宜麻黃湯小續命湯汗之為有表邪瀉于內當散表邪則藏府自安矣始痢宜下久痢宜補然亦有先補而後下者正此之謂是也○痢症便膿血或赤或白或赤白相雜或

宜清熱消積 開胃氣 升 利小便

黃連 黃芩 白芍 紅麴 山查 橘紅 升麻

葛根 甘艸 滑石 蓮肉 扁豆 烏梅 如胃弱加

人參三四錢 蓮子四十粒 橘紅二錢 升麻七分 如腹痛以黃連四錢 白

李氏醫鑑

芍藥錢五分 炙甘草錢五分 黃柏錢一 升麻錢一 煎服如裏急同上藥

加當歸二錢如後重甚加檳榔一錢五分枳壳一錢五分木香汁匙七如

口渴去木香如小便赤澀短少或不利亦倍之赤多倍滑石

曲七白加惡心欲嘔卽噤口痢多用豆白芍以綠

色升胎 佐之久痢不止加 一錢五分、白茯苓二錢

復有毒痢一症或痢毒內陷下膿血各藥不効者加金銀花

爲君地榆丹砂犀角汁次之凡產後滯下積滯雖多腹癰

雖極但用人參白芍當歸紅麴升麻益母州炙甘州滑石

末足矣若惡露未盡兼用乳香沒藥五厘炒砂仁錢六

之自愈血虛可加阿膠三錢凡胎前滯下宜用黃連黃芩白

芍藥 甘艸 橘紅 紅麴 枳殼 蓮肉 畧用 升麻 未滿  
用滑石 七川勿

芍藥甘草湯 加黃芩名黃芩芍藥湯 治熱痢腹痛後重

身熱膿血稠粘脈洪數本方加白朮 治脾濕水瀉身重

**困弱** 保命集曰瀉痢不止或暴下者皆太陰受病不可離芍藥人不受濕則不痢故須白朮四時下痢于白芍

白朮內脊加防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附更詳外  
症治之如身困倦加白朮自汗逆冷氣息微加桂附以溫

之如裏急後重膿血稠粘雖在盛冬于溫藥內亦加大劑  
切庵曰裏急後重有因火熱者火燥而性急也有因氣滯

者大腸氣壅不得宣通也有因積滯者腸胃有物結壅也  
有氣虛者中氣陷下不能升也有血虛者津枯腸燥虛坐

勞實是也。常分痼論治。脈洪大而實。  
爲裏是宜下。若脈浮大。慎不可下。

李氏醫鑑

卷之七

十一

芍藥湯 痢血 治下痢膿血 稠粘腹痛後重 下痢皆屬濕熱赤爲傷血白爲傷氣膿血

稠粘氣血兩傷也腹痛後重氣血皆滯也行血則膿血自愈調氣則後重自除

白芍兩 歸尾 黃芩 黃連錢五 大黃錢三 木香 檳榔 甘

桂半 每服五錢利不減加大黃  
下痢由濕熱鬱積  
手腸胃不得宣通

故大便重急小便赤澹辛以散之苦以燥之寒以清之甘以調之加肉桂者假其辛熱以爲反佐也

桂甘艸加枳壳名導滯湯一作導滯湯治前症兼渴者此方八多日

蒼朮地榆湯 治脾經受濕痢疾下血

蒼朮 三兩 地榆 一兩 每二兩煎 開鬱地榆清熱涼血

收前醫為治血非肝風之平齊衣走者參月方升  
白芍阿膠卷栢名芍藥地榆湯治泄痢膿血乃至脫肛

香連丸 治下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連 二十兩吳茱萸十兩 木香 四兩八錢 醋糊丸米飲下

方等分蜜丸一方加甘艸八兩黃連 用蜜水拌蒸曬九

痢為飲食不節寒暑所傷濕熱蒸鬱而成黃連苦燥瀉寒

勝熱直折心脾之火故以為君用吳茱萸同炒者取其能利

大腸壅氣且以殺大寒之性也痢乃脾病傳于大腸水香

通利三焦泄肺以平肝使不尅土氣行而滯亦去也一寒

一熱一除一陽有相濟之妙經所謂熱因寒用寒

因熱用也痢初起忌用為黃連厚腸胃瀉腸也

白頭翁湯 治傷寒熱痢下重欲飲水者 此傷寒轉痢之症

黃連 芍藥 枳實 黃芩 各四兩 水煎服之

李氏醫鑑 卷之七 下痢 十三

白頭翁 秦皮 黃連 黃芩 各三兩

成無已曰腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛故以純苦

之劑堅之徐忠可曰此主熱利下重乃熱傷氣氣下陷而

重也陷下則傷陰陰傷則血熱雖後重而下用調氣之藥

病不在氣耳周揚俊曰邪傳厥陰少陽其表也藏府相連

于法禁下故但謀去其

濕濕除而利自止矣

真人養藏湯 治瀉痢日久赤白已盡虛寒脫肛 此門為大

腸受熱受寒皆致脫肛○大腸者傳導之官腎者強作之

官酒色過度則腎虛而泄母氣肺因以虛大腸氣無所主

故脫肛小兒血氣未壯老



香等氣丸

黃連阿膠丸 治冷熱不調下利赤白裏急後重臍腹疼痛

口燥煩渴小便不利 濕熱瀉于腸胃故腹痛口渴而便秘

黃連 兩 茯苓 兩 阿膠 兩 為末水熬阿膠為丸空心米湯

下延年除茯苓加乾姜 黃連瀉火燥濕開

熱阿膠補陰益血潤燥利腸以和其裏急後重能使肺氣

下降通于膀胱清熱利水止渴除煩為清熱之平劑黃連

本除濕 治赤白痢 薑茶 各三錢煎服 或微炒煎此

平淺而忽之也 本方加白梅 各梅蜜飲治熱痢 除不加木 治冷痢

李氏醫鑑 卷之七 帶下 治痢

蜜善 治痢

槐花散 治血痢腹不痛不裏急後重

槐花 炒 荆芥 炒 青皮 等分為末每服三錢米飲下

六一散 加紅曲 名清六九治赤痢 紅曲能調 加乾姜 名溫

六九治白痢 乾姜能收 濕熱之氣

羌活勝濕湯 濕熱 除川芎加蒼朮升麻麥 升麻除濕湯治脾

虛瀉痢 芽神曲猪苓澤瀉名

左金丸 治肝火燥盛噤口痢湯藥入口即吐

黃連 六兩 吳茱萸 一兩 水丸 本方加糯米一撮 濕瀉

時 ○本方如白芍等 名戊巳丸治熱痢熱瀉 熱瀉者黃

胃土已為脾土加白芍 伐肝瀉木使不封土也 ○保和丸 治食滯下痢

人參樗皮散 治久痢膿血不止 久痢不止 氣虛也

人參 樗根 白皮粗末 等分為末米飲或酒調下 勿用

九味羌活湯 治毒痢

茵陳丸 治赤白痢 感應丸 治寒積瀉痢

胃風湯 治血痢而挾濕者寔可倚伏

膠艾湯 四物加阿膠艾葉甘艸治男婦血虛下痢

桃仁承氣湯 治痢疾畜血急痛 烏梅丸 治久痢

李氏醫鑑 卷之七 帶下 治痢

參苓白朮散 加石菖蒲 治噤口痢 訓庵曰噤口雖屬脾虛

香失之溫山藥失之閉惟服 此散胸次一開自然思食

平胃散 加川續斷 二錢 每服二錢止血痢

噤口痢要方 人參同黃連煎湯呷之但得下咽便好 黃連

要藥時珍曰治痢用香連先水大散用黃 連乾姜 姜黃散用黃連生姜

案 梁莊公血痢用烏梅胡黃連龜心土等分為末茶調服

而愈 ○曾魯公血痢百餘日困醫不能療應之用盞梅

肉一枚研爛合臘茶 八醋服一啜而安

丹溪曰一人面白脈弦數獨胃脈沉滑因飲白酒作痢下

淡水膿血腹痛後重小便不利參朮為君滑石甘艸枳殼

木香為佐下保和丸三十粒次日症盡獨小便未利

與六一散而安此消積兼施首 ○寇宗奭云 卷之十六



疏飲無度多食魚蟹奇毒在藏日夜三四十溲大便與膿  
血糞下大腸連肛門痛不堪忍用止血痢藥不切又以助  
風藥則益其益腸風則有血無膿如此半年氣血漸耗食  
減肌瘦服熱藥則腹愈痛血愈下服冷藥則注瀉食減服  
溫平藥則若不知如此期年垂命待盡或教服人參散一  
服却二服戒三服膿血皆定遂常服之而愈其方治大腸  
風虛飲酒過度挾熱下痢膿血痛甚多日不瘥用枳椇白  
皮一兩人參一兩為末米飲調服忌油膩濕麵青菜菓子  
甜物雞豬魚  
羊蒜薤等物

### 本艸備要主治註釋

木香 治後重瘰癧同枳椇治痢疾行血則膿血 枳實 除後

白頭翁 治後重瘰癧同枳椇治痢疾行血則膿血 枳實 除後

秦龜子 治逆散加此以散帶 赤石脂 治大小腸下後

### 李氏醫鑑 卷之七 痢下

七

而瀉無以固之其他諸藥輕浮不能達下惟赤石脂體重  
而瀉血入下焦陰分故為久痢泄瀉要藥仲景桃花湯用  
之加干 白芍 牛膝 瀉痢不 艾葉 治冷 附子 干姜 使

姜梗米 白芍 牛膝 瀉痢不 艾葉 治冷 附子 干姜 使

君子 良姜 地漿水 治泄痢冷熱赤白以新汲 雄黃 治

石硫磺 治冷 大蒜同黃丹 治痢 桔梗 升溪日痢疾腹痛乃

宜桔梗 胡椒 蕪荑 以上並治冷痢蕪荑 雞蘇 治血 薄荷

治血痢血病在凝 五靈脂 羚羊角 扁柏 枝子

並治 棕燒黑能止久血痢 荆芥 苦參 乾葛 血痢止 木賊

血痢 與髮灰同用更良 大黃 治下痢 澤瀉 車前子 治

痢 赤 牡蠣 大青艸 治熱 赤白 澤瀉 車前子 治

瀉 知母 治下 黃芩 得白芍 治下 胡黃連 治瀉 羅下 搗

汁治噤口痢夏月食其葉數斤秋不患痢冬月以 子 潤  
萊攤屋瓦上任意霜雪打至春收之煎湯飲治痢 下  
病後 枳椇 同 砂仁 治赤 華菱 治氣痢牛 玄明粉 治痢 瀉  
重 止用大黃玄明粉以推蕩之而瀉痢反止蓋 山豆根 治下  
宿垢不爭疾終不除經所謂通因通用是也

木鱉子 赤小豆 治瀉 淡豆豉 治血痢又口 綠豆 薏仁

並治 神曲 同 紅曲 治赤 五谷虫 治毒 淮藥 滑石 白

礬 皂礬 石灰 百艸霜 鷄脆皮 並止 禹餘糧 治下

厚朴 烏藥 並治 瘰癧 青蒿 治久 龍骨 海螵蛸 五倍

子 墨栗壳 金櫻子 核代賴石 龜板 治久 槐花 治赤

黃蠟 療下 蠟匱丸 巴豆丸 論載洩瀉門 椿樗皮 治久 若濕無

李氏醫鑑 卷之七 痢下 七

未盡勿遽用勉強 石蓮子 治痢 沉香 治痢 烏骨雞 治痢

固瀉必受他症 治痢 傷暑 伏暑 芒硝 治疫 地榆 止久

益胃氣 阿膠 治痢 傷暑 伏暑 芒硝 治疫 地榆 止久

小便

李東垣曰氣口大于人迎四倍名曰關關則不得小便人迎大于氣口四倍名曰格格則吐逆關者其氣之格者甚矣之氣是關無出之由格無入之理也小便者足太陽膀胱所主生於肺金肺中伏熱不能生水是絕小便之源也渴而小便不通者肺氣不得降是也故用清燥金之正化氣薄淡滲之藥瀉火而清肺滋水之化源也若熱在下焦而不渴是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之藥藥治之○肺為水之上源邪氣散精上歸于肺始能通水道下輸膀胱腎為水藏而主一便一瀉有熱則小便數甚至不能少忍火性急速故也○若欲便清先分肝火元小便頻數便時痛不可忍者此必先大瀉秘熱不通也此疾本因貪酒色或以過食辛熱草賦之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也此便數而痛與淋症清而痛者不同宜用草解一兩鹽水炒為末每服二三錢使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通

李氏醫鑑

卷之七

小便

九

便數而痛自減也○丹溪曰便不通屬氣虛血虛寒熱痰閉皆宜吐之以升其氣氣升則水自降氣虛用參朮升麻等先服後吐或就參著藥中調理吐之血虛用四物湯先服後吐或就芍歸湯探吐之痰多二陳湯先服後吐或加香附木通寔熱當利之或入正散蓋大便動則小便自通矣○或口以吐法通小便其理安在曰取其氣化而已經謂三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣三焦之氣一有不化則不得如決瀆而出矣豈獨下焦膀胱氣塞而已哉又曰譬如滴水之器上數若閉則下數無自以通必上竅開而下竅始出也○小便不通則若欲死者急以甘草節五錢煎湯垂服至下即通此急救之良訣也○熱在上焦氣分便秘宜用淡滲之藥瀉火清陰滋水之化源○熱在下焦血分便秘而渴乃真水不足膀胱枯涸無陰則陽無以化宜用黃柏知母大苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通○丹溪曰小便不通有熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升又有隔二隔三之治如肺不燥低膀胱熱宜瀉膀胱此正

治如因肺熱不能生水則清肺此隔二之治如因脾熱不能運而精不上升故肺不能生水則燥脾此隔三之治○瀉膀胱知柏之類清肺車前茯苓之類燥脾二木之類○有病小便閉者衆不能盡張子和易以急流之水煎煎藥一飲而溲○轉脬之症脬系轉反屈曲不舒水道乃閉小便急痛亦不易治強忍小便乃致于是孕婦有此當舉胎胎○壅脹門加味腎氣丸後有利小便精論

甘澤飲 治上焦肺熱小便秘瀉

甘艸 澤瀉 茯苓 通艸 車前子 瞿麥 木通

扁蓄 枝子 琥珀

五苓散 表裏 治口渴渴小便不利本方去桂名四苓散 無惡寒用桂五苓為渴而小便不利者若不渴則本方加辰砂名茯苓甘艸湯足矣若但渴則四苓足矣

李氏醫鑑 卷之七 小便

辰砂五苓散並治小便不利本方合益元散加琥珀名茯苓琥珀湯治便數而欠頻而短少

三黃丸 治下焦熱口不渴而小便秘

滋腎丸 一名通 治三焦積熱胸膈煩躁小便赤澀

黃柏 知母 各一兩 桂一錢 研 每服百丸

水香檳榔九 治二便不通 猪苓湯 治口渴渴赤

八正散 治濕熱下注咽乾口渴小腹急滿小便不通或

因熱為腫 治濕熱下注小便急澀則小便當行矣而卒不行者乃熱澀之也

車前子 木通 瞿麥 扁蓄 滑石 甘艸 枳

枝子 大黃加燈艸煎一方加木香 取其辛能利氣

此手是太陽手少陽之合也不通則肺熱而心火肺  
為氣化之源心為小腸之合也車前清肺熱而通膀胱  
利濕而兼治熱者也滑石利氣散結使子大黃苦寒下  
此皆濕熱而兼利濕者也甘艸用稍者取其經達莖中甘  
能緩痛也雖治下焦而不偏于治下必三焦通利水始下  
行也○膀胱藏水三焦出水故治小便  
不利刺灸法但取三焦穴不治膀胱

草薢分清飲 治小便頻數 腎氣虛則不能

六味地黃丸 加杜仲 牛膝 治小

便頻數 益智辛熱 治小

涼膈散 治心火上盛中焦燥寔小便秘

李氏醫鑑 卷之七 小便

補中益氣湯 治中氣不足以致小便利 經所謂氣化

桑螵蛸散 治小便數而欠 數頻數也欠便短也溺雖出于

則便數小腸 能安神寬補心氣療健志

人參 茯苓 一用 志肉 石菖蒲 桑螵蛸 龍骨

龜板 酥炙一方用 當歸等分爲末臨臥服二錢人參湯下

腎着湯 治膀胱熱痛溺于小便上爲清溺 風寒濕邪客

能化故水道不通足太易經上額絡胸太陽

經氣不得下行入胃而流下則爲清溺

東垣曰王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石癰裂  
出水夜不得眠飲食不下治諸利小便藥通服不効  
余診治歸而至且不寐問記案云無陽則陰無以生  
無陰則陽無以化又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣

化則能出矣此病癰秘是無陰則陽無以化也此因  
梁積熱損傷腎水又逆上而爲嘔噦內閉外格之症  
悉具死在旦夕矣遂以北方大苦之劑與滋腎丸每服  
百粒少時前陰如刀刺火燒溺如瀑泉腫脹消此症  
一在生焦氣分而渴一在下焦而不利若膀胱虛陰  
無以化又常用入味腎氣丸一人素多酒色二便不  
通下極脹痛用利藥不効是濕熱之氣壅塞精道病在  
二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也  
用棟子茴香穿山甲  
倍用辛牛煎服愈

本州備要主治註釋

蘆根 治小便數中空能入心肺清上焦熱熱清

而桑螵蛸 縮小便能通故能縮腎與膀胱相表裏腎得所

又能 茯苓 小便結者能通多者 山黃 縮小便 金櫻 治小便

李氏醫鑑 卷之七 小便

左烏藥同益智仁等分爲丸 治虛便數者取其 花椒 治瀉

芡實 治小便 石斛 治遺精 杜仲 治小便 菟絲子 同續斷

便 葶子 治遺 固紙 縮小便 天冬 麥冬 白芍 牽牛 燈

心 通艸 木通 白茅根 浮萍 澤瀉 車前艸子

黃柏 知母 扁蓄 地膚子 香薷 並利小便 使君子

治便 華薢 能去濁 石膏 治小便 滑石 同蘿下 桑白皮

猪苓 苦棟子 梨 瞿麥 防已 二陰不通者非此不

經之 蛤粉 升溪日 郁李仁 治癰 秦艸 牛乳點服 髮利二 赤

小豆 利小便 石熱 磨汁飲之 狗脊 治失溺 牛膝 治失 紫苑 便

及瀉血者服  
一兩立効  
車前艸  
根葉搗汁  
飲治尿血  
苦根  
治尿  
楮樹皮  
利小便  
加  
味腎氣丸  
腫滿  
治小便不利  
方後訶庵君附子  
論其精晰可參看

李氏醫鑑

卷之七

小便

三

大便秘結

李東垣曰腎開竅于二陰經曰大便難者取足少陰夫腎主五液津液足則大便如常若創飽勞役損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪火伏血中耗散真陰津液虧少故大便燥結少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦潤之陽結者散之陰結者溫之傷食者以苦泄之血燥者以桃仁酒製大黃通之風燥者以麻仁加大黃利之氣滯者以郁李仁枳實通之角仁潤之不可概用牽牛巴豆之類下之損其津液燥結愈甚或成不救經曰脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱脾虛則土弱不能生金肺無所資遂不能生水故外則皮毛枯槁內則二便閉結宜滋肺和脾壯水養血又曰肺為生木之源火旺剋金則肺病而津液枯故二便難則以滋陰降火為先大腸為傳導之官變化出焉秘結不通由于風燥熱燥陽結陰結氣結氣虛津竭血竭陽結宜散陰結宜溫熱補潤治各不同風結即風秘由風搏肺藏傳于大腸或素有風病者亦多秘氣秘由氣秘不升降血秘由亡血血虛津液不足熱秘由大腸熱結冷秘由冷氣橫于腸胃凝陰固結津液不通非燥熱也仲景曰脈浮而數能食不大便者此為定名曰陽結脈沉而遲不能食身體重不大便反難名曰陰結東垣曰寒秘熱秘即陽結也宜散之虛秘冷秘即陰結也宜溫之丹溪曰古方通大便皆用降氣昂劑益肺氣不降則難傳送用枳壳沉香訶子杏仁等是也又老人虛人風人津液少而秘者宜滑之用胡麻仁潤膠等是也如妄以峻藥通之則津液走氣血耗弊轉通而即秘矣必變生他症綱目曰大便秘滿不知氣不降也便以爲塞而行大黃如此害人甚速風秘者忌生燥也氣秘者氣滯也故大便秘不通燥則血滯津液不行或偏身虛癢

李氏醫鑑

卷之七

大便秘結

三

潤腸丸 治腸胃有伏火大便秘滿全不思食風結血結

大黃酒浸

歸尾

五錢

桃仁

研

大蘇仁

去壳

蜜丸

一方有

防風風濕加秦艽皂角子

性

本方加防風皂角仁蜜丸

名活血潤燥丸治同。是月得則潤燥。本方去羌活加升

熱各潤燥湯治同。加升麻者能升始能降也。

通幽湯 治幽門不通上衝吸門。壅塞不開氣不得下大便

艱難名曰下脫不通治在幽門。下脫即幽門胃之下口也。人身上下有七門皆下衝

上也幽門上衝吸門吸門即含氣喉上掩飲食者也衝

其吸人之氣不得下歸肝腎為陰火相拒故膈噎不通濁

陰不得下降而大便乾燥不行胃之濕與陰火俱在其中

則腹脹作矣治在幽門使吸門通利其陰火潤其燥血

生其新血則幽門通吸門亦不受邪屬壅

得開脹滿俱去矣是濁陰得下歸地也

歸身 升麻 桃仁 紅花 甘艸 錢 生地 熟地 五

或加 五分 本方 加 大黃 麻仁 各當歸 潤腸湯治同 諸藥滋陰養

李氏醫鑑 卷之七 大便秘結 重

明矣加升麻者天地之道能升而後能降清陽不升

則濁陰不降所謂地氣上為雲天氣下為雨也

麻仁蘇子粥 治虛人老人風秘

大麻仁 蘇子 研 等分洗淨合研再用水研取汁煮粥暖

滑腸潤燥利便除風和血下氣行而不峻緩

而能通故老人產婦氣血不足者所宜用也

升陽除濕防風湯 治大便秘塞或裏急後重數至圉而不

能便或有敗膿或血慎勿利之利則必至重病反鬱結而

不通矣以此湯升舉其陽則陰自降矣

除白 青皮 陳皮 黃連 炒黃柏 上甘艸 升麻 二柴胡

降矣 桂枝 人參 黃耆 蒼朮 白朮 厚朴 猪苓 三

澤瀉 吳黃 分 白豆蔻 炒麴 分 麻黃 六分 杏仁 四粒

蘇子降氣湯 治大便不利 火炎津枯有升無降故失便

而愈不通或暫通復秘因而下血者亦

當順氣順則自通當求溫緩之劑

木香順氣湯 治陰陽壅滯氣不宜通胸膈痞悶腹脇脹

滿大便不通 大便不通者清陽

天王補心丹 治大便燥而閉或時澀者 由心火不能

牛疏丸 治老人虛秘冷秘 半夏 等分生薑汁糊

李氏醫鑑 卷之七 大便秘結 重

木香檳榔丸 治大便不通

元戎四物湯 四物加 桃仁 治藏結便秘

三黃丸 治三焦積熱心膈煩躁大便秘結

當歸龍薈丸 治腸胃燥澀

涼膈散 治心火上盛中焦燥定大便秘

潤燥通秘方 治心火上盛中焦燥定大便秘

蜜煎 治便秘 煎蜜成膠乘熱納

搜風順氣丸 治風秘氣秘便溺阻隔

滋燥養榮湯 見身治火燥肺金血虛外燥皮膚波揭及血虛

風燥老人虛人便秘或大便風秘

案

李時珍曰一婦年八十四忽腹痛頭痛惡心不食醫皆議補脾治風清利頭目服藥雖愈全不進食其家憂惶予辨前藥皆誤此是老人風秘藏府壅滯聚于胸中則腹脹惡心不思飲食上至于齒則頭痛不消也今作麻仁潤腸而氣泄下結糞如椒者十餘枚漸得通利不藥而愈○一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥瀉服破黃藥則若開知如此三十餘年其人體肥膏梁而多澀日吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降津液皆化為痰不能下滋腸胃非血燥也潤藥多滯破黃入血而不能入氣故無効用牽牛為末皂角膏丸九經服便通一人素多酒色病二便不通服藥時時七晝夜用通利藥不効予思此乃濕熱之邪在腸胃遂路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也

李氏醫鑑

卷之七

大便秘結

七

本艸備要主治註釋

東垣曰桃仁杏仁俱治大便閉當分氣血其便難屬陽明虛夜便艱難為陰血虛虛人便閉不可過泄脈浮為氣中杏仁陳皮肺沉屬黃耆同陳皮白蜜能通虛人腸閉血用桃仁陳皮功元參 天冬 半夏 益母艸 二便通 紅花 紫艸 則功閉得此涼之則 凌霄花 威靈仙 治大小 秦艸 乾葛 血行而毒出 牽牛 冬葵子 下 榆白皮 俱利 細辛 治便 葶藶 利 木通 防已 濕熱流入十二經致二 木鱉子 利大 大麻仁 腸滑 石硫磺 性雖熱疏利大腸 鹽通二 枸杞 利大 地骨皮 利二 瑣陽 又治老人虛秘 肉苁蓉 潤大腸 杏仁 通大腸 桃仁 通血 瓜蒌子 利便

泄瀉 腸鳴 脫肛 膿血

機要論泄瀉有屬風屬濕屬火此因于外感者也三因言七情感動氣不平亦致泄瀉此因于內傷者也外則當調六氣內則當調五臟又有因飲食而泄者法當消導因風食泄者當解散因痰積上焦致大腸不固而泄者當除痰有脾胃氣虛而泄者當補中益氣使胃氣升騰而泄自止○凡水瀉濕也腹痛腸鳴而泄火也利則為邪瀉而瀉者食也完穀不化氣虛也在傷寒下利則為邪熱不殺穀也久瀉名脾瀉腎虛而命火衰在下則生食泄瀉宜白朮丸治瀉丸散優于湯劑○清氣在下則生食泄瀉能升陽明清氣故為治脾腎虛弱泄瀉之聖藥○腎虛泄瀉腎虛則命門火衰不能蒸氣脾腎虛弱泄瀉之聖藥致飲食減少腹脹腸鳴嘔泄瀉如鼎釜之下無火物終不熟故補命門相火即所以補脾○腎瀉者五更時瀉也經曰腎者胃之關也前陰利水後陰利瀉腎屬水水旺于子腎之陽虛不能運化開故將交陽分則瀉也脾瀉者脾之清陽下陷不能運化開門元氣不足不能分別水穀不痛

李氏醫鑑

卷之七

泄瀉

夫

瀉也○開門在大小腸之交主今水穀兩症皆由腎命火衰不能上生脾土故也○劉河間曰瀉而水穀變色者為熱不變色而澄澈清冷者為寒若肚門燥瀉小便赤黃米穀雖不變色而澄澈清冷者為寒若肚門燥瀉小便赤黃則痛此與傷食不同傷食腹痛得瀉則減今瀉而痛不止故責之土敗木賊也水瀉腹不痛者濕也痛甚而瀉而痛減者食積也瀉水腹痛腸鳴痛一陣瀉一陣火也或瀉或不瀉或多或少者痰也完穀不化者氣虛也○濕在藏腑則瀉泄小便反瀉腹或脹滿

訶子散 治虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛及作膿血

日夜無度 泄瀉為氣脫 脫肛為形脫 御米殼 去蒂蜜 訶子 煨去核 干姜 炮六 橘紅 五 間訶子散訶子 一兩半 木香 錢五 甘艸 錢二 黃連 錢二 為末每服 生半煨

二錢用白米湯調下治瀉久腹痛漸已瀉下漸少以此止

之知不止加一兩竭其餘邪火止痢厚腸甘白芍

湖也甘緩酸收和中止痛加訶子瀉以收脫加白木

以應脾厚利除濕散滿平胃調中故更藉以去餘邪也

升陽除濕防風湯 治胃虛泄瀉腸鳴

蒼朮 防風 茯苓 白朮 白芍 益智仁 半夏

各五錢 姜棗煎

四神丸 治腎瀉脾瀉 註見

破固紙 四兩酒浸 五味子 三兩 肉豆蔻 二兩 吳茱萸 一兩

炮 用大棗百枚生姜八兩切片同煮棗爛去姜取棗肉搗丸

李氏醫鑑 卷之七 泄瀉 三

每服二錢 臥鹽湯下 若至旦服之至夜藥力已盡

破固紙辛苦大溫能補相火以通君火火旺乃能生土故

以為君肉蔻辛溫能行氣消食煖胃固腸五味酸能補腎

酸能瀉精吳萸辛熱除濕燥脾能入少陰厥陰氣分而補

火生姜煖胃故大補下焦元陽使火旺土強則能制水而

不妄行矣本方單用固紙肉豆蔻名二神丸治同 火乃土

固紙補腎為葵水肉豆蔻厚腸胃為戊土戊土化火同為

補土母之藥○許學士曰有全不進食者服補脾藥皆不

効于授二神丸頓能進食此病不可全作脾治蓋腎氣怯

弱真元衰削是以不能化食如鼎釜之下無火物不熟也

兩本香 黃連丸亦名四神丸治同 前香亦煖腎之藥木香

肝和脾不使木盛尅土也○薛氏醫案云脾胃虛寒下

者補中黃連湯加木香肉桂命門火衰脾上虛寒者宜入味九

胃氣虛俱虛者十全大補湯送四神丸大便滑利小便便

瀉或收體虛者加減腎氣丸

大順散 治暑伏熱脾胃受濕水穀不分清濁相干

感應丸 治新舊冷積瀉痢等症

木香 肉豆蔻 丁香 半兩 干姜 炮 百艸霜 一兩 杏仁 一百粒

黃蠟六兩溶化重絹濾去滓好酒一斗砂鍋內煮數沸候

李氏醫鑑 卷之七 泄瀉 三

消冷蠟浮用清油一銚內熬熟取蠟同化成汁就銚內

和前藥木乘熱攪勻丸如豆大每服三十丸空心溫湯下

肉蔻通食下氣和中丁香煖胃助陽宜木香

升陽補氣和脾疏肝杏仁降氣最寒潤腸消積能逐

銅冷而散痞通關巴豆善破沉寒而奪門胃氣積滯

銅非此莫攻○神前和中溫散亦能消積治痢為佐也

巴豆不令人食其性自能消化

茯苓白朮湯 等分治脾虛不能制火濕盛泄瀉

六一散 治泄瀉熱濕 戊巳丸 治熱瀉 黃黃肚瀉

五苓散合小柴胡名柴苓湯 治泄瀉發熱口渴

青州白丸子 治痰盛泄瀉 肥人滑泄多屬之痰

健脾丸 脾胃去人參和實麥牙加香附木香 荷葉燒飯

九名理氣健脾丸治脾胃虛弱久瀉

香砂六君子湯 脾胃 治虛寒胃痛或腹痛泄瀉

參蘇飲 加白木補 治傷風泄瀉 逍遙散 治食泄

痛瀉要方 治痛瀉不止

白木 土炒三兩 白芍 炒二兩 陳皮 炒兩 防風 一兩 或煎或丸久瀉加

升麻

天眞丸 補血 治一切亡血過多形稿肢麻飲食不進腸胃滑

泄津液枯竭久服生血益氣煖胃駐顏

李氏醫鑑 卷之七 聖

精羊肉 七斤去筋膜脂皮 肉從蓉 山藥 黃耆 五兩 人參 三兩 白木 二兩 為

乾入水二斗煮爛再入後藥 黃耆 五兩 人參 三兩 白木 二兩 為

末糯米飯作餅焙乾和九溫酒下如難丸用蒸餅杵丸

喻嘉言曰此方可謂長于用補矣人參補氣羊肉補形從

蓉山藥為男子之佳珍合之當歸養營黃耆益衛天冬保

肺白木健脾而其製

胃風湯 脾胃 治風冷乘虛客于腸胃食泄注下完後不化

埋中湯加 陳皮各補中湯 治泄瀉瀉不已者加同子惡食

食不化加砂仁

四逆湯加 官杜良 名環水散 治虛寒水瀉冷汗脈微甚者

嘔吐此為急病 漿水者油利漿水澄徹

香砂六君子湯 脾胃 治虛寒腹痛泄瀉

麻黃湯 小續命湯 並 治厥陰經下利不止脈沉而遲手足

厥逆膿血稠粘 機要曰此有表邪

四君子加 木香藿 各七味白木散 治脾虛肌熱泄瀉虛熱

作渴

案 朱德宗食水太過病脾疾國醫不効召楊介進大聖中

丸上日服之屢矣介曰疾因食水臣請以水藥此藥是

李氏醫鑑 卷之七 聖

時珍曰 婦年六十餘患瀉五載犯生冷油膩肉食即作痛服

當以熱下之則愈巴豆五粒服二日遂愈自是

每用治瀉痢愈者近有人巴豆炒去烟令紫黑可以止

本神備要主治註釋

多氏方瀉痢不止用大黃元明粉以推瀉之而瀉痢

反止益前痛不爭疾終不除經所謂通因通用也

暴瀉痢 物遮開升陽之藥無速於此此証處方也

研木人指腎腰熱止久為久 白芍 泄瀉不 升麻 木香

赤小豆 五倍子 代赭石 芡實 治風 澤

瀉水瀉 車前子 治瀉 苡仁 上茯苓 木鱉子 山



藥 華菱 五味子 香附 肉蔻 嬰粟壳

聚仁 金櫻子 石榴皮 赤石脂 烏梅 訶子 肉桂

盛泄瀉上為木 治冷 熟地 黃芩 烏梅 訶子 佐白木蓮

久吳茱 治冷 熟地 黃芩 烏梅 訶子 佐白木蓮

瀉 治冷 熟地 黃芩 烏梅 訶子 佐白木蓮

李氏醫鑑

卷之七

泄瀉

三

腸風 藏毒 癖 痔瘻 脫肛

血之在身有陰有陽陽者順氣而行循流脈中調和五臟  
泥陳六府謂之榮血陰者居于絡脈端守藏腑滋養神氣  
濡潤筋骨若感內外之邪而受傷則或循經之陽血至其  
傷處為邪所阻滯經外或居絡之陰血因留著之邪積  
聚而出則皆滲入腸胃而泄矣世俗率以腸風名之不知  
風乃六淫之一耳若腸胃受火熱二瀉與寒濕濕熱其  
氣及飲食勞力傷其陰絡之血者亦可謂之腸風平針經  
曰腸絡傷則血外溢而吐衄陰絡傷則血內溢而便溺○  
戴氏以隨感而見色鮮者為腸風積久而發色瘀者為藏  
毒又云色鮮者為熱白大腸氣分來色瘀者為寒白小腸血分  
來○又云腸風者風邪滯胃藏毒者濕邪滯胃○藏毒腸  
風之血出於腸胃之邪五痔之血出於肛門此孔處治各  
不同○此病多由濕熱風燥之邪如久不愈者不宜純用  
寒涼須兼溫補及升提藥大法涼血用槐角地榆偏補  
芩炒連枝子生地○和血用阿膠當歸川芎白芍○風濕  
用秦艽防風荆芥蒼朮茯苓血瘀少加桃仁紅花蘇木寬

李氏醫鑑

卷之七

腸風痔瘻

三

腸用枳壳升提用升麻生血補氣加人參黃耆白朮升脾  
黃前為近血出腸胃後為遠血出肺肝○瘻漏也痔漏  
大腸大腸與肺為表裏肺移熱于大腸故腸風痔瘻清藏  
熱則腸熱亦清矣○糞前有血名外痔瘻後有血名內痔  
殺道努肉名舉痔頭上有孔名痔瘻內有虫名虫痔大法  
用槐角地榆等與治腸風藥同不宜偏用寒涼須兼補劑  
收功○五痔此痔壯痔脈痔腸痔血痔多因濕熱下流傷  
血分無所施洩則通肛門而為痔腫○手陽明大腸庚金  
也清燥主收司行津液以從陽明胃土之化旺則生化萬  
物人或醉飽入房酒熱留著忍精不泄流注發間前陰之  
氣歸于大腸木火勢而侮燥金大就燥則大便閉而痔  
作矣受病者燥氣也為病者胃濕也濕熱風燥四氣合邪  
法當為大潤燥疎風和血止痛○調脂湯  
日湯風宜先用通散散次用歸脾湯

槐花散 治腸風藏毒下血

槐花 側柏葉 荆芥 枳壳 等分為末每三錢米飲

下藥生而西向東金之正氣能制用木木主升金主  
治吐血不止氣血虛寒用栝實湯養陰燥濕最清血分槐  
花疏用芍藥涼大腸利芥散聚搜風血二病要藥枳  
殼寬胸本方除栝實地榆酒燭九名槐角丸疏風治同本  
方加當歸生地用名加減四物湯補血寧血若以風為虛  
也治同本方除栝實枳殼加當歸川芎槐花散治腸澀下  
血濕毒下血

敗毒散加防風治腸風下血清鮮

羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼 桔梗

茯苓 甘艸 防風 荆芥 加姜三片薄荷少許

李氏醫鑑 卷之七 腸風痔瘻

胃風湯 治腸風下血 胃有風濕流入大腸故下血

龍腦雞蘇丸 治腸風 六味地黃丸 治便血

搜風順氣丸 治腸風下血

人參檮皮散 治藏毒挾熱下血 挾熱者謂挾各熱及飲酒煎炙之熱也

人參 檮根白皮 粗皮醋炙 等分爲末 米飲或酒調下

蘇蘇飲 合四物茯苓補心湯治便血

防風通聖散 治便血腸風痔瘻

經驗方 治血虛久痔 氣不攝血則妄行濕熱下流則

黑地黃丸 治血虛久痔 戒此治血虛久痔之聖藥

皆木 浸熱地一斤 五味子半 乾薑七錢 夏五錢 聚肉丸 米飲  
或酒下 兩連其長超超玄箸視後人之脾腎雙補麗難者  
相去 遠矣

秦艸白木丸 治痔瘡 痔瘻有膿血大便燥結痛不可忍

秦艸 白木 歸尾 酒洗 桃仁 研一 枳實 炒 皂角子 燒存 澤

瀉地榆 錢三 麵糊丸 大便秘澀若以大黃推之其津液益

矣 本方除白木枳實地榆加若 名秦艸蒼木湯治同 東

日腸 成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者兼受火 本

熱也去風熱火濕四者之邪以破氣藥兼之治法全矣 本

李氏醫鑑 卷之七 腸風痔瘻

大便時疼痛 如無痛者 本方用秦艸一味加羌活治防風麻

炙甘艸紅花 湯治痔瘻成塊下垂不任其癢本方 除地榆

名秦艸羌活 湯治痔瘻成塊下垂不任其癢本方 除地榆

本艸備要主治註釋

槐實 治腸風血痔十月上已採漬牛 山茶花 治腸風爲末

或酒調服 枳殼 治痔 良初起勿用 吳茱萸 治腸風痔疾

故治 沒藥 治痔 藥 治痔 柿乾 治腸風痔瘻 圓眼 治腸

不歸 代楮石 治痔 石燕 治痔 馬兜鈴 治痔 花粉

痔瘡 赤芍 治痔 首烏 治痔 續斷 治痔 茜艸 治痔 荆芥



陰陽假二物之靈氣以助吾心之靈氣也。又人之精與志皆藏于腎，腎精不足則志氣衰，不能上通于心，故迷惑善忘也。志內若液熱而寧，散則能通腎氣上達于心，強志益心，清神寧散，則神昏解，神能開心孔而利九竅，去濕除痰，又通能清腎，能通肝使痰火散，而心肝寧則聰明開而志意強矣。

定志丸 益心強志能療從忘

志肉 石菖蒲 人參 茯苓 蜜丸 硃砂為衣 張子和

方 無菖蒲加茯神 定志丸 酒糊丸 姜湯下 安魂定驚

天王補心丹 終南宜從師課而方心 治思慮過度心血不足

怔忡健忘 心口多汗 大便或秘或瀉 口舌生瘡等症

生地 四兩 人參 玄參 丹麥 茯苓 一用 當歸 洗 五味

李氏醫鑑 卷之七 驚悸怔忡健忘

子 一兩 桔梗 志肉 炒 五 藟仁 枳子仁 炒 研 天冬 炒 麥

冬 蜜丸 彈子大 硃砂為衣 臨臥燈心湯下一丸 或喻含

化 一方有石菖蒲四錢 無五味子 一方有甘艸

歸脾湯 治思慮過度 勞傷心脾 怔忡健忘 驚悸盜汗等症

溫膽湯 治膽虛痰熱 不眠虛煩驚悸 即二陳加枳實竹茹 加姜或加藟或加人

養心湯 治心虛血少 神氣不寧 怔忡驚悸

黃耆 茯苓 茯神 當歸 川芎 半夏 通 一 甘艸 炙

錢 柏子仁 炒 去血 棗仁 炒 志肉 五味子 人參 肉桂 錢

每服五錢

瀉青丸 治肺火傳熱 不能安臥 多怒多驚 肝虛胆怯

二陳湯加胆星 枳實 石菖蒲 治驚悸健忘 怔忡不寐

羌活勝濕湯 三因加 治卧而多驚 悸多魔溺者 邪在少陽

妙香散 夢遺門 治驚悸 桑螵蛸散 小使 能安神魂療健忘

十味溫胆湯 後夢 治怔忡健忘驚悸

本艸備要主治註釋

志肉 強志益智治迷 石菖蒲 開心孔利九竅為水神 茯苓

治憂志驚悸 茯神 療心虛多 郁李仁 治悸用酒 圓眼 養血

李氏醫鑑 卷之七 驚悸怔忡健忘

地黃 能交心腎 治健 淮藥 治健 虎骨 治驚 龍骨 安魂 琥珀 寧

定 黃公節 治健心 木 枳子仁 寧神 棗仁 寧心

三黃金花丸 治中外諸熱寢汗咬牙夢語驚悸

六君子湯 治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒

瀉青丸 治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒

火干之故卧不安肝在志為怒故多怒肝虛胆怯故多驚亦由血虛

本神補要主治註釋

志肉 或善忘驚悸 栢子仁 益志寧神腎 石菖蒲 益心安

夢事仁 治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒

砂 治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒

淮山藥 治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒

李氏醫鑑

治換便 淡豆豉 治換 不得眠 治換 不得眠

治換 不得眠 治換 不得眠 治換 不得眠

治換 不得眠 治換 不得眠 治換 不得眠

治換 不得眠 治換 不得眠 治換 不得眠

治換 不得眠 治換 不得眠 治換 不得眠

治換 不得眠 治換 不得眠 治換 不得眠

治換 不得眠 治換 不得眠 治換 不得眠

治換 不得眠 治換 不得眠 治換 不得眠

治換 不得眠 治換 不得眠 治換 不得眠

治換 不得眠 治換 不得眠 治換 不得眠

夢遺失精

心君火也君火一動相火隨之相火寄于肝胆腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固故精脫而成夢矣○陽印邪火也○牛純曰病之初起亦有不在肝腎而由心肺脾之不足者然必傳于肝腎而為病也○又曰心腎是水火之藏法天地施化而成之道故精神為五藏之宗至若由他藏而致腎之虛者必由心火之動而致之也

心而泄者則血脈空虛水液不攻自脫而泄者則皮稿毛焦筋接色青白而泄者色黃肉消四肢懈怠自肝而泄者筋接色青白而泄者色黃肉消四肢懈怠自肝而泄者

相火而泄者則血脈空虛水液不攻自脫而泄者則皮稿毛焦筋接色青白而泄者色黃肉消四肢懈怠自肝而泄者

動則相火動而泄者則血脈空虛水液不攻自脫而泄者則皮稿毛焦筋接色青白而泄者色黃肉消四肢懈怠自肝而泄者

聖賢只是教人收心養性其旨深矣○要全善曰群古治夢遺方屬醫者居大半庸醫不知為醫但用瀉劑固脫愈瀉愈驚其病反甚矣○心腎為水火之藏心傷則火動火動不已則腎水受傷腎主藏精所受五藏六腑所輸

李氏醫鑑 卷之七 夢遺失精

致之精皆不得藏而時下矣故為遺精夢泄戴氏曰遺精自則用心過度心不攝腎以至失精者有思色慾不遂致精失位輪泄而出者有色慾太過滑泄不禁者亦有年壯氣盛久曠精滿而泄者○劉庵曰治遺精大法有五心神浮越者神神志石龍骨之類鎮之痰飲迷心者猪苓丸之類導之思想傷陰者紫雪珠粉丸之類除火思思想傷陽者謙市鹿茸菟絲等補陽除陽但虛者丹溪作心虛治用珍珠粉丸定志丸補之

扶元丸 治遺精白濁

菟系子 五味子 石蓮肉 白茯苓 三淮藥 六兩將菟

浸透分酒煮藥料為丸漏精腰湯

下赤濁心湯下白濁茯苓湯下

水陸二仙膏 治遺精白濁

金櫻膏 取牛黃者然膏一斤艾實一斤藥熟為粉和丸鹽酒下

熱則全甘而失瀉性

和丸鹽酒下

子 52-137

金鎖固精丸 治精滑不禁精滑者火炎上而水趨下心腎不交也

沙苑蒺藜炒 芡實蒸 蓮鬚二兩 龍骨酥炙 牡蠣鹽水煮一日連殼粉 夜煨粉一兩 蓮

子糊粉為丸鹽湯下

珍珠粉丸 治夢遺

黃柏蛤粉等分柏鹽水炒焦 黑色蛤粉

猪苓丸 治夢遺猪苓末二兩先將一半炒半夏令黃取半夏為末糊丸更用猪苓末一半同炒微裂

砂餅養之中未間空心鹽酒湯任下釋曰半夏有利性猪苓導水益腎閉導氣使通之意也

諸子清心飲治遺精淋濁遇勞即發五心煩熱

六味地黃丸 治遺精 七寶美髯丹 治心腎不交遺精

李氏醫鑑 卷之七 夢遺失精 聖

妙香散王荊公 治夢遺失精

淮藥二兩姜汁炒 人參 黃耆 志肉 茯苓 茯神一兩 枯梗

錢甘艸錢 木香五分 麝香錢 辰砂二錢 另研為末每服二錢酒下

十味溫胆湯 治夢遺

橘紅 半夏 茯苓或用茯神 甘艸 枳實炒 竹茹 人參

志肉 棗仁 熟地 加姜棗

本神備要王治註釋

石連肉龍骨益智仁等分為末每服二錢空

龍骨五倍炒 赤石脂牡蠣殼 餘糧石等分為末水丸 晚蚕蛾為

末每服三壯蠟五味子地黃黃肉枸杞子車前子沙苑蒺藜

藜蓮鬚杜仲治夢遺 覆盆子黃柏沙苑蒺藜蓮鬚五味砂仁

魚膠炙肉 治夢遺 內從蓉 萆薢 漏蘆 罌粟殼

山藥 伏龍肝 蓮子 芡實 巴戟 續斷以上通苑

系子止遺泄 蓮子治遺 椿槲皮治夢遺 茯苓治遺精 砂餅

寒之人又當用溫熱之味峻○核桃肉皮瀉飲肺潤腎性

其下非決滲之味所能治○胡椒治泄精下 澤瀉泄精亦有因濕

勝金櫻蓮鬚也 花柳治泄精下 熱者用此味良

李氏醫鑑 卷之七 夢遺失精 聖

淋濁 赤白濁血

心腎氣清濁相干熱毒勝勝溺滿而痛曰淋氣淋便濁  
餘溺勞淋房勞即發冷淋寒戰後瘦背淋便出如膏不淋  
精結成石尿血而痛即血淋也色鮮者心與小腸實熱色  
赤者腎與膀胱虛冷大法治淋宜通氣清心平火利濕不  
宜用補恐濕熱得補增劇也○又有中氣不足致小便不  
利者宜補中益氣經所謂氣化則能出是也○精與濁所  
出之氣不同便濁即是腎肝胆之火也精濁乃精氣清  
丹溪曰葉氏原病候論曰白濁者由勞傷腎氣虛冷故  
也歷代宗其說不惟白濁之理不明所治之法亦誤不思  
內經本無白濁之名惟言少陰在泉客勝便變少陽在  
泉客勝則便白又言思無病入房太甚發為白濁與脾  
移熱于腎出自二者皆隨濁而下大非白濁之源乎原病  
式因舉內經謂諸病水液渾濁皆屬于熱言天氣熱則水  
渾濁寒則清潔可謂發聖人之旨以正千載之誤矣予嘗  
聞先生論赤白濁多因濕熱下流膀胱而成即靈樞所謂

李氏醫鑑

卷之七

淋濁

中氣不足便濁為之變是也必先補中氣使升舉之而後  
分其藏府氣血赤白虛寒以治與夫其他邪熱所傷者固  
在渴熱補虛設腎氣虛甚或火熱亢極者則不宜過用寒  
涼之劑必以反佐治之要在權衡輕重而已○葉氏曰遺  
精多作腎虛補之而罔效不知此因脾胃濕熱所乘飲  
酒厚味痰火之人多有此疾腎雖虛其精本于脾胃飲  
食生化而輸于腎若脾胃受傷濕熱內鬱使中氣清而不  
清則所輸皆濁氣邪火擾動水不得而安靜故令遺濁也  
淋病在濁家局肝胆部濁病在精家局腎部或由濕熱  
或由虛寒大抵熱者多而寒者少赤白濁血白濁氣或由敗  
精瘀而塞尿道痛澀異常  
非是淋不宜用熱藥治

治濁固本丸 治胃中濕熱滲入膀胱下濁不止

蓮鬚 黃連 黃柏 益智仁 砂仁 半夏 茯苓

一猪苓 兩 二甘艸 兩 三精濁多由濕熱與痰黃連瀉心火  
黃柏瀉腎火所以清熱二苓所以

利濕半夏所以除痰濕熱多由于濕滯砂仁益智辛溫利  
氣又能引腎脾經氣以散留滯之氣且稍濟連柏之寒甘  
藥固脫

六一散 治石淋 暑熱皆陽邪在下則便秘火

葉生車前生藕汁各三錢生益元散治血淋

八正散 治濕熱下注淋痛尿血或因熱為腫 濕熱下注

便門 詳小

華薛分清飲 治虛陽白濁小便頻數凝白如油名曰膏淋

腎氣虛則不能管束而小便數膀胱有熱則水道滯而清  
濁不分或敗精滲入胞中及服熱藥飲食痰積滲入皆成  
淋濁○小便如膏油後三消

門白茯苓湯詳明之極妙

李氏醫鑑 卷之七 淋濁

川華薛 石菖蒲 烏藥 益智仁 分甘艸 稍減 分入鹽食

煎服 一方加茯苓 此以疏泄而為禁止者也 腎水虛則

使小便赤而痛也 腎既虛熱膀胱不足加之

以渴飲則小便淋瀝由虛虛不能主其府也

琥珀散 治氣淋 血淋 膏淋 砂淋 大抵多屬于熱熱甚生濕

滑石 錢 琥珀 木通 扁蓄 木香 當歸 鬱金 妙一

滑石滑可去着利竅行水扁蓄苦能下降利便通淋琥珀

能降肺氣通于膀胱木通能導心火入于小腸血溺由于  
血亂當歸能引血歸經氣淋由于氣滯木香能升降諸氣

諸淋由心火盛鬱金能涼心散肝下氣而破血也  
東垣用藥凡例小腹痛用青皮疎肝黃柏滋腎蓋小腸小  
腎部位

蓮子清心飲 治憂思抑鬱發熱煩躁或酒色過度遺精淋

濁遇勞即發四肢倦怠五心煩熱夜靜甚煩躁遺精淋  
年久也心火妄動則不能下交于腎故元精失守也遇  
勞則發為勞淋勞則動其心火也蓋偏熱者陽虛也

石蓮肉 人參 黃耆 茯苓 柴胡 黃芩 地骨皮

麥冬 車前子 甘艸 錢 空信服

小薊飲子 治下焦結熱而成血淋 心主血小腸其府也熱

李氏醫鑑 卷之七 淋濁 聖

便出為血淋蓋小便必自小腸滲入膀胱心熱者小腸必  
熱經所謂胞移熱于膀胱則癰秘溺血是也然熱必兼濕  
戴氏曰多有熱極而血凝黑者未可便  
以為冷也○痛為血淋不痛為溺血

小薊 蒲黃 黑藕節 滑石 木通 生地 枝子 炒淡

竹葉 當歸 甘艸 各五

小薊藕節退熱散瘀生地涼血蒲黃止血木通降心肺之  
火下達小腸枝子散三焦鬱火由小便出竹葉涼心而清  
肺

龍膽瀉肝湯 治白濁 澀血 肝脈絡于陰器白

一方 除當歸生地澤瀉木通車前亦名龍膽瀉肝湯治同

七寶美髯丹 治淋瀝 六味地黃丸治淋瀝

還少丹 治白濁 龍膽瀉肝丸 治熱淋

滋腎丸 治淋症

羌活勝濕湯 加澤瀉 治淋症

三黃金花丸 治淋秘 茯苓丹 治白濁

導赤散 治小腸有火便赤淋痛

根木丸 加澤瀉 各一 治脾濕淋症

有外皮敷小腸時艱阻非淋症也以牛骨作屑塞于皮端  
或漸展開勿藥自愈 五淋極難見効並痛欲死惟用牛  
膝一兩入乳香少許煎服數劑即安 熱淋白淋磁石湯  
金砂三錢用紅棗煮熟去皮為丸南棗亦可空心鹽湯下

李氏醫鑑 卷之七 淋濁 聖

小便淋瀝痛不可忍難脫內黃皮五錢陰乾燒存性作  
服白湯下立愈 小便及溺血者紫苑服一兩立効  
虛赤濁連子六一湯用石蓮子肉六兩炙甘艸一兩為末  
每服一錢燈心易下 淋濁并泄精用杜鵑蓮鬚車前子  
澤瀉茯苓肉桂甘艸黑枝木通交骨滑石黃芩蓮子燈心  
二十節空心服 白濁石蓮子龍骨益智仁等分為末空  
心服

案 一人病血淋痛脹欲死李時珍以

本神備要主治詳釋

甘艸稍止重中痛淋 尿血 天門冬 治白微淋 益  
母艸 治血 澤瀉 治淋 貝母 同 白茅根 雞蘇 黃芩 若  
參 並治淋 木通 治淋瀝 通艸 燈艸 治淋 蒲公英



李氏醫鑑

卷之七

寒

並為通淋要藥 治熱 地膚子 通淋無陰則石 葦 治淋  
妙品至驗至効 扁蓄 治淋 地膚子 通淋無陰則石 葦 治淋  
海金沙 治五淋 草薢 治五淋 薏仁 治淋 益土所以生金  
微寒 瓦松 即生古瓦上 治淋 浮石 通淋 阿膠 治淋  
清熱 石決明 通五 桑螺蛸 通五 茯苓 治淋 琥珀 通五 猪  
苓 治淋 枳實 治淋 石燕 通五 腰背痠疼宜用此以  
飲脾精生 枝子 治五 榆白皮 治五 沉香 治氣 石蓮子  
于穀故也 生地 白茅根 鬱金 苦參 澤瀉 漏蘆  
伏龍肝 扁柏 通五 雞屯皮 菲子 龍骨  
桑螵蛸 通五 車前子 通五 水穀而固精致  
李氏醫鑑

李氏醫鑑

卷之七

寒

汗 盜汗 兼傷寒汗後諸症  
心之所藏 在內者為血 發于外者為汗 汗乃心之液也 五  
藏六府表裏之陽 皆心主之 以行其變化 隨其陽氣所在  
之處而生 汗亦隨其火發所在之處而為汗 是汗盡由  
心出也 汗而自汗 自汗屬陽虛 睡而自汗 曰盜汗 屬陰  
虛 汗者 心之陽衰者 腎之陰虛 睡而自汗 曰盜汗 屬陰  
人陰中表液失其固衛 故散離然汗出 〇 滋陰七覺則陽  
氣復而汗止矣 因熱邪乘陰虛而出者 汗必熱 因寒邪乘  
陽虛而出者 汗必冷 有火者 謂有面赤口渴 骨蒸便赤 皆  
重脈數諸症 〇 凡傷風傷濕 中暑風溫 痰氣虛血虛 脾  
虛胃虛 亡陽 痰飲 傷寒 房室 癰疽 產後 等症 皆能令  
人出汗 汗又曰飲食飽甚 汗出于胃 驚而奪精 汗出于心  
持重遠行 汗出于腎 疾走恐懼 汗出于肝 搖體勞苦 汗出于  
脾 〇 凡頭汗 左額屬肝 右額屬肺 鼻屬脾 頤屬腎 額屬  
心 〇 津液自胃府旁達于外 為手足汗 有因胃熱胃寒之  
故 外感初起 多自汗

當歸六黃湯 治陰虛有火盜汗發熱

當歸 生地 熟地 黃芩 黃柏 黃連 等分 黃耆

加此手足少陰藥也 盜汗由于陰虛 當歸二地所以滋陰  
汗由火擾 黃芩連柏所以瀉火 熱無熱不作汗 熱得汗由

腠理不固 倍用黃耆所以固表 初起口此盜汗與傷寒盜

表牛黃散以和表為至古法 小柴胡加桂至之此屬陰虛  
故以補陰為主 〇 土材曰陰虛則元氣有降而無升而復  
用此苦寒煎殺之劑得母紀虛虛之戒乎 惟火定氣強者  
宜之不然苦寒損胃 補陽深耳 〇 幸絕曰陰虛陽必炎故  
發熱自汗 當歸六黃湯加地骨皮 芍藥 虛陰必乘故發厥自  
汗 黃耆建中湯甚和 加附子 或新附湯 有熱熱合邪汗出  
不休以風藥勝其熱 甘藥滋其燥 活潑湯 有痰痰不  
汗自出 宜理氣降痰 痰去則汗自止 有用固散 汗愈不

收止可理心血汗乃心之液心失所養不能攝血故溢而  
為汗大補黃耆湯加聚仁有微熱者更加石斛下靈砂丹  
初應曰自汗陽虛盜汗陰虛然亦有過服參耆而汗反甚  
者以陽盛陰虛陽愈補而陰愈虧也又宜清熱養血而汗  
自止

牡蠣散 治陽虛自汗

牡蠣研黃耆 麻黃根一錢 浮小麥百粒 煎服

柏子仁丸 治陰虛盜汗

柏子仁炒研去油二兩 人參 白朮 半夏 五味子 牡蠣

麻黃根一錢 麥麩五錢 棗肉丸米飲下五十丸 三百服

附撲汗法白朮藥本川芎各二錢半 米粉兩半 為末絹袋盛週身

撲之治汗出不止又方龍骨牡蠣糯米等分為末撲之又

方用麻黃根蛤粉粟米等分為末絹袋盛撲之

溫經益元散十全大補加 治汗後頭眩心悸筋惕肉瞤或汗

出不止太勝宜汗多則亡陽故有諸症陽明

大補黃耆湯十全大補去白芍加山黃 治氣血兩虛自汗不

止五味防風茯苓入姜棗煎

人參養榮湯驚悸 治發汗過多身振脈搖筋惕肉瞤

還少丹 治發熱盜汗 逍遙散 治盜汗

歸脾湯 治驚悸盜汗

調中益氣湯理氣 治氣虛多汗

黃耆六一散 治盜汗

黃耆六兩 甘草一兩 大麥煎服

升陽除濕湯羌活勝濕湯見濕門除 治陰汗不絕

五苓散治暑濕相搏自汗身重 加黃連

人參白虎湯 治身熱汗出

六味地黃丸 治自汗盜汗

人參散諸熱 治盜汗倦怠一切血熱虛勞

玉屏風散 固表聖藥 散取其相畏而相使也

李氏醫鑑 卷之二

歸脾湯 治盜汗

案 海藏曰晉郎中童子盜汗七年諸藥不効予與京師散

三黃丸三日病已蓋腎主五液化為五濕腎水上行乘

心之虛心火上炎而入肺欺其不勝皮毛以是而開為

汗出也○先以涼膈散瀉胸中相火次以三黃丸瀉心

火以助陰則腎水還本藏玄府 閉而汗自已矣○玄府汗孔也

本艸備要主治註釋

葳蕤止自汗 大蘇仁治胃熱 半夏並治 天雄發汗又能 糯米

收自 浮小麥止虛汗 淡豆豉得熱則發汗 柏子仁止 桑葉

未盜汗從正日發汗不發 地骨皮止虛 白芍固勝

汁五味飲止自汗 白朮無汗能發汗 澤瀉止除 酸棗仁飲



柏子仁丸

治經行復止血少神衰

女子善懷每多憂思

生血而血少血少則肝無所藏而肝之脈枯故經閉不通  
行經日月事不來者胎脈閉也胞脈屬心而終于胞中今  
氣上通肺心氣不舒  
下降故月事不來也

柏子仁

去油牛膝

浸卷柏

錢澤蘭

續斷

二熟地

一蜜丸

下

柏子仁安神而養心地黃牛膝續斷補肝腎而益衝  
任卷柏澤蘭活血脈而通經閉 卷柏生用破血炙

血止

五積散

傷寒表

加醋

治婦人經水不調

固經丸

治經行不止及紫黑成塊

衝任為經脈之海若無

調適矣若勞動過度損傷氣血衝任之氣虛不能約經  
血故經多暴下或由陰虛陽搏為熱所乘致傷衝任

李氏醫鑑

卷之八

經

三

熱則妄行脈數疾小為順大者為逆紫黑成塊  
塊甚血得寒則凝既行而紫黑故知非寒也

龜板

酒炙

白芍

酒炙

黃芩

酒炙

香附

牛酒

經多不止

陰虛

度也

黃芩

酒炙

香附

陰養

血壯水以制陽

光柳皮

治以止脫

正氣天香散

氣滯

治月水不調

婦人多憂移故氣病為多氣

為血配氣滿則血亦不能行

故經

不調

香附

錢烏藥

錢陳皮

蘇葉

干姜

每服五

錢煎

諸藥調理氣血

干姜入氣兼入血解鬱散瘀

令氣調而血和則經行有常自無壅滯之患

返魂丹

即益母草

治月經不調赤白帶下胎前產後一切

諸病

五月五日六月六日或小雪日益母花正開時連根取  
陰乾用花葉及子石臼搗末蜜丸或搗汁干砂調內文武  
火熬成膏服忌飲如胎動腹痛下血不止當歸湯下橫生  
逆產胎衣不下炒益母湯下產後血暈口渴狂言產後中風  
失音口喎及血結奔痛時發寒熱面赤心煩或鼻衄舌黑  
口乾並童便和酒下產後喘嗽惡心吐酸或無九酒下  
產後瀉血東湯下產後痢疾米飲下產後崩漏米湯下  
產後帶下膠艾湯下產後二便不通煩躁口苦薄荷湯下  
產後以童便化下一丸能安魂魄調經絡破血痛經不調  
者服之則調久無子者服之則孕益母草功諸諸水行血  
去瘀生新利大小便故為經產良劑益母草一名荒蔚李  
時珍曰根莖花葉實皆可用若治血分風熱明目調經  
子為良若胎產瘧癰消水行血則可並用  
蓋根莖花葉諸子行子則行中有補也

逍遙散

血虛潮熱臍腹脹滿經候不調

溫經湯

治經凝作痛新故相搏血室停寒

李氏醫鑑

卷之八

經

四

當歸

川芎

白芍

桂心

丹皮

莪朮

人參

川牛膝

甘草

各一

每服五錢水煎溫服

不拘

益胃升陽湯

補中益氣加

治經候凝結血塊暴下脾虛水瀉

玉燭散

四物合涼

取四時和氣謂

治經閉腹痛體瘦善

機歸尾

生地

川芎

赤芍

大黃

芒硝

甘草

此子

和

當歸散

見經

治經三四月不行或一月再至

數月不

少也

滋之以芎歸白芍補之以白木山黃一月再至

行有

醫金散

治經脈逆行上為吐衄

治經

鬱金為末加酒汁與姜汁煎服

升陽舉經湯

治經水不止

黃耆 當歸

白朮

羌活

防風

藥本

獨

活 附子

甘草

人參

熟地

川芎

細辛

六桃仁十個去

紅花

肉桂

白芍

每服

漸加

至五錢

調經湯

小柴胡與四物各半

柴胡

半夏

人參

甘草

黃芩

清金養血湯

治婦人經候不調骨蒸勞熱咳嗽或有汗無汗比之逍遙散之類取效甚捷

李氏醫鑑

李氏醫鑑

卷之八

五

川芎

當歸

白芍

香附

麥冬

白朮

丹皮

地骨皮

生地

五味子

甘草

不拘時服

木香

枳殼

活

血通

經調

和氣

血

人參

荆芥

散

治月水不調

歸脾湯

治經帶

阿膠湯

治損傷衝任月水過多淋瀝不斷

抑氣散

治婦人氣盛于血變生諸症頭暈腦滿

諸疾荷血少氣多壅于胸

香附

陳皮

茯苓

甘草

為末

每服

二錢

經曰高者抑之平者散之鬱氣陳皮調諸氣伏神安心氣甘  
草緩逆氣氣得其平則無亢害之患矣若鬱甚者不必泥  
此調經白芍盛于血則當抑氣若行氣之藥則真  
氣耗散除火愈盛而氣血兩虛矣是方平和為常用  
或謂滋陰之藥使陰血先足而陽火自平亦正  
當之一法蓋補其不足正所以制其有餘也

丹皮

生地

益母子

澤蘭

蘭葉

阿膠

柴胡

俱

延胡

香附

均治月候

艾附丸

治婦人

菴藹子

治經

茜

草

一兩酒煎

薑黃

通

三菴

大黃

葶藶

瞿麥

子

漏蘆

王不留行

芒硝

蟹

蠶

肉桂

花

椒

俱通

桃仁

射干

紅花

牛膝

均治

五靈脂

閉

妙用能

代顏石

治經

木通

行經

元亨內氣

我本

止

經多

干姜

桂枝

皆溫

赤芍

鱉甲

均治

通

經

藥

治婦人

發熱

咳嗽

經期

先至

同

五

艾葉

調

白微

調經

種子

古

靈脂

艾葉

調

白微

調經

種子

古

丹皮

艾葉

調

白微

調經

種子

古

丹皮

艾葉

調

白微

調經

種子

古

丹皮

艾葉

調

白微

調經

種子

古

丹皮

艾葉

調

白微

調經

種子

古

丹皮

艾葉

調

白微

調經

種子

古

妊娠傷寒

婦人先調血此大畧之詞耳要之脈緊無

汗名傷寒脈緩有汗為傷風熱病

表實六合湯

治妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病

四物湯

治血虛

此足太陽經也凡婦人傷寒六經治法皆同惟懷妊者則以安胎為主藥中不可有犯胎者則不可用也河藏皆以四物為君又正安胎餘同傷寒例分經而治麻黃細辛發汗解表故加用之治表實無汗者

四物四兩加桂枝地骨各七錢名表虛六合湯治妊娠傷

寒表虛自汗身熱惡寒頭痛項強脈浮而弱能退熱止汗

四物四兩加防風蒼朮各七錢名風濕六合湯治中風

李氏醫鑑

卷之八

七

氣肢節煩痛頭痛身熱脈浮四物四兩加升麻連翹各七

錢名升麻六合湯治下後過經不愈濕毒發斑如錦紋者

四物四兩加柴胡黃芩各七錢名柴胡六合湯治胸脇滿

弦小陽經症四物四兩加大黃五錢桃仁十枚

妙治大便秘小便赤氣滿而脈沉微太陽陽明本病也急

下之

之謂

四物四兩加人參五味各五錢治汗下後咳嗽不止

四物四兩加厚樸枳實各五錢治傷寒後虛痞脹滿

陽明本虛者

本胃也四物四兩加枝子黃芩各五錢治汗下

後不得眠四物四兩加石膏知母各五錢治大渴而煩脈

長而大四物四兩加茯苓澤瀉各五錢治小便不利太陽

本病

本病

干治汗下後血漏不止損動胎氣者四物四兩加附子肉

桂各五錢治四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉遲者少陰

病也

錢治畜血症以上原本名四物大黃湯并六合湯之類茲

柴節之及妊娠寒傷亦併從減以部首概之

當桃仁莫妄施要教母子俱無損大黃四物對分之吳

日產後傷寒不可輕易發汗蓋有產時傷力發熱有血

李氏醫鑑

卷之八

七

過多發熱有惡露不盡發熱有三日乳著發熱或早起

動飲食停滯一皆發熱狀類傷寒要須詳辨大抵產後大

血虛空若汗之則變筋惕肉瞤或昏迷不醒或搐搦不定

或大便秘結其害非輕凡有發熱且與四物湯并柴胡黃

宜最多白芍須炒過酒蒸熟地黃佐之加軟荳蔻胡干姜

人參主之最効蓋干姜辛熱能引血藥入血分引氣藥入

氣分且能去瘀生新而陽生陰長之道以熱治熱深合內

經之旨如病者不盡者益母丸黑神丸必兼用之胃虛食

少者加白朮茯苓有痰者加陳皮半夏其餘六經治

例同皆必以四物為主乃養血務本之要也劉河間曰火

抵產病大行從損損榮氣弱病從增損四物宜詳察病

而用之謂產後血虛散熱破結軟堅大黃推蕩走而不

然二藥相須同為峻下之劑王好古曰本草言芒硝墮胎

杜安謂口病當之故胎無恙

也經云有故無損云云見前

妊娠 胎前產後等症 安胎 催生下血 收子服

兼附症別

脈經云血旺易胎氣壯雖孕是以不致多由血熱血火而其源起於血陰不足陽勝而內熱也血日枯也諸陰清熱則血自生胎而有子矣亦有子宮寒而不孕者當溫煖子宮而即孕矣又有肥人體盛而不孕者以子宮脂滿寒故不受孕也以二陳為君而加氣血藥則自受孕矣婦人受孕一月形如露珠乃太極動而生陽天一生水謂之胎足厥陰脈主之經水即閉飲食稍異二月如桃花辨乃太極靜而生陰地二生火謂之脾脾音運膜也足少陽脈所主若吐逆思食各日惡阻有孕明矣或偏嗜一物乃一藏之虛如愛酸物乃肝經只能養胎而虛也三月如清昇淨先成鼻與雌雄二器乃分男女手厥陰相火所主胎易動四月始受水精以成血脈形像具手足顯成手少陽脈所主五月始受火精筋骨四肢已成毛髮始生足太陰脈所主六月始受金氣以成筋骨目眚成足陽明脈所主

李氏醫鑑

卷之八

妊娠

九

主七月始受木精以成骨造其魄能動左手太陰脈所主八月始受土精以成皮膚九歲皆成近其魄能動右手手陽明所主九月始受不精百節平備三轉其身足少陰脈所主十月神氣備足乃生足太陽脈所主推手少陰太陽脈所主者君主之官無為而已有隱胎者須防三五七月宜服清熱涼血安胎之藥

校宮丸

治子宮脂滿不能孕育

肥而不孕多由痰盛故以二陳為君

芍藥

白朮 半夏曲 香附

一茯苓 神麴

五橘紅

甘草

粥丸

紫蘇飲

治胎氣不和湊上胸腹脹滿頭痛心腹腰脇痛名

子懸

由下焦氣實相火旺盛

蘇葉

當歸

白芍

人參

陳皮

大腹皮

甘草

加蘇煎空心服心腹痛甚者加木香延胡

補大腹以利順其氣氣順血和則胎安矣既用其氣而復以參甘養其氣者順則順其邪逆之氣養則養其沖和之氣

也

四物湯加艾葉四製香附

虛冷不妊

白朮散

治子腫面目肢體虛腫如水狀

胎中挾濕水與血搏濕氣流溢故也

白朮 姜皮 陳皮 茯苓皮 大腹皮 為末米飲

下指迷方有桑白皮無白朮

此即五丹溪除姜皮腹皮

李氏醫鑑

卷之八

妊娠

十

用芍朮通補中導水行氣

此症有服鯉魚湯鯉魚名

天仙藤散

治子氣 婦人衝任素受風濕因妊娠而足腫痛

天仙藤 氣活血能解血中之風氣 香附 烏藥 陳皮

甘草

等分加紫蘇 木瓜生薑

空心煎服或為

末鹽湯調下日三

紫菀湯

治子嗽

紫菀

天冬

桔梗

甘草

桑白皮

杏仁

竹茹

入蜜

服

安樂散 治子淋心煩悶亂子淋勝脫小腸虛熱也虛則不能制水熱則不能通利故淋

傷胞門相表裏故煩悶亦有因房勞內傷胞門而任虛者宜八珍湯或腎氣丸

人參 細辛 當歸 甘草 燈草 五木通 滑石 麥冬

冬三 爲末每二錢麥冬湯下陳來章曰虛熱宜補故用參甘之甘林開宜通故用通燈之滲肺燥則天氣不降而麥冬能清之腎燥則地氣不升而細辛能潤之血燥則溝瀆不濡而當歸能滋之也

膠艾湯 治婦人漏下或半產後下血不絕或妊娠下血產者四五月而墮胎必傷其血海血因

腹痛爲胞阻產者四五月而墮胎必傷其血海血因

阿膠 芎藭 甘草 艾葉 當歸 白芍 乾地黃

李氏醫鑑 卷之八 婦人 經水 經水 經水

治胎動 嚴氏治胎動經漏腰痛腹痛搶心短氣加黃耆又

方阿膠 蛤粉炒艾葉數莖亦名膠艾湯治胎動不安腰

腹痛或胎上搶心去血腹痛指迷方加秦艽

當歸散 妊娠宜常服之血少有熱胎動不安及數半產難產者並宜服之胎無疾苦臨盆易產產後百病

當歸 川芎 白芍 黃芩 白木 爲末酒調服日二

此足太陰厥陰藥也衝任血盛則能養胎而安胎芎藭芍藥養血而益衝任又懷妊宜

清熱涼血血不安行則胎不安黃芩養陰退陽能除胃熱白

木通脾燥濕亦除胃熱胎氣係於脾脾虛則帶無所附故

易落脾胃健則能運化精微取汁爲血以養胎自無

恐阻順逆之患矣故丹溪以本木爲安胎之聖藥

竹葉湯 治妊娠心驚膽怯終日煩悶名子煩受胎四五箇月相火用事

不安亦有竹葉湯治之或虛火君火大行俱能乘肺以致煩躁胎動不安亦有竹葉湯治之

麥冬 茯苓 黃芩 人參 淡竹葉 一方茯苓爲

君無人參有防風即母如言天者加竹瀝妊娠心煩固多

虛也如和火盛者單用九君火盛者單用黃連九君火盛者單用黃連九君火盛者單用黃連

參木飲 治妊娠轉胞轉胞者胎過及胞壓在一邊胞系轉弱痰飲壅滯以致之

當歸 熟地 川芎 白芍 人參 白木 陳皮 半

夏 甘草 加姜煎空服此即入珍湯而去茯苓加陳皮半更以除痰也

李氏醫鑑 卷之八 婦人 經水 經水 經水

朱丹溪曰胎前之病婦人稟受弱者憂悶者性燥急者食

味厚者多有之古方用滑利藥鮮効因思胞不自轉爲胎

所壓胎動不安起胞系自疏水道自通矣近吳宅寵人患此

似血火則胎弱不能舉氣多有飲中焦不消而胎知

所避而胎下乃以上藥與服隨以探吐喉中吐出藥汁候

氣定又與之八點而安此恐偶中後治數人皆効仲景云

婦人本胞氣全反前雙胞系了疾但利小便則愈宜服

氣丸以中右後冬故也地黃爲君功在補

胞又法將好婦倒懸胞轉而小便自通矣

托胎丸 治受孕一兩月慣墮胎者

杜仲 入兩糯米湯煎 續斷 二兩酒 山藥 六爲糊丸或棗

肉爲丸米飲下 二藥大補腎氣托 安胎訣 安胎妙藥似神藥白木砂仁各一錢阿膠歸芍



小便安然如若腰疼加杜仲本香潤紙水

安胎飲

安胎飲可安胎任四物陳皮甘草

佛手散

佛手散治產後血虛為効

羊肉湯

羊肉湯治產後血虛為効

當歸

當歸 芍 牡蠣 龍骨 生薑 附子 炮 桂

枝

每服一兩羊肉四兩加葱白煮服

達生散

達生散治產後血虛為効

氣血虛弱

氣血虛弱榮衛滯澀期易生如達生

李氏醫案

李氏醫案卷之八

當歸

當歸 芍 人參 白朮 陳皮 紫蘇 甘草

大腹皮

大腹皮 入青葱 黃楊腦子 煎 黃楊木 或加枳殼

仁或春加川芎夏加黃芩冬如本方或有別症以意消息

仁或春加川芎夏加黃芩冬如本方或有別症以意消息

朱丹溪曰

朱丹溪曰產難往往見于鬱悶安樂之人富貴奉養之家

若貧賤者

若貧賤者鮮有之古方有瘦胎飲為湖陽公主而作恐非

至到之言

至到之言子族妹苦于難產遇胎則燭而去之子甚憫焉

視其形肥而

視其形肥而對于女工知其氣血久生不運男因母氣虛

亦不能自運

亦不能自運其當補母氣則兄健易產今其有孕五六月

以大全其方

以大全其方紫蘇飲加補氣藥與之數十貼得男甚快因

散云

散云昔湖陽公主產難方士進瘦胎飲用只壳四兩妙

送宗

送宗明其不然蓋孕婦全賴血氣以養胎血氣充實胎

易生

易生彼公主奉養太過氣實有餘故可服之若一服

方服之張氏加香附行氣寬胸湯下許學士六次特

釣藤湯

釣藤湯治瘰癧胎動不安

釣藤鈎

釣藤鈎 當歸 扶神 人參 桔梗 桑寄生

熱加黃芩

熱加黃芩枝子柴胡白朮風痰加半夏南星竹瀝風勝加

羚羊角散

羚羊角散治產後惡露已盡忽昏暈不知人

子痛

子痛陰主靜陽主動風陽邪也諸風眩掉

羚羊角

羚羊角 獨活 防風 川芎 當歸 棗仁 茯苓

杏仁

杏仁 苡仁 木香 甘草 加姜煎一方有五加

皮

皮 人參 白朮 熟地 棗仁 當歸 川芎 桂心

人參

人參 白朮 熟地 棗仁 當歸 川芎 桂心

柴胡

柴胡 荆芥 防風 甘草 當歸 川芎 桂心

姜煎

姜煎 柴胡 荆芥 防風 甘草 當歸 川芎 桂心

清魂散

清魂散 治產後惡露已盡忽昏暈不知人

治產後惡露

治產後惡露已盡忽昏暈不知人

治產後惡露

治產後惡露已盡忽昏暈不知人

治產後惡露

治產後惡露已盡忽昏暈不知人

治產後惡露

治產後惡露已盡忽昏暈不知人

治產後惡露

治產後惡露已盡忽昏暈不知人

治產後惡露

治產後惡露已盡忽昏暈不知人



產後發症 以脫血無以養筋

催生四聖散 白芷二錢 枳殼二錢 冬葵子 木通各二錢 煎服

卽下

三合散 四物四君合小柴胡湯治產後日久虛勞

麻子蘇子粥 治產後大便不通 產後有三種疾鬱胃則多汗多汗則大便秘故難于

藥用 大麻仁 蘇子 等分洗淨合研再用水研取汁煮

粥啜

或問產後禁服用白芍否曰新產血氣未平恐其酸收作痛耳其性溫治血虛氣痛新產正血虛氣痛之時醇酒微炒用之何害又血塊凝滯作痛不可泥于產後大補氣血放胆下之用玉燭散無妨推陳致新亦是補法只因產後大

李氏醫鑑 卷之八 補氣血一語致廣血而殞者多矣

參朮膏 治產後胞損成淋瀝症

人參二錢 白朮二錢 黃耆半錢 茯苓 陳皮 桃仁各一錢 炙甘草

五分 用猪羊胞煮湯入藥煎服 丹溪曰收生不謹以致損

年患此因思肌肉破傷在外者且可補完胞雖在內或亦可治診其脈虛甚則用梧日難產之人多是氣虛難產之後

氣血尤虛因用峻補以此膏饒時與之每劑一兩一月而安蓋令血氣驟長其胞可完若稍遲緩恐難成功

本草備要妊娠主治註釋

紫石英 治女子血海虛寒不孕 衝爲血海任主胞胎經血

云女子系胞于腎及心包經風寒乘之故不孕紫石英性溫走二經散風 確砂 覆盆子 子多寒下焦爲暖子宮之要藥

孕淫陽覆 治陰絕 破固紙 治婦人血虛婦人之血脫氣蛇

牀子 治子藏 陽起石 治子宮 續斷 治胎漏 艾葉 治子宮

仲 治胎漏 葱白一物湯 治發汗而安胎加姜亦佳 生地

小 紫蘇 阿膠 知母 木香 砂仁 薑子 俱安

黃芩白木 聖藥 鹿角膠 治血閉不孕 胡黃連 治胎 竹茹 治

動 貝母 治產 益母草 上木通 車前子 白葵藜 王不

留行 禹餘糧 大麻仁 滑石 俱催 冬葵子 胎丹 參

死胎 牛膝 治產 麥芽 下花乳石 下死胎包衣惡血 紅花

赤石脂 東垣云胞胎不下清劑可以下之 批杷葉 治

李氏醫鑑 卷之八 乾 茜根 治產後 蘇木 血暈腹滿欲死產 羚羊角 主產後

茹 胎前不損子 伏龍肝 治產後 夜明砂 治死 蟬退 治產後

治胞衣 水片 治產 皂莢 胎下 皂角刺 治胎衣 石燕 胎即下

澤蘭 治產後 血虛腰痛行未盡 白微 治產虛 鬱金 治產

血攻 姜黃 同 白芷 治產後 傷風 知母 治產 青蒿 同 上

干姜 產後大熱者宜之此非有餘之熱乃陰虛生內熱也

吳萸 產後必飲之 山查 治兒枕作痛惡露積于太陰少

黑芝麻 後熱主產 竹瀝 治大熱者寒而能補胎后不得虛胎

前不損子世人因本草大寒二字棄而不用不知假火而成何寒如此之甚耶

柴胡新產發熱不可用

治胎前產後多口渴方

黃芩酒炒 柴胡 一錢 硬石膏 五錢至一兩 麥冬 五錢至一兩 知母 二錢至四錢 橘紅 二錢至三錢 白茯苓 三錢 竹葉 五十片至一百片 胃虛加人參 二錢至三錢 河水煎饑服發日五更溫服滓再煎六分并進如

熱甚寒亦甚加姜皮 二錢至四錢 白朮 三錢

治胎前產後甚不渴少汗方

人參 姜皮 各五錢 橘紅 二錢至四錢 五更溫服再煎五六分

進寒甚者陽氣虛而下陷也益陽氣則寒自止邪自散

李氏醫鑑 卷之八 胎產

故應多服人參 如貧人即以白朮或葛根代之 如汗多加黃耆 五錢

治產後癰主方

當歸 三錢至五錢 柴胡 一錢 鱉甲 四錢至七錢 牛膝 一兩 白茯苓 二錢 橘紅 三錢 姜皮 一錢至二錢 干姜 炒黑四分 煎露一宿五更溫服 如

渴加麥冬 六錢 竹葉 五十片青蒿三五錢 如渴甚更加知母 三錢 花粉 二錢 痰多加貝母 四錢 如脾胃弱加人參 三錢至一兩

元氣虛亦如之 有肺熱者去人參加白芍 四錢 如

多加黃耆 五錢至一兩 寒甚加桂枝 七分至一錢 干姜 炒黑 七分

如惡露未盡亦如之并加益母草 五錢 黑豆 炒一兩 蘇木 打碎 五錢

別以 熱多加青蒿 三四錢

滯下

凡胎前滯下宜用黃芩黃連白芍炙甘草橘紅紅曲枳殼連肉 升麻未滿七月勿用滑石症急者必須用之不拘此例

凡產後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等藥行之致傷胃氣遂不可救但用人參白芍當歸紅曲升麻 益母草炙甘草一倍滑石末 四五錢 若惡露未盡兼用乳香 沒藥 各七分 炒砂仁末 一錢 久之自愈血虛加阿膠 三錢 粉炒 五錢

必多致損胎薛氏云如內傷飲食外感風寒用香正氣散為主若因食滯平胃散若陽氣虛寒手足厥冷須用補為急理中湯產後霍亂藏府虛冷飲食不消須用理中湯致若熱而飲水者五苓散若寒而不飲者理中湯

經漏不止曰崩陰虛陽痿謂之崩而任經虛致風動筋榮血以致崩中暴下時發時止亦一說但未及肝血虛清亦自生風之急詞卷曰衝爲主海任主胞胎任脈通衝脉盛則月事以時下無崩漏之患且易有子崩中由損傷衝任氣血俱虛經曰陰虛陽搏謂之崩由陰虛而陽搏之血得熱而妄行也帶者病木于帶脉而得名赤濁血白濁氣白陰虛陽竭榮氣不升衛氣下陷或濕痰濕熱蘊積而下流也此非時血行淋瀝不已謂之漏下忽然暴下如山崩然謂之崩中有五色以應五藏良方曰帶下起于風寒濕熱所傷人于胞中或中經脉流入藏府陰虛陽竭榮氣不升衛氣下陷滯于下焦奇經之分因帶脉而得名白濁氣其狀如涕相連而下言帶者亦病形也有濕熱流滯下焦者有肝腎陰虛精勝者有驚恐而木乘土位濁液下流者或思想無窮而爲白淫者或餘經濕熱而滯小腹之下者風者色白如涕傷脾經者黃如爛瓜傷腎經者黑如衄血

主

虛者補中益氣而兼升提  
血虛者養血滋陰而兼調氣

如聖散  
治崩漏不止

烏梅肉一兩 黑姜半兩 爲末每服二錢烏梅湯下瀉能止血故用

枏酸能收欬故用烏梅溫能守中故用干姜黑能止血故並煨水勝火也

固下丸 治赤白帶

樗皮兩半 白芍五錢 良姜煨黑 黃栢煨黑 三錢 粥丸米飲下

當歸煎丸 治赤白帶下腹中痛不飲食羸瘦

補劑云：中已久爲白帶，下多時，骨本枯，久則血少，復亡其陽，故白滑之物，下漏不止。

當歸 熟地 阿膠炒 續斷 白芍炒 赤芍炒 牡蠣煅

地榆炒黑三錢 醋燉丸米飲下

白芷散 治赤白帶滑脫不禁

白芷雨海螵蛸二個胎髮一錢爲末酒調下二錢白芷辛溫燥濕

祛風蠅蛸醋溫收濕和血胎髮  
補陰消瘀煨黑又能止血也

七寶美髯丹 治白帶崩漏 古黑神散 治虛損崩漏

涼血湯 治血崩不止

川芎五 當歸各一錢 生地各一錢 黃芩 黃連 知母 防風

柴胡 黃柏炒 荊芥 紅花各八分 細辛 蔓荊子 羌

活各六分 藥本五分 甘草 升麻各四分 食前服

李氏醫鑑  
卷之八  
崩帶  
三

歸脾湯 治經漏崩帶

本草備要崩中主治註釋  
鹿角膠  
中不止

五靈脂 治崩中非正流之藥乃去瘀之  
劑與荊芥防風治崩中義同 生地 何首烏 治

續斷 益母子 並用治 艾葉 延胡 茜草 凌霄花

地榆頭花 白茅根 白芷片 帶升麻 雞蘇 木賊 白

慧石  
 砂仁  
 香附  
 赤石脂  
 禹餘糧  
 代赭石

伏龍肝 鷄脆皮 烏骨雞 阿膠 龍骨 海螵蛸

鐵板 牡蠣 廬垂 扁柏 訶子 檳榔 白皮 秦皮

上同  
槐花 棕 竹茹 蓮子 石榴皮 蓮鬚  
治同荷葉

**艾實** 治大小痢並治帶類 **白果** 治小腸赤白者濕傷血不  
 分從肺大腸來帶濁並有寒熱二症 **艾葉** 治帶升麻能解  
 亦有因痰者宜二陳加升柴二味 **蜀葵花** 赤者治赤帶  
 急 白者治白帶 **肉苁蓉** 帶韭子同乘蠅蛸能治  
 淫訶子收飲 同蛇床子五味山萸杜仲續斷帶下虛寒  
 存性與炙 蛤粉丹溪云治槐米炒牡蠣煨為粉等分為末  
 灰同服 服或糊丸米飲下治白帶甚効

李氏醫鑑

卷之八

崩帶

三

乳婦 乳巖 乳癰 內外吹

**猪蹄湯** 治乳少 猪蹄一隻雄通草一兩 煮食  
 廣濟方用猪蹄四隻煮汁加土木瓜根渴虛太渴者三著少

**米苳** 敗者稀粥食治同或以猪蹄湯調益元散服以木梳  
 梳乳房乳汁自下 又穿山甲王不留行皆通乳之藥俗

**梔乳房** 乳汁自下 日穿山甲王不留行皆通乳之藥俗

**皂角** 蛤粉 等分為末每服二錢酒下  
 治乳便用方 治乳癰初起腫痛未成膿者  
 矣

李氏醫鑑

卷之八

諸乳

三

**蒲公英** 連根帶葉二兩搗爛好酒半斤同煎數沸熱服存  
 渣敷腫上蓋腫一時許再用連髮葱白湯一鐘微

汗而

**乳吹** 腫驗方 蒲桃葉搗 麥麵 醋調敷即消

**乳癰** 奇驗方 以頭垢丸下二三粒少頃一吐而愈

**麥冬** 治乳 貝母 上瓜 菱子 木通 通草 蒺藜 漏蘆

俱治乳 赤小豆 大麻仁 下乳又 煎蘆 俱下 葱 冬葵子

開下乳 益母草 治乳 黃芩 上 蒲公英 治乳癰肝經病同

許木鱉子 治乳 百合 治乳癰 榆白皮 治如乳和陳醋 皂

服木鱉子 如癰 白梅 傳乳 陳皮葉 敷乳 青皮 消乳 天花粉 治乳

凌霄花 主產乳 餘疾 結 茜根 治乳 結

乳吹乳癰方 鯽魚去鱗腸入芫花煮去芫花食湯并魚

即出頭

本草經疏忌宜 乳巖乳癰內外吹 忌 補氣 升 辛溫燥酸飲宜

散結氣 涼血活血 清熱解毒

貝母 栝葉 運翹 花粉 山慈姑 山豆根 紫花

地丁 黃連 甘草 柴胡 白芷 橘皮 牡鼠糞

乳香 沒藥 漏蘆 夏枯草 金銀花 瓜蒌仁 頭

垢 人爪 鯢鯢甲 牛枝蓮 茜根

請乳

小兒

小兒疳積 疳積者胎毒痰熱所生 初生未食乳之前 用牛黃二五厘 合黃連甘草末 塞其口 令吐之 甚妙 小兒牙關緊閉 急慢驚風 用杜牛膝絞汁 入好酒清之 即吐 以醋拌渣 敷項下 服之 取其吐痰 風邪或因母腹中受驚 或因大驚而得 蓋小兒神氣尚弱 驚則神不守舍 舍空則痰涎歸之以致痰迷心竅 或感風寒 胃溫 或飲食不節 逆于氣鬱而致成 涎閉 寒諸經厥而乃成 或數日一發 或一日數發 發則眩撲倒地 昏不知人 痰涎抽掣 口眼喎斜 或隨氣作六畜之聲 滿有五疳 瘰癧 瘰癧者有畜所屬 心瘰癧其聲如羊 肝瘰癧其聲如犬 脾瘰癧其聲如牛 肺瘰癧其聲如雞 腎瘰癧其聲如豬 筋急而縮 為痰涎緩而伸 為痰伸縮不已 為痰 卒然脫手 抽掣或口眼喎斜 吐涎而身軟 時發時止 為癇 皆陰虛血熱風火相持 痰隨火湧

牛黃丸 治風癇迷悶涎潮抽掣

李氏醫鑑 卷之八 小兒

美

沉香天麻丸 治小兒因驚發搐痰多眼白癰瘰筋掣 小兒 神氣

尚弱驚則神思無依又動于肝風風火相扇故痰壅心竅而筋掣抽搐音觸牽制也

羌活 錢五 獨活 錢四 沉香 益智仁 川烏 二錢 附子 地 天麻

防風 半夏 錢三 當歸 甘草 礬蠶 錢半 每服五錢姜三片

煎

安重散 更 治小兒腹痛狀似驚癇 腹痛有積痛食痛虛痛 大同小異惟重痛者

口唇淡而沫自出當隨症用藥重與癇相似小兒本怯故胃虛冷則重痛而心痛與癇界相似但目不斜手不搐也

金液丹 虛損 治慢驚 涼膈散 門 治小兒驚急

索雪 傷寒 變現 治小兒驚癇 定志丸 傷寒 門 安重定驚

木香檳榔丸

治小兒驚癇積熱

風引湯

治小兒驚癇日數十發

控涎丹

治驚癇加

治驚風成塊

奪命丹

治小兒急慢驚風痰涎壅盛藥不可下命在須臾

青州白丸子

治小兒驚風

治驚癇日數十次

玉屑無憂散

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

李氏醫鑑

卷之八

小兒

地骨皮散

治虛熱潮作及傷寒壯熱餘熱

治驚癇日數十次

大連翹飲

治小兒丹毒發熱痰涎壅盛一切諸瘡癰癤頭

項生核或傷風傷寒時行發熱等症並宜服之

連翹心

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

木通

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

當歸

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

防風

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

黃芩

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

柴胡

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

甘草

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

荊芥

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

木香

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

檳榔

治小兒驚癇

治驚癇日數十次

退 石膏

六味地黃丸

治小兒行遲齒遲腳軟顫開陰虛發熱諸病

皆屬腎虛用之應手神効

消毒犀角飲

治小兒丹毒身熱氣粗啼叫驚搐不寧等症

犀角

治小兒驚癇

金銀花

治小兒驚癇

薏根

治小兒驚癇

馬齒莧

治小兒驚癇

雞腸草

治小兒驚癇

地膚子

治小兒驚癇

李氏醫鑑

卷之八

小兒

杜牛膝

治小兒驚癇

丹皮

治小兒驚癇

天麻

治小兒驚癇

史君子

治小兒驚癇

冬花

治小兒驚癇

紫菀

治小兒驚癇

南星

治小兒驚癇

故廬

治小兒驚癇

薄荷

治小兒驚癇

黃連

治小兒驚癇

防已

治小兒驚癇

附子

治小兒驚癇

犀角

治小兒驚癇

燈草

治小兒驚癇

白礬

治小兒驚癇

五靈脂

治小兒驚癇

夜明沙

治小兒驚癇

雄黃

治小兒驚癇

阿膠

治小兒驚癇

羚羊

治小兒驚癇

麝香

治小兒驚癇

熊膽

治小兒驚癇

龍骨

治小兒驚癇

龍齒

治小兒驚癇



木鱉治疳積 地黃甘能殺虫 五靈脂 蟬蛻治勞疳積 蟾酥治癰

水片五分共再研極細用溫湯漱淨再吹藥疳上日  
用六七次吹藥變從外流爲吉內文惡毒入里爲危

癰瘍

朱丹溪曰癰疽皆因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也而  
行脈中氣行脈外相並周流與氣相搏之則凝滯而行  
為不及熱與火搏之則沸騰而流行為太過氣得邪而  
津液稠粘為痰為核久滯入脈中血為之濁此陰陽  
陽也血得邪而凝滯也通滯或凝或結久滯出脈外氣  
為之亂此陽滯也陰也百病皆出於此不止癰疽而已也  
內經曰榮氣不從逆於肉裏乃生癰腫又曰諸癰瘡瘻皆  
以備氣急其餘各症各有專方不能多錄癰疽之生始  
喜怒憂樂之不時飲食居處之不節或金石草藥之發  
寒暑燥濕之不調致陰陽不平而結聚成癰癰而腐  
輕者起於大腑浮達而為癰重者發於五臟沉滯而為疽  
若疽等症發於內者為肝癰肺癰腸癰等癰外者為背癰  
疽難明太陽經虛從背而出少陽經虛從脅而出陽明經  
虛從臍而出督脈經虛從腦而出凡癰疽痛者為實邪腫

李氏醫鑑

癰疽之八

癰疽

三

而不痛為虛邪腫而赤者為結熱腫而不赤為癰  
氣停痰血滯則氣壅氣壅則經絡滿急故腫且痛  
李東垣曰癰疽及諸癰面赤雖伏火熱禁不得攻事為  
氣壅鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖  
便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤  
之如見風脈風症只宜發表風藥便可以通利太偏者止  
乾燥秘澀尤宜潤之慎不可下九竅不利癰疽難止  
可下汗之則愈機要曰治癰疽須明托裏疎瀉調和藥  
其邪在內者其脈沉實發熱煩躁外無脈者其邪在表  
其邪在表者其脈浮大發熱煩躁外有脈者其邪在表  
中者外無脈者其脈沉實發熱煩躁外有脈者其邪在表  
用此三者雖未即愈必無變症其邪在內者其脈沉實  
珍貴之藥可住其病不知癰疽之症其脈沉實發熱煩  
寒痛溫之風痛除其風濕痛導其濕導痛潤之寒痛通之  
陰陽不和者調之虛痛補之實痛瀉之癰疽而閉者開之  
藥肉敗潰引之經絡開通者利之不耳一而無權也

經流三癰疽皆山榮家實熱氣逆所致急在癰疽血熱  
結解大劑連進內外夾攻務使消滯即勢大毒盛一時  
不能散盡亦必十消七八從使積膿保無大害若失  
于救治使熱毒內攻其膜必壞壞則神人不能救矣  
真人活命飲 治一切癰疽腫毒初起未消者

銀花 三錢 陳皮 當歸 防風 白芷 甘草 節 貝母

天花粉 乳香 沒藥 皂角刺 穿山甲 歸身 大

酒以助藥勢忌酸物鐵器 此藥當服於未潰之先未成者  
散已成者潰者若已潰者不可服

金銀花酒 治一切癰疽惡瘡不問發在何處或肺癰腸癰

初起便服奇効

李氏醫鑑

癰疽之八

癰疽

三

金銀花 五兩乾者亦可 甘草 一水二碗煎一磁罈入酒一

碗畧煎分三服一日一夜盡服重者日二劑服至大小腸

通利則藥力到外以生者為癰酒調敷毒四圍

金銀花 藥能清熱解毒甘能養血補虛為 本方用金銀花

二甘草 一加黃耆 酒一重湯煎服名同毒金銀花湯治

痛瘍色變紫黑者 附忍冬膏 金銀花 四月採鮮花搗

汁熬膏茶酒任點服養陰陽補虛療風尤宜於火熱熾

盛之人永無疔疽之患膏酒亦佳 花藥同功 而花尤勝

癰疽 治一切瘡癰惡毒先服此丸後服托裏使毒不攻

心 黃蠟二兩 白礬一兩 先將蠟溶化候少冷入礬和均為丸

酒下每十九二十九漸加至百九則有力應後服之亦

佳心為君主不易受邪凡患癰疽疔毒上攻心則命立傾矣

黃蠟甘溫白礬酸澁並能固膜護心解毒定痛托裏

諸症所必用也

托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈弦洪實數腫

甚欲作膿者脈弦洪實數乃實熱

金銀花 當歸一兩 大黃 朴硝 花粉 連翹 牡蠣

皂角刺三錢 黃芩 赤芍一錢 每五錢半酒半水煎

神授衛生湯外科 治癰疽發背腦疽對口丹毒瘰癧癰毒

疔瘡濕痰流注及外科一切瘡症但未成者即散已成者

即潰能宣熱散風行瘀活血解毒消腫疏通臟腑且藥性

平和功效甚捷誠外科首用方也

羌活八分 防風 白芷 川山甲土炒 沉香 紅花 連翹

石決明煨各六分 金銀花 皂角刺 歸尾 甘草節 花粉

各一錢 乳香五分 大黃酒拌炒二錢 水二碗煎八分病在上部先服

藥隨後飲酒一杯病在下部先飲

酒一杯隨後服藥借酒以行藥勢

破棺丹 治諸瘡腫熱

大黃二兩 芒硝 甘草各二

救苦勝靈丹方一名救苦丹 治瘰癧馬刀挾瘰從耳下或耳

後下項至肩或入缺盆中缺盆在兩脇 乃手足少陰經分其瘰

癰在頸下或煩車乃足陽明經分受心脾之邪而作也今

將三症合而治之 黃耆黃耆皮毛定元氣活通經散諸

氣聚十二經滯滯漏蘆升麻各一錢 葛根五錢 此三味足

藥中不可無也 當歸 生地 熟地此三味和血 白芍各三錢

去腸胃中當歸 生地 熟地此三味和血 白芍各三錢

補中益肺治腹痛必用 防風五分 羌活 獨活一錢 此三味

之夏倍用冬寒少用 陽痿脊痛項強腰似折項似拔者用之防風辛溫若毒在

膈已上雖無太陽症亦當用之為能去上部風邪去病源

急柴胡八分 功同連翹如瘰 牛蒡子解毒無入參補氣

李氏醫鑑 卷之八 瘰癧

如氣短不調 甘草五分 能調中和諸藥 肉桂二分 能散

及喘者加之 甘草五分 能調中和諸藥 肉桂二分 能散

瘰癧當少用之此藥因熱用之氣又為傷寒覆 黃連以治

蓋其症用大辛熱以消浮燥之氣煩燥者去之 昆布煩悶

黃柏炒各三分 如有熱或腿脚無力加之無此勿用 昆布煩悶

瘰癧欲去衣者腎中伏火也更宜加之無此勿用 昆布煩悶

堅硬者宜用 三稜煨二錢 莪木煨三錢 此二味瘰癧堅

瘰癧者宜用 三稜煨二錢 莪木煨三錢 此二味瘰癧堅

黃芩 八錢半酒 知母 黃柏 炒酒 花粉 洗酒 桔梗 昆布 五錢

柴胡 四錢 升麻 連翹 甘草 炙 三稜 洗酒 莪朮 洗酒 葛根 三錢

歸尾 洗酒 白芍 錢二 黃連 錢一 每服六七錢先浸半日煎食後

熱服服後仰臥 取藥在口內另將半料蜜 九留藥湯吞之量虛實服

飛龍奪命丹 治一切疔腫癰疽惡瘡初發或發而黑陷漏

氣內攻者

天南星 雄黃 巴豆 去油 錢黃丹 乳香 硝砂 信石

分斑苗 十六個去 麝香 少 爲末蟾酥和爲丸如黍米太

每服十丸或十四丸 量人虛實好酒送下瘡 上下服法如前忌油膩

李氏醫鑑 卷之八 癰疽

此十二經通行之藥也毒氣內攻癰疽黑陷非平劑所能  
勝南星雄黃黃丹味辛性燥能殺毒破瘀巴豆硝砂大毒  
大熱能祛寒化積斑蟊蟾酥辛寒至毒能拔疔毒下惡物  
信石燥烈切破癰香香實通竅乳香能使毒氣外出不致  
由攻引之以酒使行經絡無毒不瀉也此乃厲劑所謂藥  
若不顯其厥疾不瘳此類是也此方世俗多用之然香實  
燥毒之劑益無經不至者備汗吐下三法病因食食飲一  
切毒及瘡脈沉細脈數毒在裏并溫毒用之神効若  
大熱大渴毒氣厥發脈浮洪在表及膏梁積熱之人不宜  
輕用世人多不分此又有以半夏代雄黃者殊不知雄黃  
治諸瘡及百節中大 風中惡者之意也

托裏十補散 治癰瘡初發或已發邪高痛下瘡盛形羸脈

無力者 補形氣調經脈自常消散不得汗之下之也

黃耆 人參 當歸 錢川芎 桂心 白芷 防風 厚

朴 桔梗 甘草 一錢 每服二錢加至五六錢熱酒

本方加 白芍連翹木 亦名托裏散治發背疔瘡 此爲表裏

其成助陽內托之功也丹溪曰若冬月腫痛用之可轉重

就輕若潰瘍夏月用之以桂枝之溫散佐以防風白芷各

恐雖有參考難爲倚仗世人不 分冬夏無論經絡不能無快也

托裏黃耆湯 治諸瘡潰後膿多內虛 潰後膿血出多陰陽

黃耆 人參 當歸 桂心 茯苓 志肉 麥冬 五

味 妙 等分每服五錢食遠服 丹溪曰癰疽潰後補氣血理脾胃實爲切

要否則數月之後虛症仍見轉成他病也 托裏溫中湯 治瘡瘍爲寒變而內陷膿出清鮮皮膚涼

李氏醫鑑 卷之八 癰疽 下疳滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔逆氣短呃逆不得安

臥時發昏 此孫彥和治王伯壽臂瘍方也六脈沉微色

用此大辛之劑益舍 附子 炮四 干姜 炮 羌活 錢二 木香 錢半 茴香 下香 沉香

益智仁 陳皮 甘草 錢一 加姜五片煎 止痛當歸湯 治腦疽背疽穿潰疼痛

當歸 生地 白芍 黃耆 人參 甘草 炙 官桂 各一

兩 歸地 活血涼血參耆益氣補中官桂解毒化膿奇化腐

則痛漸止白芍和脾酸以飲之甘草扶胃甘以緩之痛自

矣 減

灸法  
火攻  
拔毒

平氏醫錄

卷之八

失主

解

凡癰疽不起，癰肉不腐，瘰癧流注，腫頑惡瘡，不愈用桑木片扎成小把，然火欠息，灸患處，內限鋪瓦。

消無名腫毒極驗方

肥皂極肥大者個 蛤粉兩四 馬料豆升半 肥皂子去 將二味填

滿用麻扎固。以泥包裹炭火燒煉。俟烟去盡。去外泥。入土

內一夜拔火毒研細末用醋調敷乾卽加醋于上或再去更敷

生肌散  
欽瘡長肉  
初起者  
禁用

寒水石 滑石 龍骨 海螵蛸 蜜佗僧 枯礬

粉  
粉印鉛  
粉

乾胭脂 錢五

共爲細末摻瘡口上

不飲益因膿水散溢而潰爛也石膏亦名寒水石滑石解肌熱龍骨枯礬善收燥肌而活血解毒蜈蚣陀僧定粉收濕燥膿故飲又方檳榔枯礬各一兩陀僧黃片鹽湯各一錢輕粉五分亦名生肌散而生肉也

又張子相

芙蓉敷法

一切瘡疔腫毒用芙蓉花或葉根皮搗爛或乾

即覺清涼痛止腫消已成者卽膿出已潰者卽易斂瘍醫秘之名爲清涼散清露散鐵箍散皆此物也或加赤小豆末或蒼耳燒存性爲末和入亦妙芙蓉辛平性滑涎粘清肺涼血散熱止痛消腫排膿

綠豆粉 甘涼無毒主解諸熱益氣解酒食諸毒治發背癰

痘瘡腫及湯火傷灼  
故能解諸熱及酒食毒湯火灼瘡發

孝

卷之六

卷之四

到

背癰疽瘡肺皆熱毒所致甘寒解陽明之熱則毒氣不聚  
犯胃而嘔惡腸胃清涼而諸毒散矣熱傷氣陰熱故能毒  
也氣

護心散又名內托散又名乳香萬全散  
凡有瘡癤一服至三服  
內宜連進十餘服方免變

症使毒氣出外服之稍遲毒氣內攻漸生嘔吐或鼻生瘡菌不食卽危矣四五日亦宜間服之

**真菜豆粉**  
**乳香**  
調半兩燈心同研和勻以生甘草煎濃湯  
錢時時呷之若毒氣衝心有嘔逆

之症大宜服此蓋能壓熱下氣消腫解毒服至一兩則香徹於孔竅聖藥也一方有丹砂二錢五分

乳香黃耆散正宗治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者

或未成者速散已成者速潰敗腐膿毒不假刀砭惡肉自

脫乳香 沒藥分 黃耆 瞿粟壳密炒 人參 廿

脫乳

香  
沒藥

分

黃耆

畢聚

蜜炒

人參

草 川芎 當歸 白芍 陳皮 熟地 各一量 痼上下

食前後服之

托裏消毒散 治癰疽已成不得內消服此以托之未成者

可消已成者即潰腐肉易去新肉易生

傷胃 氣 此時不可用內消 泄氣寒涼等藥致

人參 川芎 白芍 黃耆 當歸 白朮 茯苓 銀

花 各一錢 白芷 皂角刺 桔梗 各五 脾弱者去白 芷加人參

排膿內托散 治癰疽腦項諸發等瘡已潰流膿時宜服

當歸 白朮 人參 各二錢 川芎 白芍 黃耆 陳皮

李氏醫錄 卷之八 癰疽

茯苓 各一錢 香附 肉桂 各八分 甘草 五分 白芷 頂之上 桔梗 之

上加 牛膝 五分 下部加 姜三片 透膿散在後

神功內托散 治癰疽腦項諸發等瘡至十四日後當腐潰

流膿時不作腐貴兼瘡不高腫脈細身涼者用

當歸 白芍 各一錢 人參 各五分 白芍 茯苓 陳皮

附子 各一錢 水香 甘草 各五分 川山甲 八分 煨姜 三片 大棗

常歸拈痛湯 見前 此方東垣本為治脚氣 濕熱之劑後人用治諸瘡甚驗

豬膏酒 治瘡疥最良 豬脂二斤 金銀花 煮酒

經驗方 治下部濕瘡久不愈兼治膿窠瘡

五加皮 石菖蒲 連翹 蒼朮 木瓜 土茯苓 黃

柏 黃耆 苡仁 金銀花 鱉龜胡麻

經驗方 此方 治下部濕瘡 久不愈 兼治膿窠瘡

生地 銀花 連翹 蟬退 丹皮 白蘚皮 紅花

防風 白芷 木通 靈仙 甘草 青木香 續斷

桔梗 荊芥 白蒺藜 加燈心

京省名醫治疔毒定驗方

核批穀半邊填人尿其中合毒 上用艾炙其毒自消 馬齒莧 搗爛和梳垢封疔毒又燒為灰和多年醋淬先炙疔毒以 封之根即出生絞汁服之惡物 一方圓眼肉貼額

李氏醫錄 卷之八 癰疽

或和口 沫効

透膿散 治癰疽諸毒內膿已成不穿破者服之即破

黃耆 四錢 川山甲 炒末 一錢 川芎 一錢 當歸 二錢 皂角刺 一錢 服法如 前飲酒

前飲酒

出癰疽頭

針清二孔牛旁子亦一 針清二孔牛旁子亦一 針清二孔牛旁子亦一

周禮天官 瘍醫凡瘡瘍以五毒攻之瘍音羊瘡瘻也鄭 註五毒之藥作之合黃整置石膽丹砂雄黃礬石磁石其 中燒之三日三夜其烟上著以 鷄毛掃取之以注瘡瘻音武

本草備要主治癰疽瘡瘍一切腫毒消散註釋

瓜薤仁 紅花 小薊 大黃 蒲黃 姜黃 三棧

散一切血瘀 消腫止痛 白芷 升麻 連翹 牛蒡子 金銀花

石菖蒲 防己 俱消腫 皂角刺 宜通竅 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 散十二經 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

射乾 紫柏香 山豆根 俱消腫 薄荷 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

散一切瘰癧 走肢節 外達皮膚 甘遂 末傳 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

芋根 瘰癧 香附 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

山藥 能消熱 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

血腫 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

李氏醫鑑 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

石決明 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

風 苦參 白蒺藜 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

貝母 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

子 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

其驗乃奇 消腫止痛 犀角 化瘰癧 草薢 一名鷄腸草 瘰癧 瘰癧

金蘇木 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

服口正 辨服又 穿山甲 桔梗 養血又 地榆 大黃 枯  
 磨丹參 以上俱 犀角 赤小豆 烏梅 研末傳之  
 本草備要生肌飲口註釋

經驗飲口方

蚌竹屑 栢末 潮腦 乳香 沒藥 輕粉 冰片

黃丹 白臘 為細末鎔化貼

白蠟 生肌止痛 飲方多用 木通 漏蘆 扁柏 花粉

丹參 生肌 白及 逐瘀生新之聖藥 木鱉子 生肌 磁石 煅

節子 生肌 續斷 自然銅 黃丹 去瘀生肌 黃蠟 白蠟

李氏醫錄

卷之八

生肌

生肌外 白礬 生好肉 琥珀 從辛溫藥 桂心 生肌 貝母 散

火降和散 瘡口自 五倍子 散熱毒 瘡口 代賴石 金瘡

乳石 止金瘡出血 木敷 石灰 風化者 良藥 灰火毒 已山

尤效 散血定痛 生肌 止痛 金瘡 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口

納肺中 陰虛用 殺瘡 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口

脂口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口

楊梅瘡 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口

調服日楊梅瘡方不載明正德間起于嶺表其症多屬  
 陽明厥陰而兼及他經蓋相火寄于厥陰肌肉屬于陽明  
 故也醫用輕粉劫劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒  
 出瘡即乾癢然毒氣實入經絡筋骨血液枯涸筋失所養

變為拘攣癰漏竟致廢劉士荻苓能解輕粉之毒去陽明  
 濕熱用一兩為君以仁余銀花防風木瓜通自蘇皮各  
 五分是英子四分名搜風解毒湯  
 血虛加當歸七分名搜風解毒湯  
 杖瘡極驗方 上好石灰 水用桐油二兩入水內攪敷上亞  
 血從毛孔 而出即愈

消風散

治癰 治癰 治癰 治癰 治癰 治癰 治癰 治癰

麻油 治癰 治癰 治癰 治癰 治癰 治癰 治癰

子取油 治癰 治癰 治癰 治癰 治癰 治癰 治癰

海桐皮 白鮮皮 漏蘆 使君子 紫草 治癰 治癰 治癰

李氏醫錄

卷之八

跌打

跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷

跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷

跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷

跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷

跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷

跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷

跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷 跌打損傷

復元活血湯 治從高墜下惡血留于脇下疼痛不可忍  
 者 凡損傷必有惡血停滯不問傷在何  
 處 經惡血必留于脇下以用主血故也



柴胡五錢 當歸 花粉 川山甲錢二 甘草 紅花錢二 桃仁

五十粒去 大黃酒浸 每服一兩加酒煎以利為度肝文曰

皮尖研 經行下脇下屬陰少陽故以柴胡引引為佳 諸藥破白潤血氣味相合各有攸歸痛自去矣

跌打損傷方 歸尾 桃仁 澤蘭 菴藷子 大黃各三錢酒

煎服非汁和童便飲散 其瘀血骨折治法見前

刀斧傷 割海螵蛸末傅之血立止古墻石灰為末傅之亦

佳

金瘡血出不止 用原蚕蛾炒為末傅之

本草備要主治註釋 琥珀合金

李氏醫鑑 卷之八 損傷 聖

續斷主折跌金瘡 白欬治撲損 骨碎補治折傷唐太 益母

草去瘀生新 澤蘭治撲損 海螵蛸刀斧傷刮末 狗脊毛同上三七

治折傷金 苧根折傷金瘡 生地主折跌 菴藷子治閉性氣

鹿角膠主折跌傷損瘀血或病後溫入 慈石止金 茜根治

跌打無病之血 合歡續筋骨能補 牛膝治傷折 蒲黃治撲

傷已傷之血 紅曲治跌打損 蘇木治跌打損 花乳石敷之即愈 打跌

黃蠟續絕 蘇木治跌打損 乾漆續筋骨 半夏治跌打損 南星治跌打損

出竹竿刺并箭鏃

螳螂一個巴豆半粒為末敷傷處微瘻且忍極 瘻底拔之以黃連貫仲湯洗拭石灰敷之

船中進飛矢中目拔矢而鐵留于中痛困俟死一醫教以 寒食餠點之至夜磨瘻一餅而出旬日而瘻陷音夷即愈 也

象牙諸鐵及雜物入肉刮取屑 白梅刺入肉中用骨 牛膝

王不留行 酸棗仁壳 木刺

湯火傷

葛子搗爛和蜜塗 梨切片 蘿下生為敷治 蛤粉治湯 菜豆粉

治湯火 山茶花麻油調 白欬殺火毒治金瘡撲損 大黃為末

白或麻 薤白搗細 蜜調塗 青魚膽塗火

名公經驗方 黃蠟 白蠟各一兩 白欬一兩 雄猪板油四兩

李氏醫鑑 卷之八 損傷 聖

油一兩先將板油化開再入二蠟 炸化離火再入白欬麻油即愈

雞子清調大黃末塗之炒黃栢末亦可一法以冷燒酒淋

湯火傷驗方 烏桕樹外粗皮炒為末 桐油或麻油調敷痛即止

又經驗方 細茶葉炮過者曬乾為細末用麻油調敷痛即

止而易愈或用鐵器藏即以濕爛者敷

上亦



切魚肉驚	蒲公英	解食	礪砂	音鏡治肉	礪砂	解毒胎毒
聖菌毒	土茯苓	解傷癰瘡毒	花柳	殺魚	五味子	解酒
葛花	秦艽	蛤粉	桑椹	黃連	草薢	扁豆
參	枳實子	以上並	食鹽	檳榔	砂仁	白蔻
白果	烏梅	西瓜	甘蔗	梨	酒	白蔻
赤小豆	解小	蟹	解漆毒	見	殺魚肉菜	石菖蒲
草	莪術	藥毒	之化	成水	石菖蒲	益母

諸毒

三

**救急良方** 人之以疾病死而得終其天年者皆不幸也。幸也乃有暴橫之速大如縊溺。幸而得救。傷小如骨硬刀斧湯火之害。坐視其轉死而莫之能救。者多矣。茲取簡便良方以備緩急。倘用此而救活一命。於人心獨無愧。

**於人心獨無愧**

**暴死** 凡人遇潮於心卒然倒撲。急扶入暖室。扶策正坐。用菜汁灌鼻中。或用皂角末吹入鼻中。良久自甦。或搗韭急于人中穴及兩足大指端。離甲一韭菜許。各灸三五壯。即活。凡人卒然昏倒。身冷無痰。此名氣厥。亦名中氣。若身溫有痰者。則名中風。但扶正坐。氣順即安。或用皂角末吹鼻。令嚏亦佳。凡冬月中寒卒倒。身強口噤。手足厥冷。如無醫藥。當濃煎姜湯灌之。凍死有氣者。以灰炒熱盛囊中。按其心頭。冷即易之。若暈以火烘。冷與火爭。必死。若以熱湯亦死。或用姜汁熱酒各半溫服。凡暑月道中中暑卒死。以路上熱土圍臍。令人尿其中。即活。姜湯灌之。熱皆可灌之。或用熱土大時。等分。燉水灌之。或呼。

**李氏醫鑑**

**及臥冷地** 正如凍死人。若遇近火即死。

**縊死** 急用手裏衣物緊塞喉道。抱起解脫。安放正平。揪髮耳內。或刺雞冠熱血滴口中。男用雞女用雞。鼻即氣轉。或再屈伸其手足。將手磨之。若氣不接。將腰打三四拳。或以皂角末搐鼻。切不可割斷繩。

**溺死** 急倒提出水。用牛一頭。令橫臥以腹合牛背上。牽牛徐行。令吐出腹中之水。以老姜擦牙。即活。口噤者。攪開。橫一筋于牙間。使水得出。如無牛。以鍋覆地。將溺人背對鍋。俯臥。以手托其頭。水出即活。或俯臥。枕上。腳後指高。盤膝。膝中待其水自流出。或用皂角末。綿裹。納下。即出水。即活。切忌火烘。逼寒氣入內。不救。

**噎死** 如原有燈。即得。切忌火烘。但痛咬其腳跟。或咬大指。指而唾其面。或以皂角末吹入鼻中。得嚏即醒。

**絞腸痧**

補養論

補者補其不足也。養者養其將竭之。使之得生。遂條達而不受其患也。人之氣稟。得其中。有偏于陽而陰不足者。有偏于陰而陽不足者。必假藥以滋助之。而又須優游安舒。假之歲月。使血氣歸于和平。乃能形神俱茂。而疾病不生也。經曰。聖人不治已病。治未病。不治已亂。治未亂。夫病已成。而後藥之。亂已成。而後治之。譬猶渴而穿井。關而鑄兵。○諸方散入各門。

消導論

消者消其積也。導者行其氣也。脾虛不運。則氣不流行。氣不流行。則停滯而為積。或作瀉痢。或成癥痞。以致飲食減少。五穀無所資稟。血氣日以索。衰因致危。困者多矣。故消而導之。輕則用和解之劑。重必假峻下之湯。元蓋謂

收瀉論

陰不降。則清陽不升。客垢不除。則真元不復。如戟定禍亂。然後可以致太平也。消導諸方。散入各門。峻劑見攻裏門。

三部原本諸方散入各門

滑則氣脫。脫則散而不收。必得酸澀之藥。斂其耗散。而後發者可返。脫者可收也。如汗山亡陽。此氣脫也。若亡血不脫。骨之屬是也。氣脫兼以氣藥。血脫兼以血藥。亦兼氣藥。氣者血之帥也。陽脫者。見鬼陰脫者。目有此神。脫也。當補陽助陰。非清劑所能收也。諸方全前。

理氣論

經曰。諸氣鬱結。皆傷于肺。又曰。怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。熱則氣泄。勞則氣耗。思則氣結。九氣不同。百病皆生于氣也。夫人身之所恃以生者。此氣耳。源出中焦。總統于肺。外達于表。內行于裏。周流一身。頃刻無間。出入升降。晝夜不息。常易當病于人。故及至七情交感。五志妄發。乖戾失常。清者化而為濁。行者阻而不通。濁者失其清而不和。實者失其虛而為滯。行而為勝。則為火矣。人守有宗氣。營氣。衛氣。中氣。元氣。胃氣。脾和之氣。上升之氣。而宗氣尤為主。及其氣為病。則為冷氣。滯氣。上氣。逆氣。氣虛。諸變症矣。河間所謂五志過極。皆為火。丹溪所謂氣有餘。便是火。無病之時。宜保之。養之。和之。順之。病作之時。當審其何經何症。寒熱虛實。而補瀉之。

補中益氣湯

升陽

治煩勞內傷。身熱心煩。頭暈惡寒。懶言。

惡食。脉洪大而虛。或喘或渴。或陽虛自汗。

宜本湯加麻黃。

俱宜蜜水炒過。欲其引。或氣虛不能攝血。或瘧痢脾虛。久參者。至表故。又不可缺。

不能愈。一切清陽下陷。中氣不足之症。

中者脾胃也。藏府。

胃饑飽勞役。傷其脾胃。則氣虛。無以稟氣。而皆病矣。陽氣下陷。則陰火上升。故熱而煩。非實熱也。頭暈者。諸陽之會。清陽不升。則濁氣上逆。故頭痛。或作或止。非如外感頭痛。不也。陽虛不能衛外。故惡寒。自汗。氣虛故懶言。脾虛故惡食。脾胃虛。則火上升。肺故喘。金受火灼。不能生水。故渴。脾虛不能統血。則血妄行。而吐下。清陽下陷。則為瀉痢。氣血兩虛。則瘧不止。名瘧瘵。瘵者。瘦也。

黃耆

錢半

人參

錢

甘草

錢

白朮

土炒

陳皮

留白

當歸

分升

麻

柴胡

錢

薑三片。棗二枚。煎如血不足。加當歸。精神短少。

加入人參。五味。肺熱咳嗽。去人參。噤乾如葛根。風藥多。味烏根。獨能止渴。

者以其能升胃中清氣入肺而生水耳 頭痛加蔓荊子痛甚加川芎腦痛加蘇本細辛風濕相搏一身盡痛加羌活防風有痰加半夏生薑胃寒氣滯加青皮蔻仁木香益智腹脹加枳實厚朴木香砂仁腹痛加白芍甘草熱痛加黃連能食而心下痞加黃連咽痛加桔梗有寒加肉桂濕勝加蒼朮陰火加黃柏知母陰虛去升柴加熟地山藥山藥大便秘加酒煨大黃咳嗽春加旋覆欬冬夏加麥冬五味秋加麻黃黃冬冬加不去根節麻黃天寒加干姜泄瀉去當歸加茯苓蒼朮益智 觀此加減則用藥之大較亦可得而識矣

王氏醫鑑

卷之九

聖氣

三

此足太陰陽明藥也肺者氣之本黃耆補肺固表為君

者肺之本土能生金脾胃一虛肺氣先絕人參甘草補脾益氣和中瀉火

為臣東垣曰參者甘草瀉火之聖藥蓋煩勞則虛而生熱得甘溫以補元氣而虛熱自退故亦謂之為白

朮燥濕強脾常歸和血養陰為佐補陽必兼和陰不然則已亢升麻以

升陽明清氣右升而復其本位柴胡以升少陽清氣左旋而陽升

則萬物生清升則濁陰降加陳皮者以通利其氣同補藥則補濁

用則瀉脾生薑辛溫大棗甘溫用以和榮衛開腠理致津液諸

虛不足先建其中中者脾胃是也李東垣曰脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而

乘其土位其次肺氣受邪須多用黃耆而人參甘草次之脾胃二虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而固腠理不令

自汗上喘氣短故以人參補之心火乘脾用炙甘草溫以瀉火熱而補脾元若脾胃急痛併大虛腹中急縮宜多服之中清氣在下必加升麻柴胡以升之引參者甘草甘溫之氣味上升以補胃氣之散而實其表又緩帶脉之縮急氣亂于中清濁相干用去白陳皮以理之又助陽氣上升以散滯氣脾胃氣虛為陰火傷其生發之氣榮血大虧血減則心無所養致令心滿而煩病名曰怔忡門上聲故加甘辛微溫之劑生陽氣伸景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血更以當歸和之少加黃柏以救腎水瀉陰中伏火如煩猶不止少加生地補腎水木旺則心火自降李士材曰虛人感日不任發散者此方可以代之東垣曰肌熱者表熱也服此湯一二服得微汗則已非正發汗乃陰陽氣和自然汗出也準繩曰凡四時傷寒通宜補散故升陽治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君子加發散藥血虛者四物湯加發散藥東垣治風濕無汗者用神木湯有汗者用白木湯治剛瘧神木湯加羌活麻黃治柔瘧白木湯加

李氏醫鑑

卷之九

理氣

四

謂辛苦之人觸胃之病傷寒是也明醫雜著云發熱有數種治各不同仲景論傷寒傷風此外感也故宜發表以解之此麻黃桂枝之義也感于寒冷之月即時發病故用辛熱以勝寒如春溫之月則當變以辛涼之藥夏暑之月則當變以甘苦寒之劑又有冬溫此天時不正陽氣又泄用藥不可溫熱又有瘟疫沿門閭閻相似者此天地之瘴氣當隨時令參氣運而治宜辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒若夫飲食勞倦為內傷元氣則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足也又有勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變為火是謂陰虛火旺勞瘵之症故升陽發陽有餘陰不足之論用四物加黃柏知母補其陰而火自降此用血藥以補血之不足者也又有夏月傷暑之病雖屬外感却類內傷東垣所謂清暑益氣是也又有因暑熱而過食冷物以傷其內或過取風涼以傷其外此則非暑傷人乃因暑而致之病治宜辛熱解表辛溫理中

之藥却與傷寒治法相類者也。外感之與內傷，寒病之與熱病，氣虛之與血虛，如冰炭相反，治之若差，則輕病必重，重病必死矣。醫者讀此書而不讀東垣書，則內傷不明，而殺人多矣。東垣脾胃論，深明飢飽勞傷，發熱等症，俱是內傷。悉類傷寒，易見。汗下以內傷多，而外感少，只須溫補，不必發散。如外感多，內傷少，溫補中帶加發散，以補中益氣為主。如內傷兼寒者，加麻黃、桂枝、羌活、獨活，以助陽氣。黃連、黃芩、知母、石膏，加羌活、獨活，此東垣特發陽虛發熱之一門也。然陰虛發熱者，十之六七，亦類傷寒。今人一見發熱，則曰傷寒，須用發散，發散而愈，則曰傷寒之法已窮。余嘗于陰虛發熱者，見其大熱而赤，口渴煩躁，與六味地黃湯一大利，即愈。如下部惡寒足冷，上部渴甚，躁極，或飲而反吐，即加肉桂五味，甚則加附子，令飲以此活人。多矣。此丹溪發明陰虛發熱之旨也。本方除當歸、白朮、木香、蒼朮，名謂中益氣湯，治脾胃不調，胸滿肢倦，食少短氣，口不

李氏醫鑑

卷之九

理氣

五

知味心知和則及食入反出，本方加白芍五味子，亦名調中

益氣湯東垣治氣虛多汗，餘治同前。補中湯純用甘溫所謂

加白芍五味之酸，以收耗散之氣，有發有收。此東垣別開一路，以廣補中之妙者乎。本方加蒼朮倍

分半夏黃芩，益智各三分，名參朮益胃湯。東垣治內傷勞倦

燥熱短氣，口渴無味，大便溏黃。本方去白朮，加草薢，神曲

半夏黃柏，名升陽順氣湯。治飲食勞倦，所傷滿悶，短氣不

思食，不知味，時惡寒。吳鶴皋曰：升柴辛甘升其清，清升則

陰氣順矣。參耆甘草當歸補其虛，虛補則正氣順矣。半夏陳皮利其膈，膈利則痰氣順矣。豆蔻神曲消其食，食消則

穀氣順矣。東垣曰：升麻柴胡味薄性陽，引脾胃清氣行于陽道，以滋春氣之和。又引參耆甘草上行，充實脾胃，使衛

外為固，凡補脾胃之藥，多以升陽補氣名之者，此也。又曰：但言補之，以辛甘溫熱之劑，及味之薄者，諸藥是也。此助春夏之升浮者也。此便是瀉秋收冬藏之藥也。在人此助秋冬之沉降者也。諸加減主治方散入各門。此方在人一身之身是肺腎也。諸加減主治方散入各門。此方原為感症中有內傷一種，故立此方，以補傷寒書之所本及非補虛方也。今感症家多不敢用，而以為調理補虛服食之藥，則誤矣。調理補虛，乃通其義而轉用者耳。

本草備要主治註釋末附短氣論

黃耆補肺氣 甘草補三焦 人參大補肺 沙參專補肺氣 白朮補氣

黃精補中 薏苡補中 狗脊溫養 石斛清元 志肉壯氣 五味子補氣

柴胡能引清氣上行 升麻能升陽氣于至陰之下 茯苓寧心 枸杞益氣

李氏醫鑑

卷之九

理氣

六

益氣補血而 天麻益氣 連翹散諸經 蘇葉下氣 同

益智補氣 白茅根補中 大棗補中 白果溫肺 胡桃補氣 茅薢溫中

益氣補氣 天冬補氣 麥冬補氣 雞蘇補氣 醋補氣 旋覆花補氣 烏藥補氣

胡椒補氣 郁李仁補氣 桑白皮補氣 紫苑補氣 白欬補氣 沒藥補氣

志肉同 麥芽補氣 葱通上下 薑子補氣 薤白補氣 厚朴補氣

同陳皮補氣 橘紅補氣 茯苓補氣 砂仁補氣 白豆蔻補氣 散

肉蔻補氣 草薢補氣 百合補氣 山藥補氣 羊肉補氣 牛肉補氣

阿膠補氣 紫河車補氣 薑香補氣 甘松補氣 華菱補氣

氣補氣 納氣補氣 紫河車補氣 薑香補氣 甘松補氣 華菱補氣

琥珀能使肺氣下大腹皮沉香能降能升上至天下至

傷氣檀香要藥吳茱萸溫中延胡索能行血中氣滯氣中

金亦不損正氣薑黃理血中我木破氣中三稜散氣結功

力桔梗利肺膈癆杏仁降氣利胸陳皮同補藥則補則

青皮破滯削堅山查行氣木瓜氣脫能收枇杷葉降氣

刺火降荔枝核散滯淡豉黑豆均下神曲散香附乃血

中氣藥通行十二經八脉主一切氣人身以氣為主氣盛

逆則病絕則死矣七情之氣香附丹溪曰天行健運不

此理耳時珍曰凡人病則氣滯而飯香附為氣木香三焦

李氏醫鑑卷之九理氣

之藥能升降諸氣肺氣疎肝氣和脾氣時珍曰諸氣附

諸屬子脾中焦氣滯用之者脾喜芳香也大腸氣滯則後

重勝脫氣不化則癰秘肝氣鬱則為痛下焦氣滯用之者

附氣短論金匱云平人無寒熱氣短不足以息者實也又云

肺痛而短氣大吐下之二十日吐膿痰一桶而安傷寒

病短氣氣促不能相接與喘不同有實有虛有表有裏此

為水停心下亦令短氣水氣內漬所傳不一故有或為之

症初發曰傷寒失于汗下而短氣為實汗下後短氣者為

虛虛宜解肌

理血論

人身之中氣為衛血為營經曰營者水穀之精也調和五

藏瀝陳于六府乃能入于脉也生化于脾總統于心藏交

于肝宣布于肺施泄于腎澆灌一身目得之而能視耳得

之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步

藏得之而能液府得之而能氣出入升降濡潤宜通靡不

由此也飲食日滋故能陽生陰長取汁變化而赤為血也

注之于脉充則實少則清生旺則諸經恃此長養衰竭則

百脉由此空虛血盛則形盛血弱則形衰血者難成而易

虧可不謹養乎陰氣一傷諸變立至妄行于上則吐衄妄

行于下則腸風衰涸于內則虛勞枯槁于外則消瘵癰熱

勝則色黑熱勝于陰發為瘡瘍濕熱于血則為癰瘡癰熱

水則色黑熱勝于陰發為瘡瘍濕熱于血則為癰瘡癰熱

也主血正傷其陽則火熾而血凝

李氏醫鑑卷之九理血

四物湯治一切血虛及婦人經病經期先後諸

當歸生地白芍川芎凡血症通宜四物湯如

涼血心加黃連肝條茶肺枯茶大腸實茶膽黃連腎膀胱

黃柏脾生地胃大黃三焦地骨皮心胞絡丹皮小腸山枝

木通如清氣心與胞絡加麥冬肺枳殼肝柴胡青皮脾白

芍胃乾葛石膏大腸三焦連翹小腸赤茯苓膀胱滑石琥

珀血虛加龜板血燥加人乳瘀血加桃仁紅花韭汁童便

行之氣血加薄荷玄參散之血不止加炒蒲黃京墨久不

止加升麻引血歸經婦人經血紫黑脉數為熱加芩連血



淡豚運為寒加桂附人肥有痰加半夏南星橘紅人瘦有  
火加黑枝知母黃柏轉者加木香砂仁蒼木神曲瘀滯加  
桃仁紅花延胡肉桂氣虛加參耆氣實加枳朴

此手少陰足太陰厥陰藥也

心生血脾統血肝藏血

當歸辛苦甘溫

入心脾生血為君生地甘寒入心腎滋血為臣白芍酸寒

入肝脾欽陰為佐川芎辛溫通上下而行血中之氣為使

也川芎入厥陰心包肝經上行頭目下行血海血海衝脉

也玉機微義曰川芎血中之氣藥也通肝經性味辛散

能行血滯于氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能

生真陰之虛也當歸血中主藥也通肝經性味辛溫分三

治全用活血各歸其經也芍藥陰分藥也通肝經性味酸

寒能和血活血虛腹痛也此特血病而求血藥之屬者也

李氏醫鑑

卷之九

理血

九

若氣虛血弱又當從長沙血虛以人參補之陽旺則能生  
陰血也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木丹皮血竭血滯者所  
宜蒲黃阿膠地榆百草霜桐灰者血虛所宜乳香沒藥五  
牛膝枸杞龜板夏枯草益母草者血虛所宜乳香沒藥五  
靈脂沒藥花者血痛所宜乳香沒藥五靈脂沒藥花者  
血寒所宜苦參生地汁血熱所宜芍藥能解類而長可應無  
窮之變矣丹溪治陰虛發熱于血藥四物湯亦分陰陽血  
之動者為陽芍藥主之血之靜者為陰地黃主之血之陰  
不足雖芍藥辛溫亦不用血之陽不足雖地黃辛寒亦用  
之與瀉火之法正治從治相同吳鶴皋曰天地之道陽常  
有餘陰常不足人身亦然故血者難成而易虧大草木無  
情安能生血以地黃能養五臟之陰芍藥能調營中之氣  
陰陽調和而血自生耳若夫失血太多氣息幾微之際慎  
勿與之蓋四物陰類非所以生血者也當重用參耆以固  
欲絕之氣故曰脫血者先益其氣否則川芎香寬反能耗  
氣氣血雙亡而死矣故凡虛損胃虛氣弱之人皆不宜多  
服或問四物湯是女門諸藥于內亦有脾胃藥乎一陽子  
曰四物湯隱隱脾胃治法人味久矣脾經少血多氣當歸地

黃生血滋潤脾經土畏賊邪下來剋土芍藥能瀉水補脾  
肝欲散用川芎之辛以散之非制木補土調胃之藥乎或  
曰產後禁用川芎否曰新產血氣未平恐芍藥酸收作痛  
耳芍藥端治血虛氣痛新產正血虛氣痛之時醇酒微炒  
用之何害又血塊凝滯作禍不可泥于產後大補氣血放  
膽下之用玉燭散無妨推陳致新亦是補法只因產後大  
補氣血一語致積血而煩者多矣○附子和玉燭散歸尾  
生地川芎赤芍大黃黃芩甘草治經閉腹痛體瘦善飢取  
爾雅四時和氣謂  
之玉燭之義也

本方加黃柏知母名知柏四物湯再加玄參名滋陰降火

湯治陰虛有火知柏四物蜜丸名坎離丸治陰虛嗽血此

詳論入勞瘵門并勞瘵忌本方加羌活防風一用名合湯

用四物知柏亦入本門治風虛眩運風秘便難蜜丸名補肝丸

肝以散為補也

本方加木

李氏醫鑑

卷之九

理血

十

香檀郎名治氣六合湯治血虛氣滯或血氣上衝本方四  
物各七錢加防風一兩枝子黃芩黃連各三錢每服五錢  
如脉實加大黃名生地黃連湯治婦人血風症去血過  
多因而燥渴循衣摸床撮空閉口揚手擲足錯語失神脉  
弦浮而虛男子去血過多亦有此症陶節菴曰大承氣湯  
也自內而之外者用之氣血合病循衣摸床症同自氣之  
血血而復之氣者大承氣湯下之自血之氣氣而復之血  
者生地黃連湯主之二者俱不大便是承氣湯對子又  
與三黃石膏湯相表裏是皆三焦包絡虛火之病也病既  
危急只得以此降血中之伏火耳綱目曰四物與桂枝麻  
黃白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆可作各半湯  
此易老用  
藥大畧也



治傷於勞役肌熱面赤煩渴引飲脉大而

虛血實則身涼血虛則身熱此以飢飽勞役傷其陰血虛陽獨勝故肌熱煩渴與陽明白虎症無異但白虎症得

之外感實熱內盛故脉大而長按之有力此症得之內傷血虛發熱脉洪大而無力內經所謂血虛脉虛是也悞服白虎湯

黃耆兩 當歸二錢 酒洗  
空心服

此足大陰厥陰藥也。當歸氣味俱厚，爲陰中之陰，故能滋陰養血。黃耆乃補氣之藥，何以五倍于當歸？而又云補血。湯子益有形之血，生于無形之氣，又有當歸爲引，則從之而生血矣。經曰：陽生則陰長，此其義耳。切菴曰：病本于勞，役不衡傷血而亦傷氣，故以二藥並補之也。

思慮過度勞傷心脾怔忡健忘驚悸盜汗

理血。

發熱體倦食少不眠或脾虛不能攝血致血妄行及婦人

經帶心藏神而生血。心傷則不能生血。而血少。脾主思而藏血。脾傷則血不能歸脾。脾不能統血。則妄行。故致諸症。諸計

人參  
白朮炒  
茯神  
棗仁炒  
龍眼肉二錢  
黃耆炙錢半  
當歸

木香 甘草 姜棗煎

木香草甘溫以補脾茯神龍眼志棗以補心  
志肉苦澁心熱棗仁

本香行氣舒脾既以行血中之滯又以助參耆而補

氣壯則能統血血自歸經而

諸症悉除矣

血腎貫心主血脾統血肝藏血凡治血症須按三經用藥志肉棗仁補肝以生心火茯神補心以生脾土參耆甘

草補脾以固肺氣木香香  
先入脾總欲使血歸脾耳

參養榮湯 見証  
治脾肺氣虛榮血不足驚悸健忘寢汗

發熱食少無味身倦肌瘦色枯氣短毛髮脫落小便赤澀

經曰脾氣散精上輸于肺此脾氣上升也肺主治節通調水道下輸膀胱此天氣下降也脾肺虛則上下不交而爲

血無所藉以生。脾虛故氣短。肺虛故食少。心主脉。脉

皮毛腠理肌肉血虛火盛亦治發汗過多身振脉搖筋惕

汗爲心液汗卽血也發汗過多則血液枯

此手少陰足太陰氣血藥也五藏交養互益能統治諸病

卷之九

11

薛立齋曰。氣血兩虛。而變現諸症。莫能名狀。勿論其病。勿

而此肺虛候也養榮原不及肺謂菴曰肺主氣凡補氣藥

理實一貫古方補血湯黃耆五倍丁當歸而云補血非明

手。見五藏互相滋潤。傳精布化。榮不及于肺也哉。如生脉散保

肺華也而云生脉者脉即血也

本門諸大能入各別門類

草備要統治諸血王

當歸 衄血 淋瀝 公血 日餘 羣注 房勞 勞熱 咽乾 一氣 淋瀝 淋瀝 頭痛 腰痛 心腹 諸痛 衝脉 爲病 氣逆 裏急 帶下

陰虛而陽無所附者四物湯用之爲君治血之總劑血虛

屬陰。四物能養陰。陰得其養。則血自生。非四物能生血也。

李氏醫鑑

卷之九

理血

主

若氣虛血弱之人當用人參取陽旺生陰血之義多有過服四物陰滯之藥而反致害者使血氣各有所歸故名血分使氣調而血和也。○四物湯用川芎者特取其辛溫而能行血藥之滯耳豈真用此辛散之味以養下元之血哉。○故籍其相濟川芎行氣搜風補血潤燥散瘀調經止痛上以生血也。川芎行頭目下行血海治頭暈腹氣鬱血鬱諸痛濕瀉血痢寒痺筋攣乾生地補陰血治虛發熱吐血尿血運通肝中折跌絕筋填骨髓養肌肉利大小便調經安胎又能殺蟲治心腹急痛本草謂口丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也。○不知血藥屬陰其性凝滯若胃虛氣弱之人過服歸地等劑反致痞悶飲食減少痰症百出至死不可不悟。○豈不惜哉。大抵血虛固不可專補其氣而氣虛亦不可遂補其血也。凡勞病陽虛宜四君補氣陰虛宜四物補血。陰陽俱虛者宜白及補肺性清而收得秋金之令入合用名八珍湯。肺止吐血。樹玄云試血法吐水內

李氏醫鑑

卷之九

理血

主

子為滋補良劑氣血太和諸病不生。七寶美髯丹以之為君。已鉄器丹皮為伏火而補血。中伏火已升故入血分時珍曰伏火即陰火也。陰火即相火也。世人常以黃柏治相火不知丹皮之功更勝。和血涼血而生血。破積血通經脈為吐衄必用之藥。又治神志不足內經云水之精為志故腎氣志火之兩為神。故心藏神。續斷補肝腎理筋骨通血脈而理傷損。上傷中琥珀足厥陰血分消。栝子仁益側栝葉補陰止血養陰。肺而燥。肺血破瘀結。栝子仁益側栝葉補陰止血養陰。肺而燥。一切吐血。崩漏肉桂入肝腎血分。桂心活血化汗。化膿地骨皮為熱涼血退有汗之骨蒸補正。防風治血。防風為上部之使地榆蘇木多破血。紅花入肝經而破瘀血。活血瘀。吐紫黑血者吐出為好。吐未盡加桃仁紅花行之。茜根血大抵鮮血宜止。瘀血宜行。少用養血多用則行血。

<p><b>和降真香</b> 治一切血虛乾枯 牛膝 散惡血 木賊 治諸血</p> <p><b>王不留行</b> 走血通脈 乃陽明衝任之 早蓮草 補腎止</p> <p><b>甘大麻仁</b> 破積 赤石脂 花乳石 能化血 禹餘糧 血分重</p> <p>李先知 下焦血虛 人難食 代煎石 寒熱血氣除 固</p> <p>須用 餘血 赤石脂 又治 崩漏 代煎石 寒熱血氣除 固</p> <p>治 經血 崩漏 白礬 止痛 食鹽 煎血 兒茶 蔓荊子 血</p> <p><b>五靈脂</b> 入肝經 通利血脈 散 犀角 治吐血 齒痛 五</p> <p><b>倍子</b> 止血 枝子 止血 厚朴 破宿 五加皮 皮 椿樗皮</p> <p>入血分而清血病 山茶花 治諸血 可 棕 燒黑與炭同 乾</p> <p>不足者宜 椿皮 山茶花 代煎石 服治久血不止 乾</p> <p><b>漆</b> 破日久凝結之瘀 桃仁 治熱入血室 血燥血痛 皮膚血</p> <p>血能化瘀 瘀血為水 桃仁 熱燥癢 諸血如狂 并損傷 瘀血</p>	<p><b>李氏醫鑑</b> 卷之九 理血</p> <p>及夜 山查 散瘀 荷葉 涼血 散血 去瘀血 留 香附 得歸地 蚊</p> <p>凡血在 藏府 絡者 逐攻下 蓋食血 瓜蒌子 服止血</p> <p>治一切血症 龜甲 補新 自然銅 消瘀 骨碎補 能破血 止血</p> <p>寒降火也 龜甲 補新 自然銅 消瘀 骨碎補 能破血 止血</p> <p>治折 海螵蛸 治血 紫石英 甘辛性溫 而補重 以去怯 濕以</p> <p>肝血不足 用此 紫草 涼血 凌香花 伏火破血 去瘀 延胡</p> <p>重鎮心 滿補肝 第一 大小 刺 破血下氣 行而帶止 吐</p> <p>索 為活血 利氣 第一 大小 刺 破血下氣 行而帶止 吐</p> <p>入下焦 蒲黃 生用 行血 消瘀 療打損傷 妙 卷栢 生用 破</p> <p>除而 熱 蒲黃 生用 行血 消瘀 療打損傷 妙 卷栢 生用 破</p> <p>灸用 止血 蓮子 治一切 藕節 治一切血病 和地 菴蘭子</p> <p>腸腹 收脫 蓮子 治一切 藕節 治一切血病 和地 菴蘭子</p> <p>行血 散結 散中有 白茅根 清瘀血 開發寒熱 治吐 切</p> <p>痛 閃挫 氣痛 折傷 白茅根 清瘀血 開發寒熱 治吐 切</p>
--	---

<p>人以微而忽之 惟事苦寒之 鬱金 下氣破血 治嘔血吐血</p> <p>刺傷 冲和之氣 烏足知此 鬱金 下氣破血 治嘔血吐血</p> <p><b>姜黃</b> 下氣破血 莪朮 破氣中之血 三稜 破血中之氣</p> <p><b>荆芥</b> 炒黑止下焦血 用山枝 乾地榆 滿黃</p> <p>李士材 曰 若血受病 亦先調氣 謂氣不調則血不行 氣諸</p> <p>血虛 見各門 惟汗孔 出血 謂之肌 心與肝也 又驚而動</p> <p>動血 者 屬心 心動 血者 屬肝 肝動 血者 屬腎</p> <p>屬肺 思而動 血者 屬脾 勞而動 血者 屬腎</p> <p><b>用藥加減約畧</b> 合前補中益氣湯後 註解</p> <p>時珍 曰 枳殼 湯治 胸中痞滿 下氣 取其通肺利膈下氣也</p> <p>甘桔湯 通治 咽喉 口舌 諸病 取其辛苦 散寒 甘平 除熱也</p> <p>宋仁宗 加 荆芥 防風 連翹 逐名 如聖 湯王好古 加 枳殼</p> <p>頗詳 失血 加 訶子 辟不出 加 半夏 上氣 加 陳皮 涎嗽 加 知</p> <p>母貝 咳 湯加 五味 酒毒 加 葛根 少氣 加 人參 嘔 加 半</p> <p>生 姜 吐 膿 血 加 紫 菀 肺 癆 加 阿膠 胸 膈 不 利 加 枳 殼 心 胸</p>	<p><b>李氏醫鑑</b> 卷之九 加減</p> <p>症滿 加 枳實 日 赤 加 枝子 大黃 面腫 加 茯苓 膚痛 加 黃耆</p> <p>發 斑 加 荊防 疫毒 加 牛勞子 大黃 不得 眠 加 枝子 訶菴 日</p> <p>觀 海 藏 所 加 則 用 藥</p> <p>之 大 較 亦 可 議 矣</p> <p><b>彼此相濟主治約畧</b></p> <p><b>紫蘇</b> 味辛 入氣分 色紫 入血分 香溫 散寒 通心 利肺 開胃</p> <p>安胎 利大小 腸 解魚 蟹 毒 多 服 泄 人 真 氣 同 陳 皮 砂 仁 行</p> <p>氣 安胎 同 養 香 烏 藥 溫 中 止 痛 同 香 附 麻 黃 發 汗 解 肌 同</p> <p>川 芎 當 歸 和 血 散 血 同 桔 梗 枳 殼 利 膈 寬 腸 同 荷 子 黃 芩</p> <p>杏 仁 清 痰 定 喘 同 木 瓜 厚 朴 散 瘀 解 暑 治 霍 亂 腳 氣 黃 芩</p> <p>瀉 中 焦 實 火 除 脾 家 濕 熱 往 來 寒 熱 腹 痛 消 痰 酒 後 則 上</p> <p>行 瀉 肺 火 利 胸 中 氣 治 上 焦 之 熱 熱 熱 天 氣 喉 咽 目 赤</p> <p>腫 痛 等 症 得 紫 胡 退 寒 熱 得 白 芍 治 下 痢 得 厚 日 砂 仁 辛</p> <p>黃 連 止 瀉 痢 得 桑 皮 瀉 肺 火 得 白 木 安 胎 之 聖 藥 溫 香</p> <p>香 宜 補 肺 滋 腎 和 胃 醒 脾 快 氣 調 中 通 行 結 滯 得 檀 香 溫</p> <p>寇 入 肺 行 人 參 益 智 入 脾 得 黃 耆 益 冬 入 腎 得 赤 石 脂 水</p>
--	---

七

凡陰症因寒附藥宜冷服熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰益其治之以熱則拒格不納用熱藥冷飲下嚥之後令體既消熱性便發情且不違而致大益此反治之妙也又有寒藥熱飲治熱症者此寒因熱用義亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒此正治也以寒治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所主而先其所用是也故亦曰從治

冷者調去火氣煎湯細細吸之可以小

試陳永飲若倉庫未固不宜驟貯米穀往往食早者多不可按食此理此法不但施之調劑新愈之後凡病新愈後皆宜如此調理漸次飲食至于羣腥等物愈宜緩進若用之早不惟無益而且反復難健

六君子湯 為病後調理助脾進食之劑

八參 白朮 茯苓 甘草 黃耆 山藥 各二錢 姜三片

聚二枚煎

五皮飲

脾滿

一方五加皮易陳皮羅氏五加皮易桑白皮

治病後脾肺氣虛而致腫滿

理中丸

祛寒

治大病後喜吐久不了了胃中有微寒宜此

之

李氏醫鑑

卷之九

病後

九

久病後小便數而大便難庸醫認為脾約症妄以麻仁丸投之誤矣升溪曰此因陰血枯槁內火熾灼熱傷元氣又傷于脾而成脾金受火氣無所攝脾為肺子肺耗則液虧金耗則木寡于畏土欲不傷其可得乎肺失傳送脾失轉輸故大便秘而小便數也理宜滋養陰血使火不熾而全化行木有利而脾土運津液乃能入胃腸潤而通矣

導赤各半湯 治傷寒後心下不硬腹中不滿二便如常身

無寒熱漸覺神昏不語或睡中獨語目赤口乾不飲水與

粥則嘔不與勿思形如醉人名越經症 傷寒不戰不滿二

也神昏睡語不思食形如醉人此邪熱傳于少陰心火

上而逼肺也邪熱在陰故不渴此症自足而傳于經故曰

黃連 黃芩 犀角 知母 山枝 滑石 麥冬 人

參 甘草 茯苓 加燈心姜棗煎

竹葉石膏湯

治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐 傷寒解後

津液不足故虛羸少

竹葉 石膏 人參 甘草 麥冬 半夏 粳米 升

虛根湯 治傷寒病後嘔噦不下食 此由初病熱盛時多服

冷氣便發故脾胃虛寒而不和

蘆根 升 竹茹 升 生薑 兩 粳米 合

蘆根甘寒降伏火利小水竹茹甘寒除胃熱清燥金生薑辛溫祛寒散逆氣三者皆能和胃胃和則嘔止加梗米

者亦藉以

李氏醫鑑

卷之九

病後

手

枝子大黃湯 變現 治傷寒食復

枳實枝子湯 治傷寒勞復

參苓白朮散 治久瀉及大病後助後調理消渴者尤宜

人參 淮藥 蓮肉 白扁豆 白朮 二 桔梗

妙黃 砂仁 白茯苓 苡仁 炙甘草 各一斤半

白扁豆 砂仁 白茯苓 苡仁 炙甘草 各一斤半

白扁豆 砂仁 白茯苓 苡仁 炙甘草 各一斤半

諸積 酒釐氣釐血釐

經曰大積大聚其可犯也其大半而止過者死東垣五積方用三枚我水皆兼人參贊助成功所以治瘵不宜

用下藥恐損真氣宜于破血行氣藥中加補脾藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也切菴藥治積諸藥神曲麥芽化穀食積下化麵食砂仁阿魏山查黃連化肉食紫蘇化魚蟹積花柳根根消積香酒積積子積牽牛花行水飲三稜莪朮木鱉甲消癥瘕木香檳榔行氣破石粉攻痰積巴豆攻冷積雄黃粉攻涎積重虫水蛭破血積諸酒入血入于酒為酒毒多氣入血入于氣為氣鬱虛勞人敗血難療為血瘀如虫之行上段人咽下他人肝或附脇或或隱胸腹惟用蕪荑炒兼緩胃理氣之藥乃可殺之切菴曰積久成形謂之積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或痰或食聚多是氣傷肉食輕者宜山查黃連黃連重者宜礬紅棗肉為丸服二錢不可過終身忌蕎麥傷麵食宜炒

礬砂丸

一切積聚

治一切積聚痰飲心脇引痛

礬砂 巴豆 三稜 干姜 白芷 木香 青皮 胡椒 大黃 乾漆 檳榔 肉豆蔻 為末醋醋

李氏醫鑑

卷之九

諸積

三

二升煮巴豆五七沸再下三稜大黃末同煎五七沸入礬砂熬成膏和諸藥杵丸菜豆大每五粒姜湯下

此治肉積氣積血積通劑也礬砂化肉食性大熱能爛五金本草言其能化人心為血故治癰瘡癥瘕肉積有殊功乾漆散瘀血木香青皮行滯氣三稜破沉寒銅冷大黃巴豆能斬關奪門方內多辛熱有毒之品用之以破冷攻堅惟大黃苦寒假之以湯熱去其毒蓋積聚既深攻治不得不峻用醋者酸以收之也王機微義曰方中因白芷散水行氣故更言治痰飲也山查古曰壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時有感皆能成積若連以磨堅破結之藥治之積去而人己衰矣乾漆破血三稜大黃牽牛之類得藥則暫快藥過則傷氣血積自消如滿座皆君臣哉故善治者當先補虛使氣血旺積自消如滿座皆君臣則小人自無容地也不問何積先調其中使能飲食是

感應丸

世為

治新舊冷積

倒倉法

用壯黃牛肉二十斤洗淨煮為糜濾去渣熬成琥珀色煎一晚不食至日空腹坐空室取汁每飲一鍾少時又飲積數十鍾身覺覺痛如病在上則吐在下則利在中則吐而利後必瀉即飲已瀉數碗以漸餘垢飢倦先與米飲二日與米粥次與厚粥軟飯將養一月而沉痾悉安矣須臾房事半年牛肉五年月溪曰生神上黃中色肉胃藥液無形之物也積聚既久回薄腸胃曲折之患豈餘兩丸散所能鏡也予內夜充滿流行無處不到如洪水泛濫一切凝滯皆宜而去矣此方傳于西域里人中年後行一二大亦却疾養壽之一助也王綸曰牛肉補中非以下藥備為奇方也

李氏醫鑑卷之

卷之九

諸積

三

李氏醫鑑卷之十

治法提綱

陰陽寒熱虛實氣血



病在于陰明其陽病在于陽明其陰犯之者是謂誅伐無過病之熱也當察其源火荷實也苦寒鹹寒以折之若其虛也甘寒酸寒以攝之病之寒也亦察其源寒從外也辛熱辛溫以散之動于內也甘溫以益之辛熱辛溫以佐之經曰五藏者藏精氣而不寫者也故曰滿而不能實是有補而無瀉者其常也雖偶受邪則瀉其邪邪盡則止是瀉其邪非瀉臟也臟不受邪母輕犯也世謂肝無補法知其謬也六府者傳導化物糟粕者也故曰實而不能滿邪客之而為病乃可攻也中病乃已母盡劑也病在于經則治其經病流于絡則及其絡經直絡橫相維輔也病從氣分則治其氣虛者溫之實者調之病從血分則治其血虛則補肝補脾補心實則為熱為寒者清之病者行之因症互異宜精別之病在于表母攻其裏病在于裏母虛其表邪之所攻必從之受邪為本現症為標五虛為本五邪為標營夫腹脹由于濕者其來必速當利水除濕則脹自止是標急于本也當先治其標若因脾虛漸成脹滿夜劇晝靜病屬于陰當補脾陰夜靜晝劇病屬于陽當益肺氣是病從本生本急于標也當先治其本舉一為例餘可類推矣病屬于虛宜治以緩虛者精氣奪也若屬沉痾亦必從緩治虛無速法亦無巧法蓋病已沉痾凡欲施治宜有大策故亦無速法病屬于實宜治以急實者邪氣勝也邪不速逐則為害滋蔓故治實無遲法亦有巧法此病機緩急一定之法也

李氏醫鑑

卷之十

治法

臟氣法四時并四氣所傷藥隨所感論

夫四時之氣行乎天地之間人處氣交之中亦必因之而感者其常也春氣升而生夏氣長而散長夏之氣化而更秋氣收而斂冬氣藏而沉人身之氣自然相通是故生者順之長者敷之化者堅之收者肅之藏者固之此藥之應于天者也春溫夏熱元氣外洩陰精不足藥宜養陰秋涼冬寒陽氣潛藏勿輕開通藥宜養陽此藥之因時制用補

李氏醫鑑

卷之十一

藏氣

二

不足以和其氣者也然而一氣之中初中末異一日之內寒煥或殊假令大熱之候人多感暑忽發水泄亦復感寒由先而感則為暑病由後而感則為寒病此藥之因時制宜以合乎權乃變中之常也此時令不齊之所宜審也假令陰虛之人雖當降冬陰精虧竭水既不足不能制火則陽無所依外洩為熱或反汗出藥宜益陰地黃五味酸甲拘杞之屬是矣設從時令快用辛溫勢必立斃假令陽虛之人雖當溫陽氣不足不能外衛其表表虛不任風寒灑淅戰慄思得熱食及御重裘是雖天令之熱亦不足以敵其真陽之虛病屬虛寒藥宜溫補參耆桂附之屬是矣設從時令快用苦寒亦必立斃此藥之舍時從症者也假令霍亂須用黃連滑石以洩之本不利升須用葛根以散之此藥之舍症從時者也從違之際權其輕重耳至于四氣所傷因而致病則各從所由是故經曰春傷于風夏生霍亂秋必痾泄藥宜清暑藿香以除寒熱石膏知母乾薑冬傷于寒春必病溫藥宜溫散麻黃桂枝以散寒邪

制方和劑治療大法論

夫虛實者諸病之根本也補瀉者治療之綱紀也何謂虛五藏六府虛所生病也何謂實五藏六府實所生病也經



寒因寒用通因通用寒因熱用熱因寒用用熱遠熱用

寒遠寒論

經曰寒因寒用者譬夫脾虛中焦作脹腎虛氣不歸元氣上焦逆滿用人參之甘以補元氣五味子之酸以收虛氣則脾得補而脹自消腎得補而氣自歸元上焦清泰而逆滿自平矣通因通用者譬夫傷寒挾熱下利或中有燥屎必用調胃承氣湯下之乃安下利不休得六一散清熱除積而愈皆其義也寒因熱用是藥本寒也而反佐之以熱熱因寒用是藥本熱也而反佐之以寒則無拒格之患故法應熱治所投熱劑僅使中病毋令過焉過則反生熱病矣用寒遠寒義亦同此

天地風氣漸薄人亦因之漸弱用藥消息亦必因之而

變不可執泥古法輕用峻利論

大人在氣交之中其強其弱卒莫逃乎天地之氣明是以上古之人度百歲乃去今則七十稱古稀矣身形長大常過七八尺今則世鮮六尺之軀矣其壽數精神既已漸減則血氣既虧亦應因之漸薄乃天地之風氣使然有非人力所能挽回者又況時下本造衆生識皆見陋五欲熾然難解難遏強喪戕賊日惟不足是疾病業生虛多實少臨症施治多事訓養專防危殆此今日治法之急務也設宜用熱亦當先之以溫病宜用寒亦當先之以清縱有積滯宜前必須先養胃氣氣血者人之所賴以生者也氣血一虧則諸邪輻輳百病橫生世人之疾病十有九虛醫師之藥百無一補寧知用藥之誤則實者虛虛者死是死于藥而非死于疾病也其慎其難屬諸司命臨症之頃宜加戰兢勉之哉毋執已見而輕人命也

通評虛實論

經曰邪氣盛則實精氣奪則虛又曰邪之所奏其氣必虛凡言虛者精氣奪也凡言實者邪氣勝也是故虛則受邪邪者為實法先攻邪邪盡治本邪若未盡勿輕補益犯之者是謂實實精者陰也氣者陽也設被創奪是五臟六腑之陰精陽氣皆虛也宜從其類以補之陰精虛者補陰精陽氣虛者益陽氣一切剋伐攻擊之藥概勿施用犯之者是謂虛虛經曰實實虛虛損不足而益有餘如是者醫殺之耳戒之哉

治陰陽諸虛病皆當以保護胃氣為急論

夫胃氣者即後天元氣也以穀氣為本是故經曰脈有胃氣曰生無胃氣曰死又曰安穀則昌絕穀則亡可見先天之氣縱猶未盡而他氣不至盡傷獨胃氣獨有傷敗以主于絕則絕矣矣穀氣者譬國家之餉道也餉道一絕則萬眾立散胃氣一敗則百藥難施若陰虛若陽虛或中風或中暈乃至瀉利瀉下胎前產後下腫瘡疽瘡疹痧癘驚癇靡不以保護胃氣補養脾氣為先務本所當急也故益陰宜遠苦寒益陽宜陽溫氣祛風勿過燥散消暑毋輕下通瀉利勿加消導瀉下之忌苦硝巴豆牽牛胎前泄瀉之忌當歸產後寒熱之忌芩連枝子丁腫癰疽之未潰忌食歸



癆瘵之不可妄下其他內外諸病應設藥物之書  
凡與胃氣相違者概勿施用投藥之頃宜加三思

### 諸病惟虛與火為難治論

經曰精氣神則虛又曰邪之勝其氣虛者空也無  
也經曰內虛則人難散則百病易起蓋虛者非委  
任賢智安靖休養以生息之末有保其無事也病之重者  
亦猶是已醫非明辨孰能鎮之以靖久而不搖卒成敗合  
散以克復故物之功哉是故經曰不能治其虛安問其餘  
蓋言虛為百病之本宜其首舉以冠諸症也夫火者陽也  
氣也與水為對精者水也水為陰精火為陽氣二物既配名  
曰陰陽和平亦名少火生氣如是則諸病不作矣設不善  
攝養以致陰虧水涸則火偏勝陰不足則陽必奏之是謂  
陽盛陰虛亦曰壯火食氣是知火即氣也氣即火也故仙  
經謂藥即火火即藥一而二而一者也東垣亦曰火藥  
原氣不兩立亦指此也譬諸水性本流木寒過極則凝  
不流為層冰矣解則復常非二物也蓋平則為水火既濟  
當斯時也火即真陽之氣矣及其偏也則即陽氣而為火  
也始與原氣不兩立而成乖否之象矣按藏人亦曰莫治  
風莫治燥治得火時風燥了言苟能解此則已達陰陽水  
火之原曲暢旁通何施不可正指火之變態多端其為病  
也非一了此則餘皆可辨然學者非心領神會詎足喻于  
乎

### 陽常有餘陰常不足藥必因之以為損益誤則殺人論

人身之有陰陽也水一而火二焉是稟受之始陽常  
有餘陰常不足天地且然況于人乎故自少至老所生疾  
病靡不由于真陰不足者其恒也若夫真陽不足之病千  
百而一二矣陽者氣也火也神也陰者血也水也情也陰  
陽和乎氣血均調是為平人氣血之常候苟失所養或縱  
恣房室或肆情喜怒或嗜犯陰陽或嗜好辛熱以致腎水  
真陰不足不能配陽火運使陽氣有餘餘即致腎水  
故火愈盛而水愈涸于是發為吐血咳嗽吐痰內熱骨蒸  
盜汗種種陰虛等病醫師不察不揆其本凡見前症不分  
陰陽類施溫補參耆二水視同食物佐以姜桂若咳五

倘遇惡劇輒投附子于是輕者重重者斃藥相連死而  
不悟良可憫也然使其術得善者不獨醫師之罪亦病者  
不明有以致之耳何則難成易敗者陰也蓋精之藥縱醫  
師選用無差亦必無旦夕之功助陽之藥能使胃氣一動  
暫則飲食如增或陽道與之有似神王醫藉以要功病者  
利其速效彼此因循莫辨真偽由是知陰虛真水不足之病  
十人而九陽盛真火不足之病百不得一醫師之藥補助  
陽火者往往陰虛之病百不得一醫師之藥補助  
多覺無藥可治之反存也予見世醫以此  
傷人者甚眾茲特著其誤以為世戒

### 上盛下虛本于腎水真陰不足論

人身以陰陽兩稱為半偏勝則病此大較也水不足則火  
有餘陰既虧則陽獨盛蓋陰陽之精互藏其宅是陰中有  
陽陽中有陰也故心火也而含亦液腎水也而藏白氣赤  
液為陰白氣為陽循環往復晝夜不息此常度也苟不知  
攝養縱恣情慾虧損真陰陽無所附因而發越上升此火  
空則發之義是周身之氣併于陽也併于陽則陽盛故上

### 李氏醫錄

卷之十

上盛下虛

六

焦熱而致嗽生痰迫血上行而為吐衄為煩躁為頭痛  
不得眠為胸膈骨痛為口乾舌苦此其候也陽愈盛則陰  
愈虛陰愈虛則為五心煩熱為潮熱骨蒸為遺精為骨之  
無力為小水短赤升田不接則飲食不化為泄瀉為卒僵  
仆此其候也治之之要當急降氣當益陰精氣降則陽交  
于陰是火下降也精血生即腎陰復是水上升也此既濟  
之象為坎離交也坎離交即是小周天至此  
則陰陽二氣復得其平矣病何自而生哉

### 陰精陽氣補益不同論

經曰形不足溫之以氣人參羊肉黃耆人胞紅鉛之屬是  
矣蓋陽氣也乃可以却沉寒經曰精不足補之以味人乳  
鰵甲地黃黃柏枸杞牛膝天冬之  
屬是矣補陰精也乃可以除伏熱

### 治氣三法藥各不同論

一補氣氣虛宜補之如人參黃耆羊肉小麥糯米之屬是也  
二降氣調氣降氣者即下氣也虛則氣升故法宜降其

之輕者如蘇子補皮麥冬此把草薤根汁甘其重者如  
番降香鬱金與橘之風調和也逆則宜和和則調也其  
藥如木香沉香白豆蔻砂仁香附檀香烏藥之屬○  
三破氣破者損也實則宜破如少壯人暴怒氣聚之類然  
亦可暫不可久其藥如枳實青皮枳殼半之屬溫氣分  
之病不出三陽治之之法及所主之藥皆不可混溫者也  
誤則使病轉劇世多  
不察故表而出之

### 治血之法三各不同論

血虛宜補之虛則發熱內熱治宜甘寒甘平酸寒酸溫以  
養榮血其藥為熟地白芍牛膝炙甘草酸棗仁龍眼肉鹿  
角膠肉蓯蓉甘枸杞  
甘菊花人乳之屬

血熱宜清之涼之熱則為癰腫瘡瘍為鼻衄為齒衄為  
衄血為舌上出血為舌腫為血崩漏為赤淋為月事先期  
熱入血室為赤帶為赤白帶下為眼赤赤痛法宜酸寒苦寒  
涼以除實熱其藥為重便升皮赤芍生地黃芍藥犀角地骨  
李氏醫鑑

大小前黃草黃連山枝大黃青黛天冬玄參刺芥之屬  
血瘀宜通之瘀必發熱發黃作痛及作結塊癰積滋宜辛  
溫辛熱辛平辛寒甘溫以入血運行佐以酸寒乃可較堅  
其藥為當歸紅花桃仁蘇木桂五靈脂蒲黃姜黃鬱金京  
三稜延胡索花蕊石沒藥蟲乾漆自然銅韭汁重便牡  
蠣芒硝之屬蓋血為榮陰也有形可見有色可察有症可  
審者也病既不同藥亦各異治之之  
法要在合宜倘失其宜為屬不淺

### 治吐血三要論

宜降氣不宜降火氣有餘即是火氣降即火降火降則  
氣不上升血隨氣行無滯出上痰之患矣降火必用寒涼  
之劑反傷胃氣胃氣傷則脾不能統血血愈不降歸經矣  
今之療吐血者人患有一則專用寒涼之味如黃芩山  
枝青黛柿餅灰四物湯黃柏知母之類往往傷脾作泄以  
致不救一則專用人參肺熱還傷肺致逆愈甚亦有有用  
而愈者此是氣虛喘嗽氣弱陽不由陰虛火熾所致然亦  
百不一二也宜以白芍藥炙甘草制肝枇杷葉桑門冬

荷榆紅貝母清肝瀉火仁濟藥養脾非藥番降香蘇子下氣  
青蒿歸心山黃柏地骨皮地骨皮補陰清熱酸棗仁白茯苓  
神養心山黃柏地骨皮補陰清熱酸棗仁白茯苓  
補之法非多服藥不効病家試其功醫者張皇無主百  
藥雜試以致殞命悲夫  
宜行血不宜止血血不流經絡者氣逆上壅也夫血得  
熱則行得寒則凝故降氣行血則血循經絡不求其止而  
自止矣止之則血凝血凝必發熱惡食及胸脇痛日就  
痼矣  
宜補肝不宜伐肝經曰五藏者藏精氣而不瀉者也肝  
為將軍之官主藏血吐血者肝失其職也養肝則肝氣平  
而血有所歸伐之則肝不能藏血血愈不止矣

### 腎泄多明黎民所由論

凡人之生二五妙合之頃識神依託是中即攬父精母血  
以為立命之基遂成左右兩腎腎間動氣即道家所謂先天  
祖氣是也藏乎兩腎之中以腎屬水故稱坎宮以平人  
氣象言之此氣至于午一陽生生即漸漸上升歷五寅卯  
李氏醫鑑

已而六陽已極則入離宮于後一陰生即白氣變為赤  
液漸漸降下至坎宮復為白氣晝夜循環升降不息此即  
腎家所謂真陽之火道家所謂若火即先天祖氣歸家所  
寓為相火者是也方此火之自下而上也行過中焦必經  
脾胃則運腐熟水穀蒸精而化精微脾氣散精上歸于  
肺通調水道下輸膀胱氣化而出是謂清升濁降既濟之象  
也苟不慎攝生之道不明正性之理則必務快其心逆于  
生樂憂患以傷心寒熱以傷脾燥以傷肺多慾以傷肝  
多慾以傷腎則真氣漸衰精神日損馴至子午一陽不以  
時生不能上升腐熟水穀則精無由而化實為三陽之候  
陽氣微則不能應候而化物故天黎明而泄其泄亦澀  
名陽微泄是為腎泄亦名大瘕泄昔人以助神九治之予加  
人參蓮肉雞寶奇効蓋人  
參補五藏之陽氣故也

### 少年人陽痿因于失志不宜清陽論

經曰腎為作強之官技巧出焉情與志者也夫志主決  
定心主思維思維則或遷或改決定則一立不移此作強

之官之驗也。若不達則陽氣不舒，陽氣舒即其火也。若夫極盛之火，謂之密器之中，則因其氣促不得發越，則火立死而寒矣。此非真火衰也，乃悶鬱之故也。宜其抑鬱通其志意，則陽氣立舒而病立起矣。

### 痰飲藥宜分治論

大痰之生也，其由非一。其為治也，亦不同。由于陰虛火炎，上迫于肺，肺氣熱則煎熱津液，凝結為痰，是謂陰虛痰。火痰在乎肺而不乎腎。治宜降氣清熱，益陰滋水，法忌辛溫燥熱補氣等藥。由于脾胃寒濕生痰，或兼飲過度，好食油麵豬脂，以致脾氣不利，壅滯為痰，痰厚膠固，其至流于經絡及皮裏膜外，或結為大塊，或成瘰癧，或微夜不眠，或卒爾眩仆，不知人事，或發癲癩，或昔肥今瘦，或呼吸不常，或身重腹脹，不便行走，或泄瀉不止，及成癰瘻種種怪症，皆痰所為。故昔人云：怪病多屬痰。痰病多屬火，有以夫。此病在脾胃，無關肺腎。治宜燥脾行氣，散結軟堅。云云。若泥若寒濕調等藥，及諸厚味，由于風寒鬱閉，然氣在肺，而痰在脾，則喘病亦在肺，治宜驅痰除肺熱藥中加辛熱藥。

### 李氏醫案

### 卷之十

九

溫如麻黃生薑干姜之屬，以散外寒，則藥無格拒之患。法忌滋補酸收等藥，病則不齊，藥亦宜異。利潤利燥及利發散各有攸當，非可混施也。世以痰飲混稱，藥亦混投，殊不知痰之與飲，其由自別，其狀亦殊。痰質稠黏，同粘飲如清水，特其色有異，或青或黃或綠或黑，或如酸漿，或伏于腸胃，或上支胸膈，刺痛難忍，或流于經絡，四肢則關節不利，支飲上攻為心痛，為中脘痛，甚則汗出為嘔吐，酸水苦黃水等種種各異，或發寒熱，不思飲食，及不得眠，皆其候也。此症多因酒後過飲，茶湯則水漿與腸胃飲食濕熱之氣，壅而為飲，或因情抱抑，飲食停滯，不得以時消散，亦能成飲。總之，必由脾胃有濕，或脾胃本虛，又感飲食之濕，則停而不消。此飲之大畧也。治宜燥濕利水，行氣健脾，乃為得也。其藥大都以半夏茯苓為君，佐以猪苓澤瀉，以滲泄之，白朮蒼朮皮以開散之，蘇梗旋覆花以通暢之。東垣五飲中有人參，其旨概可見矣。

### 瘧痢宜從六淫例治論

風寒暑濕燥火，此天之六淫，其邪自外而入，感之而病。蓋其邪之所在，以攻治之。經曰：夏暑于胃，秋必痲痺，乃暑邪為病也。雖有山嵐瘴氣發瘧一症，治猶不同。然其症大都多熱多寒，或熱多寒少，或寒多熱少，或單熱不寒，或單寒不熱，頭疼骨疼，大渴引飲，口苦舌乾，嘔吐不思食，或煩躁不得眠，必用白虎湯二三次，隨症增損，解表以祛暑邪。而後隨症消息，以除其苦。可也。濕下者，俗呼為痢疾，皆緣暑濕與飲食之積滯膠固而成。其症類多，莫急後重數登，固而不便，或發熱口渴，或惡心不思食，何莫非暑之標症也。必用六一散黃連芍藥為主，而後隨其所苦為之增損。傷氣分則調氣益氣，傷血分則行血和血，然未有不先治暑而可獲効者矣。治病必求其本，其斯之謂歟。

病由七情生者，祇應養性怡情，發舒志氣以解之，不宜

### 全仗藥石攻治論

大喜怒憂思悲恐驚七者，皆發于情者也。情即神機，神機不定，無跡可尋，觸境乃發，滯而難通，藥石無知焉。能損其

### 李氏醫案

### 卷之十一

十

妄執縱通其已滯之氣，活其已傷之血，其狀默約綿綿之意，物而不化者，能保無將來復結之病乎。祇宜以識遺識以理遺情，此即心病還將心藥醫之謂也。如是庶可以便得者，通結者化，情與境離，不為所轉，當處寂然，心君泰定，其為累也乎。

傷寒溫疫癰疽瘰癧瘡疾諸病，皆由實邪所發，自裏發

### 出于表者，吉；由表陷入于裏者，凶論

傷寒溫疫初發邪在于表，必頭疼身熱，病偏三陽，即于此時急表散之。冬月即病，宜用辛溫辛熱以汗之，春溫夏熱宜用辛涼辛寒甘寒以汗之，汗後身涼脈靜無所傷，犯病不復作而愈。如投藥滯滯，或病重煩躁不徹之干，致致邪熱內結，病偏三陰，須下乃愈。內虛之人，不勝下藥，多致危殆。又有少陰咽痛等症，則又不宜下，或成狐惑蟲食肛門，種種難治之條，皆失于不早發散故也。瘰癧皆由榮家實熱氣逆所結，急宜涼血活血散結解毒，大劑連進，內耗

夾攻務使消散即勢大毒盛一時不能散盡亦必十清  
八經使潰膿保無大害若失于救治使熱毒內攻其膿必  
壞壞則神人不能救矣痘疹之害多在血熱解于一二日  
內者十全八九若遲則熱毒內攻陷入于裏腸胃當之必  
致大便泄乳食不化或神昏悶亂便秘腹脹則十不救  
一除是稟受虛寒方堪前托濟以溫熱可救危急若夫寒  
家便須速用辛寒甘寒苦寒之劑清涼散十不失一假  
令病重藥輕或治療後期或誤投溫熱則邪熱內攻煩躁  
悶亂不可救藥 瘧本暑邪法當解肌若元氣先虛之人  
脾胃薄弱候投破氣消食克伐之藥則中氣愈虛邪反內  
陷必便膿血治或失宜多成腹脹馴至不救往往而是此  
之四症皆須急治要以自裏達表者吉自表陷裏者凶故  
藥宜解散通利最忌收瀉破氣及諸溫補其開乎死  
生者最大故特表而出之俾世人知所先務也

### 五運六氣之謬論

原夫五運六氣之說其起于漢魏之後乎何者張仲景  
末人也其書不載也華元化三國人也其書亦不載也  
之則越人無其文後之則叔和鮮其說予是以知其為後  
世所撰無益于治療而有誤乎後學學者宜深辨之予見  
今之醫家學無源本不明所自侈口而談莫不動云五運  
六氣將以施之治病譬之指算法之精微謂事物之實有  
豈不謬哉不知五運六氣者虛位也歲有是氣至則算無  
是氣至則不第既無其氣焉得有其藥乎一言可竟矣其  
云必先歲氣者譬夫此年忽多淫雨民病多濕藥宜類用  
二木苦溫以燥之佐以風藥如防風羌活升麻葛根之屬  
風能勝濕故也此必先歲氣之謂也其云母伐天和者即  
春夏禁服用麻黃桂枝秋冬禁服用石膏知母麥連芍藥之類  
即春夏養陰秋冬養陽之義耳乃所以遵養天和之道也  
昔人謂不明五運六氣檢偏方書何濟者正指後人愚索  
不明五運六氣之所以而誤千方冊之所載依而用之動  
輒成過即雖檢偏方書亦何益哉予少檢素問中載有是  
說既長游于四方見天下醫士學士大夫在在說談其義  
于時心竊疑之又見性理所載元儒輩盛吳氏于天之氣  
運之中亦備載之予益自信其為天運氣數之法而非醫  
家治病之書也後從岐邑見趙少宰家藏宋板仲景集

論其非不善板始終詳後並未嘗載有是說六經治法之  
中亦並無一字及之予乃諦信予見之不謬而所為非治  
傷寒外感之說予嘗遵仲景法治一切外邪為病靡不  
應乃信非仲景之言不可為萬世法程羅學混溫疑誤後  
人故特表而出之俾  
來學知所決擇

續補傷寒并雜方說

前編主治古方俱已備載各門所有散列傷寒卷內如變現祛寒發表表裏和解祛風中風時行瘧症等類諸方與石山汪先生傷寒大綱並集於後以便稽覽至於前卷間有只載主治方名未及藥味者如六味地黃湯逍遙散補中益氣小柴胡二陳湯之類靡不習見習聞即令未及見聞他本可考不必規又於此也

新安理田詒安堂昌期氏書



續雜方目錄

犀角地黃湯	<small>吐衄諸血詳論</small>	加味犀角地黃湯
人參敗毒散	<small>表散室用人參詳論</small>	牛黃丸
<small>詳論</small>		
清胃散	<small>原列口齒門遺誤今補出</small>	黃耆湯
訶子清音湯		枳實導滯丸
十棗湯		龍膽瀉肝湯
四逆湯	<small>四逆者四肢厥逆也○方載傷寒卷內</small>	吳茱萸湯
烏藥順氣散		紫雪
九味羌活湯	<small>見後傷寒卷內</small>	五積散
代類旋覆湯		小建中湯
調胃承氣湯	<small>方見後傷寒卷內</small>	五苓散
麻黃湯	<small>見後傷寒卷內</small>	黃芩湯
桂枝白虎湯		理中湯
消風散		茵陳丸
神水散		青州白丸子
三黃石膏湯		金匱風引湯
搜風順氣丸		
時氣瘟疫	天災流行	補方目錄畢

犀角地黄湯 并解論 治傷寒胃火熱盛吐血衄血嗽血便

血蓄血如狂等症。

生地黃 兩半 白芍 兩一 丹皮 犀角 二錢半角尖尤良其精氣盡在是也

每服五錢熱甚如狂者加黃芩一兩因怒致血者加枝子

柴胡 黃芩瀉上中二焦之火枝子瀉三焦之火 節庵加當歸紅花

桔梗陳皮甘草藕汁名加味犀角地黄湯治同 當歸引血歸經藕汁

涼血散瘀桔梗以利上焦陳皮以導中焦紅花以行下焦

此足陽明太陰藥也血屬陰本靜因諸經火逼遂不安其

位而妄行犀角大寒鮮胃熱而清心火芍藥酸寒和陰血

而瀉肝火丹皮苦寒瀉血中之伏火生地大寒涼血而滋

水以其平諸經之僭逆也

海藏曰血分三部藥有重輕犀角地黄湯治上血如吐血

之類抵當湯九治下血如蓄血如狂之類又曰脾不裹血

越而上行實者犀角地黄湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐

血者咸用芍藥王之故知太陰藥也醫賈曰犀角地黄湯

乃衄血之方蓋犀水飲也可以分水可以通天鼻衄之

血從任督而至顛頂入鼻中惟犀角能下入腎水引地黃

滋陰之品由腎脉而上故為對症若陰虛火動吐血與咳

咯者可借用成功若陽虛勞嗽及脾胃虛者皆不宜

朱肱活人書言瘀血入裏吐衄血者犀角地黄湯乃陽明聖

人參敗毒散 詳論解方載

喻嘉言曰傷寒宜用人參其辭不可不明蓋人受外感之

邪必先汗以驅之惟元氣旺者外邪始乘華勢以出若素

弱之人藥雖外行氣從中較輕者半出不出重者反隨元

氣縮入發熱無休矣所以虛弱之體必用人參五七分入

表藥中少助元氣以為驅邪之主使邪氣得藥一湧而出

全非補養衰弱之意也即和解藥中有人參之大力者居

間外邪遇正自不爭而退否則邪氣之縱悍肯聽命和

解耶不知者謂傷寒無補法邪得補而彌熾古方表汗用

五積散參蘇飲敗毒散和解用芍藥胡白虎湯竹葉石膏

等方皆用人參領內邪外出乃得速愈奈何不察邪外感

體虛之人汗之熱不退下之和之熱亦不退大熱呻吟津

液灼盡身如枯柴醫者技窮正為元氣已竭故藥不應手

耳倘元氣未竭先用參三五七分領藥深入驅邪何至

汗和而下不應耶東垣治內傷外感用補中益氣加表藥一

二味熱服而散外邪有功千古傷寒論科從仲景至今明

旨使體虛之人百無一活醫家卑除不用全失相傳宗

而殺人者是與耆耆術歸桂附等藥同行溫補之誤不謂

與羌活獨活柴胡胡川芎半受枳殼枳梗黃芩石膏等

牛黃丸 治風癰迷悶涎潮抽掣

胆星

全蝎

去足

蟬蛻

二錢五分

牛黃

白附子

僵蚕

洗防

風

天麻

半錢五分

麝香

煮棗肉

和水銀

分細研入藥末爲

丸

荆芥

薑湯下

此手少陰足太陰厥陰藥也

牛黃清心解熱開竅利痰天

麻防風南星全蝎辛散之味

僵蚕蟬蛻清化之品白附頭

面之藥之遊風皆能搜肝風而散痰結

麝香開竅水銀劫

痰引以薑芥者亦以逐風而行痰也

認庵曰牛黃丸之方

要在於搜風化痰寧心通竅多用

水麝牛雄金珠犀珀若

中藏者宜之如中府中血脈者反能引風入骨此方藥味

清胃散

原列口齒門

今補于此

生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方加石膏

黃耆湯

黃耆 熟地 白芍 五味子 麥冬

甘草 二 桔梗 一或等分 訶子 加意便服

枳實導滯丸

大黃

枳實

炒黃芩

炒黃連

炒神曲

炒五

白朮

炒茯苓

三

錢

蒸餅爲丸多寡量服

澤瀉

二

十棗湯

芫花

炒

甘遂

大戟

等

大棗

十

先煮棗去滓入前藥末

煎

人服

錢

龍膽草

酒

炒黃芩

炒枝子

酒

澤瀉

木通

車前子

當歸

酒

洗

生地

炒

柴胡

甘草

吳茱萸

一升

人參

三

大棗

十二

生薑

六

烏藥

順氣散

烏藥

橘紅

二

麻黃

節

川芎

白芷

桔梗

枳殼

炒

一

去系

炮姜

甘草

分

加姜葱煎

虛汗者去麻黃加

黃耆

紫雪

黃金

百

寒水石

石膏

玄參

一斤

甘草

炙

角

煎

香

五

丁香

一

煎

升麻

並搗

入前藥汁

林礞

礞石

各二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

中煎

去渣

入後藥

林礞

礞石

各二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

一升

人參

三

大棗

十二

生薑

六

烏藥

順氣散

烏藥

橘紅

二

麻黃

節

川芎

白芷

桔梗

枳殼

炒

一

煎

去系

炮姜

甘草

分

加姜葱煎

虛汗者去麻黃加

黃耆

紫雪

黃金

百

寒水石

石膏

玄參

一斤

甘草

炙

角

煎

香

五

丁香

一

煎

升麻

並搗

入前藥汁

林礞

礞石

各二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

中煎

去渣

入後藥

林礞

礞石

各二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

二斤

吳茱萸

一升

人參

三

大棗

十二

生薑

六

烏藥

順氣散

烏藥

橘紅

二

麻黃

節

川芎

白芷

桔梗

枳殼

炒

一

煎

去系

炮姜

甘草

分

加姜葱煎

虛汗者去麻黃加

黃耆

紫雪

黃金

百

寒水石

石膏

微炭再加辰砂三兩研飛麝香當門子一兩二錢研細合成退火氣冷水調服每一二金無黃本事方

五積散

白芷 陳皮 厚朴六分常歸 川芎 白芍 茯苓 桔梗 枳殼七分 枳實七分 麻黃四分 乾姜 肉桂重表者 甘草用桂枝 三加姜葱煎有汗去蒼朮麻黃氣虛去枳殼桔梗加入參白朮

代梔旋覆湯

旋覆花即金沸草三兩 代類石一人 參一兩 甘草三兩 半夏半升 生薑五兩 大

小建中湯

解服

桂枝 生姜三兩 芍藥六兩 甘草一兩 大棗十二枚 入飴糖一微火

五苓散

猪苓 茯苓 白朮炒十漚 澤瀉一兩六錢 桂半兩 認鹿日雞三錢 服後多飲熱水汗出而愈無惡寒症不可用桂五苓為渴而小便不利者設若不渴則茯苓甘草湯足矣若但

黃芩湯

黃芩三兩 芍藥 甘草二兩 大棗十二枚 去核

桂枝白虎湯

石膏一斤 知母六兩 甘草二兩 梗米六先煮石膏數十沸再投藥米 合熟湯成溫服加桂枝各本方

理中湯

白朮陳壁土 人參 乾薑炮 甘草炙一兩 一本方等分蜜丸各理中丸

消風散

荆芥 陳皮去 厚朴 甘草炙五錢 防風 羌活 藿香 蠶 蟬蛻 川芎 茯苓 人參 為末每服三錢茶酒下

茵陳丸

茵陳 枝子 鱉甲炙 芒硝二兩 大黃五兩 常山 杏仁炒三兩

巴豆

巴豆一兩 去殼五錢 蜜丸梧桐子每服一九或吐或利或汗如不應更服一九不應則以熱湯投之老幼以意加減

神水散

蒼朮二兩 川芎 白芷 羌活 藥本 細辛 炙甘草各一兩

每服四錢加薑葱煎

青州白丸子

白附子

白附子生 南星生 半夏生 水浸生衣川烏去皮臍生 為末

絹袋盛之水擺出粉未盡再搗再擺以盡為度貯磁盆日暴

夜露春五日夏三秋七冬十日晒乾糯米糊丸兼豆大每服



三、黃石膏湯

石膏半兩 黃芩 黃連 黃柏七錢 枝子三十箇 麻黃 淡豉二合

每服一兩薑三片棗二枚細茶一撮煎熱服

金匱風引湯 原撰注已見前卷脚門

搜風順氣丸

大黃酒拌九蒸 晒五兩 大麻仁 郁李仁 山藥酒蒸 山萸肉 車

前干  
牛膝  
酒蒸  
二兩  
菟絲子  
酒洗  
獨活  
防風  
枳櫚  
根

鼓炒 蜜丸 補方畢

集解卷之二

時氣瘟疫 天災流行

四時不正之氣謂之疔氣疔氣熾而反大涼時宮寒而反人  
溫非時而有其氣也冬時傷寒不即病皆至春而變爲溫病  
至夏而發爲熱病夫更宜乎治門則曉傳染相似謂之風疫  
頭痛發熱惡寒無汗邪在表也咳嗽鼻塞聲重風寒兩感發  
表實而氣爲之不利也然傷風寒而咳嗽者其感爲輕溫熱  
時毒感於口鼻傳入陽明邪正交爭陰勝則憎寒陽勝則壯  
熱流於百節則一身盡痛上行頭面則爲腫大名大頭瘟

大無神木散 治感山嵐瘴氣僧寒壯熱一身盡痛頭面腫

大時毒 蒼木 厚朴錢 楠紅錢 甘草錢 藿香 石薑

蒲各一此即平胃散而重用陳皮爲君者也蓋人之一身  
錢半以胃氣爲主胃氣強盛則客和不能入夜治外邪  
必以強胃爲先也加藿香菖蒲取其辛香溫發亦能通和  
而益胃也吳鶴皋曰大無此方但理脾胃而解脾之痰自

新舊名媛傳美細卷之一

在其中不愧爲  
冊溪之師矣

十神湯 感冒門  
治時氣嘔逆風寒兩感頭痛發熱惡寒無汗

咳噎鼻寒聲重  
陽明瘟峻時氣

人參敗毒散 論詳解前 治時氣疫癘嵐瘴鬼疔或聲如蛙鳴

俗名蝦蟆瘟邪氣疔也。本方除人參加黃芩治濕病不惡風寒而濕氣靖已未江蘇大要用。

敗毒散倍入參去前胡獨活服各盡效萬曆己卯大疫用  
本方數效崇禎辛巳壬午大飢大疫道鍾相望汗和藥中

惟加人參者多活此劍餌與荒之偷飲食起居不節致患  
時氣者宜用此法嘉言曰暑濕熱三氣門中推此方爲第

氣合邪勝。當截其氣。立傳。則爲癰。癰。乃中風。月  
辛平。更有人參。大力者。荷正。以祛邪。病者。日服二三劑。使

瘦邪不復留壽不損哉奈何俗  
醫戒去人參固與他方有別耶

普濟消毒飲

治大頭天行初覺憎寒體重次傳頭面腫盛

目不能開上喘咽喉不利口渴舌燥俗云大頭天行親戚

救泰和間多有此者醫以承氣加鹽梔下之稍緩翌日

如故下之又緩終莫能愈漸危為東垣視之曰夫身半

以上入之氣也身半以下地之氣也此邪熱客于心肺之

間上以頭面為腫盛以承氣湯瀉胃中之邪熱是為訣伐

無過病以達至其所為故遂震此方

全活甚眾遂名普濟消毒飲

黃芩酒炒 黃連酒炒 玄參 連翹 板藍根 馬勃

犀角剉碎 薄荷錢 僵蚕 升麻七分 柴胡 桔梗二錢

末湯兩時又服之或密為丸嚥化一方無薄荷有人參三

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

也諸藥各走一經祛風發汗而勝

熱散三陽之邪而能升清者也

蒼朮二兩 川芎 白芷 羌活 藁本 細辛 炙甘草

一兩每服四錢加薑蔥煎

水解散 治天行一二日頭痛壯熱

麻黃四兩 桂心 甘草炙 白芍二兩 大黃 黃芩三兩

天行溫疫熱自內達外與傷寒由表傳裏者不同故雖

一二日之淺可以汗下兼行不必同於傷寒之治法也

小柴胡湯加羌活防風各柴胡羌活湯 治溫疫少陽症

柴胡升麻湯見發表門 治時行瘟疫

九味羌活湯 治感冒四時不正之氣瘟疫熱病

玉屑無憂散治八和辟瘟疫

單參散 治天行瘟疫

破棺千金湯 治天行熱毒垂死

苦參一兩 水與酒各一煎八分重者水醋各半煎服一汗而

時行腫頭經驗方 用井底泥塗一塊俟消後又塗一塊

逍遙散 治溫疫

人參養胃湯治嵐瘴瘟疫

本草備要主治註釋發狂并傷寒

花椒善辟疫故元 桃仁辟邪治發 黃仲疫氣流行雖水經

旦飲椒酒熱如狂中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

中飲此水則不傷

藥	升麻	治時氣	苦參	治溫病	龍胆草	治時氣	大青草	治傷寒
狂	漏蘆	茵陳	花粉	治時疾	葱	治時疾	犀角	羚羊角
猪苓	治傷寒	苦楝子	治傷寒	杏仁	治天行	元參	治傷寒	心
內驚	海金沙	枝子	牙硝	逐砂	治傷寒	熱狂	天熱	利小
水	治時行	瘟咬	又宜	冰	傷寒	陽毒	其	昏迷
白虹	能利水	治瘟病	大熱	狂言	五穀	重	治熱病	人中黃
治天行	竹瀝	白蘚皮	治天行	葛根	生	解	木通	治天
盛之	官行	而邪	不能	容	故	能	療	之
從口	鼻	而入	此藥	辛溫	緩胃	辟惡	散邪	故主之
錢漿水	一大	盞	空	腹	頓服	之	便	臥仰一食
惡心	腹內	如車	鳴	疔	利	病	良	久
藥時	先令	煮漿水	粥	于	井中	懸	看	待
利過	度	即	喫	冷	粥	一	碗	止
								之
								不
								喫
								即
								困
								人
								疔
								音
								鳴
								急
								腹
								中

新安汪石山先生傷寒大綱

傷寒歌訣

婺源昌期李文來輯訂

一曰二日太陽膀胱頭痛體熱腰痛脊強寒則傷營惡寒無汗脈浮而緊麻黃表散風則傷衛有汗惡風脈浮而緩桂枝室宗營衛俱傷宜大青龍二日三日陽明胃經鼻乾目痛身熱倍增脈洪而長不睡惺又有一汗桂枝無汗葛根惡寒弱定大柴○通論三日四日少陽胆腑寒熱往來嘔逆口苦脇痛耳聾脈弦而數小柴胡湯是本經藥胆無出入和解為常只此加減再無他方四日五日傳脾太陰腹滿作瀉口乾脈沉桂枝大黃可與之通腹寒自利附子理中五日六日少陰腎經脈沉口渴湯宜小承沉瀉不渴四逆是稱六日七日厥陰在肝唇青筋急煩滿囊拳脈如不浮建中可安浮緩如瘧各半之間辯經用法又固如是日論經猶恐為末日斃雖多但見表症亦宜汗之日製雖少但見裏症亦宜下之半表半裏即和解之邪之中人初亦無常或入於陰或入於陽有在太陽全不傳者有從太陽即傳陰者有不從陽直中陰經而即病者又曰巡經越經傳者語下表裏及得度者合病併病兩感等名非常其道寧造其精三陽脈浮則當汗瘥不浮不

沉法室和鮮三陰脈沉有無力分有力室下無力室溫汗下  
溫涼俱非細放苟或一差變症繼至病若少愈室慎起居食  
復勞復安可忽諸所謂傷寒得之冬月故仲景方爲冬月設  
非冬寒時法當有變四時傷寒世俗之見非時感冒致用辛  
涼九味羌活小柴胡湯葛根敗毒竹葉等湯

主治方

麻黃湯

麻黃湯內用桂枝 杏仁甘草四般兒  
發熱惡寒身體痛 須知一服汗淋漓

麻黃錢六 桂枝錢四 甘草錢三 杏仁二十

加葱五 薑三 水煎服  
桂枝湯內藥四般 芍藥甘草一處橫  
若把二方合室用 方名各半治傷寒

桂枝湯

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 桂枝 芍藥 甘草 杏仁

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 桂枝 芍藥 甘草 杏仁

水煎服取微汗爲度  
大青龍湯不用猪 麻黃湯中用石膏  
風寒俱盛如煩躁 須教服此汗消又

麻黃 桂枝 甘草 杏仁 石膏 加薑棗水煎服

升麻葛根湯

升麻葛根湯四味 更加芍藥甘草是  
傷寒發熱與頭痛 汗出惡寒風熱治

升麻 赤芍 甘草 芍藥 升麻 赤芍 甘草 芍藥

每服三 水煎熱服  
大柴胡湯 大柴胡湯用大黃 半夏枳實此爲良  
赤芍黃芩通六樣 薑棗前來利大腸

柴胡 黃芩 芍藥 枳實 柴胡 黃芩 芍藥 枳實

分作三服  
生薑大棗水煎溫服如不利再服

小柴胡湯

小柴胡湯只五般 半夏人參一處橫  
更有黃芩與甘草 生薑來子水同煎

小柴胡湯

小柴胡湯只五般 半夏人參一處橫  
更有黃芩與甘草 生薑來子水同煎

小柴胡湯

小柴胡湯只五般 半夏人參一處橫  
更有黃芩與甘草 生薑來子水同煎

柴胡 黃芩 甘草 人參 半夏 各三 每服五錢加姜棗

水煎不拘時服

小承氣湯

小承氣湯三件藥 枳實大黃并厚朴  
結胸諸語大便秘 每服五錢湯沸啗

大黃 厚朴 枳實 大黃 厚朴 枳實

分作二服加薑三片水煎服未利  
再服 絞汁服

四逆湯

四逆湯中薑一兩 生附城半去皮犬  
二兩甘草水煎服 逆而下利用之啗

甘草 二兩 乾薑 兩附子 兩每服五錢水煎湯服不拘時

建中湯

建中湯內藥何如 甘草芍藥同桂枝  
又有黃耆建中者 即于此內加黃耆

甘草 一兩 芍藥 三錢 桂枝 錢半 水煎服內加黃耆 錢半 各黃耆建中湯

小承氣湯

小承氣湯半裏薑 細辛肉桂與麻黃  
芍藥五味同甘草 八般水煎服之良

半裏 乾薑 細辛 肉桂 麻黃 芍藥 各三 五味 錢二

草 錢三 每服五錢加生薑四片水煎溫服

大承氣湯

大承氣湯用朴硝 大黃等分不須饒  
厚朴倍加併枳實 通腸四味甚奇佳

大黃 厚朴 枳實 朴硝 大黃 厚朴 枳實 朴硝

每服看症酌酌多少先煮厚  
朴枳實至七分納大黃煮至五分去渣納朴硝煎二三

沸通口服以利爲度未利再服

調胃承氣湯

調胃承氣湯是三 芒硝甘草大黃  
水煎服之須再利 便秘狂言醫藥前

大黃 芒硝 甘草 大黃 芒硝 甘草

水煎溫服

大黃 芒硝 甘草 大黃 芒硝 甘草

水煎溫服

<p>三承氣湯 三一承氣如何識 大小調胃三合一 甘草附黃枳朴同 却來五件同煎汁</p> <p>大黃 芒硝 厚朴 枳實 各半 甘草 一兩 水二鍾煎至一鍾</p> <p>納芒硝煎一沸去滓過口服不拘時每服一兩</p> <p>六一順氣湯 六一順氣六方併 四承大陷大柴等 大黃厚朴枳芒硝 甘芍柴芍鉄粉傾</p> <p>大黃 厚朴 枳實 甘草 芍藥 柴胡 黃芩 朴硝</p> <p>先 水煎滾二三沸後入藥煎至八分臨服時鉄粉水</p> <p>桃仁承氣湯 桃仁承氣五般奇 甘草硝黃與桂枝 血症發黃并血渴 狂言亂語總相宜</p> <p>桃仁 甘草 芒硝 大黃 桂枝 水煎服</p> <p>大陷胸湯 大陷胸治大結胸 芒硝并連大黃皮 傷寒下早目成此 服散快利斯為功</p> <p>大黃 芒硝 甘草 五分 〇分作二服每服水一鍾煎大黃 錢芒硝三錢連末 至六分納硝煎一二沸絞汁調 甘遂末二分半 溫服未快再服</p> <p>小陷胸湯 小陷胸治小結胸 黃連半夏瓜蒌同 以其苦泄辛能散 微吐黃涎氣便通</p> <p>半夏 四錢湯洗 黃連 二錢 瓜蒌實 大者一兩半惟剖其壳 全不到 子不到又其子非也 水</p> <p>三鍾煮瓜蒌汁一鍾半納藥煎至 一鍾絞汁兩大溫服以吐涎為度</p> <p>白虎湯 白虎湯中用石膏 甘草知母本方抄 人參亦有加之者 熱渴虛煩用此煎</p> <p>知母 石膏 四兩 甘草 炙一 加梗米 合〇煎六分溫服無時</p> <p>加入參半兩各 大參白虎湯</p> <p>竹葉石膏湯 竹葉石膏更用參 甘草人參半夏 生薑以及陳倉米 虛煩躁渴熱相尋</p>	<p>石膏 一半 二錢 人參 二錢 麥門冬 五錢 半 甘草 炙二錢 〇每服</p> <p>五錢水一鍾入青竹葉生薑各五片又云竹葉十片 半去滓入梗米百餘粒再煮水熟去米溫服不拘時</p> <p>黃連解毒湯 黃連解毒湯四味 黃柏黃芩枝子是 黃連解毒湯 黃連解毒湯四味 黃柏黃芩枝子是</p> <p>黃連 黃芩 黃柏 枝子 各等 〇每服一兩水二鍾 既濟湯 既濟湯中藥七般 甘草參香半夏枳 竹葉門冬兼附子 陰陽隔絕四肢寒</p> <p>甘草 人參 黃耆 半夏 門冬 附子 竹葉</p> <p>真武湯 真武湯中芍藥魁 白朮茯苓甘草隨 附子炮來加減用 生薑水煎總相宜</p> <p>芍藥 白朮 茯苓 甘草 附子 〇每服五錢加生薑 九味羌活湯 九味羌活生地黃 川芎白芷細辛防 黃芩蒼朮同生地 能代麻黃桂枝湯</p> <p>羌活 防風 蒼朮 各錢 甘草 川芎 白芷 生地 黃 芩 細辛 各一錢惟 水鍾半加姜三片葱白三莖煎 一鍾溫服食後取微汗為度如無汗啖稀粥助之</p> <p>人參敗毒散 人參敗毒散桔梗 川芎甘草茯苓等 枳殼前胡羌活獨活 柴胡十味性京冷</p> <p>人參 柴胡 甘草 炙 桔梗 羌活 獨活 芍藥 茯苓 枳殼 前胡 等分 〇每服三錢水一盞姜三片薄荷少 許煎至七分去渣溫服</p>
---	---

附代寧汪初菴先生手授三焦命門辨

五藏六府有三焦一府內經言之最詳難經又加發明愈益  
賜書後人不信三經妄生臆說如龍川志云有徐道者見一  
俄夫醫制始盡而骨脉尚全往視其藏見右腎下有暗膜如  
掌大正與膀胱相對有二白脉夾脊貫腦以此為三焦馬玄  
臺素問解又分列右腎以為三焦之府是皆一焦而非三焦  
矣李東垣又分手足三焦是為六焦而非三焦矣張景岳類  
經以有名無形一語為非是以而以軀殼之邊際為三焦是泥  
其外而遺其中矣皆與經文不相符也按先正云三焦取火  
能腐物之義火之性自下而上三焦者始子原氣由于中脘  
散于膈中皆相火之自下而上者也上焦主納而不出下焦  
主出而不納其納其出皆係乎中焦之腐熟焦之為義可見  
矣張景岳三焦包絡命門諸其略曰難經曰心主與三焦  
為表裏俱有名而無形叔和啟玄而下皆宗之二子不能辨  
孰敢再辨至徐遁陳無擇始創言三焦之形有脂膜如掌大  
李氏醫鑑

正與膀胱相對子編考內經曰三焦者中瀆之府水道出焉  
屬膀胱是腑之府也曰密理厚皮者三焦膀胱厚粗理薄皮  
者三焦膀胱薄以及緩急而結各有所分曰勇士三焦理橫  
怯士其焦理縱曰上焦開發宣五穀味薰膚充身澤毛是謂  
氣中焦受氣取汁變化而赤是謂血曰營出中焦衛出下焦  
曰上焦出胃口貫膈而布胸中中焦亦並胃中出上焦之  
後化精微而為血下焦別迴腸注于膀胱而滲入焉水穀居  
十胃中成糟粕下于大腸而成下焦曰上焦如霧中焦如瀾  
下焦如澀具在心包絡則曰諸邪之在于心者皆在于心之  
包絡三焦既無形矣何以有水道之出有厚薄緩急直結  
縱橫之分何以如霧如瀾如澀及氣血之別心主亦曰無形  
矣則代心而受者受之何所則此經文有無可見夫所謂  
三焦象三才也焦者象火也色赤屬陽之謂也夫人之一身  
外自皮毛內自藏府其腔腹周圍上下全體狀若大囊者果  
何物乎其著內一層形色最赤象如六合總統諸陽是非三

李氏醫鑑 三焦命門辨

焦而何至其相配表裏則三焦為藏府之外衛心包絡為心  
主之外衛如帝關之重城故皆屬陽均稱相火而其絡絡相  
通允稱表裏此固甚明無容辨也客曰既三焦心主為表裏  
何以復有三焦命門表裏之說余曰內經初無命門之名惟  
根結篇氣陰陽離合等篇有曰命門者目也此蓋指大腸經  
穴終丁睛明此外並無左右腎之分及右腎為命門之說也  
命門之始起于難經曰腎有兩者非皆腎也左者為腎右者  
為命門命門者精神之所舍原氣之所繫男子以藏精女子  
以繫胞王叔和因之而曰腎與命門俱出尺部後世致有命  
門三焦之配內經實所無也黃庭經曰上有黃庭下關元後  
有幽闕前命門又曰丹田之中精氣微玉房之中神門戶梁  
丘子註曰男以藏精女以約血故曰門戶元陽子曰命門者  
下丹田精氣出飛之處也脉經又曰左為腎右為子戶所謂  
子戶即子宮也俗名子腸居直腸之前膀胱之後當關元氣  
海之開男女精血皆存乎此而子由此出又子宮者男女之

通都道家以先天真一之炁藏乎此為九還七返之基故曰  
丹田醫家以衝任之脉盛于此名曰血室以氣之呼接乎天  
根氣之吸接乎地根又名氣海實則一子宮耳在女子可以  
手探而得俗名產門在男子精泄之時自有關闕知覺父母  
交會之際施由此出受由此入謂非先天立命之門戶乎夫  
命門者子宮之門戶也子宮者腎藏藏精之府也腎藏者先  
天真一之氣其門鎖鑰之司也而所以為鎖鑰者正賴命門  
之開固蓋坎中之真陽以為一身生化之原也坎卦內奇而  
外偶腎兩者坎外之偶也命門一者坎中之奇也命門總主  
乎兩腎兩腎皆屬于命門為水火之府陰陽之宅精氣之海  
死生之寶若命門虧損則五藏六府皆失所恃而陰陽病變  
無所不至矣醫不知此尚安足云思按難經所云三焦有名  
無形者蓋指上中下之空處而言景岳以為有形者蓋指軀  
殼之邊際而言兩人所說實共一物也愚竊以理推究之則  
難經之義為長夫景岳以軀殼之邊際為一大府此與內經

所謂派府雖經所謂外府兩說相合特從前水經道破而最  
岳又由焉而不知者耳但三焦之用實係中央之空處而  
不在於四旁之邊際也老子曰三十幅共一轡管其無有車  
之軸運以爲器當其無有器之用繫戶牖以爲室管其無  
有室之用故有之以爲利無之以爲害夫車器室三者皆自  
也然車之載物器之受物室之便居處利出入者則在於空  
無之處也經曰宗氣積於上焦營氣出于中焦衛氣出于下  
焦又曰上焦貫膈而布胸中中焦化精微而爲血下焦注勝  
脫而滲入是其所以細繼宗氣變化精血流行營衛與夫貫  
膈布胸別迴腸注勝脫者將在于無形之中央乎抑在于有  
形之邊旁乎經又曰上焦如霧中焦如沤下焦如瀉夫霧與  
瀉皆結于空中似有而無之物也漬所以行水而非水亦空  
無之地也是內經數說悉皆歸重于無形之空處而非鍾自  
于難經矣景岳特據厚薄直結縱橫以爲辨是皆執有之遇  
而求達夫用無之妙遂致輕議古人不知古人已得其精已

李氏醫鑑

三焦論

三

通得其氣乎難經曰三焦者水穀之道路氣之所終始也上  
焦在胃上口主內而不出其治在膻中兩乳間中焦在胃中  
脘主腐熟水穀其治在臍旁下焦當膀胱上口主分別清濁  
主出而不內其治在臍下一寸又曰三焦主持諸氣有名而  
無形其經屬于少陽此外府也又曰三焦所行之命爲原何  
也臍下腎間動氣者人之生命也十二經之根本也故名曰  
原三焦者原氣之別使也主通行三氣經脈于五臟六腑原  
者三焦之尊號也故所止轉爲原五臟六腑之有病者皆取  
其原也夫既曰主持諸氣又曰經脈五臟六腑而通于十二經  
府豈非以三焦兼包內外能統五臟六腑能通行于十二經  
絡也乎難經又曰小腸謂赤腸大腸謂白腸臍謂青腸胃謂  
黃腸膀胱謂黑腸下焦之所治也是明言下焦兼包五府矣  
豈上中二焦獨不能兼包諸藏乎是景岳腔腹大囊之說難  
經久已棄之矣景岳特不書未透耳又按華元化中藏經曰  
三焦者三元之氣也號曰中清之府總領五臟六腑營衛經

李氏醫鑑

三焦論

四

地根正謂此也蓋指此爲藏精之宮則可指爲泄精之處則  
不可指爲繫胎之根則可指爲藏胎之地則不啻若命門之  
大可以容胎是特哀然一革囊而已其何以孕育元精元神  
元氣子一離宮此中之精氣盡耗尙賴何者以爲安身立命  
之基乎景岳看難經未明致多三焦一辨已屬駢枝又不識  
命門真面目而以子宮子腸當之且混認丹田氣海便是子  
腸以爲九還七返之基正在于此不亦大可駭乎此愚之聲  
說特加辨析以聽識者之論定焉續醫說亦有辨三焦爲有  
形一篇議論尤爲不暢不足置辨

三焦命門繫乎離命者甚大古今之論其夥求其確得真  
途而無疑義者實未易見甚矣斯道之至精至微而言之  
之不易也來醫鑑於請正於先生蒙先生極口贊賞  
詳正差訛玉成全璧更將近著素靈內三焦命門端按增  
卷內博極而精詳確而明破從前之疑誠建司命之津梁  
光固照耀斯編功更昭垂萬載  
後學李文來敬啟

李氏醫鑑十卷續補二卷

內府藏本

國朝李文來編文來字昌期婺源人初休寧汪桓作醫方集解本草備要二書淺顯易明頗行於世康熙丙子文來撮合兩書條分縷析分類排纂以成是書名曰李氏醫鑑實則汪氏書也又以裸證及傷寒有未備者更輯爲續補二卷末附桓所作三焦命門辨一篇稱醫鑑成請正於桓詳校差訛玉成完璧更授以是篇附刻卷末則文來輯是書時桓尙無恙與所手定無異矣



## 濟陰綱目十四卷

〔明〕武之望輯 〔清〕汪淇箋釋

中國科學院圖書館藏清雍正天德堂刻本

附《四庫全書總目·濟陰綱目

十四卷》提要

### 濟陰綱目序

夫醫者活人之事而亦殺人之機也今天下醫書亦繁夥矣未盡其變紙上陳言何足爲用設沉疴當前醫士環視生之乎殺之乎曰殺之也何以明其然也拘泥古方以療今疾如此者醫殺之耳男子無論矣自序一女子之情隱微難見病不自知而一委於醫醫又不能得其隱微望聞問無有焉一憑於脈脉其可盡憑乎惟是妄意揣度聊復從事焉嗟乎此何等事而竟以意度之想當然乎哉然隱微亦難言矣從其隱而隱之則無乎不隱如倉公之診女子知其

思欲不遂脉出魚際一寸是也從其顯而顯之則無乎不顯如婦人因夫不歸而發狂疾哭泣無時詬詈無度醫者迎而奪之拔劍砍之彼則蒲伏不敢仰視久之愈矣是也岳武穆云運用之妙存乎一心兵法也亦醫法也吾因是而又知天一生水之

自序三

義矣水能生人亦能殺人故禹之治少濫之患禹非能治水也因水以治水也人能知禹之治水則知所以治婦女之科矣故濟陰綱目一書其立論自調經始有綱領有原委有條貫有分疏一病之中三致

意焉一方之設細詳釋焉得其隱微能盡其變使人閱之一團生氣浮於紙上詎非活人之書哉雖曰濟陰而實所以扶陽也無陽則陰無以生無陰則陽無以化陽施陰化而醫道之能事畢矣吾非能知醫也而因醫以知醫故重爲訂之以廣仁人之

自序三

心而已雖然喻指爲月指終非日讀者因指識月焉可也

肯

雍正戊申年孟冬月西陵懋漪子汪其右  
子甫題於孝友堂別業



濟陰綱目凡例

一凡醫家治男子易治婦人難所以丹溪云寧治十男子不治一婦人甚言女科之難也惟茲濟陰綱目一書集百家之精華彙諸書之奧旨真千古之秘義功參大化一時之鴻寶福庇坤元也

一書理解微妙無不條分節判標榜詳明卽一圖一點俱出匠心令人一見了然至于上層批評箋釋各從本末源流分疏辯駁學者開卷既易于尋方病者得醫無

濟陰綱目

凡例一

綱奇

難于對症矣

一編雖屬婦人端刻其論脉理經絡處俱採內經素問之精微如某症加減某藥等不僮女科要書卽大小諸家細爲觀覽咸可觸類旁通所謂造化在手物類聽其鑪錘橐籥在心乾坤亦任其旋轉耳

一婦人得病種種與男子不同其所由起世人畧而不知此書獨先明其病源因何而啟然後論脉論症中引古方之的確而增減其藥味上批議論之可否而酌量其

去從此因病用藥按脉切理不拘于方之內也神而明之存乎其人

一集內凡藥味之炮製煎熬之合法加減之精當各以類推種種不同初入門者宜細心翫習卽四澥醫宗窮究厥中與理則其學自居聖功之上而盧扁再出矣

一書醫家之秘寶因原板無存世人每欲購求遺本真如丹經仙錄可思而不可得今本坊重登梨棗照原本不易一字至于紙用精良鐫寫名手以方可壽人書

濟陰綱目

凡例二

綱奇

可壽世述者不厭精工識者自爲鑒賞

一此刻之後隨有慈幼綱目卽證治準繩之幼科也復增圈點詳加評釋亦如是編之精詳梓以問世蓋濟陰所以扶陽地天于焉常泰而慈幼卽以康老運用是咸亨不佞壯志既頽致藉仁術以傳婆心熱腸未冷願持垣方下問國手倘不棄於梁公之藥籠或有補夫黃帝之緒鞭也

康熙四年一陽月西陵僊漪子注 洪石子父題于蜩寄

調經

論經主衝任二脉

論脾胃生血

論三月一來為居經

論調經當抑氣

論調經大法

論經候愆期

論月水不利

論過期不止

論經病發熱

論熱入血室

脉法

調經通用諸方

四物湯

簡易當歸散

大溫經湯

四製香附丸

九味香附丸

百子歸附丸

當歸地黃丸

治經候先期方

先期湯

金匱土瓜根散

論心脾為經血主統

論經不調由風邪客於胞中

論師尼寧婦異乎妻妾之治

論調經先去病

論經水異色

論月水多少

論月水不斷

論經病疼痛

論往來寒熱

論行經泄瀉

增損四物湯

嚴氏抑氣散

十味香附丸

艾附暖宮丸

人參養血丸

治月事不調

治心腹疼痛

治氣血虛弱

治經水不調

治小腹痛

治子宮冷

治經水不調

治經水不調

治經水不調

治經水不調

治經水不調

治經候過期方

過期飲

治經水過多方

當歸飲

丹溪方

治經水澀少方

七沸湯

四物加熟地黃當歸湯

治月水不利方

牛膝散

養榮湯

歸濟丸

治月水不斷方

止經湯

蒲黃散

治過期不止方

芩心丸

補中膏

治經病疼痛方

越痛散

加味四物湯

加味烏藥湯

薑黃散

琥珀散

滋血湯

膠艾湯

四物加熟地黃當歸湯

生丹散

玄歸散

固經丸

八物湯

烏藥湯

澹寮煮附丸

玄胡索散

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

治月水不利

當歸散 治久遠血氣病痛小

經驗方 治瘡病不省人

三神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛

交加散 治經閉不調腹痛

交加散 治月事滯澀經閉

交加地黃丸 治經閉不調血塊

瓦龍丸 治血氣

桂枝桃仁湯 治經閉不調

柴胡丁香湯 治三十歲經閉

小溫經湯 治經閉不調

沒藥除痛散 治腹痛

六神湯 治血氣不進飲食

治經病發熱方

加味四物湯 治月事不調

治往來寒熱方

地骨皮散 治血氣兩虛寒

本事方 治血脈不調往來

七寶湯 治寒熱

柴胡散 治寒熱如勞倦

柴胡抑肝湯 治寒熱如勞倦

生地黃丸 治經閉不調

小柴胡加地黃湯 治中風發熱

治熱入血室方

乾薑藥胡湯 治婦人傷寒經閉

牛黃膏 治熱入血室發狂不認人

海蛤散 治婦人傷寒

經閉門

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

論經閉不行有三治宜補血瀉火

論經閉因肝勞血傷

論經閉因勞傷當大補脾胃

論室女經閉成勞因心虛

論經閉因積冷結氣

論經閉因痰飲所隔

論下利經閉利止經來

論經閉總由血滯血枯

論經閉大法

治血枯經閉方

玉燭散 治胃熱善食津液燥竭以致

二黃散 治婦女經閉

五補丸 治血虛安胎

五子仁丸 治血虛有火經閉不通

加味補中益氣湯 治血虛有火經閉不通

十全大補湯 治血虛有火經閉不通

溫經湯 治經閉不通

紅花當歸散 治經閉不通

麥香花散 治月事不調

土牛膝散 治月事不調

琥珀散 治月事不調

萬病丸 治月事不調

產寶方 治月事不調

和血通經丸 治月事不調

大黃膏 治月事不調

通經丸 治月事不調

治痰結經閉方

丹溪方 治痰結經閉

加味導痰湯 治痰結經閉

藥石丸 治經閉堅結

一粒仙丹

通經下取方

血崩門

論崩中由傷損衝任

論氣隔血脫法當升舉

論過服寒涼法當溫補

論開痰行氣

論崩漏難治

瘕法

治血熱崩漏方

刺芥四物湯治崩漏初起不問

河間生地黃散治經閉紫黑

小蘇湯治崩血色如木得溫則順此

治崩中血不止

一方治

簡易黃芩湯治陽衰陰

治勞傷崩漏方

膠艾四物湯治勞傷月水過多不止

當歸芍藥湯治經閉鮮紅因勞傷脾虛氣

歸脾湯治思慮傷脾不能因血以致

相子仁湯治思慮過度心傷不

治崩漏氣陷方

益胃升陽湯治血脫益氣先補胃以助生長

柴胡調經湯治鮮血不止項急

調經升陽除濕湯治崩下血不止多

論血崩因虛熱

論血瘀腹痛法當收止

論補中去積

論殺血心痛

經驗簡要治崩中等證法

奇效四物湯治肝熱血

遠血地黃湯治野水陰虛不能

金華散治血虛有

天德堂

治崩漏血瘀昏暈疼痛等證方

五靈脂散治血崩不止昏

香附子散治血崩五色不止併治產後小

煮附丸治崩漏帶下積聚疼痛

如神散治血崩亦

一方同

加減四物湯治天癸至或後至卒暴崩漏不止

治崩漏虛寒方

丁香膠艾湯治心氣不足飲食不節崩漏不

芎藭湯治血寒下腹重痛經閉不通

斷下湯治血熱下血崩漏先痛食減乏力

加味四物湯治崩漏

治崩漏虛脫方

鹿茸丸治經候過多其色紫黑呼吸少氣

治崩漏虛脫方

大前方治崩下不止

又方治崩中不止結血

伏龍肝散治勞傷任脈如豆汁血片五色赤

地榆散治崩中

補宮丸治諸虛久不妊

一方治崩漏不止

血見黑則止方治諸方品味錯雜然總是治久崩止

五灰散

如聖散

當歸散

治崩漏血瘀昏暈疼痛等證方

五靈脂散治血崩不止昏

香附子散治血崩五色不止併治產後小

煮附丸治崩漏帶下積聚疼痛

如神散治血崩亦

一方同

加減四物湯治天癸至或後至卒暴崩漏不止

治崩漏虛寒方

丁香膠艾湯治心氣不足飲食不節崩漏不

芎藭湯治血寒下腹重痛經閉不通

斷下湯治血熱下血崩漏先痛食減乏力

加味四物湯治崩漏

治崩漏虛脫方

鹿茸丸治經候過多其色紫黑呼吸少氣

治崩漏虛脫方

大前方治崩下不止

又方治崩中不止結血

伏龍肝散治勞傷任脈如豆汁血片五色赤

一方治血崩

立應散

必效散

香礬散

止崩雜方 共二十方

孫真人方 治九竅出血

卷之三

赤白帶下門

論帶下由勞傷衝任

論帶下虛寒宜溫補

論帶下當以壯脾胃升陽氣為主

論帶久不止當補衛厚脾

論帶下濕熱藥用正治從治之異

論室女帶下

消瘀血

尿法

治濕熱帶下

清白散 治白帶 有

檳皮丸 治赤白帶 有

蒼蠅檳皮丸 治赤白帶 有

苦楝丸 治赤白帶 有

萬安散 治赤白帶 有

大聖萬安散 治赤白帶 有

治濕熱帶下方

琥珀散 一名易

立效散

烏金散

一方

千金方 治婦人無

論帶下五包因風邪入於胞門

論帶下痰實宜吐下

論帶久枯涸宜潤補

論帶久不止當補衛厚脾

論帶下雜治法

排膿

論白濁白淫

解帶散 治濕熱白帶 有

勝濕丸 治濕熱白帶 有

側柏檳皮丸 治赤白帶 有

四神丸 治赤白帶 有

宣明導水丸 治濕熱帶下 有

赤白帶下 有

赤白帶下 有

赤白帶下 有

赤白帶下 有

滲濕消痰飲 治濕熱痰積

小胃丹 治赤白帶 有

胃風丹 治風邪入胞 有

蒼柏參芩散 治赤白帶 有

治虛損帶下方

衛生湯 治赤白帶 有

六君子湯 治赤白帶 有

歸脾湯 治赤白帶 有

當歸澤蘭湯 治赤白帶 有

嚴氏當歸煎 治赤白帶 有

補宮丸 治赤白帶 有

千金方 治赤白帶 有

補真固經丸 治赤白帶 有

助陽湯 治赤白帶 有

治虛寒帶下方

元戎四物湯 治赤白帶 有

延胡苦練湯 治赤白帶 有

當歸附子湯 治赤白帶 有

酒煮當歸丸 治赤白帶 有

鶴頂丸 治赤白帶 有

神仙聚寶丹 治赤白帶 有

茱萸浴湯 治赤白帶 有

勝陰丹 治赤白帶 有

同陽丹 治赤白帶 有

蒼柏檳皮丸 治赤白帶 有

補藥方 治赤白帶 有

小柴胡湯 治赤白帶 有

地榆散 治赤白帶 有

補中益氣湯 治赤白帶 有

加味八珍湯 治赤白帶 有

止帶丸 治赤白帶 有

菴菴見經丸 治赤白帶 有

丹溪方 治赤白帶 有

千金方 治赤白帶 有

補真固經丸 治赤白帶 有

助陽湯 治赤白帶 有

治虛寒帶下方

元戎四物湯 治赤白帶 有

延胡苦練湯 治赤白帶 有

當歸附子湯 治赤白帶 有

酒煮當歸丸 治赤白帶 有

鶴頂丸 治赤白帶 有

神仙聚寶丹 治赤白帶 有

茱萸浴湯 治赤白帶 有

勝陰丹 治赤白帶 有

同陽丹 治赤白帶 有

同陽丹 治赤白帶 有

同陽丹 治赤白帶 有

如聖丹 治經脈不調

治帶下消脫

側柏地榆湯 治赤白帶下

伏龍肝散 治赤白帶下

固真丸 治赤白帶下

茅花散 治赤白帶下

白附丸 治赤白帶下

治白濁白淫

加味四七湯 治婦女小便不

固精丸 治下虛白濁如淋

金鎖正元丹 治遺精白濁

威喜丸 治遺精白濁

烏金散 治身熱口燥氣塊

卷之四

虛勞

論婦女虛勞與男子不同

論無熱虛勞

論察骨蒸熱

治虛勞平補諸方

增損四物湯 治血虛不足

六神湯 治血虛不足

加減大建中湯 治腹中虛痛

雙和散 治虛勞乏力

補中益氣湯 治虛勞乏力

白芷散 治赤白帶下

馬蹄丸 治赤白帶下

健白丸 治赤白帶下

地榆膏 治赤白帶下

鎖精丸 治白濁白淫

內金鹿茸丸 治白濁白淫

小便白濁日夜頻度

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

論初病大法

論有熱虛勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

歸脾湯 治脾虛失血

桔梗引子 治心氣不足

却勞散 治心氣不足

補中丸 治心氣不足

七補丸 治心氣不足

十補丸 治心氣不足

滋陰百補丸 治心氣不足

六味丸 治心氣不足

八味丸 治心氣不足

益陰腎氣丸 治心氣不足

烏雞煎丸 治心氣不足

艾煎丸 治心氣不足

治無熱虛勞

附子理中湯 治真陽不足

加味黃耆湯 治真陽不足

渾身碎痛引子 治真陽不足

戊己丸 治真陽不足

治有熱虛勞

逍遙散 治血虛煩熱

黃耆散 治血虛煩熱

知母散 治血虛煩熱

秦芫散 治血虛煩熱

胡黃連散 治血虛煩熱

紅藍花散 治血虛煩熱

黃耆散 治食後身

補肺湯 治勞嗽肺熱

人參丸 治虛勞

羊乳丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞

人參丸 治虛勞



阿膠丸 治勞嗽吐血發熱口渴盜汗

治骨蒸勞瘵

加味四物湯 治骨蒸

青蒿散 治骨蒸

河車丸 治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸等

地黃煎丸 治勞嗽生肌

治傳尸勞

天靈蓋散 治傳尸勞熱四肢無力

獺肝丸 治勞嗽

治血風勞方

人參荆芥散 治血風勞熱體疼頭昏

大效油煎散 治血風勞熱四肢無力

濟陰編目

萬全追遠散 治血風勞熱頭暈

卷之五

積聚癥瘕

論婦人諸積形狀 瘕瘕積聚八

論癥瘕

論血癥

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論腸覃 瘕瘕積聚在兩脇

論婦人瘕瘕並屬血病 瘕瘕積聚在兩脇

論痰積用吐下 瘕瘕積聚在兩脇

通治諸積方 瘕瘕積聚在兩脇

開鬱正元散

治瘕瘕積聚在兩脇

豬肚丸 治熱勞

黃連散 治骨蒸勞熱四肢無力

柴胡散 治骨蒸勞熱四肢無力

黃耆丸 治骨蒸勞熱四肢無力

地黃煎丸 治勞嗽生肌

天靈蓋散 治傳尸勞熱四肢無力

獺肝丸 治勞嗽

人參荆芥散 治血風勞熱體疼頭昏

大效油煎散 治血風勞熱四肢無力

萬全追遠散 治血風勞熱頭暈

熟地黃丸 治冷氣攻心小腹

論八瘕所 瘕瘕積聚在兩脇

論食瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論腹中瘕血 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

論瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

大七氣湯 治瘕瘕積聚在兩脇

勝紅丸 治瘕瘕積聚在兩脇

香稜丸 治瘕瘕積聚在兩脇

阿魏膏 治瘕瘕積聚在兩脇

分治八瘕方 瘕瘕積聚在兩脇

早莢散 治瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

三稜煎 治婦人血瘕

大硝石丸 治七情八氣下疳

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

療瘕瘕 瘕瘕積聚在兩脇

[illegible]

洞脂膜導痰湯

加味小柴胡湯 治肝經肺經小使不和寒熱往來嘔吐泄瀉熱厥脇作痛

治陰挺下脫

當歸散 治婦人陰中突出一物長又方

三葉丸 治陰中一物牽引腰腹或痛或癢

一稔金丸 此又附一方妙 治陰下脫方

又方 治法

托藥 治法

敷藥

治陰冷方

五加皮浸酒方 治婦人冷

八味丸 治血弱不能榮養臟腑津液枯 治陰冷方

又二方 溫中坐藥方

治交接出血作痛方

千金方 治女人交

濟陰綱目 目錄

小戶煉痛方

治傷丈夫頭痛方 附脚指

集驗方 治婦人傷丈夫頭

卷之八

胎前門上

論胎屬十二經所養

論胎前調理法

孕婦食忌

孕婦起居忌

診婦人有姙歌

驗胎方

又三方

桑白皮湯 治傷丈夫若

論治胎產三禁

論胎前用藥法

孕婦藥忌

候胎法

天德堂

加方驗胎散 婦人兩三個月月

艾醋湯 治月經不調或月

連月養胎法

烏雞湯 治婦人一月寒多為痛熱多卒驚舉重

補胎湯 治婦人一月胎

黃連湯 治婦人一月胎

茯神湯 治婦人一月胎

調中湯 治婦人一月胎

安中湯 治婦人一月胎

柴胡湯 治婦人一月胎

杏仁湯 治婦人一月胎

葵子湯 治婦人一月胎

豬腎湯 治婦人一月胎

惡阻

牛夏茯苓湯 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

陳皮牛夏湯 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

縮砂二陳湯 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

青竹如湯 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

一方 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

茯苓丸 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

橘皮湯 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

人參丁香散 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

白木散 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

縮砂散 治惡阻嘔吐心煩眩暈食

驗胎方 已結三月

探胎散

艾葉湯 治婦人二月胎

雄雞湯 治婦人二月胎

菊花湯 治婦人二月胎

阿膠湯 治婦人二月胎

麥門冬湯 治婦人二月胎

葱白湯 治婦人二月胎

芍藥湯 治婦人二月胎

牛夏湯 治婦人二月胎

旋覆花湯 治婦人六月胎

參橘散 治婦人六月胎

蘆根湯 治婦人六月胎

人參半夏丸 治婦人六月胎

歸原散 治婦人六月胎

白木湯 治婦人六月胎

二香散 治婦人六月胎

保生湯 治婦人六月胎

天德堂

胎動不安

安胎散 治胎動不安

金匱當歸散 治胎動不安

釣藤湯 治胎動不安

十聖散 治胎動不安

佛手散 治胎動不安

膠艾膏 治胎動不安

阿膠散 治胎動不安

當歸湯 治胎動不安

三物解毒湯 治胎動不安

胎漏下血 治胎動不安

加減膠艾湯 治胎動不安

濟陰綱目

大千方 治胎動不安

安胎當歸湯 治胎動不安

當歸寄生湯 治胎動不安

阿膠散 治胎動不安

榆白皮散 治胎動不安

子芩散 治胎動不安

防風黃芩丸 治胎動不安

桂枝茯苓丸 治胎動不安

大千方 治胎動不安

煩躁即子 治胎動不安

竹葉湯 治胎動不安

犀角散 治胎動不安

本木湯 治胎動不安

黃蘗湯 治胎動不安

小膠艾湯 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

人參散 治胎動不安

治妊娠心煩熱不止

一母丸 治胎動不安

紫蘇飲 治胎動不安

訶梨勒散 治胎動不安

保胎和氣飲 治胎動不安

瘦胎飲 治胎動不安

葱白湯 治胎動不安

倉公下氣湯 治胎動不安

大聖散 治胎動不安

治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

安胎和氣飲 治胎動不安

仲景附子湯 治胎動不安

心痛論

火龍散 治胎動不安

白木湯 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

一方 治胎動不安

竹茹湯 治胎動不安

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

有案

香義散 治五六月胎動氣刺痛崩漏 有孕

古今錄驗方 治胎動不安 又一方 治胎動不安

一方 治胎動不安 又一方 治胎動不安

腹痛論方

地黃當歸湯 治胎動不安 加味四物湯 治胎動不安

小腹痛論方

療姙娠氣墮胎向下一不安小腹連腰痛下血

補遺湯 治胎動不安

腰腹及背痛論方

通氣散 治姙娠腰痛 五加皮散 治姙娠腰痛

五加皮丸 治姙娠腰痛

療姙娠氣墮胎腰痛不可忍兼治腹痛

濟陰綱目

目錄

主

天德堂

小品學根方 治胎動不安

紫酒 治姙娠腰痛如折

胎水腫滿論方 治子氣

白朮散 治姙娠面目虛浮

葶藶散 治姙娠通

一方

澤瀉散 治身浮腫上氣喘急

天仙散 治胎動不安

崔氏方 治胎動不安

子和方 治胎動不安

腹中鐘鳴方

產寶方 治小兒在腹中哭

補遺方 治胎動不安

一法有

積聚論 治胎動不安

丹溪方 治胎動不安

卷之九

胎前門

傷食

平胃散 治姙娠飲食停

木香丸 治姙娠嘔吐泄瀉

中惡

當歸散 治姙娠中惡

散滯湯 治姙娠氣傷胎痛

又方 治姙娠中惡

濟陰綱目

目錄

主

天德堂

傷寒

白朮散 治傷寒熱病先以此安胎但覺頭疼發

安胎阿膠散 治姙娠胎動不安

香蘇散 治姙娠頭痛以此至之

黃龍湯 治姙娠頭痛以此至之

三黃解毒湯 治姙娠身熱表邪悉罷煩

桂枝芍藥當歸湯 治姙娠身熱表邪悉罷煩

加減當歸六黃湯 治姙娠身熱表邪悉罷煩

加味黃芩湯 治姙娠身熱表邪悉罷煩

黃龍四物湯 治姙娠身熱表邪悉罷煩

梔子大青湯 治姙娠身熱表邪悉罷煩

護胎法 治姙娠身熱表邪悉罷煩

六君子湯 治脾胃虛弱飲食

白朮散 治姙娠中惡心腹發痛如

又方 治姙娠中惡心腹發痛如

補遺方 治姙娠中惡心腹發痛如

中風

防風散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

防已散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

赤箭丸 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

醋艾熨法 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

風癱

羚羊角散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

芍活湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

瘕瘕

釣藤湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

子瘡

大全論

濟陰綱目

欬嗽

桔梗散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

百合散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

喘急

平安散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

馬兜鈴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

吐血衄血咳唾血

河間生地黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

瘧疾

七寶散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

人參養胃湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

驅邪散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

生犀角散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

白僵蠶散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

白木酒 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

葛根湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

羌活酒 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

黃帝問

目錄

馬兜鈴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

紫苑湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

桔梗湯

局方必勝散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

又方治瘧

瘧亂

香蘇散加藿香方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

七味白朮散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

人參散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

木瓜煎 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

益元散

冬葵子湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

泄瀉

胃苓湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

胃風湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

加味治中湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

草果散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

痢疾

白朮湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

黃連湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

三黃熱湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

大寧散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

鴨蛋湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

大小便不通

大腹皮散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

當歸散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

回生散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

理中湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

白朮散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

竹茹湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

桂苓甘露飲

不換金正氣散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

加味理中湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

錢氏益黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

當歸芍藥湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

蒙黃連湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

歸善湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

厚朴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

二黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

當歸芍藥湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

蒙黃連湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

歸善湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

厚朴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

二黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

當歸芍藥湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

蒙黃連湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

歸善湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

厚朴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

二黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

葵子湯 治妊婦得病六七日以上身熱 又方

猪苓散 治妊婦小便不利支胎除熱 又方

小便不通

冬葵子散 治妊婦轉胞小便不通

葵榆湯 治妊婦小便不通

歸母苦參丸 治妊婦小便不通

子淋

五淋皮 治孕婦熱結膀胱小便淋瀝

安樂散 治孕婦淋瀝小便不通

生津湯 治孕婦淋瀝小便不通

冬葵子湯 治孕婦淋瀝小便不通

地膚子湯 治孕婦淋瀝小便不通

濟陰綱目

一方 治孕婦淋瀝小便不通

補遺方 治孕婦淋瀝小便不通

雜方 治孕婦淋瀝小便不通

遺尿

白微散 治孕婦遺尿

一方 治孕婦遺尿

尿血

續斷湯 治妊婦下血及尿血

蓮蓉湯 治妊婦下血及尿血

雜方 治妊婦下血及尿血

眼目

天門冬飲子 治妊婦肝經風熱上

臟燥悲傷

甘麥大棗湯 治婦人臟燥

又方 治婦人臟燥

疰病下胎

桂心散 治疰病因疰胎

千金神道湯 治疰病因疰胎

又方 治疰病因疰胎

防胎自墮

芎藭補中湯 治胎氣虛弱不能

千金保胎丸 治胎氣虛弱不能

刑繁方 治胎氣虛弱不能

胎墮後為半產

濟陰綱目

人參湯 治半產血下過多心驚目

龍骨散 治半產血下過多心驚目

生地黄湯 治半產血下過多心驚目

烏金散 治半產血下過多心驚目

白蜜湯 治半產血下過多心驚目

地黃湯 治半產血下過多心驚目

蒲黃酒 治半產血下過多心驚目

芎藭湯 治半產血下過多心驚目

當歸補血湯 治半產血下過多心驚目

胎不長

安胎白朮散 治胎不長

長胎白朮丸 治胎不長

滑竹茹湯 治妊婦心驚悸

又方 治妊婦心驚悸

一方 治妊婦心驚悸

千金神道湯 治妊婦心驚悸

又方 治妊婦心驚悸

防胎自墮

芎藭補中湯 治胎氣虛弱不能

千金保胎丸 治胎氣虛弱不能

刑繁方 治胎氣虛弱不能

胎墮後為半產

人參湯 治半產血下過多心驚目

龍骨散 治半產血下過多心驚目

生地黄湯 治半產血下過多心驚目

烏金散 治半產血下過多心驚目

白蜜湯 治半產血下過多心驚目

地黃湯 治半產血下過多心驚目

蒲黃酒 治半產血下過多心驚目

芎藭湯 治半產血下過多心驚目

當歸補血湯 治半產血下過多心驚目

胎不長

安胎白朮散 治胎不長

長胎白朮丸 治胎不長

黃耆湯 治胎不長

人參丸 治胎不長



先期欲產過期不產

知母丸 治妊婦月  
未足痛欲產

又方 治  
首三

鬼胎

斬鬼丹 治鬼胎如  
抱一變

雄黃丸 治鬼胎瘕  
血腹痛

卷之十

臨產門

論臨產調理法

論難產由於安伏氣滯

論難產由於血滯血乾

產難治驗

論胎死腹中

臨月束胎方

束胎丸 治易生  
月服

又方 治九個  
月服

內補丸 治難產衝任脈  
虛補血安胎

保生無憂散 治難產安胎  
產或血少胎弱八月服之易生

難產催生方

三合濟生湯 治產難不下  
服此即生

佛手散 治產難不下  
服此即生

來甦散 治產難用力太過  
服此即生

黑神散 治產難  
服此即生

榆日皮散 治產難  
服此即生

槐子丸 治難產月不  
足而似欲產

加味四物湯 治過月不產  
此補血行滯

斑玄丸 治鬼胎或  
於妖魅

枳實檳榔丸 治難產  
瘕瘕

論難產催生法

論難產由於氣虛不運

論十產 楊子

論交骨不開

論產脈法

達生散 治孕至八月  
服之易產

滑胎枳殼散 治孕至八月  
服之易產

張氏方 治胎前產後  
服之易產

神寢丸 治胎前  
服之易產

天德堂

催生散 治產難  
服此即生

催生湯 治產難  
服此即生

活水無憂散 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

免腦丸 治產難  
服此即生

催生如聖散 治產難  
服此即生

催生如聖散 治產難  
服此即生

滑胎散 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

又方 治產難  
服此即生

小品方 治產難  
服此即生

黃金散 治產難  
服此即生

催生萬金不傳遇仙丹 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

立聖丹 治產難  
服此即生

治交骨不開

龜殼散 治產難  
服此即生

治胎死腹中

烏金散 治產難  
服此即生

平胃散 治產難  
服此即生

千金神造湯 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

半夏湯 治產難  
服此即生

催生散 治產難  
服此即生

七聖散 治產難  
服此即生

勝金散 治產難  
服此即生

油蜜煎 治產難  
服此即生

柞木飲子 治產難  
服此即生

催生如意散 治產難  
服此即生

三退散 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

神妙乳砂丹 治產難  
服此即生

如神散 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

勝金丹 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

維方 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

香桂散 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

一方 治產難  
服此即生

天德堂

下胎丸 治難產胞衣不出橫倒

一方 治胎死腹中胞衣不下胎前產後急妙

霹靂奪命丹 治臨產時氣喘

宣明利砂散 治胎死

牛膝丸 治死胎

一方 治產後血暈

如聖膏 治難產及死胎

一字神散 治子死腹中

雜方 治死胎

卷之十一

產後門

論產後調理法

論產後大補氣血為主

論產後服藥之誤

論新產三病

產後諸忌

脈法

胞衣不下

奪命丹 治胞衣不下

奪命丸 治胞衣不下

牛膝湯

治胞衣不出

牛膝散 治胞衣不出

加桂芎歸湯 治產後血暈

黑龍丹 治產後血暈

花蘆石散 治產後血暈

一方 治產後血暈

千金憐急丸 治產後血暈

胡氏方 治產後血暈

雜方 治產後血暈

一方 治產後血暈

血暈附歌

一方 治產後血暈

清魂散 治產後血暈

芎歸湯 治產後血暈

保命集方 治產後血暈

醋墨 治產後血暈

獨行散 治產後血暈

奪命散 治產後血暈

四味散 治產後血暈

黑神散 治產後血暈

紅花散 治產後血暈

鹿角散 治產後血暈

鬱金散 治產後血暈

治血鬱方 治產後血暈

牡丹散 治產後血暈

產書一方 治產後血暈

荆芥散 治產後血暈

一方 治產後血暈

倉公 治產後血暈

白薇湯 治產後血暈

張露不下

荷葉散 治產後血暈

起枕散 治產後血暈

廣濟方 治產後血暈

通瘀飲 治產後血暈

沒藥丸 治產後血暈

保命集方 治產後血暈

治惡血不下 治產後血暈

黑龍丹 治產後血暈

血露不絕

芎歸加芍藥湯 治產後血暈

論血露不絕

一方 治產後血暈

加味四物湯 治產後血暈

千金方 治產後血暈

烏金散 治產後血暈

一方 治產後血暈

豆淋酒 治產後血暈

蒲酌飲子 治產後血暈

一方 治產後血暈

一方 治產後血暈

壯礪散 治產後血暈

一方 治產後血暈

血崩不止

一方 治產後血暈

論血崩不止

一方 治產後血暈

加味四物湯 治產後血暈

阿膠丸 治產後血暈

乾熱地黃散 治產後血暈

固經丸 治產後血暈

瑞蓮散 治產後血暈

一方 治產後血暈

千金方 治產後血暈

一方 治產後血暈

心痛

一方 治產後血暈

大巖蜜湯一名桂 治素有宿寒因寒 失笑散治惡血上攻

黃金散 治惡血上衝心腹 治惡血上衝心腹

伏龍肝散 治惡物不出 治惡物不出

腹痛 治產後血暈 治產後血暈

加味四物湯 治惡露不盡 治惡露不盡

一方 治血作痛 治血作痛

延胡索散 治惡血攻刺 治惡血攻刺

烏金散 治腹兒枕痛 治腹兒枕痛

因神散 治心腹切痛 治心腹切痛

丹溪散 治血塊 治血塊

荷葉散 治惡露不下 治惡露不下

又方 治下血不盡 治下血不盡

產寶湯 治血塊 治血塊

香桂散 治血塊 治血塊

當歸養血丸 治惡血不盡 治惡血不盡

玉燭散 治惡露不盡 治惡露不盡

下瘀血湯 治血塊 治血塊

千金桃仁芍藥湯 治產後 治產後

獨聖散 治血塊 治血塊

定痛散 治產後 治產後

富歸建中湯 治產後 治產後

海藏方 治血 治血

一方 治血 治血

當歸蒲延散 治產後血瘀 治產後血瘀

延胡散 治血 治血

地黃散 治血 治血

黑神散 治血 治血

卷荷散 治血 治血

隱居澤蘭湯 治血 治血

又方 治血 治血

延胡索 治血 治血

當歸血竭丸 治血 治血

紫金丸 治血 治血

枳實芍藥散 治血 治血

保命方 治血 治血

增損四物湯 治血 治血

當歸散 治血 治血

羊肉湯 治血 治血

生料五積散 治血 治血

千金方 治血 治血

獨聖散 治血 治血

定痛散 治血 治血

胎前症 乾地黃湯 治產後 治產後

蘇葛湯 治產後 治產後

當歸散 治產後 治產後

抵聖湯 治產後 治產後

腰痛 當歸黃芩湯 治產後 治產後

如神湯 治產後 治產後

廣濟方 治產後 治產後

桃仁湯 治產後 治產後

五香蓮翹湯 治產後 治產後

頭痛 一奇散 治產後 治產後

芎附散 治產後 治產後

通身疼痛 趁痛散 治產後 治產後

加味四物湯 治產後 治產後

腳氣 獨活寄生湯 治產後 治產後

登之十二 外感風寒 加味芍歸湯 治產後 治產後

中風 小續命湯 治產後 治產後

竹葉湯 治產後 治產後

竹葉湯 治產後 治產後

竹葉湯 治產後 治產後

竹葉湯 治產後 治產後

竹葉湯 治產後 治產後

華陀愈風散 治產後中風及

血風湯 治產後

防風湯 治產後中風及

雲岐方 治產後半身不遂言語

防風羊角湯 治產後中風及

川芎散 治產後中風

濟危上丹 治產後中風及

大豆紫湯 治產後中風及

獨活酒 治產後中風及

雞矢酒 治產後中風及

交加散 治產後中風及

一物獨活湯 治產後中風及

羌活散 治產後中風及

發瘧 治產後中風及

小續命湯 治產後中風及

大豆紫湯 治產後中風及

大豆紫湯 治產後中風及

一方 治產後中風及

羚羊角飲子 治產後中風及

防風當歸散 治產後中風及

瘰癧 治產後中風及

天德堂 治產後中風及

防風湯 治產後中風及

華陀愈風散 治產後中風及

當歸散 治產後中風及

增損柴胡湯 治產後中風及

秦艽湯 治產後中風及

拘攣 治產後中風及

舒筋湯 治產後中風及

芎藭散 治產後中風及

防已膏 治產後中風及

八珍散 治產後中風及

一方 治產後中風及

逐血補心湯 治產後中風及

狂言語 治產後中風及

奪命丹 治產後中風及

一靈三聖散 治產後中風及

胡氏抵風散 治產後中風及

華陀愈風散 治產後中風及

增損柴胡湯 治產後中風及

當歸散 治產後中風及

秦艽湯 治產後中風及

秦艽湯 治產後中風及

拘攣 治產後中風及

舒筋湯 治產後中風及

芎藭散 治產後中風及

防已膏 治產後中風及

八珍散 治產後中風及

一方 治產後中風及

逐血補心湯 治產後中風及

狂言語 治產後中風及

奪命丹 治產後中風及

一靈三聖散 治產後中風及

胡氏抵風散 治產後中風及

華陀愈風散 治產後中風及

增損柴胡湯 治產後中風及

當歸散 治產後中風及

秦艽湯 治產後中風及

秦艽湯 治產後中風及

拘攣 治產後中風及

舒筋湯 治產後中風及

芎藭散 治產後中風及

防已膏 治產後中風及

八珍散 治產後中風及

一方 治產後中風及

逐血補心湯 治產後中風及

狂言語 治產後中風及

奪命丹 治產後中風及

調經散 治產後中風及

栢子仁 治產後元氣虛

妙香散 治產後中風及

烏金散 治產後元氣虛

四物補心湯 治產後中風及

寧神膏 治產後元氣虛

琥珀地黃丸 治產後中風及

辰砂遠志丸 治產後中風及

顛狂 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

大聖澤蘭散 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

抱龍丸 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

加味八珍湯 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

調經散 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

茯神散 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

驚悸 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

加味四物湯 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

白茯苓散 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

乾熟地黃散 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

人參散 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

茯苓散 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

歸脾湯 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

白茯苓丸 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

恍惚 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

千金方 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

琥珀散 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

天麻丸 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

登二十三 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

產後下 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

虛煩 治產後中風及

見鬼神 治產後中風及

<b>金黃散</b> 治產後惡血不 <b>荷葉散</b> 治產後宿血不 <b>集驗方</b> 治產後心迷悶	<b>川芎散</b> 治產後餘血不盡 <b>經效方</b> 治產後氣虛血冷搏於血 <b>沒藥丸</b> 治產後心悶煩 <b>人參當歸湯</b> 治產後血不快 <b>甘竹茹湯</b> 治產後內虛煩短氣	<b>竹葉湯</b> 治產後短氣欲 <b>蓮白湯</b> 治產後胸中煩 <b>仲景二物黃芩湯</b> 治在病白發 <b>竹皮大丸</b> 治產後中虛煩亂嘔逆	<b>發渴</b> <b>千金竹葉湯</b> 治產後 <b>熱地黃湯</b> 治產後 <b>清心蓮子飲</b> 治產後	<b>清陰綱目</b> <b>括蕒根湯</b> 治產後 <b>當歸補血湯</b> 治產後血脫煩躁脉洪 <b>一方</b> 治產後虛 <b>桃花散</b> 治產後不 <b>自汗</b>	<b>黃著湯</b> 治產後虛 <b>止汗散</b> 治產後盜 <b>當歸六黃湯</b> 治產後盜 <b>參附湯</b> 治陽氣虛寒自汗惡寒逆冷 <b>著附湯</b> 治陽氣虛脫惡寒自汗或口 <b>全生活血湯</b> 治產後四肢無力行步艱難	<b>麻黃根散</b> 治產後自 <b>當歸二黃湯</b> 治產後自 <b>人參湯</b> 治產後盜汗 <b>千金方</b> 治產後虛汗出	<b>發熱</b> <b>補虛湯</b> 治產後一切雜病
---	---	---	--	--	---	--	---------------------------------

<b>丹溪方</b> 治產後 <b>抽薪散</b> 治產後血 <b>人參當歸散</b> 治產後去血過 <b>犀角飲子散</b> 治產後虛 <b>往來寒熱</b>	<b>柴胡四物湯</b> 治產後往 <b>增損四物湯</b> 治產後陰陽不 <b>大調經散</b> 治產後惡露不調增寒發熱 <b>小柴胡加生地黃湯</b> 治產後發熱 <b>產寶方</b> 治產後寒熱口 <b>瘧疾</b>	<b>草果飲子</b> 治產後瘧 <b>清脾飲</b> 治產後瘧疾寒 <b>七寶飲</b> 治產後瘧疾久而不 <b>尊勞</b>	<b>白茯苓散</b> 治產後 <b>當歸建中湯</b> 治產後虛弱不足腹 <b>柴胡四物湯</b> 治產後日久 <b>雲岐熟地黃散</b> 治產後四肢煩 <b>石子湯</b> 治產後虛弱面色萎黃 <b>胡氏牡丹散</b> 治產後虛弱經水不調 <b>黃著養散</b> 治產後勞傷發熱 <b>虛羸</b>	<b>加味四物湯</b> 治產後陰 <b>人參散</b> 治產後清虛 <b>加味逍遙散</b> 治產後 <b>三合散</b> 治產後虛 <b>增損柴胡湯</b> 治產後虛弱 <b>更生散</b> 治產後去血過多不止 <b>黃龍湯</b> 治產後傷風熱入 <b>加參烏金散</b> 治產後發熱 <b>知母湯</b> 治產後身溫壯	<b>生熟飲子</b> 治產後瘧 <b>人參養胃湯</b> 治產後瘧疾寒 <b>天德堂</b>	<b>黃著建中散</b> 治產後諸虛發 <b>加味佛手散</b> 治產後血虛 <b>三合湯</b> 治產後 <b>黃著丸</b> 治產後勞傷 <b>人參養胃散</b> 治產後勞傷 <b>猪腰子粥</b> 治產後勞傷	<b>補虛湯</b> 治產後一切雜病
--	--	---	--	---	---	--	--------------------

黃耆四物湯 新產補虛要藥以芍藥酸寒能

十全大補湯 治產後失血氣未復

黃雌鷄湯 治產後虛弱

一方 治產後虛弱

瘧悶 治產後虛弱

見睨丸 治產後虛弱

腹脹 治產後虛弱

抵聖湯 治產後虛弱

加味六君子湯 治產後虛弱

紫金丹 治產後虛弱

自聖散 治產後虛弱

浮腫 治產後虛弱

濟陰綱目

大調經散 治產後虛弱

經驗方 治產後虛弱

正脾散 治產後虛弱

橘皮酒 治產後虛弱

奪魂散 治產後虛弱

漢防己散 治產後虛弱

加味吳茱萸湯 治產後虛弱

加味八物湯 治產後虛弱

加減金匱腎氣丸 治產後虛弱

積聚 治產後虛弱

河間芍藥湯 治產後虛弱

一方 治產後虛弱

當歸羊肉湯 治產後虛弱

產寶方 治產後虛弱

又方 治產後虛弱

香砂養胃湯 治產後虛弱

加味平胃散 治產後虛弱

又方 治產後虛弱

小調經散 治產後虛弱

日水湯 治產後虛弱

小調中湯 治產後虛弱

丹溪方 治產後虛弱

張氏方 治產後虛弱

七聖丸 治產後虛弱

四神散 治產後虛弱

桂心丸 治產後虛弱

一方 治產後虛弱

產寶方 治產後虛弱

千金方 治產後虛弱

五苓散 治產後虛弱

白朮散 治產後虛弱

附子散 治產後虛弱

藿香正氣散 治產後虛弱

萊復丹 治產後虛弱

嘔吐 治產後虛弱

香靈丸 治產後虛弱

橘紅半夏湯 治產後虛弱

薑朮散 治產後虛弱

錢氏益黃散 治產後虛弱

加味四君子湯 治產後虛弱

產寶方 治產後虛弱

千金方 治產後虛弱

五苓散 治產後虛弱

白朮散 治產後虛弱

附子散 治產後虛弱

藿香正氣散 治產後虛弱

萊復丹 治產後虛弱

嘔吐 治產後虛弱

香靈丸 治產後虛弱

橘紅半夏湯 治產後虛弱

薑朮散 治產後虛弱

錢氏益黃散 治產後虛弱

加味四君子湯 治產後虛弱

吃嘔 治產後虛弱

丁香散 治產後虛弱

羌活散 治產後虛弱

一方 治產後虛弱

旋覆花湯 治產後虛弱

二母散 治產後虛弱

經效方 治產後虛弱

喘急 治產後虛弱

奪命散 治產後虛弱

二味參蘇飲 治產後虛弱

一方 治產後虛弱

集驗方 治產後虛弱

異攻散 治產後虛弱

一方 治產後虛弱

天德堂

五味子湯治產後

見眠凡治產後傷風

大補湯治產後百日外

鼻衄

加味參蘇飲

濟陰綱目目錄

卷之十四

泄瀉

調中湯治產後腸胃虛怯

草薢理中丸治產後元氣虛弱

神效參香散治產後脾胃虛寒

痢疾

濟陰綱目

救急散治產後赤白

白頭翁加甘草阿膠湯治產後下

黃連丸治產後熱滑赤

一方治產後血不止餘血

神仙感應丸治產後固無積滯

連翹丸治產後久病亦白痢

三聖散治產後血

治產後諸病雜方

必效方治產後病

經驗方治產後久不津液

大便秘澀

調導散治婦人產後產前

旋覆花湯治產後傷風

六君加失笑散治產後嘔

卷之十四

如味四君子湯治產後

槐連四物湯治產後熱滑

神效參香散方證見前

麻仁丸治產後去血過多津液枯

滋腸五仁丸治產後血氣虛損

麻蘇粥治產後有三種赤白

兵部手集方治產後秘結不通

大小便不通

通氣散治產後大便不通

枳殼丸治產後大便不通

金鑰匙散治產後大便不通

遺尿

補遺方治產後遺尿

加味補中益氣湯治產後脾虛

四神丸治產後遺尿

廣濟方治產後遺尿

濟陰綱目

淋閉

茅根湯治產後諸淋無問冷

滑石通淋散治產後小便赤澀

石膏散治產後小便赤澀

一方治產後血淋

療卒不得小便方

灸臍法治產後小便不通腹脹

小便數

桑螵蛸散治產後陽氣虛弱

補遺方治產後小便數

小便不禁

千金方治產後小便不禁

又方治產後小便不禁

卷之十四

滑石散治產後

加味四物湯治產後血虛

張氏方治產後小便不通

括囊散治產後小便數

治產後小便數

治產後小便數

治產後小便數

治產後小便數

治產後小便數

治產後小便數

治產後小便數

治產後小便數





究源五物湯 治乳癰發背

橘香散 治乳癰已結未結痛

一方 治乳癰

二灰散 治乳癰不消熱毒

獨勝散 治乳癰不消熱毒

又方 治乳癰

一方 治乳癰

葱熨法 治乳癰

一方 治乳癰

雜方 治乳癰

乳妬

連翹湯 治乳妬

一方 治乳妬

天麻湯 治乳妬

飛鳥散 治乳妬

黃連胡粉膏 治乳妬

鹿角散 治乳妬

補遺方 治乳妬

乳癰

青皮散 治乳癰

益氣養榮湯 治乳癰

木香餅 治乳癰

乳癰

乳癰

括莢散 治乳癰

補遺方 治乳癰

通和湯 治乳癰

夜陰散 治乳癰

一方 治乳癰

勝金丹 治乳癰

敷乳方 治乳癰

一方 治乳癰

柳根熨法 治乳癰

瓜蔓散 治乳癰

赤龍皮湯 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

十六味流氣散 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

目錄終

濟陰綱目卷之一

關中 武之望叔卿父輯者 錢塘 張志聰隱居

西陵 汪 洪濟濟子箋釋 天都 程 望于 醫藥

○調經

良方論曰岐伯云女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任

脈通太衝脈盛月事以時下天癸之氣榮于子宮之水故云

天癸也然衝為血海任主胞胎二脈流通經血漸盈應時而下常

以三旬一見以象月盈則虧也若遇經行最宜謹慎否則與產後

症相類若被驚恐勞役則血氣錯亂經脈不行多致勞瘵等疾若

之過天此其 逆於頭而肢體之間則腫痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血

常也然有六

論心脾為經血主統

薛立齋曰經云飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於

肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行東垣先生所謂脾為

生之源心統諸經之血誠哉是言也心脾平則經候如常

或七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃虛損心火妄動

則月經不調矣大抵血生於脾土故云脾統血凡血病當用苦甘

之藥以助陽氣而生陰血也

○論脾胃生血

薛立齋曰血者水穀之精氣也和調五臟瀝陳六腑在男子則化

化液入心而

化液入心而

化液入心而

化液入心而

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

子 52-221

主亦藉肝氣  
化生故不可  
不知  
知水穀之精  
氣是生血之  
本則知脾胃  
成脾胃之健  
而血不  
不可專主  
手太陽少陰之經  
陽小腸手少陰心經  
之係功能調攝得宜則經應以時矣  
○論三月一來為居經  
脈經云師曰脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為可否者  
此為居經三月一來曰寸口脈微而遲微則衛氣不足遲則血氣  
不月此則又  
兼小腸而  
然小腸不通  
與心為合  
可通則故  
以通則為  
此言脈微  
血而虛之  
經  
此言寸脈微  
為積寒陽為聚熱陽盛不調經脈不足陰虛陽往一作故令少血  
時發酒漸咽燥汗出或瘦弱數多唾涎沫此令重虛津液漏泄故  
知非軀畜煩滿血月來一經三月一來陰盛則為名曰居經  
○論師尼算婦與子妻妾之治  
論師尼算婦與子妻妾之治

盛地氣不足  
故曰反也  
寸以放知  
此言陽脈浮  
太陰脈反弱  
之居經  
此男主內經  
而言以相火  
寄于肝也男  
女之經行也  
此出見太陰  
之氣結于春  
則入於心  
義必由子肝  
也為厥陰  
亦欲治此  
者當以柴胡  
湯為法  
其知氣法  
須隨證按  
方治之故  
不備列  
羅謙甫曰宋禧登療師尼算婦別製方者蓋有謂也此二種居  
獨陰無陽然心明而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧  
久則為勞皆讀史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背寒熱  
醫皆以為寒熱病倉公曰病得之欲男子不得也何以知診其脈  
肝脈弦出寸口是以知之蓋男子以精為主婦人以血為主男子  
精盛以思室女入血盛以懷胎也夫肝攝血者也足厥陰肝脈也  
出寸口上魚際則陰盛可知故知禧氏之言信有謂矣  
○論調經當抑氣  
濟生方論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣有所謂九氣  
喜怒哀思悲恐驚者七氣也七情以外益之以寒熱二證而為九  
氣也氣之為病男子婦人皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身  
血隨氣行氣一壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事  
將行預先作痛或月事已行淋瀝不斷心腹作痛或腰脇痛或引  
背脊上下攻刺吐逆不食甚則手足指搦狀類驚癇或作寒熱或  
為癥瘕肌肉消瘦非特不能受孕久而不治轉而為癆疾者多矣  
○論調經先去病  
李氏曰月水循環織機不作而有子若兼潮熱腹痛重則加之  
嗽汗嘔或瀉有汗則血愈消耗有咳嘔則氣往上行瀉則津偏  
於後痛則積結於中是以必先去病而後可以滋血調經就中  
熱疼痛尤為婦女常病蓋血滯積入骨髓便為骨蒸血滯積於  
中與日生新血相搏則為疼痛血枯不能滋養百骸則蒸熱於外  
血枯胞絡火盛或挾痰氣食積寒冷外邪則為疼痛

新經解  
症候  
此何思不

○論調經大法

方氏曰婦人經病有月候不調者有月候不通者然不通之中有兼疼痛者有兼發熱者此分而為四也然四者若細推之不通之中有趨前者有退後者則趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前為血實經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱也此又分而為八焉大抵婦人經病內因憂思忿怒外因飲冷形寒蓋人之氣血周流忽因憂思忿怒所觸則鬱結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不盡此經候不調不通作痛發熱之所由也大抵氣行血行氣止血止故治血病以

以經字推之  
則該者  
幸母執也而  
為先為佐元  
所當知

○論經水異色

丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅。稟火色也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁上應於月其行有常名之曰經為氣之配因氣而行成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷而行溫熱之劑則禍不旋踵矣良由病源論月水諸病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也或曰黑者北方水色

二公之說甚

用証相參元  
妨的確

也紫淡於黑非冷而何予曰經云尤則害承乃制熱甚苦必兼水化所以熱則紫甚則黑也塊婦人性熱而見即欲加倍臍腹厥陽之火無日不起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之蓋千百而一二也

準繩云冷症外邪初感入經必痛或不痛者久則鬱而變熱矣且寒則凝既行而紫黑故非寒也○葉氏曰血黑屬熱丹溪之論善矣然風寒外乘者十中常見一二何以辨之蓋寒主引澀小腹內必時常冷痛經行之際或手足厥冷唇青面白唇脈或遲或微或虛或雖大而必無力熱則尺脈或洪或數或實或雖小而必有力於此審之可以得其情矣

李氏曰心主血故以色紅為正雖不對期而色正者其色紫者風也黑者熱甚也淡白者虛也或挾痰停水以混之也如米泔水如屋漏水如豆汁或帶黃混濁模糊者濕痰也成塊作片血不

變者氣滯也或風冷乘之也色變紫黑者血熱也大藥紫者四物湯加防風白芷荆芥黑者四物湯加羌活連香附淡白者芎歸湯加參芪白芍藥香附有痰者二陳湯加芩歸如煙塵者二陳湯加泰芫防風蒼朮如豆汁者四物湯加平連成塊者四物湯加香附立胡索枳殼陳皮隨症選用

○論經候短期

王子亨曰經者常候也謂候其一身之陰陽忽伏知其安危故每月一至太過不及皆為不調陽太過則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致

一熱字而然  
症附又用其  
木南足等症  
其信之五種  
又分肝脾血  
分勞役五種  
尤為詳明  
思謂脾虛氣  
脾氣弱則  
脾氣之類  
血生於脾故  
色淡者其補  
脾宜此白木  
所必用也  
丹藥以高  
為配下用地  
黃藥者宜

丹溪云經水不及期而來者血熱也。四物湯加本連香附。○肥人  
 不及日數而多者痰多血虛有熱。南星白朮蒼朮黃連香附川芎  
 作丸。○薛氏曰先期而至有因脾經血燥者宜加味逍遙散。○有  
 因脾經鬱滯者宜歸脾湯。○有因肝經火者宜小柴胡湯加生  
 地黃。○有因血分有熱者宜四物湯加柴胡牡丹皮山梔子。○有  
 因勞役火動者宜補中益氣湯。  
 丹溪云經水過期血少也用川芎當歸人參白朮兼痰藥治之。○  
 過期色淡者痰多也。二陳湯加芎歸。○過期將黑有塊血熱也。必  
 作痛。四物湯加香附黃連。○薛氏曰過期而至有因脾經血虛者  
 宜入參養榮湯。○有因肝經血少者宜六味地黃丸。○有因體虛  
 而弱者宜八珍湯。  
 論月水多少  
 準繩云婦人病多是月經乍多乍少或前或後將發疼痛者不  
 準一側呼為經病不知陽勝陰勝所以服藥無効蓋陰氣乘  
 陽則已藏寒氣血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少  
 而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢  
 故令乍多而在月前當和血氣平陰陽斯為福也。○陽勝陰月候  
 多者當歸飲陰勝陽月候少者七沸湯。○又云經水過多為虛熱  
 為氣虛不能攝血。○經水過少為虛為虛則補之。○經水過多為  
 脈經曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰會更下利  
 若汗出小便利者可何以故師曰亡其津液故令經水反少設經  
 下多於前有當所若因當言恐大便難身無復汗也

在與凡主  
病為過  
虛

良方云婦人月水不利者由勞傷氣血體虛而風令客於胞內傷  
 於衝任之脈故也。若寸脈沉關脈沉是肝病也。兼主腹痛孔竅生  
 瘡尺脈滑血氣實經絡不利或尺脈絕不至兼主小腹引腰痛氣  
 攻胸膈也。  
 薛氏曰前證屬肝鬱二經滯肝相為表裏多因悲怒所傷。應若本  
 經風熱用補肝散。○血虛用四物加酸棗仁若腎水不足用  
 六味丸。若患諸瘧瘵治見後。  
 論月水不期  
 準繩云婦人月水不期淋瀝無時或因勞傷氣血而傷衝任或因  
 經行而合陰陽皆令氣虛不能攝血若時止時行腹痛脈沉細此  
 寒熱邪氣客於胞中非因虛弱也。○薛氏曰前証若經水不期  
 歸脾湯毒怒傷肝用逍遙散肝火妄動用加味四物湯。○經水不  
 用六君子湯元氣下陷用補中益氣湯。○熱傷元氣前湯加五味麥  
 門冬妙藥黃藥。  
 論過期不止  
 產寶云男子生於寅寅屬木陽中有陰故男子得八數女子生於  
 申申屬金陰中有陽故女子得七數男以氣為主八則卦數已  
 盡女以血為主七七則卦數已終終則經水絕衝任脈虛衰天癸  
 絕地道不通而無子矣。或勞傷過度喜怒不時經脈微之際又  
 為邪氣致衝所以當止不止而崩下也。許學士云婦人經脈過  
 期不止腰腹疼痛或七七數盡而月經下者宜用當歸散治之

此宜用十  
金大補丸  
婦人參  
湯之病

○論經病疼痛

達實云經水者行血氣通陰陽以榮於身者也氣血盛陰陽和則  
形體通或外虧衛氣之充發內乏榮血之灌溉血氣不足經候欲  
行身體先痛也此論

良方云婦人經來腹痛由風冷客於胞絡衝任或傷於太陽少陰

經用溫經湯桂枝桃仁湯若憂思氣鬱而血滯用桂枝桃仁生地

黃通經丸方見若血結而成塊用萬病丸

丹溪云經水將來作痛者血實也一云氣滯四物湯加桃仁香附

黃連○臨行時腰疼腹痛乃是鬱滯有瘀血四物湯加紅花桃仁

義術玄胡索木香有熱加黃芩柴胡○經行後作痛者血氣俱虛

也以八珍湯加減服○戴氏曰經事來而腹痛者經事不調而痛

清血細目 卷一 婦人 經水 痛

亦痛者皆血之不調故也欲調其血先調其氣四物湯加吳茱萸

半錢香附子一錢和氣飲加吳茱萸半錢亦可痛甚者玄胡索湯

然又恐感外邪傷飲食致痛痛不因血尤宜詳審和氣飲却能兼

治因冷而積因積而痛宜大溫經湯冷甚者去麥門冬不用

汪石山治一婦人瘦小年二十餘經水紫色或前或後隨行腹痛

惡寒喜熱或時感寒腹亦作痛脉皆細濡近滑兩尺重按洪洪而

滑此血熱也或謂惡寒如此何謂為熱曰熱極似寒也遂用酒煮

黃連四兩香附歸身尾各二兩五錢脂一兩為末粥丸空腹吞之

而愈

○一婦年二十一歲六月經行腹痛如割難忍求死脉得細數而

駛尺則沉弱而近駛注曰細軟屬虛數則為熱尺沉屬虛也

以

佳則止不  
尺則可久  
服經曰母使  
過之仍此是  
也

黃連久服之

精神注曰此非舊日比矣舊乃鬱熱今則虛寒東垣曰始為熱中

終為寒中是也經曰脉至而從按之不鼓乃陰盛陽虛當作寒治

且始病時而形飲小今則形肥大矣書曰瘦人血熱肥人血虛豈

可同一治也所可慮者汗大泄而脉不為汗衰血大虧而脉不為

血減耳其痛日重夜輕知由陽虛不能健運故亦凝滯而痛以

證察脉宜用助陽若得脉減痛輕方為佳兆遂投參桂湯以

加桂附一貼來早再診脉皆稍寧服至三十貼痛且愈蓋痛由

始終寒熱之異藥有前後用舍不同形有肥瘦壯少不等豈有

亦是寒涼太

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

通所謂以數

此係傷風反  
兩月一度上  
休以來

○薛新甫治一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反  
兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如常斯散薛曰脾為  
諸陰之首目為血脈之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸於胃矣  
遂用補中益氣湯生歸脾二湯專主脾胃年餘尋愈大全云客熱  
者因體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上  
無胸膈之悶虛熱口燥心煩手足壯熱者是也

容和而中  
薛氏曰前證若客邪所侵補中益氣加川芎防風肝虛血少夫味  
地黃丸胃火伏冷錢氏瀉黃散胃虛飲湯七味白朮散潮熱時熱  
入珍湯肺熱內熱逍遙散發熱體倦補中益氣湯毒熱發熱小柴  
胡湯寅卯酉戌時熱升陽益陰湯

論往來寒熱

濟陰綱目 卷一 潮熱

有熱入血室  
經水適來適斷或有信來寒熱者先服小柴胡以去其寒熱後以  
四物湯和之○薛新甫治一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口  
苦月經不調此肝火氣滯而血凝用小柴胡加山梔川芎丹皮治  
之諸病悉退

此公治飲  
男子不得之  
此時通身熱  
火降之病血  
赤是正注大  
約其意望變  
又與治本通  
大全云師尼姦婦與室女出嫁意期者多因慾心而不遂慊慊  
成病乍寒乍熱久則為勞又有經閉白淫痰涎頭風腦氣痞悶面  
癯瘦瘡等證皆姦婦之病也○薛氏曰前證若肝脈弦出魚際用  
小柴胡加生地黃送下生地黃九久而血虛佐以四物湯○若兼  
怒動肝火而寒熱者佐以加味逍遙散○一婦人因夫經期久不  
歸發寒熱月經旬日方止服降火涼血藥反潮熱內熱自汗盜汗  
月經頻數余曰熱汗氣血虛也經頻肝脾虛也用歸脾湯大味凡

而愈  
論熱入血室

良方云婦人傷寒傷風發熱經水適來晝則安靜暮則譫語有如  
瘧狀此為熱入血室治者無犯胃氣及上二焦宜服小柴胡湯若  
脈遲身涼當刺期門穴下鍼病人五吸停鍼良久徐徐出鍼凡鍼  
期門穴必瀉勿補肥人二寸瘦人寸半也

○許學士治一婦人病傷寒發熱遇夜則如見鬼狀經六七日忽  
然昏塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢危困許視之曰  
得病之初曾值月經來否其家云經水方來病作而經遂止得一  
二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從曰昨不省人事許曰此乃熱  
入血室証仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明子暮則

濟陰綱目 卷一 潮熱

譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉以邪刺之  
遂致胸膈不利涎潮上脫喘急息高昏冒不知人當先化其痰後  
除其熱乃急以一呷散投之兩時頃頃下得睡省人事次投以小  
柴胡湯加生地黃三服而熱除不汗而自解矣

○一婦人患熱入血室証醫者不識用補血調氣藥治之數日遂  
成血結胸或勸用前藥許公曰小柴胡已遲不可行也無已用期  
門穴斯可矣予不能鍼請善鍼者治之如言而愈或問熱入血室  
何為而成結胸也許曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行遇  
經水適來適斷邪愈乘虛入於血室血為邪所迫上入肝經肝受  
邪則譫語而見鬼復入胆中則血結於胸中矣何以言之婦人平  
居水養不血養肝方木受孕則下行之為月水既孕則中畜之以

於腹中結於乳下故手觸之則痛非藥可及故當刺期門也

○虞恒德治一少婦夏月行經得傷寒似瘧諸語狂亂諸醫皆以

傷寒內熱投雙解散解毒湯服之大汗如雨反如風狀次以牛黃

丸金石之藥愈投愈劇一日延虞診視脈弦而大虞思傷寒內熱

存故也因細問之患者曰正行經時因飲食後多汗用冷水沐浴

因得此證方知冷水外閉其汗內阻其血邪熱入室經血未盡血

得邪熱乍靜乍亂寒熱語掉眩類風須得玉燭散下之而愈下

後諸語已定次以四物小柴胡湯調理五日熱退身涼患遂瘳

○以脈六七至行義云一婦人溫病已十二日論之其脈六七至而漸寸稍大尺

稍小發寒熱煩赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬

少陽熱入血室也苦治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服

五味丸

五味丸

仲景方

○薛立齋治一婦人懷抱素鬱感冒經行諸語服發散之劑不應

用寒涼降火前證益甚更加月經不止肚腹作痛嘔吐不食痰涎

自出此脾胃虛寒用香砂六君子脾胃漸健諸證漸退又用歸脾

湯而全愈

○汪石山治一婦人經行必滿三日然後行診其脈皆濡弱此脾虛也

脾虛血弱經水將動脾血先已流注血海然後下流為經脾血

既虧則虛而不能運行其氣令作參苓白朮散每服一錢一日米

飲調下二三次月餘經不瀉矣

○一婦年逾四十形長色脆病經不行右脈浮軟而大左脈虛軟

而小近服常時經前作泄今年四月感風咳嗽用湯洗浴汗多因

泄一月六月復因洗浴發泄六七次雖止而神思不爽至八月

盡而經水過多白帶時下瀉泄後覺右腳疼痛舊曾閃脚跟今則

五味丸

五味丸



補下元加草靈甘岸



<p>氣染小腹痛加玄索 若腹中刺痛惡物不下倍加當歸芍藥 若腹痛作發經脈不快加熟地黃一倍添桂心半倍 經行腹痛腰痛加雲薑牛膝紅花吳茱萸荳蔻甘草銀器煨心 熱服</p>	<p>若經水澀少加葵花煎又加紅花血見愁 若經水少而色和者倍加熟地黃當歸 若經水暴下加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去黃芩 若經水如黑豆汁者加黃芩黃連 經水過多別無餘證宜黃芩六合湯四物湯黃芩白朮等分 經血淋漓不斷加乾薑蓮房炒入藥</p>	<p>陰陽交合經脈行加赤石脂黃芪肉桂百草藉熟節敗櫻灰肉豆 菴當歸木香龍骨白茯苓白朮地榆 若經水適來適斷或有寒熱往來者先服小柴胡湯以去其寒熱 後以四物湯和之如寒熱不退勿服四物是謂變証表邪猶在不 能效也依前論中變証隨証用藥調治</p>	<p>若血崩者加生地黃蒲黃 補血住崩加百草霜櫻灰首烏歸灰蒲黃炒過龍骨白朮 血成片加地黃藕節血黑片加人參白朮 若血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾 月水不調血崩或多或少或前後嘔逆心膨加陳艾黃芪 若赤白帶下宜香桂六合四物湯加桂枝香附各減半</p>	<p>以經行法 安胎經行法 須識表證 有次序可法 以經行法 中經加艾 人參開冷 而用膠艾 味可安也</p>
--	--	---	--	---

<p>四物湯為細末蜜煉九梧子大空心米飲湯下三四十丸治高年 婦人白帶良驗如白淫濁加龍骨地黃當歸如濁下五色研麝香 好酒下如鮮紅溫酒鹽湯下如帶下加肉桂蒲黃百草霜甘草黑 豆白朮玄胡索白蔞龍骨空心鹽酒下如白帶加白龍骨酒下 若婦人血積者加廣茂京三稜桂乾漆<small>炒制盡</small> 若經血凝滯腹內血氣作疼加廣茂官桂等分王右肅云熟地黃 滯血安能止痛不若以五靈脂代之 血滯不通加桃仁紅花 經閉加枳殼大黃荊芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔子 車前子 血寒加甘草烏梅柴胡柳枝 漸陰綱目</p>	<p>月經久閉加肉桂甘草黃芪黃芩子木通紅花 月水不通加野苧根牛膝紅花蘇木舊酒小同煎血氣不調加吳 茱萸等分甘草減半 諸虛不足加香附子 四物湯加甘草半兩為細末煉蜜九每兩作八丸酒醋共半盞煎 湯同化調下名當歸煎去敗血生好血如人行五里再進一服無 時</p>	<p>若虛熱病四物湯與參蘇飲相合石補心湯主之添柴胡名五神 湯大能補虛退虛熱 潮熱加黃芩地骨皮柴胡一方加柴胡乾葛黃芩人參 虛熱口乾加麥門冬黃芩</p>	<p>以甘能補 生散養血 惟氣不足 宜之如受 氣血倍 最妙</p>	<p>以經閉而用 和水之藥何 也豈非以下 焦氣滯而通 之耶 漸陰綱目 卷一調經 七 天德堂</p>
---	---	--	---	---

<p>虛渴加人參乾葛烏梅括實根  <small>各一</small>          虛而多汗加煖牡蠣黃根          虛寒潮熱加柴胡地骨皮白朮茯苓甘草桑白知母黃芩麥芽貝母人參烏梅梨子          若四股腫痛不能舉動宜以蒼朮各半湯主之          若大便燥結四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散主之          若流注濕燥宜四物理中各半湯          若氣血俱虛四物與四君子湯各半名八珍湯主之加縮砂仁保胎氣令人有子有熱加黃茶          若因熱生風者加川芎柴胡防風          若清熱生風者加薄荷乃行肝肺之氣血結滯生熱也與用          血氣勞加刺芥柴胡          清陰綱目          血風兩脇痛或盤腸成塊加大黃單橫孔香          血弱生風四肢痺痿行步艱難加人參孔香沒藥麝香甘草五靈脂羌獨活防風荆芥地龍南星附子澤蘭為末蜜丸木瓜鹽湯下          血風膨脹加甘草木香枳殼馬兜鈴葶藶蘇藿香地黃空心服          臍腹秘加大黃桃仁          滑泄加官桂附子          嘔吐不止加藿香白朮減半人參再減半          嘔逆飲食不入加白朮丁香甘草人參白朮益智仁胡椒          若咳嗽加桑白皮牛黃人參生薑北五味子甘草          若發寒熱加乾生薑牡丹皮柴胡</p>	<p>若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已          若心腹脹滿加枳實青皮          汗多加浮麥          腸風下血加槐角槐花枳殼荆芥黃芩大腹皮紅內消地榆石楠          蘇白鷄冠花為散煎一半為末空心鹽湯舊酒調下          鼻衄吐血加竹葉青蒲黃藕節半夏丁香訶子桂花紅棗飛羅麵白          赤眼生風加防風黃芩          赤眼頭風疾加薄荷清茶          藥酒滋生地黃          奶癰加連翹天茄子紅內消白芷菰片荆芥牛膝山蜈蚣乳香沒</p>
---	---

<p>此以四散腫          若諸痛有濕者四物與白朮相半加天麻茯苓穿山甲用酒煎服          治老人風秘加青皮等分          治瘡疾加荊芥酒煎常服          赤眼生風加防風黃芩          赤眼頭風疾加薄荷清茶          藥酒滋生地黃          奶癰加連翹天茄子紅內消白芷菰片荆芥牛膝山蜈蚣乳香沒</p>	<p>若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已          若心腹脹滿加枳實青皮          汗多加浮麥          腸風下血加槐角槐花枳殼荆芥黃芩大腹皮紅內消地榆石楠          蘇白鷄冠花為散煎一半為末空心鹽湯舊酒調下          鼻衄吐血加竹葉青蒲黃藕節半夏丁香訶子桂花紅棗飛羅麵白          赤眼生風加防風黃芩          赤眼頭風疾加薄荷清茶          藥酒滋生地黃          奶癰加連翹天茄子紅內消白芷菰片荆芥牛膝山蜈蚣乳香沒</p>
---	---

<p>風濕赤腫加荆芥牛蒡子何首烏甘草防風羌活地黃鹽酒</p> <p>痲腫加大腹皮赤小豆茯苓皮生薑皮</p> <p>若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者加黃芪白朮茯苓甘草宜</p> <p>八物湯</p>	<p>以有汗入桂枝湯也</p> <p>若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽經病宜表虛六合湯四物湯桂枝地骨皮各七</p> <p>若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊太陽經病宜表實六合四物湯麻黃細辛各半</p> <p>若妊娠傷寒中風濕之氣脈節煩疼脈浮而熱頭痛此太陽標病也宜風濕六合湯四物湯防風蒼朮各七</p> <p>若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦紋宜升麻六合四物湯陰綱目卷一調經通用諸方</p> <p>若妊娠傷寒胸膈滿痛脈弦少陽頭昏項強宜柴胡六合四物湯兩柴胡黃芩各七</p> <p>合小柴胡</p> <p>若妊娠傷寒大便難小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急下之宜大黃六合四物湯兩黃芩兩桃仁十箇去皮</p> <p>若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止宜人參六合四物湯兩人參五味子各半</p> <p>若妊娠傷寒汗下後虛弱脈微者陽明本虛也宜厚朴六合小治</p> <p>若咳嗽喘滿四物湯兩厚朴枳實各半</p> <p>若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合四物湯兩梔子黃芩各半</p>
---	--

<p>若妊娠傷寒身熱大渴發熱而煩脈長而大者宜石膏六合四物湯兩石膏知母各半</p> <p>若妊娠傷寒小便不利者宜茯苓六合四物湯兩茯苓澤瀉各半</p> <p>若妊娠傷寒太陽病小便赤如血狀者宜琥珀六合四物湯兩琥珀茯苓各半</p> <p>若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合四物湯兩阿膠艾各半兩一方加甘草同煎</p> <p>若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合四物湯兩附子炮去皮桂各半</p> <p>若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯四物湯加生地黃大黃兩兩</p> <p>四物與麻黃桂枝白虎柴胡理中四逆黃芩承氣涼膈等皆可作各半湯不能殫述此易老用藥大略也</p> <p>安胎及漏下血加阿膠大艾甘草蒲黃炒過</p> <p>若胎動不安下血不止每服加艾葉五七片更加葱白阿膠末黃耆減四味之半當歸只用小半如疾勢甚者以四味各半兩細剉以水四盞熟艾六塊如鷄子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分作四服一日令盡一方加粉草乾姜黃芪日二三服至二臘七日</p> <p>加阿膠艾葉水煎服名六物湯胎前產後每日可一二服亦治血刺不止腹痛難忍</p>	<p>合白虎湯</p> <p>合四苓</p> <p>非仲景法</p> <p>仲景無此</p> <p>此仲景法</p> <p>所謂有故無損也</p> <p>濟陰綱目卷一調經通用諸方</p> <p>生地黃大黃兩兩</p> <p>三</p> <p>天德堂</p>
---	--

婦人少氣 一方加黃芪栢葉阿膠甘草續斷治平常經血淋漓不斷或或多或少或赤或白非時漏下多服有效受胎小腸氣痛加木香懷香九為辛地宜識之簡驗

冬 胎前嗽加枳殼甘草款冬馬兜鈴半夏不通導人參桔梗麥門

衛肝一症先 胎氣衝肝腰脚痺行步艱難加枳殼木通連翹荆芥地黃羌獨山

皆涼血去風 枳甘草燈心空心服

熱亦為肝氣 也 姪娘心煩加竹茹一塊

如有敗血則用當歸近上節易白芍藥以赤熱地黃以生

作惡生寒而 姪娘作惡生寒面青不思飲食憔悴加陳皮枳殼白木茯苓甘草

足元宜血之 損孕下血不止頭痛寒熱耳鳴氣血勞傷所致加黃芩荆芥生地

血為熱宜黃 黃赤芍藥生薑

濟陰綱目 卷一 婦經通用諸方 三 天德堂

臨產小腹緊痛加紅花滑石甘草燈心葵子

產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

產後腹痛血塊攻腸加大艾沒藥好酒

若因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生薑煎

若產後被驚氣滯種種積滯敗血一月內惡物微少敗血作病或

脹或疼胸膈痞悶或發寒熱四肢疼痛加玄胡沒藥香白芷與四

物等分為細末淡醋湯或用童便酒調下

如血風於產後乘虛發作或產後傷風頭疼發熱自骨節痛每四

物湯加荆芥穗天麻香附子石膏薑香各二分 每服三錢水一

盞煎至七分服

產後傷風頭痛加石膏甘草

若產後虛勞日久而脈浮疾者宜柴胡四物湯乃本方與小柴胡湯合用也

若產後諸症各隨六經以四物與仲景藥各半服之甚效

產後虛熱煩悶加生地黃

產後腹痛加枳殼肉桂

產後寒熱往來加柴胡麥門冬

產後敗血染心加地骨皮芍藥 地骨皮發未苦

產後潮熱加白朮北柴胡甘草牡丹皮地骨皮

產後病眼加北細辛羌活荆芥菊花甘草木賊石決明草決明

產後浮腫氣急腹脹喉中水雞聲加牡丹皮荆芥白朮桑白皮赤

小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑蔥白薄荷

濟陰綱目 卷一 婦經通用諸方 三 天德堂

產後失音不語加訶子人參沙蜜百藥煎

產後悶亂加茯神遠志

胎前產後癆後風加乳香龍骨柴胡木香肉桂蒼朮牡丹皮白薇

人參甘草澤蘭大椒懷香煉蜜為丸木瓜酒下

簡易當歸散 治經脈不勻或三四月不行或一月再至或腰腿

疼痛不依時而行

當歸 川芎 白芍藥 黃芩 各一兩 白朮

山茱萸肉 各一兩半

右為細末空心溫酒調下三錢日三服或剉每服七錢加生

薑水煎服如冷去黃芩加肉桂一方有熟地黃

增損四物湯 治月事不調心腹疼痛補血溫經駐顏

此方不用地 黃而補肝脾 清金制水又 是四物湯之 一變用以此 惟之應變無 窮矣



玄胡索 各二 人參 黃芪 各一分  
右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食前米飲下

○治經候先期  
先期湯 治經水先期而來宜涼血固經  
當歸 白芍藥 生地黃 黃藥 知母 炒各  
條芩 黃連 川芎 阿膠 炒各  
香附子 甘草 各七分  
右作一服水二鍾煎一鍾食前溫服

金匱土瓜根散 治帶下經水不利小腹滿痛經一月再見者  
土瓜根 芍藥 桂枝 鹿膠 各七分  
右四味搗為散酒服方寸七日三服

○治經候過期 只此二方為未盡  
過期飲 治經水過期不行乃血虛氣滯之故法當補血行氣  
當歸 白芍藥 熟地黃 香附 各二 川芎 各一  
紅花 桃仁 泥分 蓬莪茂 木通 各五分 甘草 四分  
肉桂 分  
右作一服水二鍾煎一鍾食前溫服

滋血湯 治婦人血虛損血脈虛弱月水過期  
人參 黃芪 山藥 各一 白茯苓 各一  
川芎 白芍藥 熟地黃 各一  
右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

○治經水過多

當歸飲 治經水過多 抑陽助陰調經理脈若月水過多別無餘證  
當歸 酒炒 川芎 白芍藥 熟地黃 酒蒸 白朮  
黃芩  
右到水煎服○如久不止成血崩者加阿膠 炒 山梔子 炒 地榆  
荆芥 甘草或再不止更加搗茅根汁磨墨同服

膠艾湯 治勞傷氣血衝任虛損相水過多淋瀝不止及妊娠調  
攝失宜胎氣不安或因損動下血並治  
熟地黃 白芍藥 各一 當歸 艾葉 各七分 阿膠 炒 各  
川芎 甘草 各五分  
右到水煎服 一方加地榆黃芪

丹溪方 治婦人稟受弱氣不足極血故經水來多  
白朮 一錢 黃芪 生 陳皮 各一 人參 五分 甘草 二分  
右到水煎服

○治經水過少  
七沸湯 治榮衛虛經水過期或過或少腹痛一云陰虛陽虛  
少者用此  
當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 蓬朮  
川薑 木香 各等分  
右每服四錢水一盞半煎至八分溫服

四物加荊花湯 治經水過少  
當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 荊花 各一  
一升又加紅花血見愁

<p>右到水煎服</p> <p>妙在色和二字尤妙在加後二物</p>	<p>四物湯加熟地黃當歸湯 治經水少而色和</p> <p>四物湯 再加熟地黃 當歸各一兩</p> <p>右每服一兩水煎服</p>	<p>○治月水不利</p> <p>牛膝散 治月水不利。臍腹作痛。或小腹引腰。氣攻胸膈。</p> <p>牛膝 酒洗 桂心 赤芍藥 桃仁 去皮 玄胡索 炒</p> <p>當歸 酒洗 木香 牡丹皮 各七錢半</p>	<p>右為細末每服三錢空心溫酒調下或五六錢水煎亦可</p> <p>牡丹散 治月候不利。腹臍疼痛不欲食</p> <p>牡丹皮 大黃 炒 赤茯苓 桃仁 當歸</p>	<p>濟陰綱目 卷一 調經通月諸方</p> <p>生地黃 桂心 赤芍藥 白朮 各七錢半 石葦 去毛</p> <p>木香 各五錢</p>	<p>右吹咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分空心溫服</p> <p>養榮湯 治婦人血海虛弱。心中恍惚。時多驚悸。或發虛熱。經候不利</p>	<p>當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 青橘皮</p> <p>薤黃 川薤 五加皮 牡丹皮 海桐皮</p> <p>白芷 各等分</p>	<p>右到每服五錢水一盞半生薑五片烏梅一箇煎至一盞溫服不拘時</p>	<p>玄歸散 治月經壅滯。臍腹滿痛</p>	<p>此方以重在一二字。與他方不同。若因下利而致者。則不可。</p>
-----------------------------------	--	--	--	---	---	---	------------------------------------	-----------------------	------------------------------------

<p>當歸 玄胡索 各等分</p>	<p>右為粗末每服三錢加生薑三片水煎稍熱服</p> <p>歸脾丸 治月經不利。臍下膨脹。逆氣腹滿</p> <p>當歸 四錢 乾漆 三錢 炒 令烟盡</p>	<p>右為細末。煉蜜丸如桐子大。每服十五丸溫酒下</p> <p>○治月水不調</p> <p>止經湯 治婦人困倦。多睡。少食。經水時時淋瀝。或成片。或下赤白黃水。面色青黃。頭眩目花。四肢酸疼。此證急宜調理。免致崩漏</p>	<p>當歸 川芎 白芍藥 炒 熟地黃 各一兩 白朮</p> <p>黃芩 阿膠 炒 蒲黃 炒 栢葉 各七錢 香附 一兩</p>	<p>濟陰綱目 卷一 調經通月諸方</p> <p>砂仁 甘草 各五分</p>	<p>右作一服。加生薑三片水煎空心服</p> <p>蒲黃散 治血經不止</p> <p>黃芩 五分 當歸 栢葉 蒲黃 各四錢 生薑 二分</p> <p>艾葉 一分 生地黃 二十四分 伏龍肝 十二分</p>	<p>右吹咀。用水二升煎取八合分二服</p> <p>固經丸 治經水過多不止。乃陰虛挾熱所致。法當補陰清熱</p> <p>黃芩 白芍藥 各三兩 黃芩 二兩 梔板 四兩</p> <p>梔板 香附子 各一兩半</p>	<p>右為細末酒糊丸。桐子大。每五七十丸白湯下</p>	<p>○治過期不止</p>	<p>此方以生地為主。而黃芩止用一分。又無補氣之藥。當知此</p>
-------------------	---	--	--	--	---	---	-----------------------------	---------------	-----------------------------------

子 52-236



川芎 蓬木 官桂 紅花  
 右劉每服一兩水二錢酒少許同煎食前服  
 號珀散 治婦人月經壅滯每發心腹臍痛不可忍及治產後  
 惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死者  
 京三陵 蓬茂木 赤芍藥 劉寄奴  
 牡丹皮 熟地黃 真蒲黃 當歸  
 官桂 菊桂 各一兩  
 右前五味用烏豆一升生薑半切切片米醋四升同煮至豆爛  
 為度焙乾入後五味同為細末每服二錢溫酒調下空心食前  
 服○本事云一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之  
 秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血衝心二服便下常服  
 濟陰綱目 卷一 調經通經方 圭  
 尤佳予前後救人急切不少亦宜多合以濟人  
 玄胡索散 治血氣攻刺疼痛及新舊虛實腹痛  
 當歸 赤芍藥 玄胡索 蒲黃 桂皮  
 乳香 沒藥 各一  
 右為細末每服三錢溫酒空心服  
 當歸散 治婦人久積血氣痛小便刺痛四肢無力  
 當歸 赤芍藥 劉寄奴 枳殼 蘇炒  
 玄胡索 沒藥 各等  
 右為末熱酒調下二錢不拘時服  
 經驗方 治婦人臍腹疼痛不省人事只一服立止人不知者  
 是心氣痛誤矣

木通 芍藥 五靈脂 等分  
 右咬咀每服五錢醋水各半盞煎七分溫服  
 二神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛引心疏經行滯少或經  
 事不調以致疼痛  
 楠紅 玄胡索 去皮當歸 各一兩  
 右為細末酒煮米糊為丸如梧桐子大每服七十丸加至百丸  
 空心艾湯送下米飲亦可  
 交加散 治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚  
 為瘕及產後中風  
 生地黃 生薑 各五兩 各  
 右交互取汁浸沽一久汁盡為度各炒黃末之尋常腹痛酒調  
 下三錢產後尤不可缺  
 交加散 治榮衛不和月事甚澀逐散惡血治臍腹撮痛腰腿重  
 墜  
 生薑 二斤搗取 生地黃 二斤搗取 白芍藥  
 當歸 玄胡索 醋紙包煨熟 蒲黃 各一斤  
 桂心 兩 紅花 血不用 沒藥 半兩  
 右將地黃汁炒生薑生薑汁炒地黃淨各焙乾同諸藥為細  
 末每服三錢溫酒調下 若月經不依常蘇木煎酒調下 若  
 腰痛帶球子煎酒調下  
 交加地黃丸 治婦人經不調血塊脹痞肚腹疼  
 生地黃 老生薑 各一斤 俱另 玄胡索

而為丸而沒  
藥肉桂為一  
家此以三友  
人參桃仁為  
一家亦不其  
相違問古人  
方須得古人  
藥法

升陽治血  
多用瓦龍子  
方治血塊  
多用薑桂  
藥而此用大  
黃藥宜藥  
宜熱者如

即桂枝湯法  
也芍藥用赤  
者妙

要依此字  
縮字用藥亦  
奇

最在公痛

當歸 川芎 芍藥各二 明乳香

木香 各一 桃仁 去皮 人參 各半 香附 半

右為末。先以生薑汁浸地黃。以地黃汁浸生薑。淨晒乾。皆以  
汁盡為度。其十一味合一處晒乾。研為末。醋糊為丸。空心薑湯  
下。五七十丸。

左龍丸 治瘀血作痛。

香附 四兩 當歸 牡丹 桃仁 去皮 大黃 各二兩

川芎 紅花 各半 瓦龍子 煨醋煮一 晝夜二兩

右為末。炊餅丸。空心溫酒下三四丸。

已上諸方。行瘀血之劑。

桂枝桃仁湯 治經候前偶感風寒腹痛不可忍

濟陰綱目 卷一 治經病 天德堂

桂枝 芍藥 生地黃 各二 甘草 一錢

桃仁 七錢

右為粗末。生薑三片。棗一枚。水煎溫服。一婦人冬月經行。偶值  
不行。腹痛不可忍。用此藥一劑而痛止。經復行。其効如神。

柴胡丁香湯 治婦人年三十歲。臨經預先腰膈痛甚。則腹中亦

痛。經縮二三日。

柴胡 一錢 羌活 當歸 各一 生地黃 一 丁香 四分

全蝎 二箇

右剉作一服水四盞。煎至一盞。去渣。稍熱食前服。

小溫經湯 治經候不調。臟腑冷痛。

當歸 附子 炮各等分

右吹吧。每服三錢。水煎。空心服。

沒藥 除痛散 逐寒邪 療腹痛

蓬朮 煨一 當歸 玄胡索 五靈脂

肉桂 去粗 良薑 炒 蒲黃 炒 甘草 炙

沒藥 各半

右為末。每服五錢。溫酒服。

已上諸方。祛風冷之劑。

治經病發熱

逍遙散 治血虛煩熱。口燥咽乾。減食嗜睡。月水不調。又主榮衛  
不和。痰嗽潮熱。肢體羸瘦。漸成骨蒸。

當歸 酒 白芍 炒 白朮 白茯苓

柴胡 錢各一 甘草 分五

濟陰綱目 卷一 治經病 天德堂

右加生薑三片。麥門冬二十粒。去心。水煎服。不拘時。○一方加

牡丹皮。梔子炒。名加味逍遙散。○一方加知母。地骨皮。○有嗽

加桑白皮。貝母。桔梗。知母。麥冬。○咳血。加生地黃。山梔。牡丹皮。

○嘔吐。加陳皮。半夏。旋覆花。○增燥。加黃連。或麥冬。連二陳

湯

加味四物湯 治衝任虛損。月水不行。肌膚發熱。如勞瘵狀。

當歸 川芎 白芍藥 生地黃 各一兩

柴胡 半 黃芩 二錢

右咬咀。每服八錢。水煎服。○如骨蒸。四物湯加地骨皮。牡丹皮。

○一方四物湯加胡黃連。極苦。

最宜是腰  
藥肉桂是溫  
藥

此方重在腰  
胃及行肝膽

黃連放不用  
生地

陽明則熱如  
肝陰不足而  
肝火獨甚者  
宜之脾開壯  
者可加胡黃  
連

六神湯 治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進飲食  
 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 黃芪  
 地骨皮 各一錢  
 右以咀水煎空心服  
 ○治往來寒熱  
 本方 治婦人血脈不調往來寒熱狀如勞傷  
 當歸 川芎 黃芪 甘草 白芍藥 熟地黃 各一錢  
 右為細末每服五錢水一盞半煎空心服白湯服亦得當示  
 不生帶下調血脈養子宮終身無病  
 地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱或嘔或泄  
 地骨皮 柴胡 各一錢 白芍藥 熟地黃 各一錢  
 前胡 黃芪 各五分 人參 白茯苓 各一錢  
 白芍藥 甘草 五加皮 雞內金 各一錢  
 右以咀每服三五錢水一盞半煎生薑三片煎七分服  
 柴胡散 治婦人寒熱體瘦腹痛乾心煩不欲飲食  
 北柴胡 赤茯苓 黃芪 白芍藥 各一錢  
 麥門冬 三錢 龍眼 二錢 人參 地骨皮 各一錢  
 枳殼 生地黄 桑白皮 赤芍藥 各一錢  
 桔梗 甘草 各五分  
 右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾末拘時服  
 七寶湯 治寒熱往來

防風去風 知母 生地黃 各半 柴胡 去蘆  
 前胡 去蘆 桑白 甘草 各二錢  
 右以咀每服五錢水一盞半加人參三分煎七分服  
 柴胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱此四物湯與小柴胡  
 湯合方也 日微有寒熱則似病未甚  
 當歸 川芎 芍藥 熟地黃 各一錢  
 柴胡 人參 黃芪 半夏 各一錢  
 甘草 各三錢  
 右到每服一兩生薑三片水煎  
 柴胡抑肝散 治寒居獨陰無陽感心煩而多不遂是以惡寒發  
 瘧 瘧  
 柴胡 二錢 青皮 二錢 赤芍藥 二錢 牡丹皮 各一錢  
 蒼朮 半斤 山梔子 炒 地骨皮 香附子 各一錢  
 神麴 八分 川芎 七分 生地黃 連翹 各五分  
 甘草 二錢  
 右到一服水煎空心臨臥服  
 生地黃丸 治師尼寡婦寒熱如燔欲男子不得者  
 生地黃 二兩 赤芍藥 一兩 柴胡 黃芪 桑白 各五錢  
 右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸煎烏梅湯吞下日三服  
 ○治熱入血室  
 小柴胡加地黃湯 治婦人中風發熱惡寒經水適來重則明爽  
 夜則謬語如見鬼狀發作有時此名熱入血室亦治產後惡露  
 血室虛邪乘

方來忽然斷絕

柴胡三錢 半夏 黃芩各二錢 人參一錢半

甘草五分 生地黃一錢半

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎一鍾不拘時服

四物湯用生地黃加柴胡煎服亦可

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒經脈方來熱入血室寒熱如瘧或狂

言見鬼

柴胡一錢 桂枝三分 括囊根五分 牡蠣炒

乾薑炮 甘草炒各三分

右水煎服汗出而愈

牛黃膏 治熱入血室發狂不認人者

牛黃二錢半 硃砂 鬱金 牡丹皮各三錢

腦子

甘草各一錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服一丸新水化下

海蛤散 治婦人傷寒血結胸膈宜服此藥及缺期門穴

海蛤 滑石煨水 甘草各五 芒硝一兩

右為末每服二錢用鷄子清調下小腸通利其結血自散更用

桂枝紅花湯發其汗則愈

重訂濟陰綱目卷之一終

濟陰綱目卷之二

吳興 金德生問風父輯著 金斗 張探振公武父訂正

西陵 汪 洪禧滴子箋釋 天都 杏 望于周父參閱

○經閉

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也內經曰二陽之病

發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消至啓玄註曰大腸

胃熱也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化

味不化則經不足故其病則不能隱曲脾土已虧則風邪勝而氣

愈消也又經曰月事不來者胞脈閉也胞脈屬於心絡於胞中今

陽明主肌肉氣上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑後服育

濟陰綱目 卷二 經閉

方中五補丸後以衛生湯治脾養血也

○論經閉不行有三治宜補血瀉火

東垣曰經閉不行有三婦人脾胃久虛形體羸弱氣血俱衰而致

經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生天經者血脈

津液所化津液既絕為熱所燥肌肉漸瘦時見渴燥血海枯竭病

名曰血枯經絕宜瀉胃之熱熱補益氣血經自行矣此病或經適

行而有子子亦不成而為胎病者有矣此中熱結也或心包絡脈洪

數躁作時見大便秘澀小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血

海乾枯宜調血脈除心包絡中火邪而經自行矣此中熱結也或因勞

心火上上行月事不來者胞脈閉也胞脈者屬於心而絡於胞中

今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來宜安心補血瀉火經自

行矣。此肺結也。  
婦人曰：右東垣潔古治血枯之法，皆主於補血。為人也。補血者，四  
物之類。湯火者，東垣分上中下，故火在中，則善食消渴，治以調胃  
承氣之類。火在下，則大小便秘澀，治以玉燭之類。玉燭者，四物與  
調胃承氣等分也。火在上，則得於勞心，治以寧連及三和之類。三  
和者，四物涼膈等分也。潔古先服降心火之劑者，蓋亦寧連三和  
玉燭之類。後服五補衛生者，亦補氣之劑也。  
○論經閉因肝勞血傷  
醫氏曰：經云，有肝病，脇肋脹滿，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液  
先唾血，四肢清，目眩，時時前後血，病名曰血枯。此年少時因大脫  
血，或醉而入房，虧損肝氣，肝藏血，受天一之氣，以為滋榮。其經  
閉，陰綱目。卷二十一。朱肱。  
上買，膈布，脇肋若脫，血失精，肝氣已傷，肝血枯，而木榮，而肝  
妨於食，則肝，病傳脾，而聞腥臊臭，出清液，若以肝病而肺乘之，則  
唾血，四肢清，目眩，時前後血出，皆肝血傷之証也。  
○論經閉因勞當大補脾胃  
良方云：婦人月水不通，或因醉飽入房，或因勞役過度，或因吐血  
失血，傷損肝脾，但滋其化源，其經自通。若小便不利，苦頭眩痛，腰  
背作痛，足寒時痛，久而血結於內，變為癥瘕，若血水相併，脾胃虛  
弱，壅滯不通，變為水腫，若脾氣衰弱，不能制水，漸漬肌肉，變為腫  
滿，當益其津液，大補脾胃，方可保生。下節婦人女子經脈不  
行，多有脾胃損傷而致者，不可便認作經閉，必血經用通經破血  
之藥，遇有此証，便須察其脾胃如何，若因飲食勞倦，損傷脾胃，少

是但有肝氣  
鬱滯以致脾  
土失運不能  
化血者，又須  
和肝氣為要  
醫者知之  
食惡食，泄瀉疼痛，或因誤服汗下攻剋藥，傷其中氣，以致血少而  
不行者，只宜補養脾胃，用白朮為君，茯苓芍藥為臣，佐以黃芪甘  
草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等分，脾肝藥能生血，而經自行矣。又  
有飲食積滯，致損脾胃者，亦宜消積補脾，若脾胃無病，果有血塊  
凝結，方宜行血通經。  
○論室女經閉成癥，因思慮傷心  
冠宗與曰：夫人之生，以氣血為本人之病，未有不先傷其血氣者。  
若室女童男，積想在心，思慮過度，多致勞損，男子則神色消散，女  
子則月水先閉，蓋憂愁思慮，則傷心，而血逆竭，神色先散，月水先  
閉，且心病則不能養脾，故不嗜食，脾虛則金虧，故發嗽，腎水耗則  
木氣不榮，而四肢乾癢，故多怒，鬚髮焦，筋骨痠，若五臟傳過，則癥  
自能改易心志，用藥扶搖，庶可保生，切不可用葶藶等藥，涼血  
行血，宜用栝子仁丸，潤腸湯，益陰血，制虛火。  
薛氏曰：經云，五穀入於胃，其糟粕津液宗氣分為三隧，故宗氣積  
於胸中，出於喉嚨，以貫心肺而行呼吸，榮氣者，泌其津液，注之於  
脈，化以為血，以榮四肢內養五臟六腑，若服苦寒之劑，復傷胃氣，  
必致不起。  
一室女年十七，病久不愈，天癸未通，發熱咳嗽，飲食少思，欲用通  
經丸，余曰：此蓋因稟氣不足，陰血未充故耳，但養氣血，益津液，其  
經自行，彼惑於速効，仍用之，余曰：非其治也，此乃剽悍之劑，大助  
陽火，陰血得之則妄行，脾胃得之則愈虛，後果經血妄行，飲食愈  
少，遂致不救。

脈經云有一婦將一女子年十五時來診言女子年十四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰若是夫人親女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此為避年勿怪後當自下此真氣猶法事賦素弱而然也宜固天元真氣使水升火降則五臟自和而經脈通矣

○論經閉因積冷結氣  
要略曰婦人之病因虛冷結氣為證經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結臍膈寒疝或兩脇疼痛與臟相連或結熱中病在關元脈數無瘕肌若魚鱗時着男子非止女身在下未多經候不勻令陰聖痛小腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脛疼痛奄忽眩暈

胃狀是厥續或有憂慘悲傷多嘆此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實察行其鍼藥治危得安其雖同病脈各異源予當辨記勿謂不然

○論經閉因痰飲所隔  
張子和云凡婦人月事不來用茶調散吐之次用玉蘭散常歸湯三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥也

一婦人月事不行寒熱往來口乾煩赤飲食少且每開飲一二盞諸醫皆用蟲蟲水蛭乾漆礪砂芫青紅娘子沒藥血竭之類惟數人不然曰古方雖有此法奈病人服之必脾胃發痛飲食不進及

令止藥飲食少連內經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故

女子不月既心受積熱宜抑火升水流潤燥開胃誘食乃而出痰一二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自然滿流月事不為水濕所隔自依期而至矣亦不用重蟲水蛭之類有毒之藥如用之則月經總來小漫反閉他證生矣凡精血不足宜補之以食大忌有毒之藥偏勝而致天關多矣

一婦人年二十四歲經水不行寒熱往來面色痿黃唇焦煩赤時咳三三聲問其所服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散驚風散建中湯寧肺散鐵艾千百轉劇家人意倦不欲求治載入憫之先

涌痰五六升午前涌畢午後進食餘證悉除後二日復輕涌之又去痰一二升食益進不數日又下通經散湯一二升數日去痰皮數重小者如殼片大者如韋膜不月餘經水自行神氣大康矣

○論下利經斷利止經來  
脈經曰婦人下利而經水反斷者何也師曰但當止利經當自下勿佐所以利不止而經斷者但下利亡津液故經斷利止津液復經當自下若婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不足者自有微寒故不引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其經必復下

○論經閉總因血滯血枯  
李氏曰婦人以血為主天真氣降壬卒水合腎氣全盛血脈流行當以三旬一見以象月盈則虧故曰月經行乘產後七般若其時餘血一點未淨或外被風寒及濕冷暑熱邪氣或內傷生冷七情鬱結為痰為瘀積於中曰血滯或經止後用力太過入房太甚及服食燥熱以致火動邪氣盛而津液衰曰血枯

子 52-242

經則氣逆上  
怒則氣逆上  
怒則氣逆上

總結

以肝藏血  
主氣也

長方云經後破驚則血氣錯亂妄行逆於上則從口鼻而出逆於身則血水相搏變為水腫逆怒則氣血逆於腰腿心腹背脇手足之重病經行則發過期則止怒極傷肝則有眩暈嘔血癰瘰血風瘡瘍等病加之經血滲漏於其間遂成癰瘰血生瘡淋瀝不斷濕熱相搏遂為崩帶血結於內變為癥瘕凡此變證百出不過血滯與枯而已但血滯亦有虛熱血枯亦有虛熱故重則經閉不通以帶枯分言輕則經水不調止言虛與熱而已○血滯經閉宜破者原因飲食毒熱或暴怒凝滯積痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也若氣旺血枯起於勞役憂鬱却宜溫補或兼有痰火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐者熱則血行也但不純用峻藥以虧陰道至於耗氣益血之說雖女相要法

清陰綱目 卷二 經閉 玉樓子

但血為氣配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣行則行氣滯則滯如果熱火氣盛於血者方可舉犀角附子散散氣當加木香檳榔枳殼以開鬱行氣若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女一般陽生則陰自長氣衰則血亦涸豈可專耗其氣耶論者多泥叔和血旺氣衰不知叔和論肝肺二脈則宜肝旺於肺其實氣血平和有孕故繼曰兩臟通和但婦人見偏性偏婦妾志不得伸鬱怒無時不起故香附為女八仙藥經曰邪氣勝則實正氣奪則虛可不悟諸大藥只虛熱氣四證而已不謂亦大相同隨證調治飲食調和自然血氣流通更有凝滯然後可用紅花當歸散紫葳散通經丸藥經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血益陰使津液流通而不移氣血克和而惟以毒藥攻通是求

千金於乞巧必灰而後已

○論經閉大法

丹溪云經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失血治宜生血補血除熱調和之劑隨證用之或因七情傷心心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

○脈法

脈經曰胃脈微澀為不月經閉脈法備前

○治血枯經閉

玉燭散 治胃熱消渴飲食漸瘦津液為熱燥竭以致血海乾枯此即四物湯與調胃承氣湯合方也

清陰綱目 卷二 血枯經閉方

黃歸 川芎 白芍藥 地黃 大黃 芒硝 甘草 各等分

右剉每服八錢水煎食前服

三和湯 治勞心火上行以致胞脈閉塞月事不來此即四物散合方也

當歸 川芎 白芍藥 地黃 大黃 朴硝 黃芩 各等分

右剉每服八錢水煎服

二黃散 治婦人室女經脈不通服之如神

大黃 煨存性二錢 生地黃三錢

右為末作一服空心好酒調下

二氣丸 治月水不調斷絕不產而黃肌瘦憔悴不思食有燥

子 52-243

以柴胡引子相泰服之  
 大黃 四兩 另為末醋一 當歸 白芍藥 各二兩  
 右為末以膏子和丸如桐子大每服二十丸淡醋湯下食前服  
 日進三服  
 五補丸 補諸虛安五臟堅骨髓養精神凡胞脉閉先服降心火  
 之劑後服此丸及衛生湯以治脾養血也  
 熟地黃 人參 牛膝 酒浸去 白茯苓 地骨皮 各等分  
 右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五十丸空心溫酒下  
 衛生湯  
 當歸 白芍藥 各二 黃芪 三兩 甘草 一兩  
 右為末每服半兩水二盞煎至一盞空心溫服○如虛者加人  
 濟陰綱目 卷二 治血枯經閉方 八 天壽堂  
 參一兩  
 潔古先服降心火之劑者蓋亦令連三和玉燭之類後服五補  
 衛生者亦補氣之劑也  
 相子仁丸 治血虛有火月經耗損漸至不通日漸麻痺而生潮  
 熱並治室女思慮成勞經閉慎勿以毒藥通之宜此兼服澤蘭  
 湯  
 相子仁 研 牛膝 酒洗 卷柏 各半 澤蘭葉 續斷 各二  
 熟地黃 三兩 酒浸半日 石研內搗成膏  
 右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三十九  
 澤蘭湯 治證同前 妙在澤蘭為君  
 澤蘭葉 三兩 當歸 酒洗 芍藥 炒 各 五錢  
 六血生於心

此方溫補  
 血為主所  
 養者溫之  
 有溫之是也  
 已上十一方  
 重血枯一  
 字  
 凡通經消塊  
 供用藥則  
 堅大熱大毒  
 之類而此方  
 俱以行氣通  
 氣血所散結  
 氣下元之  
 藥分而及  
 以山梔湯  
 定之何也  
 山梔能治  
 塊中之大毒  
 隨能治三年  
 之塊而通經  
 也在養用之  
 此通行之劑  
 右為粗末每服五錢水二盞煎一盞溫服  
 加味補中益氣湯 治飲食勞倦損傷脾氣弱倦發熱作渴  
 飲食減少而不生血者  
 黃芪 人參 甘草 炙 白朮 當歸 陳皮 各一升 脉  
 柴胡 各三 生地黃 天花粉 各八分  
 右剉作一服水煎服  
 十全大補湯 治產後及多產育傷血或誤服汗下克伐之藥以  
 致血衰氣乏而經不行者  
 人參 白朮 白茯苓 甘草 炙 當歸 川芎 白芍藥  
 熟地黃 黃芪 肉桂 各二錢  
 右作一服水煎服  
 濟陰綱目 卷三 治血枯經閉方 九 天壽堂  
 養真湯 治婦人經閉不通臍下有塊已經三載百藥無效服此  
 數劑經行又投數劑而塊消矣  
 當歸 酒洗 川芎 白芍藥 酒洗 熟地黃 酒洗 白茯苓 陳皮  
 梔子 炒 山茱萸 去核 益母草 小茴香 酒炒 附子 酒洗 各等分  
 右剉每服一兩水煎服 五六劑後經通作丸服  
 ○治血虛經閉  
 溫經湯 治經道不行連腰膝痛微其脉沉緊此由寒氣客於  
 血室血凝不行為氣所衝新血與故血相搏所以作痛宜此湯  
 與桂枝桃仁湯  
 當歸 川芎 芍藥 官桂 牡丹皮 蓬朮 各一 人參  
 牛膝 各 甘草 各五分





<p>右為末皂角五錢，羌花二錢，水煎糊為丸，如桐子大，每服五十丸，米湯下。</p>	<p>產寶方 治月經不通，腹中痛。 牛膝六分，大黃 桃仁各五，川芎 當歸各四分，水煎，米炒黃。</p>	<p>白為細末，煉蜜丸，桐子大，每服二十丸，空心溫酒下。</p>	<p>千金桃仁煎 治血積瘕瘕，月水不行。 大黃 桃仁 各二，重炒，兩去足。</p>	<p>右為細末，醋二升半，銀石器中慢火熬膏，却入大黃，蜜丸，桃仁末不住攪，度可丸，却入朴硝再攪，良久出之，丸如桐子大，五更初溫酒下五丸，至日午取下，如赤豆汁，鷄肝，蠶衣樣，候鮮紅。</p>	<p>住，仍以調氣藥補之。 血和通經丸 治婦人經水凝滯，不行，腰背，臍腹，疼痛，漸成血塊。</p>	<p>芍藥 兩，當歸 兩，木香 兩，肉桂 兩，乾漆 兩，五靈脂 兩，大黃 兩，廣茂 兩，各水蛭 兩，各蛇 兩，各蜈蚣 兩，各桃仁 兩，各皮 兩。</p>	<p>右為末，醋糊丸，如桐子大，食前醋湯，或酒下二十丸。</p>	<p>斑苗通經丸 治經候閉塞，亦治乾血氣。 斑苗 二十個，桃仁 四十個，大黃 五錢，各。</p>	<p>右為細末，酒糊為丸，如桐子大，空心酒下五丸，甚者十丸。○如血枯經閉者，用四物湯送下。○一方加黃蠟半錢，水蛭一錢。</p>	<p>大黃膏 一名 治婦人乾血氣。 川大黃四兩，為末，用醋熬成膏，子丸，如雞頭大，每服一丸。</p>	<p>乾血氣者，然此方用大黃。</p>
---	---	----------------------------------	---	--	---	--	----------------------------------	--	---	--	---------------------

<p>酒化開，臨臥溫服，大便利一二行，紅脈自下，是調經之仙藥也。○一方加當歸頭。○一方加香附二兩，童便浸炒為末，入膏丸，桐子大，熱酒下四十丸。</p>	<p>聖惠方 治婦人月水滯滯不快，結成瘕塊，脹大欲死。 馬條草根苗五兩，剉細，水五斗，煎至一斗，去渣，別以淨器盛，熬成膏，食前溫酒調下半匙。</p>	<p>通經丸 治婦人室女月候不通，或成血瘕。 當歸 兩，桂心 兩，青皮 兩，乾薑 兩，川椒 兩，川烏 兩，蓬莪朮 兩。</p>	<p>乾漆 兩，大黃 兩，桃仁 兩，各等分。 右為末，先將四分用米醋熬成膏，和餘六分成劑，日中杵丸，如桐子大，晒乾，每服二十丸，用淡醋湯下，加至三十丸，溫酒亦得。</p>	<p>濟陰綱目 卷十 治血虛經閉方 十三 天德堂 空心食前服。○濟生方去川烏，加紅花。○已上諸方俱重劑，隨寒熱斟酌用。</p>	<p>○治痰結經閉。 丹溪方 治積痰傷經，不行，夜則妄語。 瓜蒌子 兩，黃連 兩，吳茱萸 兩，桃仁 五十，紅麴 二兩，砂 三兩。</p>	<p>山查末 兩。 右為末，生薑汁研，炊餅為丸，每服百丸，空心滾白水下。</p>	<p>一方 治月水不通，屢試有驗。 厚朴 不拘多少，薑汁炙，香細切，濃煎去渣，空心服，不過三四劑。</p>	<p>加味導痰湯 治經閉。</p>	<p>此方中有一味，其性大寒，其功甚大，其用甚廣，其效甚速，其法甚奇，其法甚妙，其法甚靈，其法甚神，其法甚妙，其法甚靈，其法甚神。</p>	<p>此方中有一味，其性大寒，其功甚大，其用甚廣，其效甚速，其法甚奇，其法甚妙，其法甚靈，其法甚神。</p>	<p>此方中有一味，其性大寒，其功甚大，其用甚廣，其效甚速，其法甚奇，其法甚妙，其法甚靈，其法甚神。</p>
---	--	---	---	---	--	--	---	-------------------	---	--	--

<p>右加生薑水煎服。 經云氣上迫肺則心氣不得下通故月事不來今用連朴之類導痰降火使不上迫於肺故心氣下通而月事來也。</p>	<p>半夏 陳皮 白茯苓 甘草 枳實 黃連 川芎 穿山甲 炮 甘草 苦丁香 川椒 苦華蘆 白附子 猪牙皂角 草烏頭各三錢 巴豆一錢全 右為細末以生葱絞汁和丸彈子大每用一丸新綿包之納陰中一日即白二日即赤三日即血神効。</p>	<p>礞石丸 治婦人經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下白帶 礞石三錢 杏仁一分 右二味末之煉蜜丸棗核大內陰中劇者再納之一粒仙丹 治婦人乾血勞並赤白帶下種子如神 巴豆一百二十個去殼用新磚一個將豆低置六十個 穿山甲五錢油 大黃 苦華蘆各一 皂角一兩刮去粗皮火炮</p>	<p>右各為末合一處以聚煮去皮核丸如彈子大用綿蘸開塞藥在內穿入三寸竹筒上頭後仍留二三寸餘挽一轉不令藥氣在外用時先以溫水洗陰內令潔淨拭乾却以葱汁浸濕烘頭送入子宮極深處整一日一夜取出藥不用少間耳冷氣下發寒發熱如傷寒狀不怕飲食任意食用無妨半日即通或鮮血或死血一切惡物悉下忌生冷發物自此子宮和緩而交媾</p>
---	---	--	--

<p>則有孕矣 通經下取方 曾試驗神効 海蛤粉 各二錢 牙皂 各二錢 巴豆 各二錢 去油 天花粉 五錢 苦丁香 紅娘子 各一錢 麝香 少許</p>	<p>右為細末每用一錢葱汁同搗為丸薄綿裹以五寸竹管納陰戶中候熱時先通黃水次則經行 血崩 論崩中由傷損衝任</p>	<p>其經血故忽然暴下或由陰陽相搏為熱所乘或傷衝任血得熱則流散甚甚至於昏悶其脈數疾小為順洪大為逆大法當調補脾胃為主 論血崩因虛熱 東垣曰陰虛陽搏則崩婦人脾胃虛損致命門脈沉細而數疾或沉弦而洪大有方寸關脈亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如瘻為腐肉之象中有白帶者必必細細寒作於中有赤帶者其脈洪數病熱明矣必腰痛或膈下痛臨經欲行而先發寒熱往來兩脇急痛兼脾胃虛弱出或四肢困熱心煩悶不得眠臥心下急宜大補脾胃而升降氣血可一服而愈或先貴而後發或先富而後貧病名脫營者心氣不</p>	<p>其氣虛不能約制則其血氣其為熱所乘者則宜涼血不常溫 其氣虛不能約制則其血氣其為熱所乘者則宜涼血不常溫 其氣虛不能約制則其血氣其為熱所乘者則宜涼血不常溫 其氣虛不能約制則其血氣其為熱所乘者則宜涼血不常溫</p>
---	--	---	--

此證由山脾  
胃經而心  
心下急又有  
虛火矣  
心主以言故  
曰心病  
陽氣內動便  
是危殆中有  
火  
足其火大熾旺於血府之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質  
肌肉顏面似不病者此心病也不形於脉故脾胃飲食不調其證顯  
矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言  
勸諭令懼死而心不動以大補氣血之藥補養脾胃微加鎮墜心  
火之藥治其心補陰陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕  
胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數澁血也故本病曰大經空虛  
發則肌痺傳為脉痿此之謂也  
薛氏曰經云陰虛陽竭謂之崩又云陽絡傷血外溢陰絡傷血內  
溢又云脾統血肝藏血其為患因脾胃虛損不能攝血歸源或因  
肝經有熱血得熱而下行或因肝經有風血得風而妄行或因怒  
動肝火血熱而沸騰或因脾經鬱熱血傷而不歸經或因悲哀太  
濟陰綱目 卷二 婦人經閉方 十六 天德堂  
過胞絡傷而下崩治法之脾胃虛弱者六君子湯加當歸川芎  
柴胡脾胃虛陷者補中益氣湯加酒炒芍藥山梔肝經血熱者四  
物湯加柴胡山梔蒼朮肝經風熱者加味逍遙散或小柴胡湯加  
山梔芍藥牡丹皮若怒動肝火亦用前藥脾經鬱火者歸脾湯加  
山梔柴胡牡丹皮哀傷胞絡者四君子湯加柴胡升麻山梔故東  
垣丹溪諸先生云凡下血證須用四君子以收功斯言厥有旨哉  
若夫去血後母以脉診當急用獨參湯救之其發熱潮熱咳嗽脉  
數乃是元氣虛弱假熱之脉也尤當用人參之類此等證候無不  
由脾胃先損而思故脉洪大察其中有胃氣受補則可救設用寒  
涼之藥復傷脾胃生氣反不能攝血歸源是速其危也  
方氏曰血屬陰也靜則循經榮內動則錯經妄行蓋人之七情過

極則動五志之火五志之火元其則經血暴下失期而來久而不  
止謂之崩中如風動木搖火然水沸類也治崩次第初用止血以  
塞其流中用清熱涼血以澄其源末用補血以還其舊若止塞其  
流而不澄其源則滔天之勢不能遏若止澄其源而不復其舊則  
源子之陽無以立故本末勿遺前後不紊方可言治也  
或有不問又  
張子和云蓋官人母五十餘血崩一載余用澤蘭丸黑神散保安  
先白微散補之不効戴人見之曰天癸已盡本不當下血蓋血得  
熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哀悲甚則肺葉布心系  
為之急血不禁而下崩內經曰陰虛陽搏謂之崩陰脉不足陽脉  
有餘數則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非者可服  
大劑大劑者黃連解毒湯是也次以香附二兩炒白芍藥二兩焙  
濟陰綱目 卷二 婦人經閉方 十七 天德堂  
當歸二兩焙三味同為細末水調下又服檳榔丸不旬日而安  
西園公治一婦人年六十二歲血崩不止投黃連解毒湯四貼後  
服涼膈散合四物湯六貼即愈此婦因悲哀大過則心悶急肺布  
葉舉而上焦不通熱氣在中血走而崩故效  
薛氏曰一婦人年將七十素有肝脾之證每作則飲食不進或胸  
膈不利或中脘作痛或大便作瀉或小便不利余用逍遙散如山  
梔伏神遠志木香而愈後憂女婦姑不時吐紫血其病每作先倦  
怠而後發熱經曰積憂傷肺積思傷脾肺布葉舉是令子母俱病  
不能攝血歸經而致前證遂以前藥加炒黑黃連三分吳茱萸二  
分煎愈後因怒吐赤血甚多躁渴垂死此血脫也法當補氣乃用  
人參一兩升麻當歸各三錢陳皮炮黑乾薑各二錢炙甘草木香各

一錢一劑頭止

一婦人年六十四。久鬱。頭痛寒熱。春間乳內作痛。服流氣飲之。類益甚。不時有血如經行。又大驚恐。飲食不進。夜寐不寧。乳腫及兩脇。厥痛如炙。午後色赤。余以爲肝脾鬱火。血燥。先以逍遙散。加酒炒黑龍膽一錢。山梔一錢半。二劑腫痛頓退。又二劑而全消。再用歸脾。加炒黑梔貝母。諸證悉愈。

一婦人因怒。崩血久不已。面青黃。而或赤。此肝木制脾土。而血虛也。用小柴胡合四物。以清肝火。生肝血。又用歸脾補中二湯。以益脾氣。生肝血。而盛此證。若因肝經有風。熱而血不寧者。用防風一兩。爲丸。以兼證之藥。煎送。或肝經火動而血不寧者。用條芩炒爲丸。以兼證之藥。煎送。無有不効。

經陰制目

卷二

血崩門

十八

王德

一婦人。性急。每怒。非太陽耳項。喉齒胸乳作痛。則胸滿吞酸吐瀉。少食。經行不止。此皆肝火之證。肝自病。則外證見。土受尅。則內證作。若自病。見用四物。加白朮。茯苓。柴胡。炒梔。炒龍膽。若內證作用。四君子。加柴胡。芍藥。神麴。吳茱萸。炒過黃連。諸證漸愈。惟月經不止。是血分有熱。脾氣尚虛。以逍遙散。倍用白朮。茯苓。陳皮。又以補中益氣。加酒炒芍藥。兼服而調。

論氣陷血脫法當升舉

東垣云。一婦人經候黑血。凝結成塊。左脘有血瘕。水瀉不止。穀食有時。化有時。不化。至今歲四月。血塊暴下。併水注俱作。是前後二陰有形之血脫焉。於下既久。經候尤不調。水瀉日見三兩行。食罷心煩不快。飲食減少。甚至瘦弱。東垣先生曰。夫聖人治病。必本四

時升降沉浮之理。惟變之宜。皆不本四時以順爲逆。非其治也。且治之大法。必先歲氣。無伐天和。無盛盛。無虛虛。遺人天殃。無致邪。

陽虛言陽無大正。絕人長命。故聖人云。陽盛陰虛。下之則愈。汗之則死。陰盛陽虛。汗之則愈。下之則死。大抵聖人立法。各自有義。且如升陽以發散之。劑是助春夏之陽氣。令其上升。乃瀉秋冬收藏。烈殺寒涼之氣。此病是也。當用此法治之。乃升降浮沉之至理也。夫天地之氣。以升降浮沉。乃從四時。如治病逆之。則殺人矣。故經云。順天者昌。逆天者亡。可不畏哉。夫人之身。亦有天地四時之氣。不可止認在外。人體亦同天地也。今經精不止。是前陰之氣血已下脫矣。水瀉又數年不愈。是後陰之氣血又下陷矣。後陰者。主有形之物也。前陰者。精氣之門戶。俱下竭。是病人周身之氣。常行秋冬之令。陰

濟陰制目 卷二 血崩門 十九 王德 主秘此等收藏之病是也。陽生陰長。春夏是也。在人身之中。令氣升浮者。穀氣上行是也。既病則周身血氣皆不生長。穀氣又不升。其肌肉消少。是兩儀之氣俱將絕矣。既下元二陰俱脫。血氣消竭。假令當日元是熱證。今下焦久脫。已化爲寒矣。此病久沉久降。寒濕太勝。當急救之。瀉寒以熱。降濕以燥。大升大舉。以助生長。補養氣血。不致偏枯。聖人立治之法。云濕氣大勝。以所勝助之。助甲風木上升是也。故經云。風勝濕。是以所勝平之也。當調和胃氣。次用白朮之類。以燥其濕。而滋元氣。如其不止。後用風藥以勝濕。此之謂也。此便是大舉大升。以助春夏二濕久陷下之至治也。又一本云。此病次用四物。隨證加減。

論血瘀腹痛法當收止

蘇氏曰血大至曰崩中或前或後或純下或血成塊或不止或  
狀非一。所感亦異。甚則頭目昏暈四肢厥冷宜服艾湯以溫之  
丹佐以三灰散或以童子小便煎理中湯或以沉香降氣湯加入  
百草霜米飲調下血崩甚而腹痛人多從惡血未盡又見血色瘀  
黑愈信惡血之說不敢止截大凡血之為患欲出未出之際停在  
腹中即成瘀色難盡以瘀為惡又需知瘀之不為虛冷乎苦必待  
見瘀血之後截之恐併與人無之矣此腹痛更有說瘀而腹痛血  
通而痛止崩而腹痛血住則痛止宜芎藭湯加乾薑熟附一錢正  
其血而痛自止仍以刺花繡拭黑片燒灰研末米飲調下一方以  
毛蟹殼燒存性米飲下亦有以早黃麻根燒灰為末米飲下  
論過寒服涼法當溫補

非久崩氣脫  
者不可用  
以下皆止  
之法而數  
黃麻又有  
血之能

濟陰綱目 卷二 血崩門  
薛氏曰表弟方健甫內五十歲辛丑患血崩諸藥罔效王貢八月  
身熱體痛頭暈涕出吐痰少食衆作火治展轉發熱絕粒數日余  
診之曰脾胃久虛過服寒藥中病未已寒病復起遂用八味丸料  
一服翌早遂索粥數匙再服食倍熱減痛止乃服八味丸而愈  
耶秋因勞役憂怒甲辰夏病復作胸飽發熱脊痛腰疼神氣憊鬱  
或作中暑崩血便血煩渴引飲粒米不進皆憤特作脉洪大按之  
微弱此無根之火內虛寒而外假熱也以十全大補加附子一劑  
遂食粥三四匙崩血漸減日服八味丸始得全愈

因怒發熱不  
主千軒而專  
附本之此  
大尹王天戌之內久患崩自服四物涼血之劑或作或輟因怒發  
熱其血不止服前藥不應乃主降火更加腹脇大痛手足俱冷余  
曰此脾虛寒所致先用附子理中湯體熱痛止又用濟生歸脾

補中益氣二湯崩血頓愈若泥痛無補法則誤矣  
蘇氏楊承典之內患前證過服寒涼之劑其證益甚更加腹脇  
悶飲食不入發熱煩躁脉洪大而虛余曰此脾經氣血虛而發燥  
也當急用八珍湯加炮薑以溫補之緩則不救不信乃服止血降  
火之劑虛證蜂起始信余言緩不及治矣  
○論補中去積

東垣云丁未年冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾殞身失  
血自後一次經數日而來今久不止其人心窄性急多驚以予料  
之他日必因心氣不足飲食失節得之大方曰容到數診得掌中  
寒脉沉細而緩間有沉數九竅微不利四肢無力上喘氣短促口  
鼻氣皆不調果有心氣不足飲食失節脾胃虛弱之證胃院防心  
是手

濟陰綱目 卷二 血崩門  
而痛在脇下急縮有積當臍有動氣腹中鳴下氣太便難諸虛證  
極多不能盡錄擬先治其本餘證可以皆去與安心定志鎮壓其  
驚調和脾胃大益元氣補其血脉養其心神以大熱之劑去其寒  
寒凝在皮膚少加生地黃去命門相火不令四肢疲弱製黃芪當  
歸人參湯

○論開瘀行氣  
丹溪云延緩胸中清氣不升故經脉壅遏而降下非開滯不足以  
行氣非氣升則血不能歸隱道此論血泄之義甚明蘇蘭胸膈滿  
延則清氣升清氣升則血歸隱道不崩矣故其症或腹滿如孕或  
膈腹疼痛或血結成片或血出則快止則悶或膈上動其治法宜  
開結瘀行滯氣消汚血

既云心脾血  
虛自當補  
乃不為治  
即用烏雞  
笑散亦効

補解得當  
云心血虛  
用烏雞  
使得要

○論後血心痛

良方云婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小產去血過多而心痛甚者亦然用烏雞骨炒為末醋湯調下失

薛氏曰前證若陰血耗散用烏雞收斂之若瘀血不散用失笑散行散之若心血虛弱用芎歸湯補養之若鬱結傷血用歸脾湯

一婦人血崩兼心痛三年矣諸藥不應每痛甚虛證悉其面色萎黃余曰心主血蓋由去血過多心無所養以致作痛宜用十全大補湯參米倍之三十餘劑稍愈百餘劑全愈

○輪崩漏雜治法

丹溪云崩漏有虛有熱則下陷熱則通流

氣虛血虛者皆以四物湯加參芪

因勞者用參芪加升補藥

因寒者用乾薑

因熱者用黃芩

漏下乃熱而虛四物湯加黃連

崩過多者先用五靈脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能行能止

紫色成塊者血熱四物湯加黃連柴胡之類

急則治其標用白芷湯調百草霜末甚者棕桐灰後用四物湯加

炒黑薑調理

經驗簡要治崩中等證○令君脈緊細手足寒紅去淡黑或五色

當歸建中加白龍骨血竭附子下紫石英震靈丹炙火二熱者

脈洪四肢溫心煩口渴燥熱血沸而成用黃芩湯荆芥散或清心

蓮子飲加竹瀝生地黃汁甚者生地黃汁磨京墨百草霜冷服○

虛者膠艾湯加麥門冬鹿茸龍骨酸棗仁或養榮湯加龍骨血竭

送震靈丹○實者腹中痛者附九四物湯加香附子心虛者恍惚

多妄健忘舌強小便多面紅盜汗相子仁湯酸棗仁湯加龍骨京

墨百草霜吞靈砂丹又靈砂當歸蓮肉龍骨棗肉花參湯送下崩

中麝香當歸附者心氣已散急服靈砂龍骨等○有田婦崩中斷

下者用大蘇根酒煎清早服或云即斷根也

產後分陰崩漏崩一受熱而赤謂之陽崩一受冷而白謂之陰崩

○脈法

脈經曰問五崩何等類師曰白崩者形如涕赤崩者形如絳津黃

崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如蚬血也○寸口弦

而大弦則為減太則為乳減則為寒乳則為虛寒虛相搏脈則為

革婦人則半產漏下○尺脈急而弦大風邪入少陰之經女子漏

白下赤○漏血下赤白不止脈小虛滑者生大緊實數者死○漏

下赤白日下血數升脈急疾者死遲者生

○治熱崩漏

荆芥四物湯治崩漏初起不問虛實服之立止

當歸 川芎 白芍藥 生地黃

荆芥穗 條芩 香附子 一錢

右對水煎服○如不止加防風升麻白朮蒲黃○一方加地榆

氣之調劑肝

氣血虧損內  
熱四物生地  
為藥血虛  
血故皆取  
此方用熟地  
以補肝之母  
以阿膠黃芩  
益肝之氣  
黃芩下元以  
助真氣之升  
所補陰從陽  
起也  
此虛者氣不  
足者黃芩  
之熱黃芩  
以補氣熱  
盛則生火又  
加大地性  
以清氣中之  
故血走而崩也

尤効○一方四物加麥連梔子黃柏○一方並加膠艾  
奇効四物湯 治肝經虛熱血沸騰而久不止  
當歸酒洗 川芎 白芍藥 熟地黃  
阿膠炒成 艾葉 黃芩一錢  
右到水煎服

河澗生地黄散 治經漏下血脈虛洪經水紫黑  
生地黄 熟地黃 白芍藥 黃芪  
枸杞子 天門冬去心 地骨皮 柴胡  
右改咀水煎服 便血者加地榆

涼血地黃湯 治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守胞絡相火  
故血走而崩也

濟陰綱目 卷下 婦人門 王 夫

生地黄 當歸尾 黃連 黃蘗 知母 桑白 川芎  
升麻各二 柴胡 防風 羌活 黃芩 細辛 荆芥  
葛荆子 甘草 紅花  
右改咀作一服水煎空心稍熱服

小薊湯 治崩漏不止色明如水得溫則煩悶者此陽傷於陰令  
入下血當補其陰脈數疾小者順大者逆

小薊葉 生地黄 白木  
右三件入水一盞煎減一半去渣溫服

烏龍酒 治崩中晝夜不止醫不能治者  
烏龍一兩 生地黄汁一盞  
右用酒五盞煮烏龍一盞去渣下地黃汁再煎二盞沸分為三

格之六心者  
火之生也故  
又以生地黃  
連以治火之  
原知母黃芩  
滋水之母  
尾破瘀血  
生血所謂去  
故生新也  
行血海之  
徐曼荆黃連  
經之血而風  
藥者皆所以  
升清經之氣  
也諸經氣升  
則陰血不  
不隨之而  
不隨之而  
而起也  
而起也

服  
治崩中去血不止  
大小薊根五兩 白茅根三兩  
右二味細切用酒五盞煮取四觔去渣分四服  
一方治婦人血崩

槐花半兩 黃芩二兩  
右二味共為細末每服五錢好酒一碗用銅稱銚一枚乘熱火  
燒紅浸入酒內調服不拘時忌生冷油膩之物

金華散 治血室有熱崩下不止服溫藥不効者  
玄胡索 當歸 瞿麥穗 牡丹皮 乾薑  
石膏二兩 桂心另 葶藶仙 各七蒲黃半兩  
右為細末每服三錢水煎空心溫服日二次

簡易黃芩湯 治崩中下血今人多用止血補血之藥惟此方治  
陽乘陰所謂天暑地熱經水沸溢者  
黃芩一味研為細末每服三錢露酒調下  
一方荆芥湯煎下

治勞傷崩漏  
膠艾四物湯 治勞傷血氣月水過多或崩漏不止及妊娠胎氣  
不安或因損動漏血傷胎者亦宜

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃  
阿膠炒成 艾葉 甘草  
右到水酒各半煎空心服





飲酒勞倦致令心火平脾其人心急情嗜臥四肢不舉困倦乏  
力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脈緩而怠按之洪大皆  
中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血主脈  
二者受邪病皆在脈脈者血之府也脈者人之神也心不主令  
胞絡代之故曰心之脈主屬心系心系者胞絡命門之脈也主  
月事皆由脾胃虛而心胞乘之故漏下血水不調也況脾胃為  
血氣陰陽之根蒂當除濕去熱滋風氣上伸以勝其濕又云火  
鬱則發之  
黃芪 蒼木 羌活各一 防風  
藥本 升麻 柴胡 甘草各  
當歸酒浸 獨活各五 蔓荊子 七分  
濟陰綱目 卷二 婦人 天  
石散 水五大盞煎至一大盞去滓稍熱服空心服藥畢持少  
時以早膳壓之可一服而已如炙足太陰脾經中血海穴二七  
壯或三七壯立已  
此藥乃從權衡之法用風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以救  
其血之暴崩也若病愈經血惡物已盡主病雖除後必須以黃  
芪甘草人參當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血  
藥是也若經血惡物下之不絕尤宜救其根源治其本經只益  
脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若過夏月白帶下脫漏不止  
宜用此湯一服立止  
治崩漏血瘀 昏暈 疼痛  
五靈脂散 治血崩不止及昏不省

五靈脂 不問多少炒  
右為末每服一錢溫酒調下○一方治血崩不止五靈脂二錢  
炒熱加當歸酒同煎或水酒煎各半盞同煎服○一方五靈  
脂半生牛熟為末酒調服○一方水煎五靈脂半乾去渣澄清  
再煎成膏入神效末為丸如桐子大空心溫酒下二三十丸便  
止○一方每服三錢水酒童便各半盞煎至八分過口服名抽  
刀散治產後有病服三服散惡血或心腹脇肋脚痛不可忍者  
或止用童子小便尤佳○或中風即入草烏頭半錢同煎亦治  
腸風下血如不飲酒者煎烏梅栢葉湯調下○如心煩口乾渴  
者加蒲黃炒減半○一方同蒲黃各炒等分名失笑散治失血  
及產後半產惡血攻心昏迷不省及心腹絞痛欲死者其效如  
神真救急之良方也人家不可不備○此藥兼能解毒及蛇蝎  
蜈蚣咬傷處立愈  
香附子散 治血崩不止或成五色亦治產後腹痛及小產血不  
止大是婦人仙藥常服益血調氣  
香附子 不拘多少春去  
毛中斷之男妙  
右為細末每服二錢清米飲調下能止血好酒調下能破積○  
冷氣煎湯下○帶下艾湯入醋少許下  
煮附片 治崩漏帶下積聚癥瘕腹痛方見調經  
備金散 治婦人血崩不止  
香附子 炒四 當歸尾 二錢 五靈脂 炒  
右為細末每服五錢酒調下空心服立効

<p>如神散 治血崩不止赤白帶下</p> <p>香附子 炒 赤芍藥 炒各</p> <p>右爲末入鹽一捻水煎食前溫服一方用香附</p>	<p>治婦人血崩臍腹痛</p> <p>香附子 三 當歸 一 赤芍藥 五 薑 五 鹽 脂 各半</p> <p>右爲細末每服三錢酒一盞重便少許同煎服</p>	<p>治血崩臍腹痛</p> <p>當歸 赤芍藥 熟地黃 香附子 牡丹皮</p> <p>木賊 去節各 沒藥 丁香 桂 去皮各</p> <p>右爲細末酒調三錢溫服</p>	<p>治血崩</p> <p>縮砂散</p> <p>治陰綱目</p> <p>縮砂不拘多少於新瓦上炒香爲細末米飲調下三錢</p>	<p>加減四物湯 治室女二七天癸至亦有當時未至而後至者亦有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多變生諸證悉宜服之</p>	<p>四物湯 四錢</p> <p>香附子 炒去毛 一錢半</p> <p>右加生薑五片水煎食前服○如血色鮮而不止者去熟地黃加生地黃</p>	<p>治崩漏虛寒</p> <p>丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脈兩尺俱弦緊而洪按之無力其証自覺臍下如水求厚衣被以禦其寒白帶白濁之物雖多聞下如屋漏水下</p>	<p>東垣所論症必折宜至</p>
--	--	---	--	--	--	---	------------------

<p>時有鮮血不多右尺脈時微洪屋漏水多暴下者是急弦脈也寒多而洪脈時見乃熱少合而言之急弦者北方寒水多也洪脈時出者命門包絡之火也黑物多赤物少合成屋漏水之象也</p>	<p>當歸 一錢 白芍藥 熟地黃 各二 川芎 二分</p> <p>丁香 各四分 阿膠 炒六分 生艾葉 一錢 後入</p> <p>右爲細末作一服水二盞煎至五沸去滓入膠艾再上火煎至一大盞空心宿食消盡帶熱服三服効</p>	<p>治帶下崩血不止及風寒冷熱勞損衝任月水不調崩中暴下腰重裏急淋瀝不斷及產後失血過多虛羸腹痛成痼娠胎動不安下血連日小便頻數肢體煩倦頭暈目暗不欲飲食</p>	<p>治陰綱目</p> <p>卷二 治崩漏 治方</p>	<p>芎藭 黃芩 芍藥 乾地黃</p> <p>吳茱萸 甘草 各二兩 當歸 乾薑 各一</p> <p>右以咀以水一斗煮取三升分三服○若月經後因有赤白不止者除地黃茱萸加杜仲人參各二兩</p>	<p>斷下湯 治衝任氣虛崩中漏下經脈不調每過月候將來臍腹腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶下三十六疾悉能治之</p> <p>人參 去蒸 熟地黃 艾葉 各一兩 烏賊骨 燒灰</p> <p>當歸 酒洗各 阿膠 炒各 川芎 各七 乾薑 炮半</p> <p>有咬咀水煎食前服 烏賊骨即海螵蛸</p>	<p>加味四物湯 治崩漏</p>	<p>東垣所論症必折宜至</p>
--	---	---	------------------------------	---	--	------------------	------------------

此則轉候以  
此主之而服  
痛一症人皆  
以為瘀血者  
多而此以爲  
痛不止者服  
熟附元正元  
體所謂崩而  
腹痛者則止  
而痛除也

四物湯一兩 人參二錢 吳茱萸一錢

右剉碎每服半兩薑棗煎食前服五六服寒熱腹痛皆退崩漏  
未止續服後熟附丸

熟附丸  
熟附子 木賊 去節 龍骨 煨 赤石脂 煨 各  
川芎 當歸 各一

右爲細末醋糊爲丸如桐子大每服五六十丸食前米飲下

鹿茸丸 治經候過多其色瘀黑甚者崩下呼吸少氣腰腹冷極  
則汗出如雨尺脈微小由衝任虛寒爲風冷客乘胞中氣不能  
固可炙關元百壯在臍下正中二寸

鹿茸 桑去毛 赤石脂 煨 烏餘糧 製各  
法然女子氣

濟陰綱目 卷二 治崩漏血虛者宜服此方 三 天德堂

當歸 熟地黃 續斷 各二  
附子 炮 艾葉 一方 栝葉 各半

右爲細末酒糊丸如桐子大每服三十九空心溫酒下○煉蜜  
丸亦可

治崩漏虛脫

大千方 治崩中下血不止小腹痛

芍藥 一兩 栝葉 六兩 微炒丹溪  
炒黃 云栝性多燥

右用水一升煎至六合入酒五合煎取七合空心分爲二服一  
方爲細末酒調二錢○一方有鹿角膠等酒調治白帶臍腹痛  
栝黃散 療經血不止

黃芩 一兩 二 側柏葉 蒲黃 各兩

以栝葉爲君  
芍藥爲臣  
清血之藥可  
治經水不調  
不消血塊  
即小腹痛亦  
是血虛也  
用酒此亦殺  
相有生肌也

鹿膠即鹿生  
意切其  
水清肝熱更  
培土元  
血片藥肝色  
是血不足而  
經故其色淡  
以此爲所  
以爲君也

伏龍肝 二兩 即空  
心對月土

右吹咀水二升煎取八合分爲二服

又方 治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

芍藥 十二 生地黃 伏龍肝 各十 阿膠 青竹茹 各八  
當歸 六分 續斷 地榆 小蘗根 各二

右用水九盞煮取三盞去滓分三服

伏龍肝散 治氣血勞傷衝任脈虛經云非時忽然崩下或如豆  
汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹疼痛經久未止令  
人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝 赤石脂 各一 芍藥 三兩 熟地黃  
艾葉 微炒各 麥門冬 去心 當歸 乾姜 各七  
肉桂 甘草 各半

濟陰綱目 卷二 治崩漏血虛者宜服此方 三 天德堂

右爲細末每服四錢棗一枚水同煎

地榆散 治婦人崩中漏下不止

地榆 蒲黃 白芍藥 白茯苓  
栝葉 微炒 蟹瓜 微炒 熟地黃 鹿角膠 碎炒  
漏蘆 各一 芎藭 當歸 各七 伏龍肝 一兩  
乾姜 炮 桂心 甘草 各半

右剉碎每服三錢水一中盞入竹茹一分煎至七分去滓食前  
溫服

按伏龍肝爲止血之聖藥蓋燥可去濕也先賢治崩用旋覆花  
半夏治漏閉濕痰而崩止者亦此意

右爲末空心溫酒調服二三錢大分名無比散無何製

藹節灰  
蓮房灰  
油髮灰  
赤松皮灰

食果而此種 扶桑之木受	青陽之氣聚 少陽并生之	性能抑肝胆 之陽以養厥	陰之血故神 仙一切服金	藥不得其寒 而不食以其	火不交不武 而其補性之	氣也若此筋 止血皆屬言	戒白鮮新公 百草之烟聖	亦松樹所產 草依之木之	能來多於 灸經上之四		
烟則此野藥 之以為調劑	火松皮灰亦 此愈清氣最	火而生居水 中是水中之	火惟鯽魚生 于四季故得	土之多其與 膠腥先入肝	以助肝氣之	升斂甲者金 之用也水中	有火水中有 金釜主收益	火土生金木 併之乾地堅	成焉若乾之	屬屬香血之	星血潤下而

各等

分

如聖散 治血止崩

櫻櫚 烏梅肉 乾薑一兩五錢 逆燒存性

右爲細末、每服二錢、烏梅酒調下、空心食前服、久思不過三服、愈。一方去乾姜、用甘草二寸、半生半熟、共爲末、二三錢、淡醋湯調服。

當歸散 治婦人血崩不止理氣血而又 瘀血者也

當歸 龍骨燒赤 香附子炒各 一錢

棕毛廣 五錢

卷之五 見黑血則止方

辛未

右爲末、每服四錢、米飲調、空心服、忌油膩豬魚雞等物。

一方 治血崩屢効

當歸 白芍藥 乾薑 櫻櫚各等 分

右各煨存性、研爲細末、醋調、以有節朱鋤左攪四十九轉、食前服。

琥珀散一名烏紗粉 治暴崩不止

赤芍藥 當歸 香附子 乾荷葉

男子髮皂莢 水洗 櫻櫚 烏紗帽是漆紗頭巾取 腸氣上衝故也

右各等分並於新瓦上、煨成黑灰、存性三分、爲細末、每服五錢、空心童便調下、如人行十里久再進一服、即止。○若虛後血去、多加米醋京墨麝香少許。

<p>灰溫酒調下二錢七〇一方槐木耳燒作灰酒服方寸七</p> <p>止崩維方</p> <p>一方荆芥蓮房各等分燒灰存性爲細末空心米飲調下二錢</p> <p>一方荆芥穗燈火燒焦爲末每服三錢用童便調下</p> <p>一方葫蘆去子穰實荆芥穗燒存性米飲調服</p> <p>一方香附子去毛炒焦黑存性爲末熱酒調服二錢不過兩服立止</p>	<p>一方砂仁新瓦炒黑爲末米飲調服</p> <p>一方益智仁炒黑爲末益米飲調下</p> <p>一方檳榔燒灰存性碾末溫酒調下甚妙</p> <p>一方亂髮皂角水洗淨爲末空心酒調下二錢</p>	<p>濟陰綱目 卷二 止動難方</p> <p>一方樓欄白礬煨爲末酒調二錢</p> <p>一方樓欄燒存性淡酒調下三錢</p> <p>一方烏梅燒灰存性爲末烏梅湯調下</p>	<p>一方桂心燒存性爲末米飲或酒調下一二錢</p> <p>一方桃仁燒灰存性研細食前溫酒調下二錢</p> <p>一方五靈脂炒令烟盡爲末溫酒調下一錢</p> <p>一方黃牛角應用尖燒爲黑灰微存性研末調服</p>	<p>一方鹿角燒灰細研食前溫酒調下二錢</p> <p>一方烏鰂魚骨燒存性爲細末每二錢煎木賊湯下</p> <p>一方以鹽白梅燒灰存性爲末空心米飲調下</p> <p>一方用夏枯草燒存性爲末米飲調下</p>	<p>夏枯草是原 陰乾藥之</p>
---	---	--	---	--	-----------------------

<p>用狗屎汁其 奇然亦屬中 陰藥也同白 草煎必妙必 妙</p> <p>一方百草霜二錢向磨汁拌定分作二服當歸酒調下</p> <p>一方京墨爲末二錢七同燒露蜂房爲末三指撮酒調服</p> <p>一方新綿一口燒研末空心酒調下立止 名一 笑散</p> <p>一方蓮蓬燒灰存性爲細末酒調下二錢</p>	<p>一方棉子花銅器炒烟盡爲末空心溫酒調下二錢</p> <p>一方用大薊俗呼爲馬次芥連根去土勿洗以磁石器搗爛仍入冷水半盞取汁服之立止</p> <p>千金方 治婦人無故尿血</p>	<p>龍骨二兩爲末以酒調服方寸七</p> <p>孫真入方 治九竅出血</p> <p>荆葉搗取汁酒和服之</p> <p>濟陰綱目 卷二 止動難方</p> <p>手元 天德堂</p>	<p>濟陰綱目卷之二終</p>		
---	---	---	-----------------	--	--

濟陰綱目卷之三

關中 武之望叔卿父輯著 武林 汪 瀨洋

西陵 汪 淇悌子纂釋 天都 查 望子

○赤白帶下

○論帶下由勞傷任

凡與氏所論  
不可帶下  
九即此言亦  
無微治之法  
何可也  
倍字作倍字  
三句通微

股氏曰與氏病源論婦人有三十六疾者七癰八瘕九痛十二帶  
下也而帶下不顯其證今人唯知赤白二帶耳此由勞傷任風  
冷據於胞絡婦人平居血欲常氣欲常少百疾不生或氣倍於  
血氣倍生寒血不化赤遂成白帶若氣平血少血少生熱血不化  
紅遂成赤帶寒熱交并則赤白俱下其脈右手尺浮浮為陽陽絕  
者無子若足冷帶下輕則漏下甚則崩中皆心不榮血肝不藏血

濟陰綱目 卷三 帶下

天德堂

所致其脈寸口弦而大弦則為漏大則為瘕其為瘕者虛  
相搏其脈為革主半產漏下又尺寸脈虛者漏血漏血脈浮者不  
可治

產寶云帶下三十六疾者是十二癰九痛七害五傷三圓謂之三  
十六疾也十二癰是所下之物一者如膏二者如青血三者如  
紫汁四如赤皮五如膿六如豆汁七如葵羹八如凝血九如清  
血似水十如米泔十一如月泥十二如經度不應期也九痛者一  
陰中痛二陰中淋痛三小便痛四寒冷痛五月來時腹痛六氣滿  
來時足痛七汗出陰中如蟲齧痛八腸下皮痛九腰痛七害者一  
害食二害氣三害冷四害勞五害房六害妊七害睡五傷者一寒  
孔痛二寒冷痛三小腹痛四腹不仁五子門不正引背痛三圓者

此指在帶二  
脈而言其曰  
熱入大小腸  
之病無不  
從邪入也  
子帶脈之  
為正  
結之  
以明濕熱之  
病

月水閉塞不通其餘二者文佚不載而仲景所說三十六種疾皆  
由子賦令熱勞損而來下起於陰內也

○論帶下五色因風邪入於胞門

良方云婦人帶下其名有五因經行產後風邪入胞門傳於厥  
而致之若傷足厥陰肝經色如青泥傷手少陰心經色如紅津傷  
手太陰肺經形如白涕傷足太陰脾經黃如爛瓜傷足少陰腎經  
黑如衄血人有帶脈橫於腰間如束帶之狀病生於此故名為帶

李氏曰平時陰陽過多及產後亡血下虛風邪乘虛入於胞絡宜  
煖宮九加附吳茱萸或黃耆建中湯去桂加當歸水煎吞苦練

九○白帶兼痛風者二陳湯加蒼柏桐星牛膝川芎兼頭風鼻涕  
皆丹溪所定

者蒼柏辛芍散

○論帶下屬濕熱結不散

保命集云赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結于脈  
故津液涌溢是謂赤白帶下本不病結緣五經脈虛結熱屈滯主

帶故女子膈下痛陰中綿綿而下也經曰任脈為病男子內結七  
疝女子帶下瘕瘕王註云任脈自胞上過帶脈貫于膈上故男子

疝女子帶下瘕瘕王註云任脈自胞上過帶脈貫于膈上故男子  
內結七疝女子帶下帶脈起於季脇章門似束帶狀今濕熱宛結

不散故為瘕也經曰脾傳之腎名曰疝瘕小腸宛結而痛出白  
名曰蠱所以為帶下宛結也宛屈者屈滯而病熱不散先以十賸

湯下後服苦練丸大延胡散調下之熱去濕除病自愈矣  
潔古云治帶下宛結而痛者先以十賸湯下之次服苦練丸大延

胡索散調之是先攻後補之法也

○論帶下屬濕熱結不散

保命集云赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結于脈  
故津液涌溢是謂赤白帶下本不病結緣五經脈虛結熱屈滯主

帶故女子膈下痛陰中綿綿而下也經曰任脈為病男子內結七  
疝女子帶下瘕瘕王註云任脈自胞上過帶脈貫于膈上故男子

疝女子帶下瘕瘕王註云任脈自胞上過帶脈貫于膈上故男子  
內結七疝女子帶下帶脈起於季脇章門似束帶狀今濕熱宛結

不散故為瘕也經曰脾傳之腎名曰疝瘕小腸宛結而痛出白  
名曰蠱所以為帶下宛結也宛屈者屈滯而病熱不散先以十賸

湯下後服苦練丸大延胡散調下之熱去濕除病自愈矣  
潔古云治帶下宛結而痛者先以十賸湯下之次服苦練丸大延

胡索散調之是先攻後補之法也

○論帶下屬濕熱結不散



○論帶下痰涎宜吐下  
子云一婦人病下連綿不絕白物或來已三載矣命予脈診其兩手脈俱滑大而有方得六七至常上熱口乾壯旺時嘔吐水手知其實有痰涎在胸中以瓜蒂散吐出冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹攻以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈  
愚按李左街之妻病白帶如水如粉中綿綿不絕臭穢之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷陽起石硫黃並附之藥重燥補汚水轉多載人斷之曰此帶濁水木熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰二三升次日下汚水斗餘行三遍汗出周身至明日病人云汚已不下升陰綱目  
卷三 論帶下  
三  
癸次用寒涼之劑服及半載產一男  
丹溪云帶與漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱無人知此其證非提甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加白朮蒼朮仍用九子肥人有帶多是濕痰用海石半夏南星炒藥青黛蒼朮水川芎○瘦人帶病少如有多是熱用炒藥蛤粉滑石川芎青黛楊梅皮  
羅先生法或十劑湯或神佑丸或玉燭散皆可用之虛者不可峻攻實者可行  
潔古云治結痰白帶以小胃丹半飽半飽津液下數丸候痰積行却服補藥  
○論帶下虛寒宜溫補  
李氏曰帶下有虛寒帶腥臭者因小水淋瀝不已或腹中寒求

產後去血過多以致陰虧陽竭氣不升經脈凝滯氣下陷精氣累帶于下焦凝滯而成白帶如涕下流腥臭黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸  
虛中有火者補經固真湯大烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃柏有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽陽氣虛極帶下腥臭多悲不樂桂附湯腹痛陰冷者四物湯加桂附常用  
酒煮當歸丸小烏雞丸琥珀調經丸  
韓氏曰山妻年三十餘十八胎九殞八天會先君松潘難作賊兄弟皆西奔妻驚憂過甚遂昏昏不省人事口唇皆青或至封喉下部虛脫白帶如注如此四十餘日或時少醒至欲自縊自縊不能堪醫或投涼劑解其上則下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥蒸其下則熱暈欲絕四弟還脈之始知為亡陽證也大柴胡宗嗣未立幾誤殺吾嫂急以鹽煮大附子九錢為君制以薄荷防風佐以鹽桂芍歸之屬水煎入井水冷與之未盡劑斯鼻熱睡通背覺即能識人時止一嗣子二女相抱痛哭疎戚皆悲執友趙惠長驚曰君何術也弟曰方書有之假對假對真而上乃假熱故以假冷之藥從之下乃真冷故以真熱之藥反之斯上下和而病解矣  
繼後主以女金丹錯綜以二三方不但去其疾且調治元氣庚午生子一今應襲也壬申生一子去年又患瘧疾十三月亦主以養元氣調生氣待飲食大進然後劫以毒藥吐下塊物甚多投以附子湯三錢而愈不費刃且暮聞其用女金丹即勝金丸也得之異人倍加香附而視氣血之偏者又加薑黃條芩倍川芎之屬取効

右卷而賦

甚多子念無子者往往有之。勸思子得子之難其苦何如。乃次第錄其方。併女金丹以濟人云。女金丹即勝金。

○論帶久枯涸宜潤補

血生于氣。故帶下久而枯涸者。濡之。凡大補氣血。皆所以濡之。如以四物湯為末。煉蜜丸。梧子大。空心米飲下。三四十丸。以療年高婦人。白帶良驗。皆潤劑也。

○治帶下當以壯脾。胃。升陽氣為主。

薛氏曰。徐用誠先生云。帶下白濁。氣而赤。橘血。東垣先生云。血崩久則亡陽。故白濁之物下流。未必全拘于帶脈。亦有濕痰流注下焦。或腎肝陰之濕。勝或因驚恐而木乘土位。濁液下流。或思慕為筋痿。或人以六脈滑大有力。用宣導之法。此為其實也。東垣以

新陰綱目

卷三

五

天德堂

前補五色分。脈微細沉緊或共大而虛。用補陽調經。乃兼責其虛也。母後用海石南星。格根皮之類。乃治其濕痰也。竊謂前証皆當壯脾。胃。升陽。氣為主。佐以各經見証之藥。色青者屬肝。用小柴胡。如山梔。防風。濕熱。帶下。小便赤澀。用龍胆。瀉肝。湯。肝血不足。或燥熱。風熱。用六味丸。色赤者屬心。用小柴胡。加黃連。山梔。當歸。思慮過度。用妙香散。等藥。色白者屬肺。用補中益氣。加山梔。色黃者屬脾。用六君子。加山梔。柴胡。不應。用歸脾。湯。色黑者屬腎。用六味丸。氣血俱虛。八珍湯。陽氣下陷。補中益氣。湯。痰下注。前湯加茯苓。半夏。蒼朮。黃芩。氣虛。痰飲下注。四七湯。送六味丸。不可拘。肥人多痰。瘦人多火。而以燥濕。瀉火之藥。輕治之也。

一婦人腹脹。脇痛。內熱。晡熱。月經不調。腹體痠痛。不時吐痰。或用

六氣之病

清氣化痰。痰厥間不利。帶下青黃。腹脇膨脹。又用行氣之劑。胸膈不利。肢體如麻。此乃鬱怒傷肝。脾。朝用歸脾湯。以解脾鬱。生脾氣。又用加味逍遙散。以生肝血。清肝火。百餘劑而愈。

一婦人久患帶下。發熱口乾。體倦。用七味白朮散。加麥門。五味。大劑。煎與。愈。飲再發。稍可。乃用補中益氣。加茯苓。半夏。十餘劑而愈。

一婦人頭暈吐痰。胸膈氣喘。得食稍緩。苦于白帶。二十餘年矣。前藥不應。此氣虛而痰飲也。痰飲愈而帶自愈。遂朝用六君子湯。夕

用六味地黃丸。不月而愈。

一婦人耳鳴。胸膈內熱。口乾。喉中若有一核。若吐不利。月經不調。兼之帶下。予以為肝脾鬱結。用歸脾湯。加半夏。黃連。并麻藤。明。間

以四七湯。下白丸。于而愈。

新陰綱目

卷三

六

天德堂

一婦人吞酸飽滿。食少便泄。月經不調。服清氣化痰丸。兩劑漸愈。寒熱往來。帶下黃白。面黃體倦。此脾胃俱虛。濕痰下注。用補中益氣。倍用參朮。加茯苓。半夏。連炮薑而愈。

一婦人帶下。四肢無力。予曰。四肢者。主也。此脾胃虛弱。濕痰下注。以補中益氣。濟生歸脾。二藥治之而愈。

一婦人帶下黃白。怒則胸膈不利。飲食少思。或用消導利氣之藥。痰喘胸滿。大便下血。予曰。此因脾氣虧損。不能攝血。歸脾。用補中益氣。加茯苓。半夏。連炮薑。四劑頓減。又用八珍。加柴胡。山梔。而痊。

○論帶久不止。當補衛厚脾。

李氏曰。凡崩中下帶。或用升提。如升陽調經湯。或用收澀。如伏龍肝散。白芷散。然暫止而終不止者。蓋衛司開闔。而為榮血之主。脾

不得用古方  
者每非古方  
有能解之便  
自能川  
收滋劫奪  
是奇兵用其  
合宜便是正  
法此蓋直在  
正治有可君  
不可偏廢也  
水精不傳便  
能生精  
脾木氣剋土則脾受傷而有濕熱而生熱熱則流瀉所以滑瀉之  
物滲入膀胱從小便而出也丹溪作濕熱而用苦寒之藥治之者  
是矣雖然古人曾有用辛溫治之而愈者不知苦寒之藥正治之  
法也辛溫之藥從治之法也蓋濕熱傷脾脾虛則瀉亦宜帶  
下非辛溫從治而能開散之乎然濕熱者皆因脾虛也  
論帶下難治法  
戴氏曰赤白帶下皆因七情內傷或下元虛冷感非一端大率下  
白帶多固而下赤者並宜順氣散吞震靈丹傷佐艾附片或米飲  
調沙參末帶下不止成疰癆者四物湯加煨牡蠣粉半錢吞回腸  
丸多服取效有帶疾愈後一二月或再發半年一發先血而後下  
帶來不可過停青末幾又復傾瀉此名癰帶最為難治○帶載下  
血小腹主之有因血虛而虛熱陷入小腸致小便澀痛也如白帶  
或成沙粒皆不可作淋治用冷劑宜以四物湯五苓散各半貼和

論室女帶下  
產後云未出女子有三病何也答曰女子一病者經水初下陰中  
熱或當風臥或扇風二病者太衝脈盛氣盛則內熱以冷水洗之  
三病者或見丹下驚怖者若三病一有所受後必有帶下之証也  
方用神仙  
聖藥丹  
○排膿  
準繩云帶下逆腸有敗膿淋漓不已腥穢甚遂至臍腹更增冷  
痛此蓋敗膿血所致卒無已期須以此排膿用白芷一兩單葉紅  
蜀葵根二兩白芍藥白礬煅枯各半兩為末同以蠟丸如桐子大  
空腹溫酒吞下十丸或十五丸候膿盡仍別以補藥佐之  
○論白濁白淫  
大金云婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交發水火不升降或  
因勞傷于腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰為澁便之道  
胞冷腎損故有白濁白淫  
李氏曰白淫蓋緣思想無窮所願不得意渴于外入房太甚發為  
筋痿久為白淫謂白物淫如白精之狀不可誤作白帶過服熱藥  
又有日夜流津如清米泔或如黏膠者謂之白崩與白淫大同多



下清血

苦棟皮 懷香 各一方 當歸 各一分  
有為末酒和丸如桐子大每服三五十丸空心溫酒下○瘰癧血  
加桃仁○血海寒加桂○如腰痠疼四物湯四錢加羌活防風  
各一錢煎湯送下

此方溫燥  
有熱所宜

四神丸 治帶下

香附 四兩 蒼朮 治瘰癧 枳殼 枳殼 枳殼 枳殼 枳殼 枳殼  
右為末黃米煮飯丸如桐子大每服五六十丸空心酒下  
已上諸方俱輕劑

萬安散 治女人赤白帶下或出白物如脂或有臭濁汚水並神  
効

此利氣  
之劑與藥  
相宜

小茴香 炒 木香 各二兩 黑牽牛 一兩 另  
右為細末以生薑自然汁調二錢臨臥服取盡惡物為効末盡  
間日再服二錢後以白粥補之忌熱毒物

三方皆燥  
下氣利水  
藥性與藥  
相宜

大聖萬安散 治女人瘰癧瘰癧腹脹胸滿赤白帶下及患血氣  
虛弱痿黃無力並休息赤白痢疾並皆治之其効不可具述孕  
婦不可服天陰晦不可服

白木 木香 胡椒 各二兩 陳皮 去白 黃芪

桑白皮 木通 各五兩 白牽牛 炒取頭末二兩

右為末每服二錢用生薑五片水一鍾半煎至一鍾去薑調藥  
臨臥服須臾又用薑湯或溫白湯飲三五口催之平明可行三  
五次取下惡物及臭汚水為度後以白粥補之服藥不可食晚  
飯及葷酒等物

宣明導水丸 治濕熱滯于下焦之分赤白帶下不止燥熱煩渴  
諸症在氣血  
兩分

大黃 黃芩 各二兩 牽牛 頭末 滑石 各四兩  
右為末水丸如桐子大每服四五十九丸滾水下隨證加減  
已上諸方俱重劑

○治濕痰帶下

滲濕消痰飲 治濕熱痰積滲入膀胱白帶不止

白木 蒼朮 炒 半夏 姜湯泡 橘紅 白茯苓

白芷 香附 各一兩 甘草 炙 五分

右到水煎服○有熱加黃芩○血虛加芎歸○氣虛加參朮○  
久不愈加升麻柴胡升提之

蒼栲栳皮丸 治肥人白帶是濕痰

蒼木 黃柏 枳殼 枳殼 枳殼 枳殼 枳殼 枳殼 枳殼 枳殼

川芎 香附 乾薑 炮 各一分 ○暑月去乾薑加滑石

右為末醋和丸如桐子大每服五六十丸白湯下

小胃丹 上可取胸膈之痰下可利腸胃之痰及濕痰熱痰諸治  
婦人結痰白帶惟胃虛少食者忌用

甘遂 瀉鹽 各一兩 芫花 好醋拌經宿瓦器  
大戟 長流水煮一晝夜 芫花 內燒器不可焦

大黃 瀉鹽 各一兩 芫花 好醋拌經宿瓦器  
以酒調炒熟勿令焦切焙乾再

右為末以白木膏丸如蓮荷子大臨臥津液嚥下五七丸或白  
湯送下取膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服○一方加  
木香栲栳各半兩

此方與十全大補湯少甘  
其藥地為其  
甘棧附生  
濕故勿用也  
然無風藥而  
六治風邪入  
胞與名則風  
何也  
小柴胡湯  
藥其白治風  
邪生風耶  
此又丹溪先  
生方也以平  
其川而治  
頭風以蒼柏  
星生而治  
治帶不正無  
奇令人可法

補藥方 治痰結白帶。先以小胃丹半錢半飽津液嚥下數丸。俟  
胃開却服此藥補之  
白木 二兩 黃芩 五錢 紅白葵花 二錢 白芍藥 七錢  
右為末。蒸餅丸如桐子大。每服三五十九。煎四物湯下。○一方  
有蒼木無黃芩。  
○治風邪帶下  
胃風湯 治風邪入于胞門。或中經脉流傳臟腑帶下五色。  
人參 白木 茯苓 當歸 川芎  
芍藥 肉桂 各等分  
右剉。每服八錢入粟米一撮水煎服。○腹痛加木香。○五積散  
去麻黃亦可。  
濟陰綱目 卷三 帶下諸方 十三 天德堂

小柴胡湯 治風邪帶下五色  
柴胡 二錢 黃芩 半夏 人參 甘草 各一錢  
右剉。加生薑三片。棗二枚。水煎服。○色青屬肝。加山梔。防風。色  
赤屬心。加黃連。山梔。當歸。○色白屬肺。用補中益氣湯。加山梔。  
○色黃屬脾。用六君子。加山梔。柴胡。不應。用歸脾湯。○色黑屬  
腎。用六味地黃丸。  
蒼柏參茸散 治婦人上有頭風鼻淵。下有白帶。  
辛夷 川芎 蒼木 黃柏 南星  
半夏 滑石 牡蠣 黃芩 酒炒  
右水煎食後服  
地榆散 治漏下五色。一十二帶。藥治嘔吐下血。地榆三兩剉碎。

以醋水各半升。煮十餘沸。去滓。食前稍熱服一合。○本草注云  
地榆主帶下。十二病。一曰多赤。二曰多白。三曰月水不通。四曰  
陰腫。五曰子癰。六曰子宮冷。七曰合陰。陽虛痛入曰小腹寒。  
痛九日子門閉。十日子宮冷。十一曰夢與鬼交。十二曰五臟五  
定。  
○治虛損帶下  
衛生湯 治帶下不止。脉微弱。腹痛。  
黃芪 三兩 當歸 白芍藥 各二兩 甘草 一兩  
右為粗末。每服半兩水煎。空心服。○一方下苦練丸三十粒。虛  
者加人參一兩。  
補中益氣湯 治勞役過度。飲食不節。損傷脾胃。以致陽氣下陷。  
濟陰綱目 卷三 帶下諸方 十四 天德堂

白帶下久不止  
黃芪 人參 白木 甘草 各一錢 當歸  
陳皮 各七升 麻 藥胡 各三  
右作一服水煎服  
六君子湯 治胃虛有痰。飲食減少。中氣不和。時時帶下。  
人參 白木 白茯苓 甘草 各一錢 陳皮 白半夏 各一錢  
右剉。一服。加生薑三片。水煎服。  
歸脾湯 治思慮過度。傷心脾。以致健忘怔忡。驚悸不寐。怠惰嗜臥。  
不思飲食。時常白帶不止。方見血崩門。  
加味八珍湯 治婦人氣血兩虛。赤白帶下。  
當歸 川芎 白芍藥 生地黃 人參 白木

脾不健運 補心此方其 近之 爲飽者也 其山與杜仲 烏梅又補帶 脉之不足而 加減法亦皆 得理宜法之  
 白茯苓 山藥 杜仲 香附 甘草 各五分  
 右加烏梅一箇生薑三片取一枚水煎食前溫服○肥人加半  
 夏○瘦人加黃柏○飽悶去人參加砂仁○腹痛去人參加小  
 茴香玄胡○冬月加炮乾薑○日久元氣下陷加升麻柴胡升  
 提之  
 當歸澤蘭丸 治婦人經脈不調赤白帶下久無子者  
 香附子 用極大子除去毛一分四分童便浸四兩酒浸  
 當歸 酒浸 白芍藥 川芎 熟地黃 生地黃 各二兩  
 澤蘭葉 艾葉 白朮 各一兩 黃芩 二兩  
 右爲末醋糊爲丸如赤小豆大每服六十丸空心白湯或酒下  
 止帶丸  
 濟陰綱目 卷三 帶下諸方 十五 天德堂  
 當歸 酒洗 川芎 白朮 人參 山藥  
 杜仲 剉碎 香附 破故紙 炒 牡蠣 煅 椿根皮 炒  
 續斷 分 青黛 半  
 右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五十九空心米湯下○腹痛  
 加玄胡索小茴香○肥人加薑製半夏○瘦人加酒炒黃柏○  
 冬月加炮乾薑少許○夏月加黃柏  
 嚴氏當歸煎 治赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日漸羸瘦  
 當歸 酒洗 赤芍藥 炒 白芍藥 炒 熟地黃 酒蒸 阿膠 炒  
 續斷 酒洗 牡蠣 煅 各一兩 地榆 兩  
 右爲末醋糊爲丸如桐子大每五十丸空心米飲下  
 提香鬼絲丸 治赤白帶下此藥不熱不寒得其和平助陰生子

此方以龍 白芍藥 補 鹿角霜 白芍藥 白朮 白茯苓 山藥  
 氣以正養而 治諸中淋瀝 以牡蠣而收 濕治帶此又 別是一神意 見然不用丹 歸地黃者慮 血藥溫而也 交局如此可  
 不問事則宜 丹溪治帶上 子熟生濕其 意以腎主閉 破而下其者 經中帶下之 故其方如此 宜者本藥而 無旁可爲此 方者一試也  
 此方有起見 其真入不能 以此非見道 人不能解此 此方補腎子 能解此虛也  
 肉桂 酒洗 沒竭 絲子 覆盆子 蛇床子 各一兩  
 當歸 酒洗 白芍藥 炒 川芎 各一兩 牡蠣 煅 烏賊骨 各八錢  
 五味子 防風 各一兩 黃芩 五錢 艾葉 三錢  
 右爲末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸鹽湯下早晚各進一服  
 補宮丸 治婦人諸虛不足久不妊娠骨蒸形瘦崩中帶下並宜  
 治之  
 鹿角霜 白芍藥 白朮 白茯苓 山藥  
 香白芷 白薇 牡蠣 煅 烏賊骨 各等分  
 右爲末麵糊丸如桐子大每服五十九空心米飲湯下  
 丹溪方 治白帶屬真陰虛者  
 龜板 炙 枳子 各二兩 黃藥 炒 一香附子 山藥  
 濟陰綱目 卷三 帶下諸方 十五 天德堂  
 苦參 楊皮 貝母 各半 白芍藥 七錢 乾薑 炒 二錢  
 右爲末酒糊丸如桐子大每服五十九空心米飲下  
 千金方 治帶下脉數者陰虛有熱也  
 柯杞根 一兩 生地黃 五兩 一方五斤  
 右二味以水一斗煮取五升分三服  
 補真固經湯 一婦白帶漏久服藥不效診得心胞尺脉極微其  
 白帶流而不止脉訣云崩中日久爲白帶漏下多時骨蒸枯言  
 崩中者始病血崩不已久下則血少復亡其陽故白濁之物下  
 流不止是本經血海將枯津液俱亡枯乾不能滋養筋骨以本  
 經行經藥爲引用爲使以太辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益



凡東垣立方  
必原脈理  
思慮虛且  
引前古為  
故治諸病  
今不能然  
怪乎此方  
用參黃益  
李仁蘇花  
柴胡明升  
氣子下腹  
和胃氣子  
生本后腹  
其清涼不  
也非深思  
不能主此  
名曰補真  
以真氣為  
服法亦妙  
此治重在  
中如水瀉  
子心故用  
黃若若若  
為在不不  
木者痛無  
見藥防足  
勝溫升散  
李可以潤  
溫原甘原  
中在在在  
分之能能  
前方參一  
右口解  
前分中多  
氣分藥內  
溫藥之味  
延胡苦練湯 治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

津液以大辛熱之氣味補其陽近生其血脈以苦寒之藥泄其  
肺而救其上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥佐而益元氣  
名曰補真固經湯

人參 乾薑 各一  
生黃芩 另郁李仁 去皮 柴胡  
甘草 炙各橘皮 不去白 白茯苓 十六分  
右除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至二  
盞去滓空心熱服候少時以早膳壓之

助陽湯 治白帶下陰戶中痛控心而急痛身黃皮緩身重如山  
陰中如冰 一名升陽  
柴胡 一分 良薑 二錢 防風  
郁李仁 乾薑  
甘草 各一 白茯苓 七陳皮 生黃芩 各五  
治陰綱目 卷三 帶下諸方 十七 天德堂

右劉散只作一服水二盞煎至一盞食前熱服  
右二方用葵花郁李仁之滑以潤燥盡枯涸滯者宜之  
○治虛寒帶下  
元戎四物湯 治婦人赤白帶下脉沉微腹痛或陰中痛  
四物湯 附子 炮各  
右劉水煎食前服○一方四物加懷香桂  
玉仙散 治赤白帶下  
乾薑 炮 白芍藥 炒 附子 炮 各  
右為細末每服三錢用水白酒調下○一方只用白芍藥酒炒  
二兩乾薑炮半兩為細末水飲調下二錢  
延胡苦練湯 治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

又以前輩中  
如桂附藥知  
不同之故在  
脈症上察計  
蓋人之病有  
氣血之辨故  
立方之師亦  
因事制宜也  
就前用一劑  
是大劑大劑  
後方止則四  
分之二又相  
理脈理均宜  
法之  
是謂苦藥以  
治前用藥  
子以藥  
地治藥  
黃芩藥  
性之屬  
多不不  
陰陽之氣  
故五桂所以  
助陽和則  
不悲而有  
少以如  
藥上上  
用藥  
遠熱之  
食以何  
以如以  
思食何  
五思之  
其後此  
治下  
延胡苦練湯 治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

延胡素 苦練子 各二 黃柏 一分 附子 肉桂 各三  
甘草 炙 熟地黃 一  
右作一服水煎食前溫服  
桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大寒  
肉桂 附子 黃藥 知母 各五  
右作一服水煎食遠熱服○如少食常飽有時似腹脹加白粉  
藥半錢○如不思飲食加五味子二十個○如煩惱面赤麻木  
如蟲行乃胃中元氣極虛加黃芪一錢八分七分甘草五分  
麻五分○此補陽氣極虛用黃柏等藥引用又升降陽藥也  
當歸附子湯 治臍下冷痛赤白帶下  
當歸 二 良薑 乾薑 附子 炮 各一 柴胡 各  
升麻 芍藥 各五 甘草 炙 炒黃連 三 薑黃 各  
右為粗末每服五錢水煎溫服為尤亦得○東垣回陽丹註云  
必用炒黃連無則不効蓋寒疝之要藥也  
酒煮當歸丸 治癰疽白帶下注脚氣腰以下如在冰雪中居火  
坑以厚衣重蓋猶冷小便不止與白帶長流而不禁固肌肉消  
瘦面白目青目慌慌無所見身重如山行步欹側腿膝枯細大  
便閉結心下痞悶懊惱飲食不下面黃背寒小便澀而不知此  
上中下三陽真氣俱竭故噦嘔不止胃寒之極也其脉沉緊而  
澀按之空虛若脉洪大而澀按之無力猶為中寒之証况按之  
空虛者乎按之不鼓是為陰寒之極也其空虛乃氣血俱虛之  
極也



今有婦人上  
升有血虛  
陰下降  
精血虧損  
子七加女子  
此以血虛  
在女子血  
與男子同  
形如婦人  
陰下是亦  
也故云  
清血膏  
便閉心下  
快煩似熱  
凡氣脈不  
浮沉以爲  
寒按之不  
無問大小  
以爲虛形  
常服此  
既白血氣  
虛而本方  
會無一味  
藥而血氣  
止一味當  
其真陽已  
即甘溫之  
亦不爲力  
也乃地能  
助氣亦不  
用  
妙在附子  
引血氣以  
通其下使  
陽之氣生  
九補上子  
天也其九  
白蘇丸  
治室女衝任虛寒帶下純白  
當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 艾葉  
牡丹皮 茯苓 龍骨 牡蠣 赤石脂  
右爲末 蘇丸 如桐大 每服五十九丸 空心 艾醋湯下  
海陰綱目 卷三 婦人諸方 十九 天德堂  
常服此  
以冷水或熱而弱或當風此室女病帶下志由有燥之婦陰  
陽過多即傷胞絡風邪乘虛而入胞經屬冷遂成積液與血水  
相連而下產後帶下由亡血失氣傷動胞絡門開而外風襲肌  
體虛而冷風入冷風與熱氣相連故成液而下冷則多白熱則  
多赤冷熱相交赤白俱下  
當歸 七錢半 附子 炮去皮 龍骨 無灰 吳茱萸 湯洗  
赤石脂 火煨 乾薑 炮各 牡蠣 一兩二錢 艾葉 半兩 以醋  
右爲細末研勻醋糊和丸如桐子大以赤石脂爲衣每服五十  
九空心用艾葉食鹽烏梅煎湯下  
白蘇丸 治室女衝任虛寒帶下純白

降血之  
升有血虛  
開之妙非  
藥石者不  
到以然其  
量博大非  
用者不放  
此方以四  
合成劑以  
藥服其下  
丹膏其下  
乎子宮溫  
懷姙矣  
此三十六  
之類  
此大熱之  
非寒者不  
可服  
鹿茸 酒蒸 白蘇 狗脊 煨去毛製  
右爲細末艾煎醋汁打糊丸如桐子大每服五十九丸空心溫酒  
送下  
神仙聚寶丹 一名琥珀 治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散  
積聚成塊或成堅癖及血氣攻注腹痛疼痛小便急脹或虛弱  
嘔吐涎沫頭眩眼花腰膝重痛面色萎黃肢體浮腫月候欲行  
先若重病或多或少帶下赤白崩漏不止驚悸健忘小便頻數  
或白時見虛熱盜汗羸瘦此藥不問胎前產後室女並皆治之  
常服安心去邪逐敗血養新血令有子  
當歸 木香 琥珀 沒藥 各一 滴乳香 二錢  
麝香 辰砂 各一  
右各另研爲細末合一處研勻水丸如龍眼核大每用一丸溫  
酒磨下不拘時○胎息不順腹內疼痛一切產難酒灌便下  
○產後血暈敗血奔心口噤舌強或惡露未盡發熱面浮前烏  
梅湯和重便磨下○室女月候不調溫酒磨下半丸○產後血  
氣不調重便磨下  
藥更治湯 治下焦虛冷臍腹疼痛帶下五色月水崩漏淋瀝不  
斷  
吳茱萸 湯洗 杜仲 炮去 蛇床子 五味子 丁皮 各一  
木香 丁香 各半  
右剉如麻豆大每用半兩以生絹袋盛水三大碗煎數沸乘熱  
熏下部通手淋浴早晚二次薰洗

生藥龍鹽膏 治帶下  
 玄胡索 厚朴 當歸 茴香 炒黃鹽  
 酒防已 肉桂 紅豆 龍骨 川烏頭  
 丁香 木香 各一錢 良薑 木通 各一錢 全蝎 三枚 椿椿 五  
 右為末煉蜜丸彈子大綿裹留經在外納陰戶內  
 勝陰丹 為上藥力小再加三錢內加行性熱藥  
 羌活 柴胡 各二錢 大蘇 破故紙 各一錢 同煎  
 三奈子 川烏頭 大椒 各一錢 甘松 升麻  
 柏白卷 各一錢 全蝎 三錢 許  
 右為細末同前法製用  
 回陽丹  
 金竭 升麻 甘松 各二錢 草烏頭 羌活 各三錢  
 大椒 三奈子 蘇合 柏椿 各五錢 大蘇  
 破故紙 各二錢 水蛭 三錢 川烏頭 柴胡 各七錢  
 右為極細末依前製如指尖大用綿裹納陰戶中覺熱下煖為  
 効  
 如聖丹 治婦人經脈不調赤白帶下  
 柏椿 蛇床子  
 右為末醋為丸如彈子大用臘脂為衣綿裹放陰戶中定坐半  
 日熱極再換大抵月水不通赤白帶下多因子宮不潔服藥難  
 効此取易達且速効而不傷臟氣也○一方用柏椿川烏各等

分煉蜜丸如彈子大綿裹納陰戶中治帶下絕產  
 側柏地榆湯 治赤白帶下以設不能成孕  
 黃芪 側柏葉 地榆 烏賊魚骨 白殭絲  
 牡蠣 用鹽泥固濟火煨肉從容浸白芷 蛇床子 各一錢  
 右到加生薑三片水煎半饑時服  
 白芷散 治赤白帶下  
 白芷 海螵蛸 二個 胎髮 一團 細末空心溫酒調下二錢  
 伏龍肝散 治赤白帶下久患不癒元陽乏力六脈微濡  
 機欄 不拘多少燒研急 伏龍肝 於灶下取赤  
 屋梁上懸塵 炒令烟盡  
 有各等分研勻入龍腦麝香各少許每服三錢溫酒或淡醋送  
 下患十年者半月可安  
 馬蹄丸 治白帶不絕  
 白馬蹄 禹餘糧 各四錢 龍骨 三鳥鯊魚骨 白殭絲  
 赤石脂 各二錢  
 右為細末煉蜜丸如桐子大每服十九空心酒下不止加至三  
 十九  
 南真丸 治白帶大下不止腰腹疼痛其寒捫之如冰腹中亦然  
 目中溜火上壅視物眩暈無所見齒齦惡熱飲痛須得黃連末  
 擦之其痛乃止惟喜乾食大渴湯飲此病皆寒濕乘其腹內故  
 喜乾而惡濕肝經陰火上滋定於標故上壅而目中溜火腎水

侵肝而上溢故目眩眩無所見齒惡熱飲者是少陽陽明經中伏火也當大瀉寒溫以九藥治之故曰寒在下焦治主宜緩大忌湯散以酒製白石脂白龍骨以枯其濕以炮乾薑大辛熱瀉寒水以黃藥之大寒為因用又為鄉導故黃藥者雖有重罪不絕人之後又為之伏其所主先其所因之意又瀉齒中惡熱也以此藥為本經之便以芍藥半錢導之恐辛熱之藥太甚損其肝經故微瀉之以當歸身之辛溫大和其血脈用藥之法簡矣。

白石脂燒赤水漿柴胡各一白龍骨二錢酒煮日

當歸酒洗三錢乾薑炮四黃藥洗白芍藥各五

右為細末水煎稀糊為丸如雞頭大每服三十丸空心食消

清血利目

卷三下諸方

溫酒白沸湯放溫送下無令胃中停住待少時以豆磨壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物與酒溫過

一方治赤白帶下不問遠年近日並皆治之

龍骨半船上硫黃三錢

右為細末每服半錢空心無灰酒下

草花散治婦人血崩不止赤白帶下

草花一櫻櫚皮三嫩荷葉三甘草三

右為細末空心酒調半匙服

雙白丸治白帶如神

石灰一白茯苓二

右為末水丸桐子大每服三十丸空心白水下

白附丸有婦經年崩漏不止諸藥不効脉滿微此與前伏龍肝散兼服愈

白附子四附子二黃狗骨頭四兩

右為細末藥丸桐子大每服三十丸

地榆膏治赤白帶下骨立者此膏血氣劑熱勝而清勝者宜之

地榆一筋用水三升煎至一半去渣再煎如稠傷絞淨空心服三合日二服

治白淫白濁

加味四七湯治婦女小便不順甚者陰戶疼痛

牛耳一厚朴七赤茯苓各二香附子各五

甘草各二

藥錄

右藥分四貼每服水二鍾生薑三片煎八分去滓加琥珀末

一錢調服

固精丸治小便白濁或白帶淋瀝

腰重等證

壯陽補粉桑螵蛸酒龍骨

五味子各白芍脂各白茯苓各

右為末酒糊丸桐子大每服七十丸空心鹽湯下

內金鹿茸丸治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁日夜無度

壯陽補粉桑螵蛸酒龍骨

五味子各白芍脂各白茯苓各

右為末酒糊丸桐子大每服七十丸空心鹽湯下

內金鹿茸丸治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁日夜無度

婦男子赤白帶下  
川後鹿茸  
有流精益氣  
滋腎之功  
益內金甘  
蠟補龍骨  
同滋養便之  
用五味  
生津液而入  
其補下無  
疑男女俱可  
服  
肉蓯蓉  
之助助陽  
得之而孕  
巴戟補精  
補精巴  
虛冷補腎  
起陽五倍  
子煨陰  
本陽中之陰  
珠砂鎮心  
主真火升  
水之製  
固脫故為下  
元真氣不足  
者所服也  
味之滋養  
過於燥而  
之滋養  
於扶苓  
者天之陰火  
氣降則水生  
水生則火有  
制而又以精  
是滋養者  
欲其滋之速  
以煨為先者

臍腹疼痛腰膝無力

鹿茸 黃耆 雞內金 肉蓯蓉 五味子

遠志肉 牡蠣 桑螵蛸 龍骨 附子各等分

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸食前溫酒或米飲任下

金鎖正元丹 治真氣不足吸吸短氣四肢倦怠腳膝痠軟目暗

耳鳴遺精盜汗及婦人白濁白帶等證

肉蓯蓉洗 紫巴戟去心 蒺藜巴 炒各補骨脂酒浸炒

五倍子八 茯苓六 砂砂另研 龍骨二

右為末入藥研令勻酒和丸如桐子大每服二十丸空心溫酒

溫湯任下

濟陰綱目 卷三 婦下諸方

三五 天德堂

威喜丸 治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常流小便濁夢寐頻

泄及婦人血海久冷白帶白濁白淫下部常濕小便如米泔或

無子息

黃蠟四兩 白茯苓去皮四兩 作塊用猪苓二錢半同於磁器

右以茯苓為末焙黃蠟搜為丸如彈子大空心細嚼滿口生津

徐徐嚥服以小便清為度忌米醋只喫糖醋尤忌使性氣

烏金散 治身熱口燥氣喘痰痛下黃水如葵汁

百草霜炒 紫金皮米泔浸粉草 各等

右為末每服二錢艾湯或醋湯空心調下○心嗜猪血入鹽酒

下○白帶用鯉魚一尾去腸不去鱗將油髮一團入魚肚內黃

泥固濟炭火內煨存性去泥研魚為末每用一錢以陳酒調同

前藥服

一方 治婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁

鹿茸屑炒 黃耆為細末 每服二錢空心溫酒調服

欲除之深也亦忌使性之句助肝氣也  
鹿茸皮過血中之氣而破血百草痛止  
藥汁之平而除黃氣通血  
行地痛自止妙在甘草等  
分不然何以能治身熱口  
燥也  
此方簡切久服備佳

濟陰綱目 卷三 婦下諸方

二十六

天德堂

濟陰綱目卷之四

吳興 金德生問風父輯著 白嶽 曹殿祚長亂父訂正  
西陵 汪 淇僑子錄釋 天都 查 望于周父參閱

虛勞

○論婦虛勞與男子不同

補中益氣是治勞倦內傷之劑乃初治之劑非久病虛勞之劑也  
潮熱盜汗咳嗽諸證出焉謂之虛勞又復失治而有皮聚毛落飲食不為朋膚骨體中熱經閉不行諸證出焉謂之癆瘵然熱至於傳尸之疾則自一種其源不起於勞飢其流或至於滅門余於雜病首冊則既條分而備列矣然男以精為主女以血為主其致病既殊其施治亦異故應別著方法而陳氏良方分勞瘵癆瘵血虛癆瘵癆瘵風勞冷勞熱勞客熱等門未免惑亂後人靡所適從今釐正如左醫者更參雜病虛勞傳尸勞二門而用之則無遺少之患矣

論初病大法

保命集云治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥杜丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後是治有熱虛勞也

戴氏曰有病後血虛者有本血虛者其入往來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈交生諸疾焉歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯即香附末

香附末

○論無熱虛勞

陽虛虛勞乃陽虛其病自上下而漸之脈也法宜溫補惟東垣元氣立論先生獨得其旨薛氏曰前證有內外真寒有內外真熱有內外假寒有內外假熱而外假熱者若飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食畏寒手足逆冷而黃嘔吐畏見風寒此內外真寒之證也宜用附子理中湯以同陽八味地黃丸以壯火若飲食如常大便堅實胸腹痞脹飲食喜冷手足煩熱面赤嘔吐不畏風寒此內外真熱之證也宜用黃連解毒湯以消陽六味丸以壯水若飲食如常大便堅實胸腹痞脹飲食喜寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒而外假熱也亦用解毒湯六味丸若飲食少思大便不實吞酸噯氣胸腹痞滿手足逆冷而赤嘔吐畏見風寒此內真寒而外假熱也亦用附子理中湯與八味丸當求其屬而治之經曰益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光使不知真水火之不足泛以寒熱藥治之則舊疾未去新病復生矣夫所謂屬者猶主也謂心腎也求其屬也者言水火不足而求之於心腎也火之源者陽氣之根即心是也水之主者陰氣之根即腎是也非謂火為心源為肝木為腎主為肺也

濟陰綱目

一婦食少作嘔口吐痰涎面黃腹痛月經不調手足逆冷此內外俱寒之證以六君加香附木香治之而瘳

一婦忽嘔吐酸水內熱作渴飲食不進惟喜冷水面色青赤投之以

以內外俱寒而不用附子經中何也

黃連黃芩大黃... 以藥入口即吐... 婦人熱作渴... 一婦初患瘧熱... 甲辰木旺痰盛... 壯火生土之劑... 背冷覺風透體... 之證也遂以大... 藥如減而病... 卷四 虛勞 三 天... 虛勞治其嫂年三十餘十八胎九殞八夭... 四十餘日或時少... 下部疾愈甚或... 證也急以鹽煮... 之屬水煎入井... 何謂也曰方書... 從之下乃真冷... 金丹錯綜以三... 以上論及治驗... 爾不可不察也

論有熱虛勞... 大寒而甚熱之... 無火也當治其... 忽往來時動時... 卷四 虛勞 四 天... 腎虛則寒動於... 物參朮肝脾鬱... 血虛加味逍遙... 丹肺經氣虛人... 氣分用清心蓮... 丹皮熱從左邊... 黃耆熱從臍下... 麥門冬肉桂如... 脚心起此無根... 味主之 一婦經行不調... 飲食少思日脯... 此肝脾氣血俱... 用十全大

補加山藥、山藥、牡丹皮、麥門、五味而漸次年秋寒熱如瘧仍用前藥而漸一婦生育多胎經月不調兩足發熱年餘其身亦熱勞則足痠痛又年許唇腫裂痛又半年唇裂見血形體瘦倦飲食無味月水不行此氣血俱衰之證彼誤用通經丸等藥復傷氣血遂致不起

○論察胃熱

準繩云五勞七傷諸證治已見雜病虛勞門茲不贅敘婦人致此多因經行胎產或飲食起居七情重傷肝脾之所致又或失於調攝或過於攻伐而成與男子治法稍有不同故彙集古藥方專治婦人者於此若欲究其源流更當稽之彼籍

○論血風勞

其病不一此病皆由脾胃虧損所致其形軀瘦腹脹微瀉無力傳於腎則盜汗不止腰膝冷痛變鬼交侵小便赤黃傳於心則心神忪悸喜怒不時煩唇赤色乍熱乍寒傳於肺則胸膈短氣咳嗽吐痰皮膚甲錯傳於肝則兩目昏暗腸下妨痛閉戶忿怒五臟既病則難治療

○論血風勞

肝熱生風故病名血風曰勞者病久血虛月候不行而體熱不止也此是肝腎之陰不足故也玉原主治

向乎或經水不通故謂之血勞氣也

薛氏曰東垣云喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故因熱懶言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐存養其氣以甘寒瀉其熱氣以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之要略云平人脈大為勞以黃耆建中湯治之

一婦人勞則足跟熱痛此足三陰血虛用聖愈湯而痊後遍身瘡癢誤服風藥發熱抽搐肝脈洪數此肝家血虛火盛而生風以天黃膽星為丸用四物麥門五味參連炙甘草山梔柴胡煎送而

○治虛勞平補諸方

增損四物湯 治婦人氣血不足四肢怠惰乏力少氣兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱

當歸 川芎 白芍藥 人參 乾薑 炮甘草 等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓熱服  
六神湯 治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不嗜飲食服之補養其氣進美飲食充澤肌膚  
當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 黃耆 地骨皮 各等分

右為經末每服五錢水煎空心溫服  
聖愈湯 治血虛心煩睡臥不安或五心煩熱  
黃耆 當歸 酒洗各 人參 川芎 熟地黃 酒洗  
生地黃 酒洗各 五分  
右水煎服  
加減大建中湯 治婦人胎前產後一切虛損月水不調膈腹疴  
痛往來寒熱自汗口乾煩渴  
芍藥 二兩 當歸 川芎 黃耆 肉桂 各一 白木  
甘草 錢五分  
右為末每服二錢加薑棗水煎服食前  
當歸建中湯 治婦人一切血氣不足虛損羸乏  
當歸 四兩 白芍藥 六兩 肉桂 去皮 甘草 各二兩  
右咬咀每服三錢加生薑三片棗三枚水煎空心服此方以歸  
無著木難調藥和中氣在血分是  
榮加配合之妙則知古人之心  
變和散 治一切大病之後虛勞乏力補血益氣  
黃耆 熟地黃 當歸 川芎 白芍藥 各一錢  
肉桂 甘草 各五分  
右咬咀每服四錢加生薑三片棗二枚水煎服  
補中益氣湯 治形神勞倦或飲食失節以致脾胃虛損清氣下  
陷發熱頭痛四肢倦怠心煩肌瘦目漸羸弱  
黃耆 人參 各一錢 白木 錢一 甘草 錢五 當歸 陳皮 各七  
升麻 柴胡 各三

右作一服水煎食遠熱服  
八珍湯 治脾胃虛損氣血俱傷垂入之生以脾胃為主脾胃一  
虛諸臟失所百病生焉  
即四君子合四物湯加薑棗煎服  
歸脾湯 治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血  
行或健忘怔忡驚悸或心脾傷痛意懶嗜臥飲食不思  
方見血崩門 勞傷  
黃耆散 治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此因失血榮衛損也  
黃耆 防風 當歸 白芍藥 熟地黃 各七錢  
甘草 錢半  
右每服五錢薑三片棗一枚水煎食前溫服  
濟陰綱目 卷四 婦人 天機  
桔梗引子 治心不足解勞倦益血  
黃耆 人參 麥門冬 心 桔梗 甘草 各二兩 青皮 半  
右為末每服三錢水一盞煎七分溫服此方以養心氣也  
門者所以通心而清火桔梗能引諸藥以上焦之  
氣而利膈氣以制諸藥之毒所謂血生於氣  
切勞散 治心時俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過即冷時  
有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜臥恍惚神氣不安睡  
多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿失治便成  
癰癆之疾  
白芍藥 六錢 黃耆 四兩 人參 去 白茯苓 半 真 湯 地  
甘草 當歸 酒洗 五味子 阿膠 熟地黃 各二兩  
右咬咀每服三錢生薑七片棗三枚水煎溫服日三



補肺湯 治勞嗽五服虧損肺熱發熱盜汗自汗咳嗽喘急  
 人參 黃芪 柴芩 五味子 熟地黃  
 桑白皮 炒各  
 右剉水煎入蜜少許食後服  
 補中丸 治婦人虛損諸疾  
 白朮 熟地黃 各一當歸 白芍藥 炒 川芎  
 黃耆 人參 陳皮 各半  
 右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五七十丸溫水下  
 人參丸 養陰生血補虛  
 人參 白朮 鹿角膠 當歸 芍藥 川芎  
 熟地黃 各等  
 濟陰綱目 卷四 補勞  
 右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心米飲下  
 七補丸 治婦人氣血虛弱衝任不和腹中經結狀若懷孕月候  
 尚來未分經脈宜服此方  
 當歸 川芎 芍藥 各三熟地黃 白朮 白芷  
 阿膠 炒各  
 右爲細末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心米飲下  
 十補丸 治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸瘦面黃背倦口苦  
 舌乾心忪多汗血衰氣盛寒熱往來一切血崩帶下墮胎落孕  
 此藥皆治孕婦服之尤有神效  
 熟地黃 淨洗酒浸蒸過 肉苁蓉 酒浸 人參 黃耆 去蘆  
 當歸 酒浸 川芎 白芍藥 白茯苓 白朮 各一兩

滋陰百補丸 治婦人勞傷氣血諸虛百損五勞七傷陰陽不和  
 生寒乍熱心腹疼痛不思飲食庭廡乏力  
 香附 剉用酒醋鹽湯煮 益母草 半 當歸 酒洗 六兩 川芎  
 熟地黃 炒 白朮 各四 白芍藥 炒 三 玄胡索 炒 人參  
 白茯苓 各二 甘草 兩  
 右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五六十丸砂仁湯或酒或醋  
 湯白滾水任下空心服  
 羊乳丸 治虛勞羸瘦  
 濟陰綱目 卷四 補勞  
 黃耆 蜜 地黃 酒洗 秦芩 山茱萸肉 柴胡 地骨皮 等  
 右爲末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸煎人參湯下不拘時候  
 日進三服  
 六味丸 一名地黃丸 治腎經不足發熱作渴小便淋瀝氣壅痰  
 嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰腿痠軟自汗盜  
 汗便血諸虛失音水泛爲疾血虛發熱等證其功不能盡述  
 熟地黃 八兩 山茱萸肉 乾山藥 各四 牡丹皮 白茯苓  
 澤瀉 各三  
 右各另爲末和地黃膏加煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空  
 心食前滾湯下  
 八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛弱飲食少思大便

此方原名附子  
此方不惟理  
氣補虛而且  
善調經種子  
然有甘辛而  
又以藥為丸  
者為以有附  
旋母為君故  
無傷于甘  
而綠地黃  
此方以黃  
補上焦元氣  
而配地黃  
之苦寒是補  
氣不補火以  
熱地補下焦  
之不足而配  
山藥之溫滋  
是補水而又  
生肝氣補散  
補少氣養  
花利一身之  
機方以羊乳  
名者以養滋  
有羊乳之功  
也下元之  
此方原名附

不實腹痛夜多瀉等證即六味丸加肉桂附子各一兩  
益陰腎氣丸 治諸臟虧損發熱肺熱潮熱盜汗或寒熱往來五  
心煩熱或口乾作渴月經不調或筋骨痠倦飲食少思或頭目  
不清痰氣上壅咳嗽肺其胸膈痞悶或小便赤數兩足熱痛或  
脚足痿軟肢體作痛等證此壯水之主以制陽光之劑  
熟地黃八兩 山藥各四兩  
白茯苓二兩 牡丹皮二兩 澤瀉各三兩 當歸  
五味子炒各二兩 生地黃酒浸  
右為末入二荷加煉蜜丸如桐子大每服五十九空  
心淡鹽湯下  
烏雞煎丸 治婦人百病血氣虛勞赤白帶下等證  
黃耆當歸各六兩 香附子四兩 白茯苓三兩 人參官桂  
熟地黃生地黃 地骨皮各二兩  
右為烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末和煖雞丸  
雞頭實大喂雞眼生肢形死去腸肚及毛洗淨槌碎骨前藥  
並納雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙乾並研為末用汁  
打糊丸如桐子大每服五十九空鹽湯下  
人參煎丸 治婦人一切虛損肌肉瘦瘠盜汗心忪咳嗽上氣  
經脈不調或作寒熱不思飲食  
人參當歸 赤芍藥 杏仁湯浸去皮炒甘草  
桔梗去 柴胡各一兩 地骨皮 宣黃連 胡黃連各一兩  
肉桂去粗 木香各半兩 麝香另研 附子一枚重二兩  
此方原名附子

氣先為以醫  
中有生也  
腎為火命門  
同之命門  
氣通而不  
宜泄故曰  
微以受五  
臟六腑之  
而救之也  
方以地黃  
野陰以山  
山藥以滋  
滋補四陰  
氣降而歸  
而丹皮以  
陰中伏火  
去而氣生  
長所以四  
皆有藥而  
生不旁也  
日醫氣血無  
謂子若氣  
者又溫生  
于陰之中  
補火生土  
故下元虛  
廣補滋陰  
宜之六味  
按附子生  
自仲景主  
制氣補元  
名之今加  
陰二字乃  
蛇足也豈  
方之有者  
五味補氣  
氣生津地  
尚可京血  
火或少佐  
無益近理而

右為細末用青蒿一觔研爛絞汁童子小便五升酒五升同熬  
至二升次入真酥三兩白砂蜜三兩再熬成膏冷方下藥末  
搜和令勻丸如桐子大每服五十九空溫酒送下無時  
艾煎丸 治婦人諸虛  
杜艾葉 大當歸各三兩 香附子四兩  
右醋煮半日焙乾為末再用醋煮糊丸艾醋湯下  
黃耆丸 補虛敗  
黃耆四兩 熟地黃二兩 北五味二兩  
右為末糯米糊丸空心鹽酒下  
○治無熱虛勞  
附子理中湯 治真陽不足飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食  
畏寒手足逆冷  
白朮 人參 乾薑 甘草 附子炮去皮臍  
右到每服四錢加生薑十片水煎服  
黃耆建中湯 治男子婦人諸虛不足羸乏少力此藥大生氣血  
補益榮衛  
黃耆三兩 白芍藥四兩 肉桂一錢 甘草二錢  
右咬咀作一服加薑棗水煎食前服  
加味黃耆湯 治陽虛惡寒  
黃耆二錢 人參 白朮 甘草各一錢 肉桂五分  
右到水煎服○其若加附子  
十全大補湯 治婦人冷勞最妙

方見經閉血枯條  
 石為細末用砂膏為丸如桐子大空心溫酒下  
 身碎痛引子治婦人勞倦  
 虎骨錢五 防風 葉本 白芷 茯苓 甘草  
 白木 當歸 芍藥炒 續斷 附子錢二  
 右為龍末雞卵煎服不拘時  
 水香丸 治婦人冷勞經脈不調臍腹氣滯四肢疼痛飲食無味  
 漸加煎服  
 木香 琥珀 吳茱萸 炮當歸 牡丹皮  
 赤芍藥 三稜 附子炮 延胡索 川芎各七  
 乾薑 人參 桂心 北柴胡 白木  
 驚甲 附子 熟地黃 陳橘皮各一  
 右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心溫酒下  
 戊巳丸 治新婚男子女人素稟虛寒滑泄飲食無味肌肉不生  
 多睡少寐終日昏蒙夜多異夢畏寒喜熱嘔吐清水狀如  
 翻胃此藥養脾開胃滋血氣長肌肉添精益髓補煖丹田  
 茴香 白茯苓 香附子 炒各三兩 胡椒 人參  
 甘草 炙各一兩 白木 硃砂半兩  
 右為細末生薑汁打糊丸如桐子大每服三三十九丸空心食前  
 白湯下日三服  
 砂丸 治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢麻痺不食  
 驚甲 附子 桃仁 去皮尖 木香 五靈脂 炒當歸 各一  
 硃砂 二兩 醋一  
 硃砂 升熟成膏

石為細末用砂膏為丸如桐子大空心溫酒下  
 治有熱虛勞  
 遺精散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪煩赤  
 口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹  
 痛寒熱如瘧又主室女血弱陰虛榮衛不和痰瘦潮熱肢體麻  
 痺漸成骨蒸  
 當歸酒 白芍藥酒 白木 白茯苓 柴胡 各一  
 甘草 炙五分 一方  
 右到散水一盞半生薑三片麥門冬二十粒去心煎七分不拘  
 時服○一方用薄荷少許無門冬  
 熱甚加牡丹皮梔子炒  
 骨蒸加知母地骨皮  
 咳嗽加五味子紫苑  
 吐痰加半夏貝母瓜蒌仁  
 飲食不消加山查神麴  
 發渴加麥門冬天花粉  
 胸中作熱加黃連梔子  
 心慌加遠志酸枣仁  
 吐血加阿膠生地黃牡丹皮  
 自汗加黃耆酸棗仁  
 久瀉加炒黑乾薑



熱一關表一  
黃芩各七錢半 赤芍藥 木香 麝香細研各半兩  
右為龍末每服四錢以水一中盞入生薑一錢三分桃柳心各七莖煎至六分去滓不拘時溫服  
亦可以  
較前方少四厘角散 治婦人熱勞心煩熱不思飲食四肢多疼經脈凝滯  
犀角屑 黃芩 甘草各半兩 赤芍藥 虎杖  
茯苓 地骨皮 麥門冬去心枳殼微炒當歸各七錢半  
柴胡 紅藍花 鱉甲醋炙黃去裙各一兩  
右為龍末每服三錢以水一中盞入生薑半份煎至六分去滓溫服無時  
紅藍花散 治婦人熱勞四肢羸瘦經脈不通  
柴胡一兩 紅藍花 當歸 生地黃 赤芍藥  
犀角屑 虎杖 大腹皮 麥門冬去心土瓜根  
地骨皮 枳殼經炒各半兩 甘草炙微赤半兩  
右為龍散每服四錢以水一中盞入生薑半份煎至六分去滓溫服無時  
鱉甲散 治婦人熱勞發渴壯熱四肢煩疼漸漸黃瘦心腹躁悶  
鱉甲醋炙黃去裙各一兩 麥門冬去心知母 川大黃微炒  
地骨皮 赤芍藥 黃芩 人參 黃芩  
桑白皮各七錢半 甘草炙微赤半兩  
右為龍散每服四錢以水一中盞入生薑半份煎至六分去滓溫服無時  
十粒煎至六分去滓溫服無時  
阿膠丸 治勞嗽出血咯血發熱肺熱口渴溢汗

如春氣可治  
阿膠丸 生地黃 卷柏葉 山藥炒 大補根  
五味子炒 雞蘇各一兩 杏仁炒 人參 防風  
麥門冬去心各半兩  
右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼麥門冬煎湯下  
豬肚丸 治婦人熱勞羸瘦  
北柴胡 赤茯苓 人參 黃芩各一兩 黃連三兩  
地骨皮 木香各半兩 桃仁去皮 鱉甲各一兩半  
右為細末用好豬肚一枚淨洗將藥末入豬肚內以線縫合蒸令爛熟於磁器內研如膏丸梧桐子大食前粥飲下三十九年食前再服  
○治骨蒸勞瘵  
清陰綱目 卷四 勞方  
加味四物湯 治婦人骨蒸  
當歸 白芍藥炒 川芎 生地黃 地骨皮  
牡丹皮各等分  
右咬咀每服六錢水煎服  
一方加白朮  
黃連散 治婦人骨蒸勞熱四肢昏沉背膊疼痛面色萎黃漸漸無力  
黃連 知母各一兩 鱉甲醋炙二兩 柴胡 木通各一兩半  
麥門冬去心 白朮 地骨皮 黃芩 犀角屑各七錢半  
龍膽草去心 甘草炙微赤各半兩  
右為龍散每服四錢以水一中盞生薑一錢淡竹葉二七片煎

至六分去滓溫服無時

青蒿散 治婦人骨蒸勞熱四肢煩疼。日漸羸瘦。  
胡赤芍地骨  
 青蒿 黃芩 柴胡 黃連 黃蘗

桑白皮 白朮 各一 桐子仁 知母 各七 地骨皮  
甘草 各一 龍膽草 二錢

右為燒散每服四錢以水一中盞入生薑二錢五分煎至六分去滓溫服

柴胡散 治婦人骨蒸勞熱咳嗽胸膈脹滿妨悶不欲飲食  
以地骨汁  
 柴胡 桑白皮 麥門冬 赤茯苓 各一 川大黃 各一  
枳殼 去核 百合 秦艽 紫苑 黃芩 赤芍藥 知母 木通 各七 半夏 易洗 七 甘草 炙 各一 附子 二兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑二錢五分煎至六分去滓溫服無時

河車丸 治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸等疾  
紫河車 一枚 初生男胎者尤良 長流水中洗淨 揀參 白茯苓 各一 乾山藥 二兩

右為細末入河車汁加麵糊為丸如桐子大以少麥芽湯煮每服三五丸米飲溫酒鹽湯任下空心服嗽甚者五味子湯下

黃蘗丸 治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦口乾心燥不得眠臥  
黃蘗 麥門冬 各一 茯苓 各一 北柴胡 生地黃 甘草 各一 酸棗仁 炒 郁李仁 枸杞子 杏仁 各一

人參 黃蘗 各一 百合 枳殼 各一 赤芍藥 各一  
知母 秦艽 各一 柴胡 各一 黃連 各一 黃芩 各一 桑白皮 各一 白朮 各一 桐子仁 各一 地骨皮 各一 甘草 各一 龍膽草 各一 附子 各一

右為細末煉蜜丸桐子大清粥吞下三十丸無時

地黃煎丸 解勞生肌進食活血養心  
生地黄汁 杏仁汁 生薑汁 藕汁 各五 薄荷汁 各一 法酒 二 沙蜜 升

右共合一處慢火熬成膏入後藥

北柴胡 兩三 人參 茯苓 相子仁 各一  
山藥 遠志肉 枳實 各一 白朮 各一 秦艽 各一 苦梗 各二 麝香 半兩 熟地黃 洗焙 四兩

右為細末以前膏和丸如桐子大食後甘草湯下二十丸

濟陰綱目 卷四 虛勞方

○治傳尸勞  
 天靈蓋散 治婦人傳尸骨蒸勞四肢無力每至晚間即熱兩頰紅色飲食不下心神煩躁  
天靈蓋 炙 安息香 地骨皮 當歸 人參 各一 山梔子仁 貝母 各一 黃連 桃仁 各一 黃柏 各一 生乾地黃 各一 北柴胡 赤茯苓 麥門冬 各一 阿魏 半兩

右為細末每服四錢以童子小便一大盞桃柳枝各七寸生薑五片葱白五寸煎至七分去滓溫服

益母草丸 治婦人骨蒸勞瘦月候不通心神煩熱四肢疼痛不能飲食  
益母草 各一 甘草 各一 酸棗仁 炒 郁李仁 枸杞子 杏仁 各一

益母草 青蒿各二桃枝 柳枝各一人  
已上四味剉細用童子小便一斗於銀鍋內煎至三升絞去滓煎成膏

柴胡 赤芍藥 犀角屑 各一 驚甲 製三 桃仁 製半  
天靈蓋 微黃 硃砂 細研水 木香 甘草 各二兩 麝香 細研  
右爲末用前膏和搗五七百杵丸如桐子大每服三十丸煎烏梅甘草湯下無時

額肝丸 治婦人骨蒸勞熱體瘦煩燥不欲飲食  
額肝一 驚甲 醋 北柴胡 各一 川升麻 桃仁 製  
天靈蓋 犀角屑 梔子仁 地骨皮 知母 各一  
黃耆 七錢 甘草 半兩 麝香 半兩 硃砂 一兩 細研水飛

濟陰綱目 卷四 婦人勞熱方  
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫水下無時

殺鬼方 治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連  
麝香 七錢 犀角屑 木香 白朮 鬼箭羽 各一  
虎頭骨 酥炙 天靈蓋 醋炙 雄黃 研 桃仁 去皮尖 麝砂 各一兩半 研

右爲細末入研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服二十丸溫水下此藥辟溫疫亦可帶

○治血風勞  
人參 荆芥散 治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目眩心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽  
人參 荆芥穗 生地黃 北柴胡 驚甲 各一

酸棗仁 炒 枳殼 梨 羚羊角 白朮 各一兩 當歸 各一兩  
川芎 防風 桂心 甘草 各半  
右爲末每服五錢生薑三片水煎熱服

地骨皮散 治婦人血風氣虛體弱寒熱發渴  
地骨皮 桑白皮 枳殼 前胡 黃耆 各一  
人參 白茯苓 白芍藥 五加皮 各一 柴胡 二錢 官桂 甘草 各半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

大效油煎散 治血風勞氣攻注四肢腰背疼痛嘔逆醋心不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻木痺血海冷敗神效  
五加皮 川烏炮 芍藥 梅桐皮 牡丹皮 各一兩

濟陰綱目 卷四 婦人勞熱方  
右爲細末每服二錢水一盞生麻油浸錢一文同煎至六分溫服常服以油浸二錢煎藥時不可攪吃藥時不可吹

治血風勞方  
荆芥穗 兩 白芍藥 牡丹皮 防風 地骨皮  
白芷 黑豆 甘草 各一 川芎 二錢  
右爲細末每服二錢水一中盞生薑三片煎一個葱白一寸煎至八分溫服無時

萬全道遙散 治血風勞五心煩躁心多怔忡恍惚憂懼頭目昏重夜多盜汗  
人參 黃耆 白朮 白茯苓 各一兩 柴胡 各一兩





然婦人經脈命絡合調則月水以時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通邪氣便得往來八合於臟若生血未盡而合陰陽即使婦人血脈變急小腹重急支滿胸脇腰背相引四肢痠痛飲食不調結牢惡血不除月水不時或月前月後因生積聚如懷胎狀邪氣甚盛者令人恍惚多夢寒熱四肢不欲動陰中生氣腫內生風甚者小便不利苦痛如淋狀面目黃黑歲月久即不復生子也。

黃瘦者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寢未定五臟皆虛虛虛精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名為陰虛則生黃瘦黃瘦之藥令人苦四肢寒熱身重淋露臥不欲食左脇下有氣結牢不可得拆若

黃瘦者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寢未定五臟皆虛虛虛精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名為陰虛則生黃瘦黃瘦之藥令人苦四肢寒熱身重淋露臥不欲食左脇下有氣結牢不可得拆若

黃瘦者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寢未定五臟皆虛虛虛精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名為陰虛則生黃瘦黃瘦之藥令人苦四肢寒熱身重淋露臥不欲食左脇下有氣結牢不可得拆若

黃瘦者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寢未定五臟皆虛虛虛精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名為陰虛則生黃瘦黃瘦之藥令人苦四肢寒熱身重淋露臥不欲食左脇下有氣結牢不可得拆若

舉重移輕汗出交流氣血未平而卒以悲怒致腹中悞咽不洩經脈變急內結不舒煩懣少力氣上達胸膈背脊少腹壅急月水與氣俱不通利而反以飲清快心月水橫流溢入他臟不去有熱則生燥瘕之聚大如半杯上下腹中苦痛連兩脇下上引心而煩害飲食欲嘔吐胸及腹中不得太息腰背重喜臥盜汗足癢削久立而痛小便失時忽然自出若失精月水閉塞大便難難病如此者其人少子療之以長鍼按而刺之法度行以毒藥瘕當下即愈

血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣溢入他臟若大饑寒吸吸不足呼吸未調而自勞動血下未定左右走腸胃之間留絡不去內有寒熱與月水合會為血瘕之聚令腰痛不可俯仰橫骨下有積氣牢如石小腹裏急苦痛瘕瘕瘕

血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣溢入他臟若大饑寒吸吸不足呼吸未調而自勞動血下未定左右走腸胃之間留絡不去內有寒熱與月水合會為血瘕之聚令腰痛不可俯仰橫骨下有積氣牢如石小腹裏急苦痛瘕瘕瘕

血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣溢入他臟若大饑寒吸吸不足呼吸未調而自勞動血下未定左右走腸胃之間留絡不去內有寒熱與月水合會為血瘕之聚令腰痛不可俯仰橫骨下有積氣牢如石小腹裏急苦痛瘕瘕瘕

血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣溢入他臟若大饑寒吸吸不足呼吸未調而自勞動血下未定左右走腸胃之間留絡不去內有寒熱與月水合會為血瘕之聚令腰痛不可俯仰橫骨下有積氣牢如石小腹裏急苦痛瘕瘕瘕

苦瘡寐氣絕。精神游亡。邪氣入於陰裏不去。則生狐瘻之聚。食入子臟。令人月水閉不通。少腹瘕瘕。胸膈腰背痛。陰中腫。小便難。胞門子戶不受男精。不藏氣。盛令人嗜食。欲嘔。喜唾。多所思。如有身狀。四肢不舉。本此病者。終身無子。其瘻有手足成形者。殺人。未成者可療。以長鍼急持刺之。行以毒藥。有法。瘻當下即愈。

蛇瘻者。婦人月水已下。新止。適閉未復。胞門子戶勞傷。陰陽未平。榮衛分行。若其中風。暴病。癰劣。飲食未調。若起行當風。及涉泥塗。因衝寒大早。若坐濕地。名陰陽亂。腹中虛。若遠行道路。飲汗井之水。食不潔之食。吞蛇風之精。留絡不去。因生蛇瘻之聚。上食心肝。長大其形。如漆在臍上下。還疔左右脇。不得吐氣。兩股脛間苦疼。少腹多熱。小便赤黃。膀胱引陰中。變急。腰目俱痛。難以動作。喜發。

濟陰綱目

卷五 瘕瘕瘻

四

宋德堂

寒熱。月水或多或少。有此病者。不復生子。其瘻手足成形者。殺人。未成者可治。療之有法。行以毒藥。瘻當下即愈。

蛇瘻者。婦人月水新至。其人劇作罷勞。汗出衣服潤濕。不以時去之。若當風睡。足踐濕地。恍惚覺悟。蹠立未安。顏色未平。復見所好。心為之開。魂魄感動。五內脫消。若入水浣洗沐浴。不以時出。而神不守水精。與邪氣俱入。至三焦之中。幕玉門先閉。津液妄行。留絡不去。因生瘻瘻之聚。大如小梓。令人小腹肉切痛。惡氣左右走上。下腹中苦痛。若存若亡。持之踵手。下引陰裏。腰背亦痛。不可以息。月水不通。面目黃黑。脫聲少氣。有此病者。令人絕子。其瘻有手足成形者。殺人。未成者可治。療有法。度以長針按瘻之行。以毒藥瘻當下即愈。

○論婦人瘕瘕

大全云。婦人瘕瘕。由飲食失節。脾胃虧損。邪正相搏。積於腹中。牢固不動。有可徵驗。故名曰瘕。氣道壅塞。故名曰瘕。得冷則發。冷入乎臟。則不孕。入胞。絡則月水不通。

薛氏之說可為病久虛者法

薛氏曰。前證若脾胃虛弱。用六君子加芎藭。若肝脾虛弱。用補中益氣。及歸脾湯。若肝火鬱滯。佐以蘆薈丸。六味丸。外貼阿魏膏。患者須慎七情六淫。飲食起居。治者不時審察病機。而藥之。庶幾有效。

○論食瘕

大全云。婦人食瘕。臟腑虛弱。月候來時。食生冷之物。脾胃既虛。不能消化。與臟氣相搏。結聚成塊。日漸生長。盤牢不移。故謂之食瘕。

濟陰綱目

卷五 瘕瘕瘻

五

宋德堂

薛氏曰。前證若形氣弱。須先調補脾胃為主。而佐以消導。若形氣克實。當先疏導為主。而佐以補脾胃。若氣壅血滯。而不行者。宜用

烏藥散。散而行之。散用烏藥。莪朮。香附。木香。各等分。為末。每二錢。熱酒送下。

脾氣虛。而血不行者。宜用四君。若歸脾補而行之。若脾氣鬱。血不行

者。宜用歸脾湯解而行之。若肝脾血燥。而不行者。宜用加味逍遙

散清而行之。大抵食積瘕塊之證。為有形。蓋邪氣勝則實。真氣奪

則虛。當養正。開邪而積自除矣。雖然。堅者削之。客者除之。胃氣未

虛。或可宜用。若病久虛弱者。不可輕試也。

○論血瘕

大全云。婦人寒熱失節。臟腑氣虛。風冷在內。飲食不消。與血氣相

右以左畔為  
血癰者凡肝  
之部皆可為  
血病

此說甚佳

結漸生癰塊盤牢不移動者是也。皆因血氣勞傷。月水往來經終  
結塞惡血不除。結聚所生。久而不瘥。則心腹兩脇苦痛。害於飲食  
肌膚羸瘦。

問瘥一也。何以知是血癰。曰。血外之証。皆悶煩燥。迷忘驚狂。痰嘔  
汗多。骨熱肢冷。其畜在下焦者。必臍下結。急外熱內痛。尺脈洪而  
數也。桃仁靈脂生地黃牛膝大黃甘草祛逐之。

薛氏曰。前証多兼七情虧損。五臟氣血乖違。而致。蓋氣主壅之血  
主滯之脾。統血肝藏血。故鬱結傷脾。悲怒傷肝。者多患之。腹脇作  
痛。正屬肝脾二經証也。潔古曰。養正積自除。東垣云。人以胃氣為  
主。治法當主於固元氣。而佐以攻伐之劑。必帶之歲月。若期速效  
投以峻劑。反致有誤。

濟陰綱目 卷五 癰疽

○論腹中瘕血

大全云。婦人月經否塞不通。或產後餘穢未盡。因而乘風取涼。為  
風冷所乘。血得冷則成瘕。血也。血瘕在內。則時時體熱。面黃。瘕久  
不消。則為積聚瘕瘕矣。

薛氏曰。前証若鬱結傷脾。用加味歸脾湯。若悲怒傷肝。用加味逍  
遙散。若產後惡露用失笑散。若肝脾虛損。用六君子。柴胡以補元  
氣。為主。胃氣虛弱。用補中益氣湯。加茯苓半夏。為主。大凡腹中作  
痛。畏手按者。此內有瘕。血若形體如常。屬病氣。元氣俱實。用桃仁  
承氣湯直下之。若痛而肢體倦怠。飲食少思。此脾胃受傷。屬病氣。  
有餘元氣不足。用當歸散調和之。若痛而喜手按腹。形體倦怠。飲  
食少思。此形氣病氣俱不足。用六君炮薑芍歸純補之。若痛而大

此瘕血之証  
之見俱攻劑  
之藥不得其  
發反致傷氣  
以致不效故  
不如善守之  
為要

便不實。飲食難化。此脾胃虛寒。用六君炮薑肉果溫之。若痛而  
作嘔。少食。此脾胃虛弱。用六君炮薑香。若痛而嘔吐。不食泄瀉。  
用六君薑桂。若兼手足逆冷。自汗。更加附子。此証多有因攻伐而  
致者。

○論瘕瘕

大全云。瘕者在腹內近臍左右。各有一條筋脈急痛。大者如臂。次  
者如指。因氣而成。如弦之狀。名曰瘕也。瘕者為僻。側在兩肋之間。  
有時而痛。故曰瘕也。二者皆陰陽不和。經絡痞隔。飲食停滯。不得  
宣流。邪冷之氣。搏結不散。得冷則發。作疼痛。○夫瘕瘕瘕瘕血氣  
塊硬。發作則痛。甚則欲死。死而復生。言之皆血之所為。僕嘗治一婦人。  
血氣刺痛。極不可忍。甚而死一二日方省。醫巫併治數年不愈。僕  
以葱白散烏雞丸遂安。又嘗治一婦人。血氣作瘕。如一小盤。橫走  
注刺痛。要一人扶定。方少止。亦用此二藥而愈。尋常小小血氣用  
此二藥。亦有奇效。故錄於後。

○論瘕瘕

大全云。婦人瘕瘕。由飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。風  
冷入腹。與血相結。所生。痛者。痛也。瘕者。假也。結聚浮假而痛。推移  
乃動也。婦人之病。有異於丈夫者。或因產後血虛受寒。或因經水  
往來。取冷過度。非獨因飲食失節。多挾瘀血。氣所成也。其脈弦急。  
者。生虛弱。小者。死。尺脈滿而浮。半為血實。氣虛。其發腹痛。逆氣上  
行。此為胞中有惡血。久則結成血瘕也。

薛氏曰。子和云。遺溺閉癃。陰痿浮腫。精滑白淫。皆男子之病也。若

男子亦有此

血濁月事不行。行後小腹有塊。或時動移。前陰突出。後陰痔核。皆女子之疝也。但女子不謂之疝。而謂之瘕。

一婦人小腹痞脹。小便時下白帶。小水淋瀝。此肝經濕熱。下注用龍膽瀉肝湯而愈。

一婦人小腹脹痛。小水不利。或胸乳作痛。或脇肋作脹。或氣逆心吻。余以為肝火而血傷。脾用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈。

一婦人小腹痞悶。小便不利。內熱體倦。懶食。用八珍湯加柴胡山梔龍膽草治之而安。

論腸覃

李氏曰。腸覃乃寒氣客於大腸。與胃相搏。大腸為肺傳送。肺主氣。氣得熱則行。得冷則凝。凝則清氣散。而濁氣結為瘕。覃延日久不消。降編目。卷五。瘕瘕。天德堂。

已患肉乃生。始如雞卵。久如懷胎。按之堅。推之移。月事時下。或多或少。氣病而血未病也。宜二陳湯加香附以開之。或香粉丸。

論婦人瘕瘕並屬血病

華繩云。古方有五積六聚七瘕八瘕之名。五臟之氣積。名曰積。故積有五。六府之氣聚。名曰聚。故聚有六。雜病準繩。言之詳矣。若夫七瘕八瘕。則婦人居多。七者火數。屬心。蓋血生於心。八者木數。屬肝。蓋血歸於肝。雖曰強分。理似不混。夫瘕者堅也。堅則難破。瘕者假也。假物成形。古人將婦人病為瘕疾。以蛟龍等為生瘕。然亦不必如此執泥。婦人瘕瘕並屬血病。龍蛇魚鱉肉髮蟲等事。皆出病此百病所。以特生于氣。中僧病瘕者。腹中有一物。其狀如魚。即生瘕也。與夫宿血停凝。結

為瘕現。雖內所感之不同。治法當以類相從。所謂醫者意也。如以

論治積須養正氣

薛新甫云。婦人瘕瘕瘕。大抵因飲食起居七情失宜。虧損臟腑。氣血乖違。陰絡受傷。循行失度所致。

羅謙甫云。養正積自除。必先調養。使榮衛充實。若不消散。方可議下。但除之不以漸。則必有顛覆之害。若不守禁忌。縱情嗜慾。其有不喪者鮮矣。

論瘕瘕

一婦人內熱作渴。飲食少思。腹內初如雞卵。漸大四寸許。經水三月一至。肢體消瘦。齒頰似蒼。脈洪數而虛。左關尤甚。此肝脾鬱結。滯陰編目。卷五。瘕瘕。天德堂。

之証。外貼阿魏膏。午前用補中益氣湯。午後用加味歸脾湯。兩月許。肝火稍退。脾土少健。午前補中益氣。下午味丸。午後逍遙散。下歸脾丸。又月餘。日用蘆薈丸二服。空心以逍遙散下。日哺以歸脾湯下。喜其謹疾。調理年餘而愈。

論婦人瘕瘕

一婦人腹內一塊。不時上攻。或作痛有聲。或吞酸痞悶。月經不調。小便不利。二年餘矣。面色青黃。余以為肝脾氣滯。以六君加芎歸。柴胡炒連木香吳茱萸各少許二劑。却與歸脾湯送下。蘆薈丸三月。餘肝脾和而諸証退。又與調中益氣湯加茯苓牡丹皮。中氣健而經自調。一婦人姓多。鬱善怒。勤於女工。小腹內結一塊。或作痛。或痞悶。月經不調。倍服伐肝之劑。內熱寒熱。胸膈不利。飲食不甘。形體日瘠。

牙眼蝕爛此脾土不能生肺金肺金不能生腎水腎水不能生肝木當滋化源用補中益氣湯六味丸至仲春而愈

一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽余曰脾為諸陰之首目為血脈之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸於目也遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主脾胃年餘而愈

松江太守何恭人性善怒腹結一塊年餘上齧蝕透血氣虛極時季冬肝脈洪數按之弦緊或用伐肝木清胃火之藥余曰真氣虛而邪氣實也恐伐肝木至春不能發生耳用八珍湯以生氣血用地黃丸以滋腎水肝脈頓退因大怒耳內出血肝脈仍大煩熱作渴此無根之火也仍以藥加肉桂二劑脈欬熱退復因大怒果

清陰編印 卷五 續前卷正心 十 方德堂

卒於季冬辛巳日乃金冠木故也

李氏曰善治癥瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰衰其大半而止不可猛攻峻施以傷元氣寧扶脾胃正氣待其自化此開鬱正元散之由名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交如地黃丸調之凡攻癥之藥病重病受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

○論痰積用吐下

子和云載人過謙遇一卒說出妻事載人問其故答曰吾婦為室女時心下有冷積如覆杯按之如水聲以熱手熨之如冰妻來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之載人曰公勿熱也如用我藥病可除孕可得卒從之載人診其脈沉而遲尺脈洪大而有方非無子可傳

之候也可不踰年而孕其良入笑曰試之先以三聖散吐涎一斗

心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而娠二子載人嘗曰用吾此法無不子之婦此言不誣至聖散用防風瓜蒂各三兩蒙蘆一兩為粗末以薑汁煎服製法詳見儒門事親○白朮調中湯凡白朮茯苓澤瀉黃連各半兩甘草一兩乾薑官桂砂仁藿香各二錢半為末白湯化蜜調服二錢無時

陽夏張主簿之妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五餘年後因性急悲感病益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不能坐臥針灸罔效從勞人耳乃邀載人診之曰此肥氣也得之季夏戊巳日在肝腸下如覆杯久不瘳令人發癆瘵瓜蒂散吐之魚腥黃連約一二錢至夜繼用舟車丸通經散投之五更黃連臘水相半五六行

更有積處皆瘳痛後用白朮散當歸散和血流經之藥如斯湯泄

清陰編印 卷五 續前卷正心 十一 方德堂

凡三次瘳瓜蒂散舟車丸方見難病傷食痰飲三門○通經散用過去麝香乾三味各等分為細末每服三錢酒溫飲酒調下○當歸散當歸杜蘅等分為末米飲調服二錢水煎食前服○此吐下兼施且甘遂等逐水太峻用者審之

○脈法

脈經曰婦人疝瘕積聚脈弦急者生虛弱者死○少陰脈浮而緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡寒絕產

○通治諸積

開鬱正元散 治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚脹痛宜此利氣行血和脾消滯

白朮 陳皮 青皮 香附 山查 海粉 桔梗 茯苓 砂仁 荳蔻 神曲 麥芽 甘草 各等分

<p>此惟病氣 氣俱在 用藥在 氣上下 生大者 忌之</p>	<p>此方劑 破氣難 白木爲 氣虛者 輕服</p>	<p>胃藥 可用</p>	<p>用藥巧 上在氣 血行血 也外在 用藥 之多</p>	<p>香枝丸 治一切積聚破癥瘕消癥塊</p>
<p>右判每服一兩生薑三片水煎服 大七氣湯 治積聚癥瘕隨氣上下心腹痞痛上氣壅塞小腹脹滿大小便不利 京三稜 蓬朮各煨 青皮 去白 陳皮 去白 香附 炒 藿香葉 益智仁 桔梗 肉桂 不見 甘草 炙七 右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服 助氣丸 治三焦痞閉胸膈滿悶氣不流通蘊結成積癥瘕氣塊並皆治之 京三稜 蓬朮 已上二味各用油紙包灰 青皮 去白 陳皮 去白 白朮 各十 枳殼 麸炒 檳榔 木香 各十 右爲末糊丸桐子大每服五十丸滾水下</p>	<p>濟陰綱目 卷五 痰厥用在下 勝紅丸 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積 女人脾血積小兒食積 京三稜 莪朮 二味同 青皮 陳皮 乾薑 炮 良薑 炒各 香附子 二兩 淨炒 右爲末醋糊丸如桐子大每服三十丸生薑湯下○虛者以補藥下之○一方加神曲麥芽</p>	<p>三稜煎 治婦人血瘕血癥食積痰滯 三稜 莪朮 各一 青皮 去白 半夏 湯炮 麥芽 炒各 右用好醋六升煮乾爲末醋糊丸如桐子大每服五十丸淡醋湯下○痰積壅滯湯下</p>	<p>香枝丸 治一切積聚破癥瘕消癥塊</p>	<p>香枝丸 治一切積聚破癥瘕消癥塊</p>

<p>此溫行之 較而不行 而中在 用藥</p>	<p>生有燥 熱藥行 堅之劑 方又以 補中 精消真 千金 方也用 者式</p>	<p>八種之山 自鹿門 子 取食飲 用此</p>	<p>皂莢散 療黃瘕瘕方 皂莢 兩各 蜀椒 一兩 細辛 兩</p>
<p>木香 丁香 各半 枳殼 炒 三稜 酒浸 莪朮 兩用巴豆 三十粒去殼同炒待巴豆黃色去巴豆不用 青皮 製 川椒子肉 覆香 等分 右爲末醋煮麴糊丸如桐子大朱砂爲衣每服三十丸薑鹽湯或溫酒下無時</p>	<p>大硝石丸 治七癆八瘕聚結痞塊及婦人帶下絕產腹中瘕瘕瘕者當先下此藥但去瘕瘕令人不困 硝石 三兩 大黃 四兩 人參 甘草 各一 右爲末以三年苦酒三升置銅石罍中先用大黃微火熬微沸常攪不息至七分內餘藥復熬成膏至可凝即如桐子大每服三十丸米飲下三日一服婦人服之或下或難肝或如米泔赤黑等物二三升後忌風冷</p>	<p>濟陰綱目 卷五 治諸積方 阿魏膏 治一切瘕瘕 羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 川山甲 生地黃 兩頭尖 大黃 白芷 天麻 各五 紅花 木鼈子 炒 去 槐柳桃枝 各三 亂髮 雞子大 右用香油二觔四兩煎黑去渣入髮煎髮化仍去渣徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處鋪平半指厚以紙蓋用熱熨斗熨其久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥 ○分治八瘕</p>	<p>皂莢散 療黃瘕瘕方 皂莢 兩各 蜀椒 一兩 細辛 兩</p>

右搗散以三角囊大如指長二寸貯之內陰中欲便則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

療青瘰癧方

戎鹽一升同皂莢半兩去皮子炙細辛一兩

右搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但臥瘰癧下青如葵汁養之如產法

療燥瘰癧方

大黃如雞子許乾薑各二兩黃連三兩桂心一兩厚朴四兩

郁李仁一兩去皮炙炒麝香三枚雞臍腔中黃蘗一枚

右搗散早朝空腹以溫酒一盞和三錢頓服瘰癧當下畢養之如產法三月勿合陰陽無子者當有

療陰綱目

卷五通治諸瘰癧方

十兩

天德堂

療血瘰癧攻刺腹脇時痛藥方

大黃當歸各半山茱萸皂莢去皮炙細辛戎鹽各二兩

右搗以香脂丸如指大每用一丸綿裹內陰中正坐良久瘰癧自下養如乳婦法

療婦人血瘰癧方

乾薑烏鰂魚骨各一兩桃仁一兩去皮炙

右搗散酒服二方寸七日二〇一方無桃仁

桃仁煎治婦人血瘰癧經候不通

桃仁大黃各半蠶蟲半兩朴硝另研

右為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大黃

蠶蟲桃仁不住手攪煎至可丸下朴硝攪勻出之乳如糖稠

蠶蟲桃仁不住手攪煎至可丸下朴硝攪勻出之乳如糖稠

太前一日不用喫晚飯五更初用溫酒吞下五丸日午取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆衣之狀未下再服如鮮血來即止續以調補氣血藥補之○本事方云項年在毗陵有一貴宦妻患小便不通臍腹脹不可忍眾醫皆作淋治以八正散之劑愈甚

診之曰此血瘰也非噴眩藥不可去用此藥更初服至日午大痛不可忍遂臥少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁一二升痛止得愈○此藥治病的切然猛烈氣虛血弱者不可輕用

療脂瘰癧方

皂莢七錢半礬石燒二錢半五味子蜀椒法詳

細辛乾薑各半

右搗散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰陽不三行其瘰癧即愈

療散方

皂莢炙去吳茱萸當歸各一兩蜀椒去汗乾薑

大黃戎鹽各二兩細辛炒礬石燒五味子各二兩

右搗篩為散以輕絹袋如指大長三寸盛藥令滿內陰中正臥隨意勿行走小便時去之則換新者

療狐瘰癧方

取新死鼠一枚裏以新絮塗以黃土穿地坎足沒鼠形置其中桑柴火灼其上一日一夜出之研為末肉桂心末二錢半酒服

療蛇瘰癧方

二方寸七病當下瘰者不過再服愈

療蛇瘰癧方

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

以上八形方 育本求道 諸實中 土銀不明	此方散結破 血行氣消飲 溫行利便 藥也	此方破結氣 散精血軟 溫利亦可備 用	猛峻之丸不 可妄試
<p>大黃 黃芩 芒硝 甘草</p> <p>烏賊魚骨 皂莢</p> <p>右搗以水六升煮之三數沸絞去滓下硝適寒溫服之十日一劑空腹服之瘕瘕下</p>	<p>瘕瘕方</p> <p>大黃一兩 乾薑 創子 附子 人參</p> <p>瘕瘕七寸 桂心 細辛 主祖 白朮</p> <p>右搗散以酒服方寸七日三</p> <p>○治瘕瘕</p>	<p>穿山甲散 治婦人瘕瘕及惡血氣攻心腹疼痛面無顏色四肢瘦弱</p> <p>穿山甲 乾甲 赤芍藥 大黃 乾漆</p> <p>桂心 川芎 芫花 當歸 麝香</p> <p>右為細末入麝和勻每服一錢熱酒調下無時</p>	<p>蓬莪茂丸 治婦人瘕瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲食</p> <p>莪茂 當歸 桂心 赤芍藥 橫櫚 昆布</p> <p>琥珀 枳殼 木香 桃仁 龜甲 大黃</p> <p>右為末煉蜜丸如桐子大食前米飲下二十九</p> <p>丁香丸 治婦人瘕瘕結塊不散心腹疼痛</p> <p>雄雀 龜甲 礞石 當歸</p> <p>芫花 巴豆 砂</p> <p>右為末研勻醋煮麵糊丸如小豆大當歸酒下三九</p>

此丹與先生 治瘕瘕方 治瘕瘕方 治瘕瘕方	中之火其 破氣消食 血氣散 行氣消食	行氣消食	行氣消食
<p>桃仁散 治婦人瘕瘕心腹脹滿不能飲食體瘦無力</p> <p>桃仁 訶子皮 白朮 赤芍藥</p> <p>當歸 陳皮 龜甲</p> <p>右為散每服二錢水一盞入生薑二錢三分煎至六分去滓食前稍熱服○右方皆攻積之藥性多偏悍用者慎之</p>	<p>○治食瘕</p> <p>化積丸 治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴嘔雜眩暈身熱時作時止</p> <p>黃連 蘆薈 香附 山楂</p> <p>川芎 山梔 三稜 枳殼 桃仁</p> <p>右為末蒸餅丸服</p>	<p>瘕瘕方</p> <p>小三稜煎丸 治食瘕酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及一切積滯不消心腹堅脹痰飲嘔噎酸脇肋刺痛脾氣橫泄</p> <p>三稜 莪朮 芫花</p> <p>右同人磁器中用米醋五升浸滿封器口以灰火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微焦同稜朮焙乾為末醋糊丸如菉豆大一服十五丸生薑湯下婦人血分男子脾氣橫泄脛滿如水桑白皮煎湯下</p>	<p>硝砂丸 治婦人食瘕久不消令人瘦弱食少</p> <p>硝砂 青礞石 穿山甲 三稜 乾漆</p> <p>硫黃 巴豆 砂</p> <p>右為末用軟飯丸如小豆大每服五丸生薑橘皮湯下</p>



礞石丸 治婦人食噎塊久不消攻刺心腹疼痛

青礞石 巴豆去皮 朱砂 粉霜 木香各二錢半

右研勻以糯米軟飯和丸如菜豆大每服二丸空心溫酒下取  
下惡物為度○右二方犯穢砂巴豆非胃氣強壯而積氣堅頑  
勢不兩立者不可輕用也

○治血癥

增味四物湯 治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地黄 三稜

廣茂 肉桂 乾漆炒烟盡

右為籠末每服五錢水煎服○余妻曾患小腹積塊每遇寒觸  
刺痛不可忍諸醫治莫效余用此一服立止

濟陰綱目 卷五 治血積

六合湯 治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 川芎 白芍藥 熟地黄酒洗 官桂 蓬朮煨切各

右咬咀每服四錢水煎空心服

血竭散 治婦人血癥作痛臍下脹滿月經不行發熱體倦

當歸八分 芍藥炒 桂心 血竭 蒲黃炒各六分 玄胡索炒四分

右為細末每服二錢空心酒調下

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走心腹疼痛

牡丹皮 當歸 玄胡索 桂心各一兩 赤芍藥 牛膝

莪朮各一兩 京三稜一兩

右為粗末每服三錢水酒各半蓋煎服

當歸丸 治婦人月經不調血積證

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黄 廣茂 京三稜各半

神麴炒 百草霜各二錢半

右為細末酒糊為丸如桐子大溫水下六七十九

大黃散 治婦人血癥血瘕食積痰滯

川大黃七錢半 隨甲醋炙黃去 牛膝去蘆乾漆一兩炒

右為末用米醋一升煎為膏每服一錢食前溫酒調下

大紅花丸 治婦人血積癥瘕經絡滯

川大黃 紅花各二兩 蘇蠶十個去

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五七丸食後

溫酒下目三服

○治腹中瘀血

濟陰綱目 卷五 治血積

桃奴散 治血癥及瘀血停積經水不通男子跌撲損傷皆効

桃奴炒 假蘇炒 玄胡索 肉桂 五靈脂

香附炒 砂仁 桃仁各等分

右為末每服三錢酒調服

大黃湯 治婦人血瘀不消及撲損血瘀

大黃生用 桃仁湯浸去皮尖 桂去粗 郁李仁去皮研

生薑 地黃各一兩

右粗搗篩每服三錢水酒各半蓋同煎至七分去滓溫服

琥珀散 治婦人經絡閉腹痛內瘀血痛不可忍

琥珀 乳香 沒藥各另研細

右每服二錢水酒各半蓋煎至七分入地黃白蜜二錢

數沸去滓入溫酒服不拘時候

地榆散 治敗血

何首烏 肉桂 地榆 香白芷 各等

右為鹿末每服二錢米泔一盞半沙糖一小塊煎至八分去滓空心食前服

○治症癖

婦人症癖冷氣兼症氣心腹痛不可忍

麝香 另研 阿魏 二錢半 麝香 五靈脂 三錢 各七

桃仁 七錢 花 醋炒 檳榔 各一 莪茂 桂心 沒藥

木香 當歸 各半

右為細末入麝香令勻梗米飲飯為丸如桐子大每服十丸淡

酒湯下無時

治婦人症癖及血氣等神効方

昔有一女八

用積痛肝一具可及十兩者以巴豆五十枚去大皮熟在肝內

用醋醋三碗然肝極爛去巴豆不用入京三稜末和調得所丸

如桐子大每服五丸食前溫熱酒下

葱白散 專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛又治婦

人胎前後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血厥宿冷百節倦

痛肌體怯弱勞傷帶瘕久服盡除但婦人一切疾病最宜服此

煎後烏雞

川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾薑 舶上懷香

芍藥 青皮 木香 麥芽 苦楝子 熟地黃 三稜

我茂 茯苓 神麝 人參 各等

右為細末每服三錢水一盞連雞葱白二寸拍破鹽半錢煎至七分內大黃訶子宜相度病狀如大便不利入大黃同煎不入鹽如大便自利入訶子煎

烏雞煎丸 治婦人胎前產後諸般疾患並皆治之

烏雞雞一隻 烏藥 蛇牀 牡丹皮 人參 白朮

黃耆 各一 若木 米泔浸切 海桐皮 肉桂 去粗

附子 炮去 川烏 炮 紅花 白芍藥 蓬莪朮

陳皮 各二 玄胡索 木香 肉荳蔻 熟地黃 洗焙

琥珀 草果 各半

右細切用烏雞雞一隻湯搗去毛及腸肚將上件藥安放雞肚

中用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油壺盛焙乾為

細末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸

胎前產後傷寒蜜糖酒下 胎前氣悶壯熱炒薑酒下 赤白

帶下生薑地黃酒下 產後敗血注心童子小便炒薑酒下

產後血塊填築心腹疼痛玄胡索酒下 胎前嘔逆薑湯下

催生炒蜀葵子酒下 安胎鹽酒下 安女經脈當通不通四

肢疼痛煎紅花酒下 血氣攻刺心腹疼痛煎當歸酒下 血

暈機欄燒灰酒調吞下 血悶煎烏梅湯研砂下 子宮久

冷溫酒或漿湯下空心日一服 血風勞人參酒吞下 小腹

疝痛炒茴香鹽酒吞下 血散四散遍身虛浮黃腫赤小豆酒

下 常服溫酒醋湯任下並空心食前服 血邪研砂麝香

行有者以行  
皮而迫以行  
之因寒而凝  
者有烏附肉  
桂以溫之其  
請以溫或溫  
中以烏附或  
酒谷以化行  
或於血中行  
氣或於血中  
行血或行表  
或行裏皆所  
以相贊成功  
總之以氣血  
為主溫行爲  
用而又以厚  
以氣爲先  
此其所以爲  
諸病可服也  
其自治胎前  
諸症則有所  
未信  
血和者和血  
之謂但血  
凝而後成云  
皆血所爲是  
認塊塊然  
有上下左右  
之分而凝飲  
食積亦須有  
凝不可執泥  
一說即此方  
所用肉桂草  
果意可知矣  
凡服藥小丸  
連帶血氣  
凝之珍

酒下  
夫症癰癰瘕。血氣塊硬。發渴刺痛。甚則欲死。寢而育之。皆血之  
所爲。僕昔治一婦人。血氣刺痛。極不可忍。甚而死一二日方有  
醫至。並治數年不愈。僕以葱白散烏雞丸。遂安。又嘗治一婦人。  
血氣作起。如一小盤樣。走往刺痛。要一人扶定。方少止。亦用此  
二藥而愈。尋嘗小小血氣。用此二藥。亦有奇效。故錄于此。  
朱先生云。此藥大治心氣脾疼。用之見効。僕嘗以此治浮腫立  
効。陳宜入病。血氣作楚。痛不可忍。服諸藥無効。召僕診之。兩關  
脈弱沉爲肝脈。沉差。緊。此血氣漸成癰瘕也。只以此二藥治之。  
而愈。又四明馬朝奉。後院亦病此。用藥治之亦愈。  
四等丸 治婦人症癰氣心腹疼痛。飲食不消  
濟陰綱目 卷五 治山良方 王三 天德堂  
大黃 醋炒 訶梨勒 去核 檳榔 木香 各等分  
右爲細末。酒煮麵糊和丸。如桐子大。每食前以生薑橘皮湯下。  
十五丸。溫酒亦得。  
又方  
龜甲 醋炙黃 川大黃 醋炒 京三稜 炮製各  
去積 去積 去積 去積 去積 去積  
右爲末。醋煮麵糊丸。如桐子大。每食前以生薑湯下十丸。  
木香 礞砂 另 丁香 官桂 附子 炮 乾漆 炒 烟  
細墨 乳香 另 廣我 青皮 沒藥 另 大黃 炮 末  
京三稜 猪牙皂角 乾薑 炮 各 巴豆霜 減半

此服法。服升  
此服法。服升  
須知女子之  
病與男子不  
同  
按此癰疽二  
字。唯相連而  
以方觀之。只  
重在癰字。癰  
字。又有癰  
癰。一癰。癰  
大癰。癰字之  
義。取其如山  
之高。而癰起  
也。不然而後  
皆癰。癰。癰  
濟陰綱目 卷五 治山良方 王三 天德堂  
右除礞砂乳香沒藥。外同爲末。以好醋一升化開。礞砂去滓。銀  
器中慢火熬。次下巴豆霜。大黃。熬成膏。將前藥末與膏子爲丸。  
如麻子大。每服三五十丸。食後溫酒送下。加至大便利爲度。  
○右三方。皆攻積之劑。全無補性。虛人禁用。實者亦須以四君  
子四物湯兼服。乃可。  
○治癰瘕  
乾漆散 治婦人癰瘕久不消。令人黃瘦。疝癰。兩脇妨悶。心腹疼  
痛。  
乾漆 炮 木香 芫花 醋炒 赤芍藥 桂心 當歸  
川芎 琥珀 研 各 大黃 炒 二 牛膝 七 桃仁 一 兩  
麝香 二 錢  
右爲細末。每服一錢。溫酒調下。無時。  
當歸散 治婦人癰瘕。血氣攻刺。心腹疼痛。不可忍。  
龜甲 醋炙 當歸 炮 桂心 檳榔 大黃 炮 各  
川芎 吳茱萸 湯 七 木香 青皮 去 白 各 蓬莪茂  
赤芍藥 桃仁 湯 七 木香 青皮 去 白 各 蓬莪茂  
右爲散。每服三錢。薑一錢。三分水煎。熱服。不拘時。  
礞砂丸 治婦人癰瘕。及積瘀血在臍。時攻腹脇疼痛。  
川芒硝 礞砂 各 一 當歸 雄黃 桂心 各 半  
大黃 炮 三 稜 各 一  
右爲細末。米醋一碗。熬大黃末爲膏。次入餘藥末。和丸。如桐子  
大。空心溫酒下十丸。漸加至二十丸。以利下惡物爲度。

氣血虛食  
立見其效  
之

此方以氣爲  
主而血藥止  
用一味然藥  
有幾種之方  
又可以用一  
十也甚平最  
宜備用

巴豆丸 治婦人疝瘕及血氣疼痛

巴豆去皮心 礞石各半 大黃炒 五靈脂

桃仁各半 木香各半 以上

右煉蜜丸如茶豆大淡醋湯空心下五丸熱酒亦可

黑神丸

神麝 檀香各四 木香 椒炒 丁香各半

檳榔四枚 漆六兩半 生牛用重

右除椒漆外五物皆半生半炒爲細末用前生熟漆和丸如彈

子大又用麝香末十二兩鋪陰地陰乾候乾并麝香收器中至

極乾去麝香治腎氣膀胱疝瘕及疝墜五瀉血崩產後諸血漏

下赤白並一丸分四服死胎一丸皆綿尿酒下一難產炒藥子

濟陰綱目 卷五 治疝瘕方

四十九枚搗碎酒煎下 諸疾不過三服疝氣十服腸氣瘕瘕

五服血瘕三九當瘕

一婦人病腹中有大塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投此丸

盡三服杯氣盡消終身不作

瑞露丸 治寒傷於內氣凝不流結於腸外久爲癥瘕時作疼痛

腰不得伸名曰腸覃

廣茂酒浸 三稜酒浸 乾漆流去膠 川烏各五

礞石四錢 青皮 雄黃另研 茴香炒 穿山甲炮各

輕粉一錢 麝香半錢 巴豆三十個 去

右除研藥外將巴豆炒三稜廣茂三味黃色去巴豆不用共爲

末入研藥勻生薑汁打糊丸如桐子大每服二十九至三十九

雞湯或酒下空心食前

烏喙丸 治腸覃亦治乳餘并男子疝氣

烏喙炮去皮 半夏湯洗 石膏煨 枳實炒 牡蠣

茯苓酒浸 桂心 乾薑炮各 巴豆研膏

右爲末煉蜜丸如豆大每服三五丸食後酒飲任下

見呢丹 治寒客於下焦血氣閉塞而成瘕日以益大狀如懷子

名曰石瘕

附子炮去皮 鬼羽箭 紫石英各三 澤瀉 肉桂

玄胡索 木香各二 血竭一錢半 水蛭 檳榔二錢

桃仁三十個 三稜五錢 大黃

右爲細末用酒糊爲丸如桐子大每服三十丸醋湯或溫酒下

濟陰綱目 卷五 治疝瘕方

食前

盧會丸 治疝瘕肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口乾作渴或肝

疝食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等証

盧會 胡黃連 黃連炒 木香 白蘗炒 青皮各五

當歸 茯苓 陳皮各一 甘草錢七

右爲末米糊丸如桐子大每服七八十丸米飲下

此小兒疳積  
藥也治人  
亦有之六  
以疳積大  
故偶錄之

此石瘕之留  
在血故多  
血分

濟陰綱目卷之五終

濟陰綱目卷之六

關中 武之望叔卿父著輯 武林 汪之琦奇玉父訂正  
西陵 汪 淇懌懌子笑評 天都 查 望于鼎父編

求子

○論求子須知先天之氣

胡氏曰男女交媾其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶為後天清質之物而一點先天真一之靈氣萌於情慾之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主於精語女則主於血著論立方男以神腎為要女以調經為先而又參之以補氣行氣之說察其脉絡究其虧盈審而治之夫然後一舉可孕天下之男無不父女無不母矣

不母矣

○論求子脉須和平

陳楚良曰人身氣血各有虛寒熱之異惟察脉可知含脉而獨言業者妄也脉有十二經應十二時一日一周與天同運循環無端其至也既不宜太過而數數則熱矣又不宜不及而遲遲則寒矣不宜太有力而寔非正氣能自寔也正氣虛而火邪來乘以寔之也治法先當散鬱以伐其邪邪去而後正可補也不宜太無力

而虛虛乃正氣正血虛也治法惟當補其氣血耳亦有男婦上熱下寒表實裏虛而未得子者法當臨睡時服涼膈之藥以清其上每晨食未入口時服補藥以溫其下暫進升散之藥以達其表及服厚味之藥以實其裏又有女人氣多血少寒熱不調月水違期

求子要訣

或後或先白帶頻下而無子者皆當診脉而以活法治之務欲使其夫婦之脉皆和平有力不熱不寒交合有期不妄用精必能生子子不場妖故欲得子者必須對脉立方因病用藥

○論求子先調經

更氏曰求子之法莫先調經每見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成孕矣詳夫不調之由其或前或後及行後作痛者虛也其少而淡者血虛也多者氣虛也其將行作痛及凝塊不散者滯也皆黑色者滯而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪滯者香附縮砂木香枳殼桃仁玄胡滯久血沉有積滯則清瀉不消虛未

同則新生之氣不最一味香附引去其生新之妙

此方奇其持求子者之真生者之真方

○論求子貴養精血

袁了凡先生云聚精之道一曰寡慾二曰節勞三曰息怒四曰戒酒五曰慎味今之談養生者多言採陰補陽久戰不泄此為大謬腎為精之府凡男女交接必擾其腎腎動則精血隨之而流外雖不泄精已離宮未能堅忍者亦必有真精數點隨陽之痿而溢出此其驗也如火之有烟焰豈有復反於薪者哉是故貴寡慾精成於血不獨房勞之交損吾之精凡日用損血之事皆當深戒如日勞於視則血於視耗耳勞於聽則血於聽耗心勞於思則血於思耗舌勞於言則血於言耗而血得其養而與日俱積矣是故貴節勞主閉

濟陰綱目 卷之六 求子

天德堂

至北內外之  
然猶未確  
至兩  
內宮二字選  
差一線法得  
口訣

濟陰綱目

卷六

求子

王

天德堂

病者腎也。疎泄者肝也。二臟皆有相火。而其系上屬於心。心君火也。怒則傷肝。而相火動。則疎泄者用事。而閉藏不得其職。雖不交合。亦暗流而潛耗矣。是故當息怒。人身之血。各歸其舍。則常凝。酒能動血。人飲酒則面赤。手足俱紅。是擾其血。而奔馳之也。血氣既衰。之人數月無房事。精始厚而可用。然使一夜大醉。精隨薄矣。是故宜戒酒。內經云。精不足者。補之以味。然醲郁之味。不能生精。惟恬淡之味。乃能補精耳。蓋萬物皆有真味。調和勝而真味衰矣。不論脂素。淡煮之得法。自有一段中和恬淡之氣。益人腸胃。洪範論味。而曰稼穡作甘。世間之物。惟五穀得味之正。但能濟食穀味。最能養精。又凡煮粥飯。而中有厚汁。滾作一團者。此米之精液所聚也。食之。驟能生精。試之有效。○煉精有訣。全在腎家下手。內

腎久久習之。而精旺矣。

○論孕子必知細縕之時  
袁了凡先生云。天地生物。必有細縕之時。萬物化生。必有孕育之時。猶犬至微。將受娠也。其雌必狂呼而奔跳。以細縕樂育之氣。觸之。而不能自止耳。此天然之節候。生化之真機也。世人種子。有云三十時辰。兩日午。二十八九。須臾此特言其大槩耳。非的論也。

丹經云。一月止有一日。一日止有一時。凡婦人一月經行一度。必有一日細縕之候。於一時辰間。氣蒸而熱。昏而悶。有欲交接。不可忍之狀。此的候也。於此時逆而取之。則成丹。順而施之。則成胎矣。其日三日。月山庚。又曰。溫溫鉛鼎。光透簾幃。皆言其景象也。當其慾情濃動之時。子宮內有如蓮花蕊者。不拘經淨幾日。自然挺出。陰中如蓮蕊初開。內人洗下體。以手探之。自知也。但含羞不肯言耳。男子預密告之。令其自言。一舉即中矣。

○論合男女必當其年

諸尚書求男論云。建平孝王妃姬。皆麗無子。擇其家未笄女子八御。又無子。問曰。承男有道乎。澄對曰。合男女必當其年。男雖十六而精通。必三十而娶。女雖十四而天癸至。必二十而嫁。皆欲陰陽

濟陰綱目

卷六

求子

四

天德堂

完實。然後交而孕。孕而育。育而子。堅壯強壽。今未笄之女。天癸始至。已近男色。陰氣早泄。未完而傷。未實而動。是以交而不孕。孕而不育。育而子脆不壽。此王之所以無子也。然婦人有所產皆女者。有所產皆男者。大王誠能訪求多男婦人。至宮詢有男之道也。王曰。善。未再期。生六男。夫老陽遇少陰。老陰遇少陽。亦有子之道也。

○論男女精血盛衰

精尚書曰。飲食五味。養髓骨肉。血肌膚毛髮。男子為陽。陽中必有陰。陰中之數八。故一八而陽精升。二八而陽精溢。女子為陰。陰中必有陽。陽中之數七。故一七而陰血升。二七而陰血溢。陽精陰血皆飲食五味之秀實也。方其升也。智慮開明。齒牙更始。髮黃者黑。筋弱者強。其溢也。比充身肢體。手足耳目之餘。雖針灸之瀝。無

盛衰之通在  
七損八益中

方是求子  
法

常

今年十二而  
子老亦事之

血竭者流白  
液精竭者必  
血來一以氣  
不及化血一  
以血不化  
精二若病則  
一般其氣  
又不止于此

有不下。凡子形肖父母者。以其精血皆於父母之身。無所不歷也。是以父一肢廢。則子一肢不肖其父。母一目虧。則子一目不肖其母。精未通。而御女以通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰已痿。而思色以降其精。則精不出。內敗小便道澀。而為淋。精已耗。而復竭之。則大小便道澀。愈疼。則愈欲。大下便。愈便。則愈疼。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年。思男女合。亦不調。不調。則舊血不出。新血誤行。或潰而入骨。或變而之腫。或雖合而難子。合男子多。則澀枯。虛人產乳。則血枯。殺人觀其精。血思過半矣。

○論成胎分男女之異

緒尚書曰。男女之合。二精皆暢。陰血先至。陽精後衝。血開。畏精。精

入為骨。而男形成矣。陽精未入。陰血後參。精開。裏血入為骨。而

女形成矣。陽氣聚面。故男子而重。溺死者必伏。陰氣聚背。故女子

背重。溺死者必仰。走獸溺死。仰伏皆然。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。父少母老。產女必羸。母壯父衰。生男必

弱。古之良工。首察乎此。氣受偏痺。與之補之。補羸女。則養血壯脾。補弱男。則壯脾節色。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯。而婚。此疾外。所務之本。不可不察也。

丹溪曰。成胎以精血之後。先分男女者。精澄之論也。愚竊惑焉。後閱東垣方。有曰。經水斷後。二日血海始淨。精勝其血。感者成男。四五日後。血脈已旺。精不勝血。感者成女。此論亦為未瑩。何以言之。易曰。乾道成男。坤道成女。夫乾坤陰陽之性情也。左右陰陽之

道路也。男女陰陽之儀象也。父精母血。因感而會。精之泄。陽之施也。血能攝之。陰之化也。精成其骨。此萬物資始於乾元也。血成其胞。此萬物資生於坤元也。陰陽交。媾胎孕。乃凝胎之所。居名曰子宮。一系在下。上有兩岐。一達於左。一達於右。精勝其血。及剛日陽

時感者。則陽為之主。受氣於左子宮。而男形成。精不勝血。及柔日陰時感者。則陰為之主。受氣於右子宮。而女形成。或自分男分女。吾知之矣。其有雙胎者。將何如。曰。精氣有餘。岐而分之。血因分而攝之。故也。若夫男女同孕者。剛日陰時感。柔日陽時感。則陰陽混雜。不屬左。不屬右。受氣於兩岐之間者也。亦有三胎四胎五胎六胎者。猶是而已。或曰。其有男不可為父。女不可為母。與男女之兼形者。又若何而分之。耶。子曰。男不可為父。得陽氣之虧者也。女不

可為母。得陰氣之塞者也。兼形者。由陰為駁氣所乘。而為狀不一。以女兼男形者。有二。一則遇男為妻。遇女為夫。一則可妻而不可夫。又有下為女體。上具男之全形。此又駁之者也。或曰。駁氣所乘。獨見於陰。而所乘之形。又若是之不同。耶。子曰。陰體虛。駁氣易於乘也。駁氣所乘。陰陽相混。無所為主。不可屬左。不可屬右。受氣於兩岐之間。隨所得駁氣之輕重。而成形。故所兼之形。有不可得而

同也。

○論男女各由百脈齊到

程鳴謙云。褚澄氏言。男女交合。陰血先至。陽精後衝。而男形成。陽精先入。陰血後參。而女形成。信斯言也。人有精先洩。而生男。精後洩。而生女者。獨何歟。東垣曰。經水纔斷。一二日血海始淨。感者成

承天之氣  
是謂胎元  
不毛之理  
坤道不順

男四五日血脈已旺感者成女至六七日後則雖交感亦不成胎信斯言也人有經始斷交合生女經久斷交合生男者亦有四五日以前交合無孕八九日以後交合有孕者獨何歟俞子木撰廣嗣要書方立圖謂實陽能入虛陰實陰不能受陽即東垣之故見也又謂微陽不能射陰弱陰不能攝陽信斯言也世有疝瘕之夫性弱之婦屢屢受胎雖欲止之而不能上者亦有血氣方剛精力過人顧乃艱於育嗣而莫之救者獨何歟朱丹溪論治專以婦人經水為主然富貴之家侍妾已多其中寧無月水當期者乎有已經前夫頻頻生育而娶此以圖其易者顧亦不能得胎更道與他人轉盼生男矣豈不能受孕於此而能受孕於彼乎愚以為父母之生子如天地之生物易曰坤道其順乎承天而時行夫知

濟陰綱目

卷六

七

天德堂

地之生物不過順承乎天則知母之生子亦不過順承乎父而已知母之順承乎父則種子者果以婦人為主乎以男子為主乎然所謂主於男子者不拘老少強弱康寧病患精易洩難洩只以交感之時百脈齊到為善耳交感而百脈齊到雖老弱病患易洩亦可以成胎交感而百脈參差雖少強雖康寧難洩亦難以成胎矣婦人所攝之血固由於百脈合聚較之男子之精不能無輕重之分也孔子贊乾元資始曰大贊坤元資生曰至得無意乎若男女之辨又不以精血先後為拘不以經盡幾日為拘不以夜半前後交感為拘不以父強母弱母強父弱為拘只以精血各由百脈齊到者則勝負耳是故精之百脈齊到有以勝乎血則成男矣血之百脈齊到有以勝乎精則成女矣至有既孕而小產者有產而

不育有育而不育者有壽而黃耆無福者則亦精血之堅脆分爲修短耳世人不察其精血之堅脆已定於稟受之初乃以小產事責之母以不育專付之男以壽夭專議之數不亦謬乎

○趕經法

求嗣全書載趕經調和訣云有一女人月經來時專在下弦之期必用養血之法以逐之視其色紫則知血熱服涼血藥以緩其氣則氣血和而來遲漸漸趕之定到初頭視其色淡短少者則服養血和血藥養其命門亦趕到初頭察女人肥瘦強弱而用藥一月便不能令趕之之久定到上弦此趕經之法也以女人上弦交多生男耳又有一等女人身體肥胖子宮脂膜長滿經水難調亦令無子須服開子宮之藥以消其脂膜

濟陰綱目

卷六

八

天德堂

○逐月養胎法

袁先生云巢氏論婦人妊娠一月名胎胚足厥陰脈養之二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎手少陰脈養之四月始受水精以行血脈手少陽脈養之五月始受火精以成其氣足太陽脈養之六月始受金精以成其筋足陽明脈養之七月始受木精以成其骨手太陰脈養之八月始受土精以成膚革手陽明脈養之九月始受石精以成毛髮足少陰脈養之十月臟腑關節人神俱備足太陽脈養之此其大略也若求其細則受胎在腹七日一變展轉相成各有相生大集經備矣今婦人墮胎在三月五月七月者多在二四六月者少臟陰而腑陽三月屬心五月屬脾七月屬肺皆在五臟之脈陰常易虧故多墮耳如昔曾三月墮胎則心脈受



傷先須調心。不然至三月復墮。昔曾五月墮胎。則脾脈受傷。先宜治脾。不然至五月復墮。惟有一月之內墮胎。則人皆不知有胎。但知不受妊。不知其受而墮也。一月屬肝。怒則墮多。洗下體。則竅開。亦墮一次。既墮。則肝脈受傷。他次亦墮。今之無子者。大半是一月墮胎。非盡不受妊也。故凡初交之後。最宜將息。勿復交接。以擾其子宮。勿令怒。勿令勞。勿令舉重。勿令洗浴。而又多服養肝平氣之藥。胎可固矣。

○論痰飲不孕。

張子和云。戴人過謙。都營中飲會。有一卒說出妻事。戴人問其故。答曰。吾婦為室女時。心下有冷積。如覆盆按之。如水聲。以熱手熨之。如冰。娶來已十五年矣。恐斷吾嗣。是以去之。戴人曰。公勿熱也。

新金匱目

卷本求子

丸

天德堂

如用吾藥。病可除。孕可得。卒從之。戴人診其脈。寸脈沉而遲。尺脈洪大有力。非無子之候也。可不適年而孕。其良人嘆曰。試之。先以三聖散吐涎一斗。心下平軟。次服白朮調中湯五苓散。後以四物湯和之。不再月。氣血合度。數月而娠。一子。戴人常曰。用吾此法。無不子之婦。此言不誣。○一婦人年三十四歲。夢與鬼神交。驚怕異。常及見神堂陰司。舟楫橋梁。如此一十五年。竟無姪。娠。至祈禱。無所不至。鑽肌炙肉。孔穴萬千。黃髮發熱。引飲中滿。足腫。委命於天。一日苦請戴人。戴人曰。陽火盛於上。陰水盛於下。見鬼神者。陰之靈。神堂者。陰之所。舟楫橋梁。水之用。兩手寸脈皆沉。而伏。知胸中有寃痰也。凡三湧三泄。三汗。不旬日而無夢。一月而有娠。

○論求子禁用熱劑

妙在溫中二字。蓋人。大熱皆不能生。物故也。

此註最當

艾性雖溫。性下寒者宜之。

大味丸。聖藥。

丹溪奉桂丸論曰。無子之因多起於婦人。醫者不求其因。起於何處。遍問古方。惟奉桂丸。其辭確。其意專。用溫熱藥。近乎人情。欣然受之。銳然服之。甘受燔灼之禍。猶憐然不悔。何者。陽精之施。陰血能攝之。精成其子。血成其胞。胎孕乃成。今婦人之無子者。率由血少。不足以攝精也。血之少也。固非一端。然欲得子者。必須調補陰血。使無虧欠。乃可推其有餘。以成胎孕。何乃輕用熱劑。煎熬臟腑。血氣沸騰。禍不旋踵矣。或曰。春氣溫和。則萬物發生。冬氣寒凜。則萬物消隕。非奉桂丸之溫熱。何以得子。應溫煖而胎耶。子曰。詩曰。婦人和平。則釁有子。和則血氣均平。則陰陽不爭。今得此藥。經血必轉紫黑。漸成衰少。或先或後。始則飲食驟進。久則口苦而乾。陰陽不平。血氣不和。疾病蜂起。焉能成胎。縱然成胎。生子亦多病。

濟陰綱目

卷本求子

十

天德堂

而不壽。以奉桂丸耗損天真之陰也。戒之慎之。人而受其九數。服調經補藥亦無妨。但忌施子。瘦人。大多者也。

○論孕子雜法

丹溪曰。婦人無子者。多由血少。不能攝精。初醫者。謂子宮虛冷。托以辛熱之藥。煎熬臟腑。血氣沸騰。禍不旋踵。或有服艾者。不知艾性至熱。入火炙。則下行。入藥服。則上行。多服。則致毒。答將誰挽。○若是肥盛婦人。稟受甚厚。恣於闊宜之人。經水不調。不能成胎。謂之軀脂滿溢。閉塞子宮。宜行濕燥痰。用星半。若米。台。芎。防。風。羌。活。滑。石。或導痰湯之類。○若是瘦怯性急之人。經水不調。不能成胎。謂之子宮乾澀。無血。不能攝受。精氣。宜涼血降火。或四物湯加香附。黃芩。柴胡。養血養陰等藥。○東垣有六味地黃丸。以補婦人之

陰血不足無子服之者能使胎孕

薛氏曰婦人之不孕亦有因六淫七情之邪有傷衝任或宿疾滯留傳遺臟腑或子宮虛冷或氣肝血衰或血中伏熱又有脾胃虛損不能營養衝任者此更當察其男子之形質虛實何如若腎虛精弱不能融育成胎者有稟賦元弱氣血虛損者有嗜慾無度陰精衰憊者各當求其源而治之至於大要則當審男女之尺脉若左尺微細或虛大無力者用八味丸左尺洪大按之無力者用六味丸兩尺俱微細或浮大者用十補丸若誤用辛熱燥血不惟無益反受其害

○脉法  
素問曰腎脈生病女子不孕  
潘陰綱目 卷六 婦人不孕  
脈經云婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得之絕產○脈微弱而滑年少得此為無子中年得此為絕產○肥人脈細胞有寒故令少子其色黃者胸中有寒

○治血虛不孕  
加味四物湯 治婦人不孕久服有子甚好

當歸 川芎 錢各二 白朮 微炒  
熟地黃 酒洗各一錢半 白茯苓 芍藥 微炒 續斷  
香附 醋煮八分 橘紅 七分 甘草 三分  
右剉水二鍾煎八分食遠服

加味四物湯 治血氣兩虛不孕  
當歸 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

肉蓯蓉 酒洗 當歸 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

白朮 白茯苓 錢各一 人參 錢五分 川芎 錢一

右剉水煎服○每月經前三服經正行三服經行後三服

調經種玉湯 凡婦人無子多因七情所傷致使血氣盛經水不調或前或後或多或少或色淡如水或紫如血塊或崩漏帶下或肚腹疼痛或子宮虛冷不能受孕宜此藥百發百中効可通神

當歸 酒洗 川芎 吳茱萸 炒各四錢 熟地黃 酒洗 香附 炒各六錢  
白芍藥 白茯苓 去皮 陳皮 牡丹皮 玄胡索 各三錢

右剉作四劑每一劑加生薑三片水一碗半煎一碗空心溫服渣再煎臨臥服待經至之日服起一日一劑藥盡經止則當交媾即成孕矣縱不成孕經當對期候經來再服四劑必孕無疑

潘陰綱目 卷六 婦人不孕 十二 天德堂

○若過期而經水色淡者加官桂炒乾熟艾各二錢○若先期三四日色紫者加條芩三錢

經驗有胎丸 治婦人久無子嗣服此經調血盛子宮溫暖成孕孕後服之可保胎氣堅固

當歸 酒洗 熟地黃 酒洗 白朮 香附 各四 砂仁 三 芍藥 酒洗  
川芎 川續斷 酒洗 陳皮 黃芩 二兩  
右為細末糯米糊丸如桐子大每服七八十丸空心淡醋湯下酒亦可以乾物壓之

婦人歸附丸 不但種子且無小產產後諸證

香附子 酒洗 砂仁 內醋煮 熟地黃 酒洗 當歸 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

鹿角 大者刮去粗皮，燒末二三兩，綿紙墊鐵鍋內，文火炒，為細末，用二兩。

右三味和勻，醋糊丸，如桐子大，每服三錢，早起臨睡各一服，白滾湯下，一月經後八房即孕。

神仙附益丸丹 不惟治婦人百病，而生育之功，効如神。

香附米 一斤，用重便浸透，取出水洗淨，露一夜，乾，再浸，再曬，如此二次，用。

右再用香附四兩，北艾一兩，煮汁用三分醋七分和前藥為丸。

如桐子大，每服五七十丸，空心臨臥淡醋湯下。

加味地黃丸 治婦人久無孕育者，効如影響。

熟地黃 四兩，山茱萸肉 二兩，白茯苓 二兩，牡丹皮 各一兩。

澤瀉 二兩，香附子 各一兩，斷文 五錢。

濟陰綱目 卷本末子諸方 十三 天德堂

右為末，煉蜜丸，如桐子大，每服七八十丸，滾湯下。

金蓮種子仙方 一名養熊丸，有小苗，女人服之有孕。

熟地黃 酒洗，當歸 酒洗，白芍藥 酒炒，益母草 酒洗，川芎 酒洗，蒼朮 酒洗。

本酒水 一兩，蛇床子 酒洗，條芩 酒洗，覆盆子 酒炒。

玄胡索 酒炒，陳皮 水洗，白丹參 水洗，砂仁 去皮，山茱萸 酒洗。

去香附 四兩，核香附 五兩。

右為極細末，先用白毛烏骨雄雞一隻，預先喂養一月，勿令與雌雞同處，臨時將雞殺死，不出血，乾去毛，剖開去腸內污物，并絲內宿食，胞內黃皮，用酒洗淨，一應事件，仍裝入雞肚內，不令見水，置壘內，入酒二觔，封固，重湯煮爛，取出，割下淨肉，搗如泥，仍將雞骨用酥油和原酒或酒氣，煉為末，入前藥末內，拌勻，再

用醋煮米糊，同雞肉末，杓內搗極細，為丸，如桐子大，每服四五

十丸，漸至八九十丸，空心清水飲下。○如月信先期而至者，加

黃芩地骨皮黃連各一兩半，清水飲下。○如月信後期而至者，

加黃芩一兩，人參白朮各一兩半，溫酒或淡鹽湯下。○如白帶

者，加蒼朮白朮升麻白芷各一兩半，淡薑下。

百子建中湯 女人服此藥，調經養血，安胎順氣，不問胎前產後，

月事參差有餘不足，諸證悉皆治之。

當歸 酒洗，南川芎 白芍藥 酒炒，熟地黃 酒洗，黃阿膠 蛤粉炒成珠。

斷艾葉 醋煮各一兩。

右為細末，煉蜜丸，如桐子大，每服八十丸，空心百沸湯點醋少許下，內寒者溫酒下。

濟陰綱目 卷本末子諸方 十四 天德堂

加味養榮丸 此方服之有孕，且無小產之患。

當歸 酒洗，熟地黃 酒洗，白朮 各二兩，芍藥 酒洗，川芎 酒洗，黃芩 酒洗。

香附 酒洗，陳皮 水洗，貝母 去心，茯苓 去心，麥門冬 去心，各一兩。

阿膠 五錢，甘草 炙，各五錢，黑豆 炒，去皮，四十九粒。

右為細末，煉蜜丸，如桐子大，每服七八十丸，食前空心白湯酒任下，忌食諸血。

加味香附丸 男服聚精丸，女服此。

香附 一斤，分四分。一分酒浸二宿，搗碎，炒。○一分米醋浸

上同，澤蘭 酒洗，海螵蛸 酒洗，當歸 酒洗，川芎 酒洗。

白芍藥 酒炒，熟地黃 酒洗，各八兩，搗乾。

右為末，用浮小麥麴酒醋水打糊為丸，如菜豆大，每日早晚兩

此三方係男  
人藥也借以  
治婦人之經  
閉者正所謂  
因病以藥方  
勿拘方以拘  
病

服白湯酒任下忌食茶服及牛肉生冷

大五補丸 瘦人無孕乃無血攝精宜潤

天門冬 去心 麥門冬 去心 萬蒲 茯苓 人參 益智

枸杞子 地骨皮 遠志肉 熟地黃 各等

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心酒下服本方數服後以七宜丸泄之

增損三才丸

天門冬 酒洗 熟地黃 酒蒸 人參 遠志 心 五味子

茯苓 酒洗 鹿角 炙 膠

右為細末煉蜜梓子下為丸如桐子大每服五十九空心好酒下○年老欲補加混元衣即頭生兒胎衣全個酒浸晒乾為末

濟陰綱目 卷本 求子諸方 十五 天德堂

入藥○一方加白馬莖酥炙○一方加附子補相火不足○一

方加麥門冬令有人力○一方加續斷以續筋骨○一方加沉

香煨下焦虛冷

神効墨附丸 治婦人久無子而經事不調及數墮胎者服之可

立效効

香附 一斤分四分用米醋煮四兩用米醋二碗同香附

白茯苓 人參 當歸 川芎 熟地黃 酒洗

上等微墨火煨醋淬 木香 錢

右九味各另為末醋糊丸如桐子大每服五十九空心好酒下

青蒿烏雞丸 婦人服能令多子

青蒿 即野蒿五斤 香附子 童便酒水酒醋各一斤 斷文 藥

細閱此方不  
用為藥而用  
不香其意在  
行而而不欲  
飲也殊不知  
胎之陰文  
苦於血之行  
故凡文附之  
類俱用醋製  
以醋入附石  
微炙之氣又  
可以通血也  
其如於此  
其如於此

秦當歸 酒洗 牡丹皮 地骨皮 白芍藥 酒洗 黃芩 酒洗

茯苓 人參 白朮 川芎 各一 鱉甲 酒洗 龜板 酒洗

右為細末取白毛烏骨雞一隻初發聲者絞殺乾去毛不用水湯亦不用水洗惟用水去脚上粗皮用好酒入磁器內同熟地黃二兩煮雞熟去骨合前藥搗爛作餅復晒乾為末仍用煮雞酒調糯米粉為糊丸如桐子大每服七八十九酒下日二三

服不拘時一月見効造藥忌鐵器

大烏雞丸 治女人羸瘦血虛有熱經水不調崩漏帶下不能成

胎及付蒸等證

香附 一斤熟地黃 兩生地黃 當歸 白芍藥 人參 各三

川芎 鱉甲 兩白朮 黃芪 牛膝 柴胡 牡丹皮

濟陰綱目 卷本 求子諸方 十六 天德堂

知母 貝母 各二 黃連 地骨皮 玄胡索 乾姜 各一

白茯苓 二兩 秦艽 一兩 艾葉 青蒿 各四

右香附等二十一味俱為細末用白毛烏骨雞一隻續死去

毛與腸將艾蒿各一半裝入腹內將雞並餘艾蒿同入堽內以

童便和水浸過雞二寸許隔湯煮爛取出去骨焙肉乾為末如

有筋骨疼痛者去肉焙骨焦為末與前末和勻雞汁打糊為丸

如桐子大每服五六十丸漸加至七八十九溫酒或米飲下品

煎炒莧菜

小烏雞丸 治婦人百病

吳茱萸 夏姜 白姜 當歸 白芍藥 玄胡索

破故紙 川椒 陳皮 劉寄奴 生地黃 菝葜木

灰一味

川芎 兩 荷葉灰 兩 北艾 兩

用風凰衣更巧中之巧

此方大補非胎不安者所宜

賜風凰衣又安用之

斑貓太毒不可多飲

赤痢之用亦在荷葉手

頭風眼痛生瘡皆可用熱藥

右為末用白毛烏骨雞緝死煮爛去骨取肉搗如泥拌藥末頭乾磨細以雞汁作糊為丸如桐子大每服五十丸空心隨引下。如從來未曾生育者乃油膜包裹子宮以致不能生氣成孕宜加風凰衣燒存性七個硃砂為衣。如腹痛血黑色者加炒黃連有濕痰者加南星蒼朮香附同丸。月水不通紅花蘇木酒下。子宮久冷茯苓煎湯下。赤帶清茶下。白帶牡蠣粉調酒下。血成豆淋酒調綿灰下。胎不安蜜酒下。腸風陳米飲調百草霜下。心痛菖蒲酒下。腹痛芍藥酒下。胎漏下血烏梅酒下。胎死不動斑貓三個調酒下。胎衣不下薤葉菜研水下。胎前產後白痢乾姜煎湯下。赤痢甘草煎湯下。耳聾眼赤清下。頭風薄荷煎湯下。血風眼黑甘草湯下。身體疼痛黃芪末調酒下。腰脚痛當歸酒下。生瘡地黃煎湯下。氣塊血塊作痛與葱白湯調服。四肢浮腫麝香湯下。咳嗽喘滿杏仁桑白皮煎湯下。常服溫酒醋任下。

十全濟陰丸 方論曰胎嗣主於濟陰者何也蓋人之所稟陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足在女人癸水易虧而難盈以至不育舊方多以辛香熱燥之劑為溫煖子宮偏助陽氣反耗陰血豈能成胎况女性多氣多鬱氣多則為火鬱多則血滯故經脈不行諸病交作生育之道遂阻矣又如脾胃虛弱者偏用四物涼血等藥則脾胃益虛飲食頓減使氣血無資生之地何以得成胎孕為子嗣之計者莫如養血順氣調經為本而兼

濟陰綱目 卷本 求子諸方

十七 天德堂

此方妙

濟陰綱目 卷本 求子諸方

十八 天德堂

以甘溫養脾辛溫開鬱斯為至當其調經之法又當因人而加減之初無一定之法也此方則以當歸身養血和氣為君入手少陰經以心主血也入足太陰經以脾養血也入足厥陰經以肝藏血也熟地黃補腎中元氣生心血與芍藥同用又生肝血川芎乃血中之氣藥下行血海通經導氣為臣人參通經活血助熟地黃以補下元白朮利腰膈間血與人參同用補益脾氣香附疎氣散鬱佐澤蘭能生新血而和平氣體牡丹皮養新血去壞血固真氣行結氣山藥能強陰補虛枸杞子補腎水而止下血腰疼為佐紫石英補心氣散心中結氣填補下焦艾葉助香附和百脉溫子宮兼行血藥而平其寒炙甘草通經脈血氣而和諸藥且緩肝經之急為使十年不孕者此藥主之

當歸身 酒 熟地黃 香附子 重便者 各四兩 乾山藥 白朮 各二兩  
枸杞子 人參 各二兩 斷艾葉 去梗筋二兩 同香附用陳川芎 各二兩  
白芍藥 牡丹皮 紫石英 大煖 各一兩 五錢 澤蘭 兩 紫河車 一具  
水內洗去穢血用 銀針挑去紫筋

右各藥俱咀片同河車入砂鍋內用陳老酒三碗陳米醋一碗清白童便一碗米泔水數碗和勻傾入鍋內浮於藥寸許如尚少再加米泔以鍋蓋蓋密勿令透氣桑柴火慢煮以河車融化汁乾為度同藥俱取出在石柏內搗極爛捻作餅子日晒夜露三晝夜宜在月滿之時以受日精月華仍焙乾為末煉蜜搗于餘杵丸如桐子大每服五十九漸加至八九十九空心淡鹽湯下隨用早飯使藥下行忌食生蘿蔔。凡月經過期而行或少

或不行皆血寒血少也。尺脉必微弱。加桂心五錢。夏月黃芪一兩。先期而來者。血熱也。脉來必數。加條實黃芩二兩。炒酒製生地黃一兩五錢。腹痛加白芍藥一兩。凡經將行而腹中先作痛者。血實而氣滯也。去血成塊者。氣凝也。脉來弦數滑大。加玄胡索一兩。炒陳皮八錢。廣木香柴胡稍各五錢。凡經水行後作痛者。氣血俱虛也。尺脉必虛澀而兼緊。加炒乾姜三錢。白茯苓一兩。桂心夏月二錢。餘月五錢。凡經行三五日後。腹中綿綿作痛。或淋瀝不止。血氣滯未盡也。尺脉見沉澀。或沉弦。加廣木香五錢。柴胡六錢。凡經水紫色及黑色。血熱之甚也。尺脉見洪數。加條實黃芩一兩。黃柏一兩。炒生地黃一兩五錢。酒浸。凡過期行經而色淡者。肥人則有濕痰。加白茯苓一兩。

濟陰綱目

卷六 求子諸方

十九 末德堂

陳皮蒼朮水酒浸一各一兩白朮五錢減去熟地黃一兩瘦人則血虛少而水混之。加桂心五錢。經行或來或斷。或發寒熱者。加柴胡八錢。白茯苓一兩。凡經脉不調。多白帶者。肥人主胃中濕痰流注。加製過蒼朮白茯苓各一兩五錢。減熟地黃一兩。凡瘦人氣多血少。脾虛加木香五錢。牡蠣煅赤石脂煅火白茯苓各一兩。凡多崩漏者。減香附艾葉各一兩。加荊芥穗炒一兩。黃芩一兩五錢。血崩或多。加阿膠珠一兩。乾姜五錢。黃芪一兩。多。元氣虛弱。經水閉者。加牛膝二兩。洗屬寒加桂心五錢。屬熱加黃芩一兩。凡婢妾素見忌於嫡室者。必多妒忌。以致經水不調。加味製香附二兩。或血弱心虛。交感時驚恐不寧。則精氣不聚。加琥珀另研酸棗仁隔紗茯神各一兩。辰砂水飛

衛氣血海任主胞胎此方用四物製藥以白朮石斛養氣澤蘭丹皮玄胡索地中桂枝子宮之藥去積生新溫中益胃亦溫和之正方也。不用地黃恐發熱也。再分兩果否。

濟陰綱目

卷六 求子諸方

二十 天德堂

石莖各五錢。治宮冷不孕。調生丸一名洗丸。治婦人衝任虛寒。胎孕不成。或多損墜。澤蘭葉當歸洗。熟地黃洗。川芎洗。白芍藥洗。牡丹皮洗。玄胡索石斛酒浸炒。白朮一兩。乾姜炮。肉桂去皮各。右為末。醋糊丸。如桐子大。每服五十丸。空心酒下。調氣煖宮丸。當歸洗。川芎洗。肉桂各二錢。白芍藥煨。香附炒。艾葉炒。阿膠蛤粉炒成。右為末。醋糊丸。如桐子大。每服五十丸。食前米湯下。艾附煖宮丸。治婦人子宮虛冷。帶下白淫。面色痿黃。四肢疼痛。倦怠無力。飲食減少。經脉不調。血無顏色。肚腹時痛。久無子息。服藥更能戒惱怒。生冷。果用經驗。香附子六兩用醋五斤以砂石鑊煮艾葉大者去川芎酒洗。大川芎一兩。吳茱萸去梗。黃芪去根。白芍藥各二兩續斷兩五錢。生地黃酒洗。官桂五錢。右共為細末。用上好醋打糊丸。如桐子大。每服五七十丸。淡醋湯食遠下。擇壬子日或天德月德日修合。勝金丸一名女金丹。治婦人久虛或產後失調。觸犯禁忌。斷產少子。及經事遲來。赤白帶下。腰脚重痛。寒熱不一。身體瘦削。眩暈。逆此藥善調經候。每日一丸。若胎前二日。一丸。產後二日。一丸。去一切雜證。効驗具述。環之寶之。

<p>香附子<small>十五兩</small> 當歸 川芎 白芍藥 人參 白朮  <small>浸三日</small>            茯苓 甘草 桂心 白薇 玄胡索 牡丹皮 蘇本            香白芷 沒藥<small>研</small> 赤石脂<small>另研各</small></p>	<p>右除香附沒藥赤石脂其餘十三味用好酒浸三日去酒曬乾  <small>通前香附一處為末方入沒藥石脂煉蜜為丸如彈子大每服            一九五更初嚼服溫酒送下白湯亦可此藥多在四十九丸後            以葵水調平受孕為度倘有孕依前三日一服無所忌戒○一            方去沒藥加沉香○一方去桂心加熟地黃丸如桐子大每服            五十丸空心溫酒或白湯下以乾物壓之</small></p>	<p>白薇丸 治婦人月水不利四肢羸瘦漸覺虛乏  <small>以溫行則可以治虛則不可</small>            當歸 白薇 栢子仁 白芍藥 川芎 白朮 桂心  <small>濟陰綱目 卷本 宮冷不孕方</small></p>	<p>附子 草薢 木香 檳榔 細辛 吳茱萸<small>各五錢</small>            人參 白茯苓 石斛 川牛膝 澤蘭葉<small>各半</small> 牡丹皮  <small>紫白英 各一兩 熟地黃 二兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心溫酒下            白薇丸 治婦人無子或斷經上熱下冷等病皆主之  <small>以之補氣行血則是以治上熱必非</small>            白薇 熟地黃 川椒<small>去核及開口者微炒出汁</small> 白龍骨<small>各一兩</small> 麥門冬  <small>去心</small> 蘇木 卷栢 白芷 覆盆子 桃仁<small>各一兩</small> 雙皮<small>各一兩</small> 黃人參 白茯苓 桂心 菖蒲 遠志<small>各七錢半</small>  <small>車前子 當歸 芍藥 蛇床子 細辛 乾姜 炮各五兩</small>            右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸空心日午溫酒下○            昔有數人無嗣俱用此方踰年而皆有子故述之</p>
--	--	--	--	--

<p>秦桂丸 治婦人血海久冷不能孕育  <small>有燥濕溫經之治而無清熱平抑之性非其陰寒者不可服內有沙參未知其解</small>            附子<small>各一兩</small> 白薇 半夏 茯苓 杜仲 厚朴 當歸            秦桂<small>各三兩</small> 防風 肉桂 乾姜 牛膝 沙參<small>各二兩</small>            細辛 人參<small>各四錢</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心酒下無効更加丸            數經調受補者服七日即交合孕後忌服</p>	<p>艾附丸 此藥能煖子宮胎前產後各隨飲用            當歸 芍藥 熟地黃 生地黃 香附子            斷艾<small>各一兩</small> 陳皮 藿香 白芷 牡丹皮            蘇本<small>各五錢</small> 丁香 木香<small>各三錢</small></p>	<p>右為細末酒糊丸每服三錢子宮冷熱酒下○白濁鹽湯下○  <small>濟陰綱目 卷本 宮冷不孕方</small></p>	<p>產後積血艾醋煎湯下            壬子丸 此藥服之不過一月有孕試之有效            吳茱萸 白芨 白茯苓 白欽<small>各一兩</small> 人參 桂心            沒藥<small>各四兩</small> 乳香<small>各三兩</small> 川牛膝 厚朴<small>各五錢</small> 當歸 石菖蒲            白附子<small>各一錢</small>            右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四丸溫酒或鹽湯下日            進三服用壬子日雞犬不聞之處修合有孕毋服無夫婦人不            可服            此方本出南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血海虛冷久無孕育及數隨胎一            切經候不調崩中漏下積聚諸證            秦桂 人參 蘇本 石斛 甘草 蠶布<small>灰</small></p>
--	---	---	---	---

此與前方相 表裏而後 烏賊又有 濕治帶下 天冬和子 有清涼潤 之用惟用 者能斟酌	桔梗 <small>各二</small> 京墨 <small>各二</small> 木香 桃仁 <small>去皮半炒</small> 糯米 <small>炒</small>	川芎 當歸 肉桂 乾姜 細辛	牡丹皮 <small>各二</small> 茯苓 <small>各二</small> 熟地黃 <small>各二</small> 香附子 <small>炒</small>	澤蘭葉 <small>各四</small> 川椒 <small>炒去</small> 山藥 <small>各三</small> 蒼朮 <small>米泔浸</small>	大豆黃卷 <small>炒</small> 一斤 方川椒山藥各七錢半	右為末煉蜜為劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯 任下或以醋調和丸如桐子大每服五十丸亦可	紫石英丸 治婦人子宮久冷不成孕育及數經墮胎月候不勻 崩中漏下七瘕八瘕白淫白帶並宜服之	紫石英 天門冬 桂心 川芎 烏梅 烏頭	濟陰綱目 卷六 宮冷不孕方 王三 天德堂	熟地黃 辛夷仁 禹餘糧 <small>炒</small> 當歸 石斛 <small>各三</small> 紫葳	牡蠣 <small>各二</small> 粉草 烏賊骨 <small>燒</small> 蓼蘗 <small>各一</small> 牛膝	栢子仁 <small>炒</small> 吳茱萸 桑寄生 牡丹皮 人參	細辛 厚朴 續斷 乾姜 <small>炮</small> 各一兩	右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心米飲溫酒任下	濕胞湯 治婦人全不產育及斷絕久不產二三十年者	朴硝 牡丹皮 當歸 大黃 <small>各一</small> 桃仁 <small>各三</small>	細辛 厚朴 苦梗 赤芍藥 人參	茯苓 桂心 甘草 牛膝 陳皮 <small>各二</small>	附子 <small>炮一</small> 鹿茸 <small>炒</small> 水蛭 <small>炒</small> 各十枚	右為末每服六錢水酒各半煮煎至六分溫服日二服夜一服
---	---	----------------	---	---	------------------------------------	---	---	---------------------	----------------------	---	--	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	---	-----------------	----------------------------------	--	--------------------------

此方為要 斷產者設	溫濕得少汗必下積血與冷赤膿如小豆汁斟酌不盡若力弱 大困不堪者只一二服止如惡物不盡用坐導藥	坐導藥 治婦人全不產及斷絕服前溫胞湯惡物不盡用此方	皂角 <small>去皮子</small> 吳茱萸 當歸 <small>各二</small> 大黃 細辛	五味子 乾姜 <small>炮</small> 各一兩 白礬 戎鹽 蜀椒 <small>各半</small>	一方無大黃有黃葵花半兩	右為細末以絹袋盛如指狀人婦入陰戶中坐臥任意勿行走 小便時去之一日一度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見 病出可十日去之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則 發疼痛須俟病出盡方已不可中輟每日早晚用苦菜煎湯薰 洗之	濟陰綱目 卷六 宮冷不孕方 王三 天德堂	內藥續生丸	母丁香 附子 肉苳蔻 枯礬 烏魚骨	右為末糊為軟丸綿裹內陰中	治痰塞不孕	丹溪植芝湯 治婦人肥盛無子以身中有脂膜閉塞子宮也宜 先服此調理	當歸 <small>酒洗</small> 川芎 <small>七錢</small> 白芍藥 白朮 半夏 <small>湯</small>	香附 陳皮 <small>各一</small> 茯苓 <small>各二</small> 甘草 <small>半</small>	右剉作十貼加生姜三片水煎吞後九子	丹溪茂芝丸	白朮 <small>二</small> 半夏 川芎 香附子 <small>各一</small> 茯苓
--------------	---	---------------------------	--	--	-------------	--	----------------------	-------	-------------------	--------------	-------	------------------------------------	--	--	------------------	-------	--



用和寢黃連

神效妙各橘紅錢 甘草  
右為末，粥丸如桐子大，每服八十丸，前湯下。  
如熱多加黃連枳實各一兩。○服此藥後，却服益斯丸。

丹溪深固集

右每服五丸，空心酒下，加至十丸，不妨覺有娠三月後不可更

益斯丸

服。○按此方，即泰桂丸也。丹溪忌服之者，蓋忌於瘦人無血者，

益斯丸

若肥人濕多者，又兼前調理藥，而所服丸數，十減其五，只服五

分無妨也，累試有效。

消脂膜導痰湯

半夏 橘紅 枳殼 羌活 蒼朮 白芍

滑石 研細各 川芎 防風 羌活 各五

濟陰綱目

卷六 婦人經不孕方 三十五 天德堂

車前子 七

右細切作一服，加生薑五片，水煎空心服，以乾物壓之。

一方：治肥盛婦人，稟受甚厚，恣於酒食，經水不調，不能成胎，謂

之軀脂滿溢，閉塞子宮。

南星 半夏 羌活 蒼朮 白芍

防風 滑石

右剉水煎服，或導痰湯亦可。

○治婢妾不孕

可與神仙附

煮附丸 治婢妾多鬱情，不宜暢，經多不調，故難孕，此方最妙，不

須便服他藥。香附子不拘多少，去毛，與麝皮米泔水浸一宿，曬乾，用上好

如多頭意

米醋砂鍋內煮之，旋添醋旋煮，以極爛為度，取出焙乾，為末，

仍用醋糊為丸，如桐子大，每服五七十丸，經不調，即調久不

孕者亦孕。

一方：治婦人妬妾，僕夫無子，常服不妬。

天門冬 赤黍米 微炒 薏苡仁 各四兩

○附斷子法

用白麴麴一升，無灰酒五升，打作糊，煮二升半，用絹帛濾去

渣，作三服，候月經將來，日，晚下吃一服，天明吃一服，月經即

行，終身絕子。○一方用故盤紙方圍一尺，燒為末，酒飲調服，

終身不復懷孕。○又方用油煎水銀，一日方息，空

濟陰綱目

卷六 婦人經不孕方 三十六 天德堂

心服，聚核大一丸，永斷孕，不損人。○一方四物湯五錢，加薤

藁子二錢，於經行後，空心溫服。

良方論曰：易曰：天地之大德曰生，然婦人有臨產艱難，或生育

不已，而欲斷之，故錄驗方，以備用。若服水銀，雖蟲水蛭之類，不

惟孕不復懷，且禍在反掌。○薛氏曰：大抵斷產之法，多用峻厲

性，有不起者，是則產之害未若斷產之害也。吾聞閨中老張羅

峰，太常李恒齋之夫人，俱因服斷產之劑，自謂形體俱佳，遇勞

必病，有日然矣。按夷堅志：載東京女子曰牡丹，以售墮胎藥，生

得惡報，今雖列如上方，以備萬一之用，用者尚其慎之。

濟陰綱目卷之六終

濟陰綱目卷之七

關中 武之望叔卿父著輯 西吳 費家琰子傳父訂正  
西陵 汪 淇儼子箋評 天都 查 望于周父參閱

○浮腫

夫氣者水之  
母血者氣之  
化非氣無以  
生血非血無  
以養氣氣不  
通則血不流  
血不通則氣  
不流而化爲  
水不通而化  
爲水走四肢  
悉皆腫滿亦  
名血分其證  
與水證相類  
實非水也用人參丸

薛氏曰按前證或因飲食起居失養或因六淫七情失宜以致脾  
胃虧損不能生發統攝氣血乖違行失常道若先斷經後浮腫此  
濟陰綱目 卷之七 天德堂

血化爲水名曰血分宜椒仁丸治之若先浮腫後經水不通此水  
化爲血名曰水分宜用葶藶丸治之此屬形氣不足邪淫隧道必  
用此藥以宣導其邪而佐以補轉元氣之劑庶使藥力有所仗而  
行則邪自不能容而真氣亦不至於復傷矣大凡月水不通凝結  
於內久而變爲血癥血水相并亦爲水腫

李氏曰經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水閉塞胞門比水腫  
更難治但能調其經則水自消小調經散葶藶丸先浮腫而後經  
水不通名曰水分乃脾不能制血與水并浮飢肉爲之虛腫紅蓉  
丸通用腎氣丸水分君澤瀉加防已葶藶水通血分君牡丹皮加  
牛膝紅花有經閉脚腫者桑白皮散

○治方

此重在水分  
故用此藥  
水所調經  
此重在水分  
故用此藥  
水所調經

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化爲水  
名曰血分

椒仁 續隨子 研去皮 甘遂 附子 炮 郁李仁

黑牽牛 五靈脂 研碎 當歸 吳茱萸 延胡索 各五錢

芫花 醋浸 右膏各一 膽礬 信礬 各一

芫青 糯米炒黃 斑蝥 糯米炒黃 各十個

右爲末麴糊丸如豌豆大每服一丸橘皮湯下○此方藥雖峻  
利所用不多若畏而不服有養病害身之患常治虛弱之人亦  
未見其有誤也

葶藶丸 治先因小便不利後至身面浮腫經水不通水化爲血  
名曰水分

甜葶藶 研 續隨子 去殼另研 乾葶末 一兩

右爲末葶藶丸如桐子大每服七丸煎扁竹湯下○如大便利  
者減續隨子葶藶各一錢加白朮五錢

人參丸 一名葶藶丸 治經脈不利血化爲水行走四肢悉皆腫滿名  
曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用此方

人參 當歸 大黃 濕紙裏飯上 桂心

瞿麥穗 赤芍藥 白茯苓 各半 葶藶 炒另研

右爲末煉蜜丸如桐子大每服十五丸至三十丸空心米飲  
下

小調經散 治敗血停積五臟日久腐爛成水變爲浮腫忌用利  
水之藥產後浮腫亦宜

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

此重在水分  
故用此藥  
水所調經

<p>當歸 赤芍藥 桂心 洗 各一兩</p> <p>琥珀 甘草 各一錢 細辛 麝香 各五分</p> <p>右為末每服五分溫酒入薑汁調服</p>	<p>桑白皮散 治脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐臥不得</p> <p>桑白皮 炒一錢 郁李仁 炒一錢 赤茯苓 二錢 木香 防已 洗 各一錢</p> <p>大腹皮 各五錢 蘇子 木通 檳榔 青皮 各七錢</p> <p>右到一服加生薑三片水煎服</p>	<p>正脫散 治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大便秘澀兼治脚氣</p> <p>厚虛不能制水而氣不降者宜之</p> <p>白朮 川芎 木香 檳榔 三 天德堂</p>	<p>甘草 各七錢半 大腹皮 紫蘇 木瓜</p> <p>陳皮 沉香 獨活 各一兩</p> <p>右咬咀每服三錢水煎食後服</p>	<p>大調經散 治榮衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿</p> <p>大豆 炒去皮 茯苓 一錢 真琥珀 一錢</p> <p>右為末每服一錢濃煎烏豆紫蘇湯下</p>	<p>大腹皮飲 治婦人血氣不和腹脹</p> <p>大腹皮 防已 木通 厚朴 括蘂</p> <p>黃芩 枳殼 桑白皮 大黃 陳皮</p> <p>五味子 各一分</p> <p>右到每服一兩水煎去滓入酒少許服</p>	<p>此開鬼門散</p> <p>此開鬼門散</p> <p>此開鬼門散</p>
---	--	--	--	---	---	--

<p>大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如散狀小便微微而不結產後者惟水與血并結血室也</p> <p>大黃 半兩 甘遂 炮 阿膠 炒 各一兩</p> <p>右到每服二錢水一盞煎七分服其血當下</p>	<p>論陰戶腫痛</p> <p>賈方論曰婦人痼疾一名便癰一名便毒俗名瘡子或肝經濕熱下注或鬱怒傷損肝其外證或兩拘小腹腫痛或玉門嫩腫作痛或寒熱往來增寒壯熱其內證或小便澀滯或腹內急痛或小腹痞悶或上攻兩脇或肺熱重墜若兩拘小腹腫痛肝經濕熱滯也用龍膽瀉肝湯玉門腫脹肝火血虛也用加味逍遙散及龍</p>	<p>濟陰綱目 卷七 浮腫 四 天德堂</p> <p>膽瀉肝湯加木香若聚投散血攻毒之劑則誤甚矣○又曰婦人陰腫因胞絡素虛風邪客之乘於陰部血氣相搏故也○薛氏曰婦人陰腫若氣血虛弱用補中益氣湯舉而補之肝經濕熱用龍膽瀉肝湯滲而清之○李氏曰陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸者用四物湯入乳香末同搗成餅安陰中立効○陰腫痛極便秘欲死者枳實煎但腫痛者四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍膽草如時常陰腫者四物湯加蘇木防風○陰戶腫痛不閉者逍遙散十全大補湯腫消不閉者補中益氣湯腫痛者加山梔牡丹皮○濕痒出水又痛者憂思過也歸脾湯加柴胡山梔牡丹皮芍藥生甘草○潰爛者逍遙散○陰戶腫痛不閉寒熱溺澀體倦少食者補中益氣湯加升麻柴胡至一錢量入茯苓山梔○陰戶不閉小便澀</p>	<p>此開鬼門散</p> <p>此開鬼門散</p> <p>此開鬼門散</p>
---	---	--	--

滲腹中一物攻動脹痛者逍遙散加柴胡山梔車前子

論陰痒生蟲

陰痒生蟲者。大云云婦人陰痒者是蟲蝕所為。三蟲在於腸胃之間。因臟虛。三蟲動作。蝕於陰內。其蟲作熱。微則為痒。重者乃痛也。薛氏曰。前證屬肝經所化。當用龍膽瀉肝湯。逍遙散以主其內外。以桃仁研粉和雄黃末。或鷄肝納陰中。以制其蟲。一婦人胸膈不利。內熱作渴。飲食不甘。肢體倦怠。陰中悶痒。小便赤澀。此鬱怒傷肝。脾所致。用歸脾湯。加山梔而愈。復因怒患。處并小腹脹痛。用小柴胡。加山梔。芎歸芍藥。痛止。用逍遙散。加山梔而愈。又因勞役。患虛腫脹。小便仍澀。用補中益氣。加山梔。茯苓。丹皮而痊。一婦人陰內痛痒。不時出水。食少體倦。此肝脾氣虛。濕熱下注。用歸脾。加丹皮。山梔。陰綱目。卷七。陰戶腫痛。五。天德堂。

梔芍藥甘草主之而安。一婦人陰內痒痛。內熱倦怠。飲食少思。此肝脾鬱怒。元氣虧損。濕熱所致。用參耆歸朮。陳皮。柴胡。炒梔。車前。升麻。芍藥。丹皮。茯苓。而痊。若陰中有蟲。痒痛亦屬肝木。以桃仁雄黃研納陰中。以殺之。仍用清肝解鬱之藥。有以雞肝納之者。乃取蟲之法也。一方搗新枕葉綿裹。納陰中。日。李氏曰。陰中生蟲。如小蛆者。乃濕熱甚。而心氣又鬱。氣血凝滯。而生。宜養香養胃湯。補心湯。疏鯉丸。外用生艾汁調雄黃末。燒烟薰之。更用雄黃散。散納陰中。陰中生細蟲。痒不可忍。食入臟腑。即死。令人發寒熱。與勞證相似。先以蛇床子煎湯。洗淨拭乾。後用梓樹皮焙乾。為末。入枯礬四分之一。勝香少許。敷之。立効。如下疳生蟲。所下如柿汁臭穢。及心中痒痛。悶絕虛煩。甚者不治。

此又謂脾開濕熱下流而生蟲者

諸陰戶生瘡

大云云婦人少陰脈數。而滑者。陰中有瘡。名曰匿。或痛或痒。如蟲行狀。膿水淋漓。亦有陰蝕幾盡者。皆由心神煩鬱。脾胃虛弱。致血氣流滯耳。故經云。諸痛痒瘡。皆屬於心。又云。陽明主肌肉。治之當補心。養胃。外以薰洗坐導藥治之。乃可。薛氏曰。婦人陰中生瘡。乃七情鬱火。傷損脾肝。濕熱下注。其外證有陰中舒出如蛇。俗呼陰挺。有翻突如餅。俗呼陰菌。亦有如雞冠花。亦有生諸蟲。亦有腫痛。濕痒。潰爛出水。脹悶脫墜者。其內證口乾。內熱。體倦。經候不調。或飲食無味。胸熱發熱。胸膈不利。腸助不調。小腹脹脹。赤白帶下。小水淋漓。其治法。腫痛者。宜用四物湯。加柴胡。山梔。牡丹皮。龍膽。草。溫痒者。宜用歸脾湯。加山梔。牡丹皮。柴胡。淋瀝者。宜用龍膽瀉肝湯。陰綱目。卷七。陰戶生瘡。六。天德堂。

肝腎有熱。肝湯。加白朮。牡丹皮。潰腐者。宜用加味逍遙散。腫悶脫墜者。宜用補中益氣湯。加山梔。牡丹皮。佐以外治之法。○陰挺下脫。大云云婦人陰挺下脫。或因胞絡傷損。或因子臟虛冷。或因分娩用力所致。薛氏曰。陰挺下脫。當升補元氣為主。若肝脾鬱結。氣虛下陷。用補中益氣湯。若肝火濕熱。小便澀滯。用龍膽瀉肝湯。一婦人陰中突出如菌。四圍腫痛。小便頻數。內熱。腫痛。似痒似痛。小便重墜。此肝脾鬱結。蓋肝火濕熱。而腫痛。脾虛下陷。而重墜也。先以補中益氣。加山梔。茯苓。冬車前子。青皮。以清肝火。升脾氣。更以加味歸脾湯。調理脾鬱。外以生豬脂和麝香末。塗之而收。一婦人陰中挺出五寸許。悶痛重墜。水出淋漓。小便澀滯。夕與龍膽瀉

肝湯分制濕熱。補中益氣湯。升補脾氣。諸證漸愈。再與歸脾湯。加山梔。用芫花。冬黃。梔。間服。調理而愈。後因勞役。或怒氣下部濕。小水不利。仍用前藥。即愈。

論陰令

良方云。婦人陰冷。因勞傷子臟。風冷客之也。○薛氏曰。陰冷。屬肝經有濕熱。外來風冷所致。若小便澀滯。或小腹痛。用龍膽湯。肝湯。若內熱寒熱。或經候不調。用加味逍遙散。若寒熱體倦。飲食少思。用加味四君子湯。若鬱怒發熱。少寐懶食。用加味歸脾湯。○一婦人陰中寒冷。小便黃澀。內熱寒熱。口苦脇脹。此因肝經濕熱。用龍膽湯。祛利濕熱。用加味逍遙散。調補氣血而安。○一婦人所患。同前。更寒熱。嘔吐。兩股腫痛。先用小柴胡。加山梔。一劑寒熱嘔吐。清陰綱目。卷七。陰寒下脫。七。天德堂。

論交接出血作痛

薛氏曰。女人交接。輒出血作痛。此肝火動脾。而不能攝血也。用補中益氣湯。濟生歸脾湯。若出血過多。而見他證。但用前藥。調補肝脾。

論傷丈夫頭痛

薛氏曰。女人交接。傷丈夫頭痛。當用補中益氣湯。六味地黃丸。以滋化源為主。

補遺局方。來復丹。治婦人與男子交接。相傷。因而四肢沉重。頭痛。

昏重米飲吞下五十九

○脈法

脈經曰。少陰脈滑。而數者。陰中生痞。○少陰脈弦者。白腸必挺。核治陰戶腫痛。

龍膽瀉肝湯。治肝經濕熱。下部兩拘。腫炊作痛。小便澀滯。陰挺如菌。或出物如蟲等證。

龍膽草 酒炒 澤瀉 各一 車前子 炒 木通 當歸 酒洗 生地黃 酒炒 山梔子 炒 黃芩 炒 生甘草 各五分

右剉水煎服。○玉門腫脹。加木香。加味四物湯。治陰戶腫痛。

當歸 川芎 芍藥 生地黃

濟陰綱目 卷七 子血作痛 八 天德堂

柴胡 山梔子 牡丹皮 龍膽草

右剉水煎服

九味柴胡湯。治肝經濕熱。下注。便毒腫痛。或小腹脇肋結核。凡肝膽經部分。一切瘡瘍。或風熱結核。癰癰並皆治之。

柴胡 黃芩 炒 各一錢 人參 山梔子 炒 半夏 龍膽草 炒 焦 當歸 芍藥 炒 甘草 各五分

右剉水煎服

加味小柴胡湯。治肝經下部腫脹。小便不利。或寒熱往來。或胸熱。或胸脇作痛。

柴胡 二錢 黃芩 炒 一錢 人參 半夏 山梔子 牡丹皮 各七分 甘草

<p>右劉加生薑水煎服 加味逍遙散 治婦人肝脾血虛濕熱流注下部陰內潰爛瘡痛 發熱胸熱寒熱等證</p>	<p>當歸 芍藥 白朮 茯苓 甘草 柴胡 牡丹皮 山梔 右劉水煎服外以鶴虱草煎湯洗</p>	<p>萬蒲散 治婦人陰戶腫痛月水滯 萬蒲 當歸各一兩 秦艽 吳茱萸 右爲末每服五錢空心慈湯調下或水煎服</p>	<p>麻黃湯洗方 治婦人陰腫或瘡爛 麻黃 黃連 蛇床子 壯艾葉 烏梅 右劉細以水一斗煮取五升去滓熱洗避風冷</p>	<p>經心錄方 治婦人陰中腫痛不可忍 艾葉 防風 大戟 二兩 右劉細以水一斗煮取五升熱洗日三次宜避風冷</p>	<p>白礬散 治婦人陰腫堅痛 白礬 半兩 甘草 半兩 大黃 一分 右爲末水和如丸棗大綿裹內陰中日兩換以愈爲度</p>	<p>黑白散 治婦人陰中腫痛 小麥 朴硝 白礬 五倍子 慈白 右伴煎湯頻洗</p>	<p>治婦人陰腫如石痛不可忍二便不利</p>
--	---	---	---	---	--	---	------------------------

<p>枳實 陳皮 各四兩 右二味炒令香熟以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處頻熨之冷則又換直至喉中覺枳實氣則痛止腫消便利矣</p>	<p>雞方 治婦人陰中腫痛 用枳實半觔切碎炒熟布裹包熨之冷即易一方用枳殼 一方用鐵精粉傅上○一方以甘菊苗研爛百沸湯淋洗患 浸○一方用馬鞭草搗爛塗之</p>	<p>大黃散 治婦人陰痒 大黃 微炒 黃芩 黃耆 各一兩 赤芍藥 玄參 丹參 山茱萸 蛇床子 各半</p>	<p>濟陰綱目 卷七 陰痒生虫方 右爲細末每服二錢食前溫酒服</p>	<p>硫鯉丸 治陰中生蟲亦治茄子疾 大鯉魚一個去頭皮入硫黃一兩黃泥固用火煨烟盡爲末 米糊丸如桐子大每服二十九溫酒下</p>	<p>廣濟方 療婦人陰痒不止 蜈蚣 雄黃 硫黃 朱砂 硝石 雄黃 各半 藜蘆 二錢</p>	<p>右爲細末以臘月豬脂和如膏用故布作纏子如指長一寸半 以藥塗上內陰中日一易之易時宜用豬椒根三五兩水煮稍 熱洗乾拭內之</p>	<p>一方 治陰中生細蟲痒不可忍若食入臟腑即死</p>
--	---	---	--	---	---	---	-----------------------------

<p>梓樹皮<small>二錢</small> 枯礬<small>五分</small> 麝香<small>少許</small></p>	<p>右和一處研勻敷之立効</p>	<p>又方 桃仁雄黃研勻納陰中仍服清肝解鬱之藥</p>	<p>又方 蛇床子白礬煎水淋洗即止</p>	<p>又方 狼牙<small>二兩</small>蛇床子<small>三兩</small>以米三升煮汁沸熱洗</p>	<p>又方 取牛肝或豬肝截五寸繩繫內陰中半日蟲入肝取出立効</p>	<p>又方 取鵝肝乘熱內陰中如有蟲當盡下</p>	<p>又方 新桃葉搗爛綿裹納陰中日三兩易</p>	<p>又方 生艾汁調雄黃末燒烟薰之更用雄黃末納陰中</p>	<p>聖惠方 療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白多</p>	<p>濟陰綱目 卷七 療痒生虫方 十一 天德堂</p>	<p>氣思美食 用鯉魚長一尺去頭肉取骨搗末熬黃黑以豬脂和以絹袋盛如常法納陰中至痛處即止蟲當自出</p>	<p>羅氏療陰痒不可忍方 杏仁燒作灰乘熱綿裹納陰中日二易之</p>	<p>又方 蒜煮湯洗之○一方用枸杞根煎湯洗</p>	<p>又方 小蓴不拘多少水煎作湯熱洗日三次</p>	<p>治陰戶生瘡</p>	<p>補心湯 治婦人陰戶生瘡名曰漏瘡或痛或痒如蟲行狀服水淋瀝陰蝕已盡治之當補心養胃</p>	<p>人參 茯苓 前胡 半夏<small>湯泡川芎各七錢半</small></p>
---	-------------------	-----------------------------	-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---	---

<p>陳皮 枳殼<small>去穢</small> 紫蘇 桔梗 乾薑</p>	<p>甘草<small>各五錢</small> 當歸 白芍藥<small>各一兩</small> 熟地黃<small>一兩</small></p>	<p>右到每服四錢加薑棗煎服○如濕熱有蟲者去薑蘇參梗四味加苦參升麻桃仁吳茱萸水炒黃連</p>	<p>香養胃湯 治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈</p>	<p>香薷 薤白仁 麻連 烏藥<small>去木</small> 砂仁</p>	<p>半夏<small>各三錢</small> 茯苓 白朮 人參<small>各五錢</small> 草澄茄</p>	<p>甘草<small>各三分半</small></p>	<p>右到薑棗煎服</p>	<p>一方 治陰肉生瘡膿本淋瀝或痒痛</p>	<p>升麻 白芷 黃連 木通</p>	<p>當歸 川芎 白朮 茯苓</p>	<p>右到水煎服更用楊梅湯浴洗</p>	<p>楊梅湯 治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓</p>	<p>甘草 乾漆<small>各三錢</small> 生地黃 黃芩</p>	<p>當歸 川芎<small>各二錢</small> 龜甲<small>炙五分</small></p>	<p>右到作一劑用水數碗煎數沸去滓時常洗患處</p>	<p>治陰瘡</p>	<p>蘇莢 川芎 黃芩 甘草 黃連 白芷 附子 礬石 雄黃<small>各六錢</small></p>	<p>右咬咀取豬脂四兩合煎傳之</p>	<p>治婦人陰瘡與男子妬精瘡犬同小異方</p>
--	---	--	-----------------------------	---	--	------------------------------	---------------	------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------	---	---------------------	-------------------------

<p>雄黃散</p> <p>雄黃 川芎 當歸 北細辛</p> <p>川椒 藜蘆 辰砂</p> <p>右爲末，綿裏內陰中，又傳外瘡上忌如常法。</p> <p>當歸 川芎 芍藥 甘草<small>各二兩</small></p> <p>地榆<small>三兩</small> 一方有蛇床子不用川芎</p> <p>右細切以水五升，煮取三升，去滓，熏洗，日三夜二。</p> <p>又方</p> <p>五倍子 甘草 滑石 黃丹<small>各等分</small></p>	<p>治瘡因口後便行房，致成淋濁，伏流陰道，疳瘡遂生，癢痒無時。</p> <p>先用胡椒熬白作湯，一日兩三度淋洗，却服後藥。</p> <p>黃芩<small>湯水</small> 兔絲子<small>酒浸</small> 沙苑藜<small>炒</small></p> <p>黑牽牛 赤石脂 龍骨</p> <p>右爲末，煉蜜丸，桐子大，每服二十丸，燕窩酒，溫上清者吞下。</p> <p>黃芩湯洗方 療婦人陰中生瘡</p> <p>當歸 大黃 黃芩 川芎 雄黃</p> <p>濟陰綱目 卷七 陰痒生瘡方 十三 天德堂</p> <p>雄石<small>各二分</small> 黃連<small>一分</small> 凡方中有云分者音</p> <p>右切以水五升，取四升，洗瘡，日三度。</p>	<p>黃丹 枯白礬 藟蒿 藟本<small>各一兩</small> 荆芥</p> <p>蛇床子<small>研極細</small> 白蛇皮<small>一條</small> 硫黃<small>各半兩</small></p> <p>右爲細末，另以荆芥蛇床子煎湯，溫洗，軟帛滲乾，清油調塗。如瘡濕，乾末搽之。</p>	<p>治瘡因口後便行房，致成淋濁，伏流陰道，疳瘡遂生，癢痒無時。</p> <p>先用胡椒熬白作湯，一日兩三度淋洗，却服後藥。</p> <p>黃芩<small>湯水</small> 兔絲子<small>酒浸</small> 沙苑藜<small>炒</small></p> <p>黑牽牛 赤石脂 龍骨</p> <p>右爲末，煉蜜丸，桐子大，每服二十丸，燕窩酒，溫上清者吞下。</p> <p>黃芩湯洗方 療婦人陰中生瘡</p> <p>當歸 大黃 黃芩 川芎 雄黃</p> <p>濟陰綱目 卷七 陰痒生瘡方 十三 天德堂</p> <p>雄石<small>各二分</small> 黃連<small>一分</small> 凡方中有云分者音</p> <p>右切以水五升，取四升，洗瘡，日三度。</p>	<p>雄黃散</p> <p>雄黃 川芎 當歸 北細辛</p> <p>川椒 藜蘆 辰砂</p> <p>右爲末，綿裏內陰中，又傳外瘡上忌如常法。</p> <p>當歸 川芎 芍藥 甘草<small>各二兩</small></p> <p>地榆<small>三兩</small> 一方有蛇床子不用川芎</p> <p>右細切以水五升，煮取三升，去滓，熏洗，日三夜二。</p> <p>又方</p> <p>五倍子 甘草 滑石 黃丹<small>各等分</small></p>
---	---	--	---	---

<p>治瘡因口後便行房，致成淋濁，伏流陰道，疳瘡遂生，癢痒無時。</p> <p>先用胡椒熬白作湯，一日兩三度淋洗，却服後藥。</p> <p>黃芩<small>湯水</small> 兔絲子<small>酒浸</small> 沙苑藜<small>炒</small></p> <p>黑牽牛 赤石脂 龍骨</p> <p>右爲末，煉蜜丸，桐子大，每服二十丸，燕窩酒，溫上清者吞下。</p> <p>黃芩湯洗方 療婦人陰中生瘡</p> <p>當歸 大黃 黃芩 川芎 雄黃</p> <p>濟陰綱目 卷七 陰痒生瘡方 十三 天德堂</p> <p>雄石<small>各二分</small> 黃連<small>一分</small> 凡方中有云分者音</p> <p>右切以水五升，取四升，洗瘡，日三度。</p>	<p>右爲末，先以甘草湯洗，然後傳之。</p> <p>肘後方 治婦人陰戶生瘡，作痒或痛。</p> <p>杏仁<small>炒</small> 雄黃 白礬<small>各五錢</small> 麝香<small>二分</small></p> <p>右爲細末，傳入陰中。一方單用硫黃研細傳之，亦效。</p> <p>銅綠散 治男婦陰部濕癢瘡</p> <p>五倍子<small>五錢</small> 白礬<small>一錢</small> 乳香<small>五分</small> 輕粉<small>一字</small> 銅綠<small>少許</small></p> <p>右爲末，洗淨搽之。</p> <p>麝香杏仁散 治婦人陰瘡</p> <p>麝香<small>少許</small> 杏仁<small>不拘多少，燒存性</small></p> <p>右爲細末，如瘡口深，用小絹袋子二個，盛藥滿，係口，臨上床後，熱安在陰中，立愈。</p> <p>濟陰綱目 卷七 陰痒生瘡方 十四 天德堂</p> <p>栢哈散 治下疳濕瘡</p> <p>黃柏<small>刮末</small> 蛤粉<small>各等分</small></p> <p>右搽上，即愈。蒸黃柏去熱，蛤粉燥溫故也。</p> <p>又方 平胃散加貫衆末，每服二錢，煮熟猪肝拌藥內陰戶數日可安。</p> <p>治陰痔</p> <p>治婦人陰中生痔，九竅有肉突出者，皆名爲痔。</p> <p>用烏頭七箇，燒存性，用小瓦礫盛，醋淬之，乘熱熨候通手，沃之良。</p> <p>洗方 治茄子疾</p> <p>茄皮 白礬 馬橋頭根 朴硝</p>	<p>雄黃散</p> <p>雄黃 川芎 當歸 北細辛</p> <p>川椒 藜蘆 辰砂</p> <p>右爲末，綿裏內陰中，又傳外瘡上忌如常法。</p> <p>當歸 川芎 芍藥 甘草<small>各二兩</small></p> <p>地榆<small>三兩</small> 一方有蛇床子不用川芎</p> <p>右細切以水五升，煮取三升，去滓，熏洗，日三夜二。</p> <p>又方</p> <p>五倍子 甘草 滑石 黃丹<small>各等分</small></p>	<p>雄黃散</p> <p>雄黃 川芎 當歸 北細辛</p> <p>川椒 藜蘆 辰砂</p> <p>右爲末，綿裏內陰中，又傳外瘡上忌如常法。</p> <p>當歸 川芎 芍藥 甘草<small>各二兩</small></p> <p>地榆<small>三兩</small> 一方有蛇床子不用川芎</p> <p>右細切以水五升，煮取三升，去滓，熏洗，日三夜二。</p> <p>又方</p> <p>五倍子 甘草 滑石 黃丹<small>各等分</small></p>	<p>雄黃散</p> <p>雄黃 川芎 當歸 北細辛</p> <p>川椒 藜蘆 辰砂</p> <p>右爲末，綿裏內陰中，又傳外瘡上忌如常法。</p> <p>當歸 川芎 芍藥 甘草<small>各二兩</small></p> <p>地榆<small>三兩</small> 一方有蛇床子不用川芎</p> <p>右細切以水五升，煮取三升，去滓，熏洗，日三夜二。</p> <p>又方</p> <p>五倍子 甘草 滑石 黃丹<small>各等分</small></p>
---	--	---	---	---



澤蘭 石灰炒少許

右煮水煎洗

傳藥 治茄子疾

朴硝爲末，黃荆柴燒瀝調敷，或濃鐵漿水調傳。

又方 治茄子疾 治茄子疾，心躁連綿，黃水易治，白水難愈，用

生枳殼爲散，煎湯煎洗，却用線帛包枳殼滓，納入陰中，即日漸消。

治陰挺下脫

當歸散 治婦人陰中突出一物，長五六寸，名陰挺，又名癰疽。

當歸 黃芩各一兩 牡蠣半兩 蝟皮炙一兩 赤芍藥五錢

右爲末，每服二錢，食前溫酒調下，滾湯亦可，如不應，更以補中

濟陰綱目卷七 陰中生痔方 十五 天德堂

益氣湯，倍加升麻柴胡兼服之。

又方 治陰挺

當歸 穿山甲 精黃炒各半 辰砂 一錢 麝香少許

右爲末，每服二錢，酒調下，尤効。

三菜丸 治陰中生一物，所大牽引腰腹膨脹，痛至甚，不思飲食，

皆因多服熱藥，及煎煇，或犯非理房事，兼意淫不遂，名陰挺。

食茱萸 吳茱萸湯浸微炒 山茱萸肉 舶上檀香

白蒺藜 桔梗慢火炒 青皮去白各一兩 五味子

海藻洗焙 大腹皮酒洗 川楝子去核 玄胡索各一兩

右爲末，酒糊丸，如桐子大，每服三十五丸，木通湯下，○下虛加

川烏炮去皮，肉桂去粗皮，各一兩，腰腹痛甚，加桃仁去皮尖，麩

此是肝家藥

炒別研，青皮去白，枳實去穢，各一兩，真南木香七錢，半服之。○  
一方每服二錢，生地黃湯調，仍用金狗脊五倍，白芷、木楊  
根、魚腥草、山黃連，各一兩，爲散，分作四服，以有背瓦礫煎熟，預  
以銀錫作一長小筒，下透確背，背上貫挺上，先煎後洗，立効，更  
服白散，凌雪花少許煎。

一捻金丸 服前藥未効，却用此。

玄胡索 舶上檀香 吳茱萸炒 川楝子去核 青木香各二兩

右爲末，粳米飯糊丸，如桐子大，每服三十五丸，空心木通湯服。

又用梅花腦子半錢，鐵孕粉一錢，水調刷上，如陰畔生瘡，以涼

血餘，每服三錢，加凌雪花少許，煎空心服立効。

治婦人陰挺出下脫方

濟陰綱目卷七 治陰挺下脫方 十六 天德堂

桂心一方作川椒 吳茱萸一兩 戎鹽二兩

右藥並炒令色變，搗羅爲末，以綿裹如指大，內陰中，日再易之，甚妙。

又方 川椒 川烏頭並生 白芨各半

右搗羅爲末，綿裹一錢，內陰中，深三寸，腹中熱即止，來日再用

之。

又方 蛇床子五兩 烏梅二枚 武叔卿先生著

以水五升，煮取三升，去滓，稍熱洗之，每日夜三五度用。

又方 硫黃 烏賊骨各半 搗羅爲末，傳之。

又方 鐵精細研，以羊脂調，布裹炙熱熨之，以瘻爲度。

又方 用羊脂煎令適冷，暖取塗上，以鐵精傳之，多少令調，以火

炙布煖熨肛上漸金內之然後末磁石酒服方寸匕三

熏洗法

用荆芥穗桑楸樹皮藿香葉煎湯熏洗即入

托藥用草麻子葉有九角者好飛過白礬爲末以紙片攤藥托

入

擦藥先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬爲末乾擦立効

敷藥用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒烟熏次用草麻子研爛塗

上吸入如入即洗去

○治陰冷

五加皮浸酒方 治婦人癰瘦陰冷

五加皮 乾薑 丹參 蛇床子 熟地黃

清陰綱目 卷七 治陰冷下脫方 十七 天德堂

杜仲各三兩 地骨皮 天門冬各一兩 鍾乳粉四兩

右剉碎以生絹袋盛用酒十五觔漬二宿每服一盞空心食前

飲之○一方用枸杞子無地骨皮

八味丸 治血弱不能榮養臟腑津液枯澁風寒客於子臟以致

陰冷

熟地黃半斤 山茱萸肉 乾山藥各四兩 牡丹皮

白茯苓 澤瀉各三兩 肉桂 附子各一兩

右爲末即地黃膏加煉蜜爲丸如桐子大每服七八十丸空心

食前白滾湯下

○治人陰冷方

乾薑 蓮花各半 蛇床子

五味子各一兩

右搗羅爲末每用兼以兔糞陰門用綿裹一錢內陰中熱即

爲効

又方 蛇床子 吳茱萸 甜葶藶各半 沒石子一枚

右爲末綿裹裹許大內陰中令腹內熱爲度

又方 蛇床子一兩 吳茱萸一兩半 一方用麝香

右爲末煉蜜丸如酸棗大以綿裹納陰中下惡物爲度

溫中坐藥 用蛇床子爲末白粉少許和勻如棗大綿裹納之自

然溫熱有効

又方 吳茱萸入牛膽中令滿陰乾百日每取二十粒研碎帛裹

納陰中良久如火熱

清陰綱目 卷七 治陰冷下脫方 十八 天德堂

治交接血作痛

千金方 治女人交接出血

桂心 伏龍肝各五錢

右爲末酒服方寸匕瘥止

又方 黃連六分 牛膝 甘草各四分每一分二錢半也

右細切以水四升煮取二升洗口三四度瘥

又方 亂髮 青皮 二味燒灰敷之

又方 用熟艾緊裹一團然後以綿裹內陰中

集驗方 療女人交接陽道遠連及他物所傷犯血流澀不止者

取釜底黑斷蒲蘆塗藥內之

又方 療女交接陽道遠連血出不止用燒髮并青布末爲粉

塗之。一方制雞冠血塗之。一方以赤石脂末塗之。一方五倍子末塗亦良。

治小戶嫁痛

甘草 生薑各五 白芍藥四分 桂心二分

右剉以水二升煎四沸服

又方 海螵蛸燒為末酒調服方寸七日三服

又方 小麥甘草二味各等分煎湯洗甚効

治傷丈夫頭痛

集驗方 療女人傷丈夫四肢沉重嘔吸頭痛

生地黃兩八芍藥兩五甘草三香豉一蒸白一斤生薑四

石以水七升煮取二升半分三服不得重作忌房事

濟陰綱目 卷七 治陰冷諸方 十九 天德堂

桑白皮湯 治婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔悶

桑白皮兩半 乾薑一桂心寸五大棗二十枚

右切以酒一斗煮三四升去滓分溫服衣適厚薄母令汗出

附治脚痠

金蓮穩步膏 治婦人脚指縫壞痛

黃連 黃柏 黃丹 荆芥 等分

右為細末摻脚指縫內布扎縛自然平穩不痛

濟陰綱目卷之七終

濟陰綱目卷之八

開中 武之望叔卿父輯著 武林 何應龍父可正

西陵 汪 洪憐濟子箋釋 天都 查 望子周父參閱

胎前門上

論胎前十二經所養

虞氏曰脈經云診其脈手少陰之脈動甚者姪子也蓋手少陰心

脈也心主血脈故也又腎為胞門子戶尺中腎脈按之不虛者姪

子也又曰婦人妊娠一月之時足厥陰脈養之二月足少陽脈養

之三月手少陰脈養之四月手少陽脈養之五月足太陰脈養之

六月足陽明脈養之七月手太陰脈養之八月手陽明脈養之九

月足少陰脈養之十月足太陽脈養之是以諸經脈各養三十日

濟陰綱目 卷八 胎前門上 天德堂

也若夫至期當養之經虛實不調則胎孕為之不安甚則下血而

墮矣夫手足十二經氣血盈虧不同如手足厥陰太陽少氣多血

手足太陰少陰少血多氣手足少陽氣多血少手足陽明氣盛血

多安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之庶無胎墮之

患其或感冒風寒別生異証又宜各按法而調治之

○論治胎產三禁

潔古云治胎產之病從厥陰經論之是祖氣生他之部也厥陰與

少陽相為表裏故治法無犯胃氣及上焦有三禁不可汗不可

下不可利小便發汗則傷上焦之陽利大便則脈散而動脾利小

便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯此三禁則榮衛自和

而寒熱止矣如發渴則白虎氣弱則黃耆血刺痛而和以當歸腹

中痰而加之芍藥大抵產病大行從增損柴胡雜証從增損四物  
宜詳察脈証而用之

○論胎前調理法

集略云母之腎臟係於胎是母之真氣子之所賴也受妊之後宜  
令鎮靜則血氣安和須內遠七情外薄五味大冷大熱之物皆在  
所禁使易露風邪不得投間而入亦不得交合陰陽觸動慾火務  
謹節飲食若食免缺唇食犬無聲食雜魚而致瘡癰心氣大驚而  
癰疾腎氣不足而解脾氣不和而癰瘦心氣虛乏而神不足兒  
從母氣不可不慎也苟無胎痛胎動漏痢及風寒外邪不可輕易  
服藥不得已已在審度疾勢輕重藥性高下不必多品然父少母老  
產女必虛母壯父衰生男必弱氣受偏痺與之補之補虛女則養  
血壯脾補男則壯脾降色虛女宜及時而嫁男及待壯而婚  
昔人論年老者有子者男過八八女不過七七則知血氣在人固  
自有量夫豈逃陰陽之至數哉

○論胎前用藥法

丹溪曰胎前當清熱養血○產婦因火逼動胎逆上作喘急者急  
用條芩香附之類為末調下條芩水中取沉者為佳○黃芩安胎  
乃上中二焦藥能降火下行○天行不息所以生生而無窮者弱  
子治血行氣有補陰之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前  
無滯產後無虛難產可煎作膏○條芩白朮乃安胎之聖藥俗以  
黃芩為寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱養血  
使血循經而不妄行乃能養胎○懷妊嗜物乃一穢之虛如受穢

物乃肝臟不能養胎而虛也○有孕八九個月必用黃芩須用枳  
殼紫蘇梗

○孕婦食忌

雞肉合糯米食○令子生寸白蟲○食大肉○令子無聲○鯉魚同雞  
子食○令子生疳多瘡○食兔肉○令子缺唇○食羊肝○令子多厄○  
食龍肉○令子項短縮頭○雞子與桑椹同食○令子倒生心寒○鮮  
魚同田雞食○令子瘡癰○雀肉同豆醬食○令子面生黑點○黑子○  
食鰱鱖○令子橫生○食生薑○令子多指○食水獺○令絕產○食雀  
肉飲酒○令子多淫無恥○食茨菰○消胎氣○食驢馬肉○過月難產  
○豆醬合薑香食之墮胎○食山羊肉○令子多病○食鯢鱔無鱗  
魚難產○食諸般菌生子驚風而夭○食雀腦○令子患雀目

○孕婦藥忌

歌曰斑斑水蛙及蟾蜍烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝  
薑豈與蜈蚣三稜代精荒花麝大戟蛇脫黃雌雄芽硝巴硝丹皮  
桂槐花辛牛皂角同半夏南星與通草瞿麥訶藟桃仁通礪砂乾  
漆蠟脚爪地膽牙根莫用好

○孕婦起居忌

便產須知云勿亂服藥勿過飲酒勿妄針灸弗向非常地便勿舉  
重登高涉險心有大驚犯之產難子必癰癩勿多睡臥時時行步  
勿勞力過傷使腎氣不足生子解顛腦破不合衣毋太溫食毋太  
飽若脾胃不和榮衛虛怯子必羸瘦多病自家及隣家修造動土  
犯其胎氣令子破形類命刀犯者形必傷泥犯者寢必垂打擊者

色青紫繫縛者相拘攣有此等驗如影響切宜避之

○候胎法

脈經曰婦人懷胎七月而不可知時時血而轉筋者此為軀也

此脈動其者娠子也○素問云婦人足少陰脈動其者娠子也

○陰搏陽別謂之有子王註云陰謂尺中也搏謂搏於手也此脈搏擊與寸脈殊別則謂有孕之兆

脈經曰妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脈滑疾重以

手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑者五月也

○尺脈左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實狀

○婦人妊娠四月欲知男女法左疾為男右疾為女俱疾為生二

子王子字云妊娠三部俱得而疾在左為男在右為女○遣娠人面南行還復呼之左迴

首者是男右迴首者是女○看上圖時夫從後忽呼之左迴首者

是男右迴首者是女也○婁全善云按丹溪云男受胎在左子宮

女受胎在右子宮斯言大契是說也蓋男受胎在左則左重故迴

首時慎護重處而就左也女胎在右則右重故迴首慎護重處而

就右也推之於脈其義亦然胎在左則血氣護胎而盛於左故脈

亦從之而左疾為男左大為男也胎在右則血氣護胎而盛於右

故脈亦從之而右疾為女右大為女也亦猶經云陰搏陽別謂之

有子言受胎處在臍腹之下則血氣護胎而盛於下故陰之尺脈

鼓搏有力而與陽之寸脈殊別也又如難節發上則血氣從上而

寸脈盛發下則血氣從下而尺脈盛發左則血氣從左而左脈盛

發右則血氣從右脈盛也丹溪以左大順男右大順女為醫人之

母以左胎  
男以右胎  
不胎者胎前  
胎前之病

濟陰綱目 卷八 胎前門上 天德堂

○診婦人有妊娠

肝藏血母肺主氣血為榮分氣為衛陰陽配偶不參差兩臟通和

皆類例血衰氣旺定無脈血旺氣衰應有體○寸微關滑尺帶數

流利往來并雀啄小兒之脈已見形數月懷胎猶未覺○左疾為

男右為女流利相通速來去兩手關脈大相應已形亦在前通語

○左手帶縱兩個男右手帶橫一雙女左手脈逆生三男右手脈

順生三女○寸關尺部皆相應一男一女分形証有時子外母身

存或即母亡存子命○往來三部通流利滑數相參皆皆陽實

陰虛脈得明通滿胸膈皆逆氣○左手太陽浮大男右手太陰沉

細女諸陽為男諸陰女指下分明長取記○三部沉正等無疑尺

內不止真胎婦夫乘妻今縱氣霧妻乘夫分橫氣助子乘母今逆

氣乘母乘子今順氣護○小兒日足胎成聚身熱腹亂無所若汗

出不食吐逆時精神結倘其中住帶疾不散胎三月但疾不散五

月母弦緊牢強滑者安沉細而微歸泉略

神方驗胎散 婦人兩三個月月經不行疑是兩身却疑血帶心

煩寒熱恍惚此藥可驗

真雀腦膏 一兩 當歸全用重一兩 右二味為細末分作二服濃煎好艾湯一盞調下或好酒調服

亦得可待三兩個時辰間覺臍腹微動仍頻即有胎也動即

愈安穩無虞如不是胎即不動所帶惡物自行母亦安也如服

藥不覺効再煎紅花湯調下必有神効

驗胎方 經脈不行已經三月者

濟陰綱目 卷八 胎前門上 天德堂

用川芎爲細末濃煎茶葉湯空心調下二錢。覺腹內微動則有胎也。否則非經痛。

艾醋湯 如過月難明有無或月數未足難明。

用艾醋收艾服半盞後腹中痛大痛是有孕不爲痛定無。

探胎散 婦人胎氣有無疑似之間以此探之有胎則吐無則不吐。

皂角 去皮

甘草 炙各

黃連 去心

右爲細末作一服溫酒調服。

○逐月養胎法。

北齊名醫徐之才云。妊娠一月名胎胎飲食精熟。酸美受御。宜食大麥。母食腥辛。是謂維正。○妊娠一月足厥陰脈養。不可針灸其

經陰期日

不卷八逐月養胎法

六

天德堂

經如大行而太衝中封。足厥陰內屬於肝。肝主筋及血。一月之時。血行否溢。不爲力事。寢必安靜。無令恐畏。

妊娠二月名胎膏。無食辛。腥居必靜處。男子勿勞。百節皆痛。是爲胎始結。○妊娠二月足少陽脈養。不可針灸其經。如少陽經外立陽

足也。足少陽內屬於膽。膽主精。二月之時。兒精成於胞。憂當慎

謹勿驚動也。

妊娠三月名胎胎當此之時。未有定儀。見物而化。欲生男者。操弓矢。欲生女者。弄珠璣。欲子美好。數視璧玉。欲子賢良。端坐清虛。是謂外象而內感者也。○妊娠三月。手心主脈養。不可針灸其經。如

如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。

如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。

如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。

如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。如少陰經內關開使。

以通耳目而行經絡。○妊娠四月。手少陽脈養。不可針灸其經。如少陽經外立陽足也。足少陽內屬於膽。膽主精。四月之時。兒六腑順成。當

靜形體和心志。節飲食。

妊娠五月。始受火精。以成其氣。臥必晏起。沐浴浣衣。深其居處。厚

其衣服。朝吸天光。以避寒殃。其食相養。其養牛羊。和以菜黃。調以

五味。是謂養氣。以定五臟。○妊娠五月。足太陰脈養。不可針灸其

經。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。如太陰經內關開使。

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲食甘饒帶自持而待之是謂養毛髮致才力。○妊娠九月足少陰脈養不可針灸其經氣猶然谷太谷穴信足少陰內屬於腎腎主續精九月之時兒脈續成皆成無處漏冷無者衣

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節入神皆備但俟時而生

烏雞雞湯 妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱腰痛重腰痛腹滿胞惡卒有所下當預安之宜服此

濟陰綱目 卷八 妊娠胎法 天德堂

烏雞雞一雙治 茯苓 阿膠 各二 吳茱萸 一升 人參 麥門冬 五合 白木 芍藥 各三 甘草 生薑 各二 右咬咀以水一斗二升煮雞汁取六升去雞下藥煎取二升內酒三升并膠烱盡取三升每服一升日三

補胎湯 若曾傷一月胎者當預服此

細辛 一兩 防風 一兩 乾地黄 白木 生薑 各四 吳茱萸 大麥 各五 烏梅 一升

右咬咀以水七升煮取二升半分三服先食服○寒多有倍細辛茱萸熱多渴者去之加瓜蒌根二兩○若有所思加柏子人參○一方有人參一兩

艾葉湯 妊娠二月陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悒中風

果有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱宜服此

艾葉 丹參 當歸 麻黃 各二 人參 阿膠 各三 甘草 一兩 生薑 六兩 大棗 十二枚 右咬咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服

○一方用烏雞雞一隻煮汁並頭血煎藥

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此

黃連 人參 各一 吳茱萸 五合 生薑 三兩 生地黃 五兩 一方用阿膠 一方用當歸 半兩

右咬咀以酢漿七升煮取三升分四服日三夜一十日一修合若願覺不安加烏梅一升水煎不用漿

濟陰綱目 卷八 妊娠胎法 天德堂

雄雞湯 妊娠三月為足形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動於經脈腹滿繞臍苦痛或腰背卒

有所下宜服此

雄雞 一隻治 黃芩 白木 生薑 各一 麥門冬 五合 芍藥 人參 茯苓 甘草 阿膠 各二 大棗 十二枚 右咬咀以水一斗三升煮雞減半出雞內藥煮取半內清酒三升并膠煎取三升分三服一日令盡○一方用當歸川芎各二兩不用黃芩生薑

扶神湯 若曾傷三月胎者當預服此

扶神 丹參 龍骨 各一 人參 當歸 阿膠 甘草 各一 大棗 二十枚 赤小豆 粒二十

分四服。日三夜一。先食服。便愈。不差再服。○一方用烏雞

身重七月忽驚抽搐腹痛卒有所手足厥冷脈若



此方妙在生  
黃八兩然非  
黃若傷寒而  
熱氣血而虛  
者不可輕用

葱白三四寸長 黃芩二兩 阿膠四兩 麥門冬半夏各一 生薑八兩  
旋覆花二合

右咬咀以水二升煮減半內清酒三升及膠煎取四升每服一升日三夜一溫臥當汗出若不出者加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗○一方以黃雌雞一隻割咽取血內酒中煮雞取汁以煎藥

杏仁湯 若曾傷七月胎者當預服此

杏仁各二 甘草各二 紫苑一兩 鍾乳乾薑各二

麥門冬吳茱萸各一 五味子三合 梗米五合

右咬咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七

生金之藥

日服一劑○一方用白雞一隻煮汁煎藥

芍藥湯 妊娠八月風寒有所犯觸身發熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或時寒懷腰背苦冷而痛目眩疏

芍藥生薑各四 人參白木 當歸甘草各三

厚朴二兩 薤白一升

右咬咀以水五升清酒四升合煮取三升分四服日三夜一○

一方用烏雌雞煮汁以煎藥

葵子湯 若曾傷八月胎者當預服此

葵子二升 芍藥四兩 白木柴胡各三 厚朴

甘草各二 生薑六兩 大棗二十枚

八月用葵子當思之

右咬咀以水九升煮取三升分三服日三夜一劑○一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

半夏湯 妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉側短氣宜服此

半夏麥門冬 吳茱萸當歸 阿膠各三

乾薑二兩 大棗十二枚

右咬咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上溫服四服病即止○一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

豬腎湯 若曾傷九月胎者當預服此

豬腎一具 白木四兩 茯苓桑寄生 乾薑乾地黃

芍藥各三 附子中者 大豆三合 麥門冬一升

右咬咀以水一斗煮將令熟去腎內諸藥煎取三升半分四服日三夜一十日更一劑

○惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自己上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宣通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

血脈不通經絡否澁則四肢沉重按風則頭目眩也覺如此候者

便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸痰水消除便飲食也既得食力體強氣壯力足養胎母便健矣

大云云

大云云雖娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如故脈息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食鹹酸甚者或作寒熱心中煩悶嘔吐痰水恍惚不能支持集氏謂之惡阻但証有輕重耳輕者不服藥亦不妨重者須以藥療之千金方以半夏茯苓湯茯苓丸專治阻病然此二藥比來少有服者以半夏有動胎之性蓋胎初結慮其易散不可不謹也張仲景傷寒論有用黃龍湯者小柴胡湯中去半夏是也此蓋為妊娠而設焉王子亨則有白朮散局方則有人參丁香散楊振則有人參橘皮湯齊士明則有醒脾

濟陰綱目 卷八 婦人 天德堂

醒脾二字足

欲皆不用半夏用之多効

李茂翁云若左脈弱而嘔服諸藥不止者當服理血歸脾藥則愈

薛氏云前證若中脘停痰用二陳藥加枳殼若飲食停滯用六君子加枳殼若脾胃虛弱用異功散若胃氣不足用人參橘皮湯兼

氣膈加枳殼胸脇痞悶更加蘇梗枳殼再加柴胡若飲食少思用六君子加紫蘇枳殼頭暈倦用六君子湯若脾胃虛弱嘔吐不

食用半夏茯苓湯益半夏乃健脾氣化痰滯之至藥也脾胃虛弱而嘔吐或痰涎壅滯飲食少思胎不安必用半夏茯苓湯倍加白

木然半夏白朮茯苓陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃予常用之驗

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食

酸醜多臥少起百節煩疼癰瘦有痰胎孕不

半夏湯洗七次白朮 陳皮各一熟地黃各一 旋覆花

右咬咀如生薑三片水煎空心服兼服後茯苓丸○千金方無

旋覆花有紫蘇葉細辛○有熱加黃芩○有客熱煩渴口瘡去

橘皮細辛加前胡知母各七分半○若腹冷下利去地黃加炒

桂心五分○若胃中虛熱大便秘小便赤澀去地黃加大黃七

分半黃芩一錢

陳皮半夏湯 治懷妊氣血不足胎氣始盛逆動胃氣惡阻嘔吐

不進飲食

陳皮去白朮 茯苓各一 半夏製一 子芩 枳殼 蘇

蘇各八 甘草 五分

右切一劑生薑三片水一鍾煎七分食遠溫服

旋覆花湯 療妊娠六七月間胎不安常處亦治阻病

旋覆花 五分 白朮 厚朴 枳殼 黃芩 茯苓 各一錢

半夏 芍藥 生薑 各一

右咬咀作一服水煎食前溫服

縮砂二陳湯 治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏 陳皮 白朮 砂仁 各一 白茯苓 二錢 甘草 各五

右如生薑三片棗一枚烏梅肉少許水煎服一二劑後服茯苓

九

參術散 治妊娠惡阻嘔吐逆痰水不食心虛煩悶

此方清而不寒  
藥自是一法

人參 橘皮 去白 茯苓 麥門冬 白朮  
厚朴 各一錢 甘草 五分

右作一服如生薑七片竹茹如彈子大水煎服

青竹茹湯 妊娠惡阻嘔吐不食

竹茹 彈子大 橘皮 白茯苓 各一錢 半夏 湯泡 生薑 各二錢

右剉水煎服忌羊肉鰾鮓等物

盧根湯 治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生薑根 七分 橘紅 四分 生薑 六分 檳榔 二分 枇杷葉 三分

右切以水二盞煎七分空心熱服

一方 治妊娠惡食心中煩悶熱嘔吐

青竹茹 麥門冬 各三兩 前胡 二兩 橘皮 二兩 蘆根 二兩

濟陰綱目 卷八 惡阻 天德堂

如體熱四肢煩熱加地骨皮一兩

右切細以水一大升煮半升去渣分兩服食前

人參半夏丸 治妊娠惡阻酸心胸腹冷痛吐逆不食

人參 半夏 湯泡 乾生薑 各半

右為末以生地黄汁浸蒸餅為丸如桐子大每服四十九米飲

生地汁浸餅  
餅法不特此  
牛黃之類皆可  
又不傷胃  
妙妙

下○張氏曰大各方論半夏動胎而不用今仲景豈獨不知此

而用於此方乎予治妊娠阻病累用半夏未嘗動胎也經云有

故無煩是也

茯苓丸 治妊娠惡阻心中煩悶吐痰眩暈先服半夏茯苓湯兩

劑後服此藥 赤茯苓 人參 桂心 乾薑 炮 半夏 洗七 陳皮 各

前方用生  
此用炮薑

又用桂心亦  
大熱矣而炮  
而生又復有  
別不可不知

乾葛根 白朮 甘草 枳殼 去白 枳實 各二兩  
右為細末煉蜜丸加桐子大每服五十丸空心米飲下日三服

○一方加麥門冬○肘後方加五味子

歸原散 治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無效者

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥 丁香 各半 白茯苓 各二錢

白朮 陳皮 各一兩 桔梗 枳殼 各二錢 半夏 洗七 炙黃

右咬咀每服三錢加生薑五片煎一服水煎服

橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食

橘皮 竹茹 人參 白朮 各二錢 生薑 一錢 厚朴 一錢

右剉水煎服

惡阻惡食黃之脾虛嘔吐黃之有火所謂諸逆衝上皆屬於火

也此方竹茹能平少火厚朴能下逆氣橘皮生薑所以開胃人

參白朮所以益脾開胃益脾欲其安緩云爾

白朮湯 治胃虛惡阻吐水甚至十餘日水藥不入者

白朮 炒一兩 人參 五錢 丁香 二錢 甘草 一錢

右為細末每服二錢加生薑五片水煎食前溫服

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒吐逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參 錢五 丁香 錢五 藿香 各二錢 蘇合 各二錢

右咬咀每服五錢水煎服

二香散 治妊娠胎動不安氣不升降嘔吐酸水起坐覺重

香附子 兩 藿香 葉 甘草 各二錢

右為細末每服二錢沸湯調下不拘時

以上數方  
法俱備

吐瀉作渴則  
效在烏梅矣  
作烏梅者非

健胎養血  
火則傷任白  
是胎孕自安

白朮散 治妊娠胎氣不和進飲食

白朮 人參 紫蘇 青皮 川芎

訶子 甘草

石岐咀作一服如生薑三片水煎服

保生湯 治妊娠惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作渴

人參 白朮 甘草 香附 烏梅

橘紅 各五

右到加生薑水煎服。覺惡心嘔吐加丁香

縮砂散 治妊娠胃虛氣逆嘔吐不食

縮砂仁為末每服二錢生薑或米飲調服

○胎動不安

海陰綱目

卷八

天德堂

大全云妊娠胎動不安者由衝任經虛受胎不實也亦有飲酒房  
室過度損動不安者有懷擊觸而胎動者有喜怒氣字不舒傷於  
心肝觸動血脈者有信醫服藥補反為藥所害者有因母病而  
胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動及母疾但當安胎其  
母自愈當以母形色察之若面赤舌青見死母活面青舌赤口中  
沫出母死子活若唇青兩邊沫出者子母俱死

安胎散 妊娠常服安胎

白朮 當歸 黃芩 甘草

右到水煎服。如腹脹加神麴麥芽各二分。○氣虛泄瀉加

人參三分陳皮二分。○潮熱加柴胡一錢。○氣上逆加枳殼三

分

若末湯 常服健脾胃清熱故胎不動

子芩 白朮

右到水煎服。一方芩末各半兩加當歸二錢。一方用芩末

等分為末。粥丸桐子大每服五十九丸白湯下。名安胎丸。

金匱當歸散 此方養血清熱孕婦宜常服之。如瘦人血少有熱

胎動不安。素孕半產者皆宜服之。以清其源而無後患也。

當歸 川芎 白芍藥 黃芩 白朮

右為末每服二錢酒飲調服。日再服。或用酒糊為丸如桐子大

每服五十丸茶湯任下。日三服。

釣藤湯 治妊娠八九月胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者此由勞

動用力以傷胎宮宜急治之

海陰綱目

卷八

天德堂

釣藤寄生酒  
肝養補氣血

釣藤 當歸 茯神 人參 桔梗

桑寄生 各五

右到水煎服。煩熱加石膏二錢半

十聖散 治因母疾病氣衰血少不能護養其胎以致不安者宜

此至之補湯加減

人參 黃耆 白朮 地黃 砂仁

甘草 當歸 川芎 芍藥 各五

右到水煎服

黃耆湯 治胎動不安腹痛下黃汁

黃耆 川芎 糯米

右細到水二大盞煎至一盞三分溫服

之陰所以補地氣之不足也  
天行之權

阿膠益金因  
血艾葉助陽  
上并升則不  
區周則不  
飲三方皆用

二方半中之  
奇且奏效也

佛手散 治妊娠因事驚動胎動不安或子死腹中惡露不下疼痛不已用此藥擦之若不損則痛止子母俱安若胎損立便下

當歸 去蘆酒 三錢 芎藭 二錢

右剉先用酒一鍾煎乾再入水一鍾煎三沸溫服

小膠艾湯 治傷損動胎下血腹痛

阿膠 一兩 艾葉 二兩

右剉水煎服○指迷方加秦艽一兩

膠艾芍歸湯 治妊娠三三月上至八九月頭仆跌胎動不安腰腹疼痛欲死已有所下

阿膠 川芎 各三錢 當歸 乾地黃 艾葉 各二兩

一方有甘草無地黃

濟陰綱目 卷八 婦人經水不安

右細切以水七升煮取三升半分三服

阿膠散 治妊娠或因傾仆或因毒藥胎動不安腰腹痛疼或有

所下

阿膠 蛤粉炒 艾葉 炒 當歸 酒浸 川芎 白芍藥 炒

熟地黃 洗 黃芩 甘草 炙各一錢

右咬咀加生薑五片棗三枚水煎空心服

當歸湯 治妊娠胎動過心煩燥悶絕口乾橫生逆產上衝下築

迷悶唇口青黑手足冷厥

當歸 人參 各一兩 阿膠 一兩 甘草 各三錢

右咬咀每服八錢加連翹白一莖水煎溫服○一方有川芎

○一方有川芎厚朴無甘草

解毒良方

一方 治妊娠從高墜下腹中下血煩悶

生地黃 益母草 各一兩 當歸 黃芩 各半

右咬咀每服四錢水一盞薑四片煎至六分去渣服無時

二物解毒湯 治誤服毒藥動胎

甘草 黑豆 淡竹葉 各等分

右用水煎濃服

白扁豆散 治妊娠誤服諸般毒藥毒物

白扁豆 生去皮為細末米飲調服方寸七神効或酒煎亦可

○治漏下血 妊娠經來

脈經云婦人經月下但為微少師脈之反言有痛其後審然其脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之則滑浮之

濟陰綱目 卷八 婦人經水不安

主 天德堂

則輕陽明少陰各如經法身反灑淅不欲飲食煩痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣盛當作血盛滑則多實

六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙

胎二胎今陽不足故令微經也○大抵妊娠經來不多而飲食精神如故六脈和緩滑大無病者血盛有餘也見

太能飲自來也

大全云夫妊娠胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任脈

虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝任之脈為經絡之海起

於胞內手太陽小腸脈也手少陰心脈也是二經為表裏上為乳汁下為月水有娠之人經水所以斷者壅之養胎蓄之以為乳汁

也衝任氣虛則胞內泄不能制其經血故月水時下亦名胞漏

此言漏胎有三種任虛者血漏自產也七情飲食傷

血漏自產也

七情飲食傷

與者因有所感也宿疾者氣血失於榮

血盡則人驚矣。又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷傷胃風寒遂致胎動。若母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也。

曾有一娠婦。月信不絕。而胎不損。問產科熊宗古。答曰。婦人血盛氣衰。其人必肥。既娠之後。月信常來。而胎不動。若晚進觀之。便以為漏胎。若作漏胎治之。則胎必墮。若不作漏胎治。則其胎未必墮。今推宗古之言。誠有旨也。巢氏曰。婦人經閉不利。別無所苦。者是謂有子。以其經血蓄之以養胎。壅之為乳汁也。有子之後。當以養胎矣。豈可復能散動耶。所以然者。有妊而月信每至。是亦未必因血盛也。若謂婦人榮經有風。則經血喜動。以其風勝則可也。既榮經為風所勝。則所來者非養胎之血。以此辨之。若作漏胎治之。必濟陰綱目。卷八。胎漏下血。天德堂。

漏胎用風藥亦足升氣則氣使血不滯胎自固不

服保養補胎之藥。且胎不損。強以藥治之。乃所謂實虛虛也。其胎終墮。宜矣。若醫者知榮經有風之理。專以一藥治風。經信可止。或不服藥。胎亦無恙。然而有胎本不同。而因房室不節。先漏而後墮者。須作漏胎治之。此又不可不審也。

方氏曰。胎動胎漏。皆下血。而胎動有腹痛。胎漏無腹痛。為異。爾故胎動宜行氣。胎漏宜清熱。

李氏曰。尿血自尿門下血。漏胎自人門下血。妊娠尿血。屬胞熱者。多四物湯。加山梔髮灰。單苦黃藥飲亦妙。因得者益元散。加升麻煎湯下。稍虛者。膠艾四物湯。久者用龍骨一錢。蒲黃五錢。為末。酒調服。

胎動下必服經日。婦人懷胎。六月七月。暴下斗餘水。其胞必倚而墮。此非時

服經日。婦人懷胎。六月七月。暴下斗餘水。其胞必倚而墮。此非時

胎動下故也

薛氏曰。胎漏黃汁下。或如豆汁。若因肝脾濕熱。用升陽除濕湯。血崩肝脾風熱。用加味逍遙散。肝脾鬱怒。用加味歸脾湯。脾胃氣虛。用錢氏白朮散。若脾氣下陷。用補中益氣湯。肝經風熱。用防風黃芩丸。風入腸胃。用胃氣湯。

加減膠艾湯。治胎動漏血有效。阿膠炒成 當歸 川芎 白芍藥炒 地榆各一 艾葉炒 甘草各五

右到一服。水煎。服。胎漏血多。起於氣滯。血逆。火動之故。可加炒黃芩。炒香附。炒砂仁。研細同煎。或有受胎至四五個月。即墮。或至六七個月。漏血要墮者。宜前方去艾葉。地榆。加白木。

黃芩。在春熟地。黃連。斷。有氣盛。亦加香附。砂仁。氣虛。加人參。黃耆之類。如傷風寒。受孕後。便宜服千金紫蘇飲。及前加減法。湯先相間。庶免再墮。

安胎飲。治妊娠卒然腹痛。下血不已。當歸 川芎 白芍藥炒 熟地黃 阿膠炒 艾葉 黃耆各一 甘草各五 地榆各五

右到一劑。加薑棗水煎服。天全方。治妊娠三四月腹痛。時時下血。當歸 熟地黃 艾葉各六 續斷各二 阿膠 雞蘇 竹茹各一

右用水一升。煎取七合。空心再服。

<p>如聖湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>鯉魚皮 當歸 白芍藥 熟地黃 川芎</p> <p>川續斷 阿膠 甘草 等分</p> <p>右咬咀每服四錢加青根少許生薑五片水煎溫服</p> <p>安胎當歸湯 治妊娠舉動驚悸胎不安小腹疼痛引腰絡下血</p> <p>當歸 川芎 阿膠 人參 大棗</p>	<p>艾葉 一方有甘草無參棗</p> <p>右以水酒各三升煮至三升內膠今烱分三服</p> <p>枳殼湯 治胎漏下血及因事下血</p> <p>枳殼 黃芩 白朮</p> <p>右到水煎食前溫服一方加生地入少酒煎</p> <p>當歸寄生湯 治妊娠胎漏非時下血</p> <p>當歸 川芎 艾葉 白朮 人參</p> <p>桑寄生 續斷 熟地黃</p> <p>右水煎空心溫服</p>	<p>二黃散 治婦人胎漏下血</p> <p>生地黃 熟地黃</p> <p>右為細末每服二錢煎白朮枳殼湯調食前服或咬咀水煎服</p> <p>阿膠散 治妊娠無故卒然下血</p> <p>阿膠 熟地黃 生地黃</p> <p>右以清酒三升攪勻溫熱分三服</p> <p>一方 治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之</p>	<p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p>
--	---	---	--

<p>生地黃汁 陳酒五合</p> <p>右同煎三五沸溫三服以止為度</p> <p>榆白皮散 治妊娠胎漏下血其難產常宜服之</p> <p>榆白皮 葵根 大麻仁 羅麥 木通</p>	<p>右咬咀水煎溫服</p> <p>一方 治妊娠胎漏下血數升胎動不安</p> <p>榆白皮 葵根 大麻仁 羅麥 木通</p> <p>葵子 左不</p> <p>右到以水五升煮取二升半分三服不渴更作服之</p> <p>本散 治肝經有熱下血</p> <p>細條黃芩 為末每服一錢以酒調服</p> <p>防風丸 治肝經有風以致血得風而流散不歸經</p> <p>防風 為末每服一錢白湯調服</p> <p>防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便血尿血</p> <p>條芩 防風</p> <p>右為末酒糊丸如桐子大每服三五十丸食遠或食前米飲或溫酒送下</p> <p>○右三方治肝經風熱之劑</p> <p>桂枝茯苓丸 仲景云婦人宿有癥病經斷來及三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠六月動者前三月經不利</p>	<p>此方治胎動不安</p> <p>此方治胎動不安</p> <p>此方治胎動不安</p> <p>此方治胎動不安</p> <p>此方治胎動不安</p>	<p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>白朮 枳殼 湯 治胎動腹痛或為胎漏</p>
--	---	--	--

凡遇此症最宜斟酌

時胎下血者。後斷三月。經也。所以血不止者。其藏不去。故也。當下其藏。桂枝茯苓丸止之。此丸在胎上故知是微也  
桂枝 茯苓 牡丹皮 桃仁 芍藥 各等分  
右五味末之。煉蜜丸。如兔屎大。每日食前服一丸。不知加至三丸。

本事方 治胎漏下血不止。

取桃樹上乾不落桃子。燒灰。和水服。○本草云。桃奴破血。又治伏梁氣積。

○右二方治瘕病破血之劑。

大千方 治妊娠忽然下黃汁中膠。或如豆汁等物。或胎動腹痛。

黃菁炒六兩 糯米五合

齊陰綱目 治瘕病 不審人煩燥 朱德堂

右以水七升。煎取二升。分爲四服。

銀芩酒 治妊娠下黃汁。或如赤豆。

芩根去黑皮 銀五兩或金

右用水酒各一大盞。煎服。

○右二方治漏下黃豆汁之症。

○煩躁即口乾

大全云。妊娠苦煩躁者。以四月受少陰君火氣。以養精。六月受少陽相火氣。以養氣。若母心驚膽寒。多有煩悶。名曰子煩也。產後云。夫妊娠而子煩者。是肺虛而熱乘於心。則令心煩也。停痰積飲。在心胸之間。或衝於心。亦令煩也。若熱而煩者。但熱而已。若有痰飲而煩者。嘔吐涎沫。惡聞食氣。煩躁不安也。大凡妊娠多人既停。

痰積飲。又寒熱相搏。氣機不舒。或煩躁。或嘔吐涎沫。則胎動不安。均爲子煩也。

薛氏曰。前証若因內熱。用竹葉湯。氣滯用紫蘇飲。痰滯用二陳白朮黃芩枳殼氣鬱用分氣飲。加川芎。脾虛用大君紫蘇山梔。其氣通於舌。若臍膈氣虛。榮衛不理。致陰陽隔絕。熱乘於心。脾津液枯少。故令心煩。而口乾也。與子煩大同小異。宜用知母丸。

薛氏曰。前証若因經實。火用竹葉石膏湯。若胃經虛熱。用入參黃耆散。若胃經氣虛。用補中益氣湯。若肺經虛熱。用紫蘇飲。若肝經火動。用加味逍遙散。若脾氣鬱結。用加味歸脾湯。若腎經火動。加味地黃丸。

齊陰綱目 治瘕病 不審人煩燥 朱德堂

竹葉湯 治妊娠心驚膽怯。終日煩悶。名曰子煩。

白茯苓 麥門冬 防風 黃芩 各二錢

右作一服。加竹葉十片。水煎服。無時。○一方有知母無黃芩。

一方有人參無黃芩。

知母飲 治妊娠心脾壅熱。咽膈渴苦。煩悶多驚。

知母 麥門冬 赤茯苓 各一錢半 黃芩 黃耆 各一錢

甘草 錢

右作一服。水二鍾。入桑白皮半錢。煎至一鍾。再入竹瀝。煎至半。同煎一二沸。服無時。

犀角散 治子煩。

犀角尖磨入 地骨皮 條芩 麥門冬 甘草 各一錢



赤茯苓 各二錢

右切作一服水二鍾煎八分入竹瀝一合溫服

當歸飲 治子煩

當歸二錢 川芎 阿膠珠 豆豉 桑寄生 各錢

葱白七

右剉水煎溫服

人參散 治妊娠熱乘心煩津液枯少頭暈乾渴

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 乾葛

黃芩 犀角 各錢五分 甘草 半兩

右剉每服三錢水煎服

竹茹湯 治妊娠煩躁不安

用淡青竹茹三兩水煎取一大升分四次服

治妊娠心煩熱不止

葱白 一握 豉 二合

右以水二大盞煎至一盞半去滓溫分三服

一母丸 治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得睡者氏謂

之子煩也醫者不知作虛煩治之損動胎氣宜矣

知母 二兩 為細末棗肉丸如彈子大每服一丸煎以參湯下

○心腹脹滿 即子煩

此證言然也 公飲所飲然 飲發動與氣相爭故令心腹脹滿也

心腹故以紫 蘇飲氣下 氣為主餘隨 症如城

薛氏曰前証若外感風寒內傷飲食用荳蔻王氣散若食陽脾

用六君子湯若陽氣壅滯胎上逼心用紫蘇飲

一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養胃湯加青皮山查枳殼

其脹益甚其胎上攻惡心不食右開脈浮大按之則弦此脾土不

起肝木所侮用六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益

氣升舉脾氣而瘥

一妊婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫胃氣等藥服之反吐

轉如脹滿寒心驗之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯

其論曰妊婦通身腫滿或心胸急服名曰胎水遂去妊婦胸前看

之胸肚不分悉以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消脹去方

得分曉死胎此証蓋因懷妊腹大不自知覺人人皆謂娠孕如此

終不知胎水之為患也

李氏曰子懸者心腹脹滿痛也妊孕四五個月以來相火養胎以

致胎熱氣逆寒心心腹脹滿疼痛宜紫蘇飲有鬱心腹脹滿甚者

加莢木及丁香少許不食者莢木湯倍白木加芍藥

火盛極一時心氣閉絕而死紫蘇飲連進救之

此証兩尺脈絕者有誤服動胎藥子死腹中則增寒手拍唇爪俱

青全以舌為証驗為歸湯救之

仲景云婦人懷妊六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹

如扇所以然者子藏寒故也當以附子湯溫其藏

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以上重如有水氣狀懷身七

月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便微利則愈

紫蘇飲 治胎氣不和。奏上心腹脹滿疼痛。謂之子懸。兼治臨產。

驚恐氣結連日不下。一方無川芎。各七寶散。

紫蘇葉二錢 大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮

當歸各一錢 人參 甘草各五分

右剉作一服。加生薑三片。葱白七寸。水煎服。

本事方云。曾有一婦。累日產不下。服通催生藥不驗。予曰。此必坐草太早。心懷一點懼氣。結而不行。然非不順也。素問云。恐則氣下。蓋恐則精神怯。怯則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。氣乃不行矣。得此藥一服。便產。及婦人六七月子懸者。用此數數有驗。不十服。胎便近下。

陳方甫治一婦。有孕七箇月。遠歸。忽然胎上衝心而痛。坐臥不安。兩醫治之無效。遂說胎已死也。用草麻子研爛和麝香調肚臍中以下之。命在垂危。召陳診視。兩尺脈絕。他脈平和。陳問二醫作何證治之。答曰。死胎也。陳曰。何以知之。曰。兩尺脈沉絕。以此知之。陳曰。此說出何經。二醫無答。陳曰。此子懸也。若是胎死。却有辨處。面赤舌青。子死母活。面青舌赤。吐沫。母死子活。唇口俱青。子母俱死。今面不赤。口不青。其子未死。是胎上逼心。宜以紫蘇飲治之。至十服而胎近下矣。

訶黎勒散 療妊娠心腹脹滿。氣衝胸膈煩悶。四肢少力。不思飲食。

訶黎勒 赤茯苓 前胡各一兩 陳皮 大腹皮 桑白皮各半 枳殼 川芎 白朮各半

右為粗末。每服四錢。薑三片。棗一枚。水煎服。

保胎和氣飲 專治胎前四五個月。身體困倦。氣急發熱。飲食無味。食胎頭暈等証。

枳殼四錢 厚朴 香附子各三錢 砂仁 蒼朮

橘紅各二錢 蘇葉一錢 甘草九分 小茴香一錢

右剉分作三服。每服用水一鍾。半煎七分服。

瘦胎飲 專治胎前五六個月。胎前困弱。體重食睡。食不知味。肚腹胎動。

當歸二錢 白芍藥 益母草 枳殼各四錢 砂仁

香附子 益智各三錢 甘草一錢

右剉分作三服。每服水一鍾。半煎至七分。空心溫服。

天德堂

枳殼湯 治婦人妊娠胎脹。

枳殼三錢 黃芩二兩 一方只用一兩

右為粗末。每服五錢。水煎服。○如腹滿。身體沉重。加白朮二兩。

葱白湯 治胎上逼心煩悶。又治胎動因驚。

用葱白二七莖。湯煮飲之。若胎未死。即安。已死。即出。未效再服。○葉全善云。此方神效。服後。消者宜之。本草云。葱白通陽氣。安胎。

一方 治胎動上逼心痛。

取艾葉如雞子大一團。以頭醋四升。煎至三升半。溫服。

倉公下氣湯 治心腹兩脇脹悶。飲食少思。四肢無力。

羌活 檳榔 青皮 大腹皮 赤芍藥

甘草 陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮

劉加生薑五片 棗一枚 水煎服

當歸湯 治胎動衝心煩悶欲死安胎止痛

當歸 川芎 人參 阿膠 甘草

連根葱白

右細剉以水二升煎四味至升半去渣下葱再煎減三合入阿膠溫服一劑分二三服

大聖散 治婦人怔忡睡中多驚腹脹坐臥不寧

白茯苓 川芎 黃芩 當歸 麥門冬

人參 甘草 木香

治妊娠遍身癢或衝心欲死不能飲食

白木 黃芩 芍藥

右用水六升煮取二升半分三服

一方 治妊娠心下滿氣急切痛

赤茯苓 桑白皮 前胡 郁李仁 檳榔

右為細末以水一升煮取一半去渣夜臥服

安胎和氣飲 治胎冷腹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子 白木 陳皮 高良薑

木香 白芍藥 陳米 甘草

右作一服生薑五片水煎服忌生冷之物

仲景附子湯 婦人懷妊六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒

者少腹如扇所以然者子臟寒故也當以此湯溫其臟

附子 白木 茯苓 芍藥 人參

右五味以水八升煮取三升去渣溫服一升日三服

心痛

大全云妊娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經為真心痛且發

夕必發旦必若傷心支絡則乍安乍作若傷於子藏則胎動而

薛氏曰前證若飲食所傷用平胃散加枳殼山查若因錯雜諸邪

當審其因而治之

一妊婦心痛煩熱作渴用白木散即愈後因停食其痛仍作胸腹

脹滿按之則痛此因飲食停滯用入參養胃湯按之不痛乃脾胃

受傷以六君子湯補之而愈

一妊婦心腹作痛胸脇作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山查

山梔青皮木香而愈又因怒仍痛胎動不食面色青黃肝脈弦紫

脾脈弦長此肝脈乘土用六君子湯加升麻柴胡木香而愈

火龍散 治妊娠心氣疼

川棟子 茴香 艾葉末

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

產寶丸 治妊娠心氣欲絕

川芎 當歸 茯苓 厚朴

右用水六升煎取二升分二服

<p>白木湯 治妊娠心腹痛欲死不可忍者</p> <p>白木<small>三兩</small> 赤芍藥<small>二兩</small> 黃芩<small>一兩</small></p> <p>石切以水六升煮取三升半分三服半日令盡微下生忌桃李雀肉等</p>	<p>千金方 療妊娠心痛</p> <p>青竹茹<small>一升</small> 羊脂<small>八兩</small> 白蜜<small>三兩</small></p> <p>右三味合煎每服棗核大三枚食前頓服日三服</p>	<p>一方 治妊娠忽然心痛絕欲死者謂之中惡</p> <p>生地黃<small>二兩</small> 枳殼<small>一兩</small> 木香<small>三分</small></p> <p>右剉酒煎服</p>	<p>一方</p> <p>青陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>橘皮<small>二兩</small> 豆豉<small>五兩</small></p> <p>右爲末以酒爲丸如桐子大溫水下二七丸無時服</p>	<p>雜方</p> <p>青竹茹一升酒三升煮取一升半去滓分溫服</p> <p>一方 破雞子一枚酒調服之</p> <p>一方 大麻子三升研水八升煮取五升分五服</p>	<p>補遺</p> <p>沉香降氣湯</p> <p>茯苓補心湯</p> <p>四七湯</p>	<p>紫蘇飲皆可用炮製論云心痛飲水惡黃連胡</p>
--	---	--	--	--	--	---------------------------

<p>○心腹痛</p> <p>大全云妊娠心腹痛者或由宿有冷疼或心膈風寒皆由虛而致動也邪正相擊而并於氣隨氣上下上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也妊娠而痛者邪正二氣交攻於內若不時差者其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮也又云妊娠心腹痛痛多是風寒濕冷痰飲與臟氣相擊故令腹痛攻衝不已則致胎動也</p>	<p>薛氏曰前証若風寒痰飲則金沸草散難痼瘕胎氣鬱結加香附川芎若飲食停滯用六神加紫蘇枳殼若怒動肝火前藥更加柴胡山梔若鬱結傷脾則前藥加枳殼白朮</p>	<p>一妊婦心腹作痛吐痰惡食胎氣上攻飲食少思此脾虛氣滯而爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p>	<p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p>	<p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p>	<p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p>	<p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 婦人 痛</p>
---	---	--	---	---	---	---

行作痛者不可用也

治初方中冬

用艾葉而此

則用白木者

蓋不治痛而

治不思飲食

也此在當歸

陳皮為君

右為細末每服二錢食前溫調服

阿膠散 治妊娠胎動腹中疝痛不思飲食

當歸 陳皮 白木 白茯苓 阿膠

川芎 各七錢半

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分服

一方 治妊娠患腹痛并胎動不安

當歸 川芎 阿膠 人參 厚朴 各二兩

葱白切一升

右咬咀以水七升煎至三升分三服○一方有甘草無厚朴川芎

芎

香義散 治妊娠五個月腹後常胸膈間氣刺痛滿或腸鳴嘔至

嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食失節之所致也蔡元度危

人有子夫人怒欲逐之遂病醫官王師復處此方三服而愈

廣中莪茂 丁香 粉草 各二錢

右為細末空心鹽湯點服一大錢覺胸中如物按下之狀

古今錄驗方 察妊娠腹內冷痛忽胎動

蓮白升 當歸切四兩

右以水五升煮取四升作三服

一方 治妊娠胎動欲落腹中痛不可忍

上等銀屑 茅根 各二斤

右以水九升煮銀屑取五升入茅根一升同煎茅根取三升分三服立安

婦人產後

胎方去其

於此藥

血熱虛虛

痛若此方

妙

一方 治妊娠痛腹

用生地黃三斤搗酒一升合煎減半頓服愈

一方 治妊娠四五箇月忽然腹痛

大棗 十四枚 鹽 一錢

右為末取一撮許酒調服即愈○一方單用棗十四枚燒存性

為末童子小便調下○一方單用鹽一斤燒令赤以兩指取一

撮酒調服

○腹痛 即子痛

仲景云婦人懷胎腹中諸疾病當歸芍藥散主之脈經曰婦人有

胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死令人摸之如覆杯者則

男如肘頭參差起者女也冷者何面冷者為死溫者為生

薛氏曰若腹中不時作痛或小腹重墜者胎動用地黃當歸湯未

應加參朮陳皮或因脾氣虛用四君子加歸地中氣虛用補中益

氣湯

地黃當歸湯 治婦人有孕胎痛

當歸 熟地黃 各二兩

右為末作一服水三升煎至一升去滓頓服○未效加入芍白

朮陳皮

加味四物湯 治血少胎痛

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 香附子 各等分

右為末每服三錢紫蘇湯調下

○小腹痛

妙在紫蘇湯

<p>大全云。妊娠小腹痛者。由胎絡虛風寒相搏痛甚亦令胎動也。 薛氏曰。前証若風寒所搏。用紫蘇飲。加生薑氣血虛用八珍湯。 氣虛用六君子湯。中氣虛用補中益氣湯。若腹脹痛。用安胎飲。加 升麻白朮不應。兼補中益氣湯。</p>	<p>一。妊婦小腹作痛。其胎不安。氣攻左右。或時逆上。小便不利。用小 柴胡湯。加青皮山梔。清肝火而愈。後因怒。小腹脹滿。小便不利。水 道重墜。胎仍不安。此亦肝木熾盛所致。用龍膽瀉肝湯。一劑諸証 頓愈。乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安。</p>	<p>療妊娠被驚。胎向下不安。小腹痛連腰。下血。</p>	<p>當歸 川芎 各八分 阿膠 炙 艾葉 各四分</p>	<p>茯苓 大棗 各二十</p>	<p>濟陰綱目 卷八 婦人 經水 痛 天德堂</p>	<p>右細切。以水四升。煮取三升。酒分三服。</p>	<p>補遺方 治妊娠小腹痛胎動不安。</p>	<p>川芎為細末。酒調下。一方用川芎當歸等分煎服。</p>	<p>○腰腹及背痛。</p>	<p>大全云。腎主腰足。因勞傷損動其經。虛則風冷。乘之故腰痛。冷氣 乘虛入腹。則腹脹。故令腰腹相引而痛。其痛不止。多動。屬氣婦人 腎以繫胞。妊娠而腰痛甚者。則胞墮也。</p>	<p>薛氏曰。前証若外邪所傷。用獨活寄生湯。勞傷元氣。用八珍湯。加 杜仲砂仁。阿膠。艾。脾腎不足。以前藥加白朮補骨脂。氣血虛。用 紫蘇飲。加桔梗枳殼。肝火所動。用小柴胡湯。加白朮。枳殼。山梔。肝 脾鬱結。用歸脾湯。加紫胡枳殼。</p>
--	---	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------	---	---

<p>一。妊婦頭項強直。腰脊作痛。此膀胱經風邪所致。用拔萃羌活湯。 一劑可愈。又用獨活寄生湯。及八珍湯。以祛邪固本而痊。</p>	<p>汪石山治一婦懷妊八月。背痛腰痛。不能轉側。大便燥結。醫用人 參等補劑。痛益加。用稍黃通利之藥。燥結雖行。而痛如故。汪診之。 脈稍洪。近。曰。血熱血滯也。宜用四物。加木香。乳沒。黃柏。火麻仁。 煎服四五貼。痛稍減。燥結潤。復加發熱而赤。或時惡寒。仍用前方。 去乳香沒藥。加柴胡黃芩。服二貼。而寒熱除。又背心悶。腹痛復 作。汪曰。血已利矣。可於前方。加人參一錢。服之而安。</p>	<p>通氣散 治妊娠腰痛。狀不可忍。此藥神效。</p>	<p>破故紙 香為末</p>	<p>右先嚼胡桃肉一個。爛後以溫酒調下。故紙末三錢。空心服。</p>	<p>濟陰綱目 卷八 婦人 經水 痛 天德堂</p>	<p>五加皮散 治妊娠腰痛。不可忍。或跨痛。先服此散。</p>	<p>杜仲 炒 五加皮 阿膠 炙 防風 狗脊</p>	<p>川芎 白芍藥 細辛 草薢 各三 杏仁 皮 去 炒</p>	<p>有咬咀。以水九升。煮取一升。去滓下膠。作三服。</p>	<p>五加皮丸 治妊娠腰痛。不可忍。者。服此丸。</p>	<p>續斷 杜仲 各二 黃芩 獨活 各三 五加皮</p>	<p>狗脊 草薢 芍藥 訶子 肉 各四</p>	<p>右為細末。煉蜜丸。如桐子大。每服四十九。空心酒下。日三服。</p>	<p>療胎動以致腰痛背痛。 杜仲 五加皮 當歸 芍藥 川芎 草薢 各等分</p>
--	---	-----------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

右為末每用三錢空心酒調下

源妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸<sub>各二</sub> 阿膠<sub>各二</sub> 甘草<sub>各二</sub> 葱白<sub>切二</sub>

右細切以水七升煮取三升去滓分溫三服

小品芋根湯 療損動胎腰痛去血胎動向下

生地黃<sub>各二</sub> 芋根<sub>各二</sub> 當歸<sub>各二</sub> 芍藥<sub>各二</sub> 阿膠<sub>各二</sub> 甘草<sub>各二</sub>

右細切以水六升煮取三升去滓內膠煎烱分溫三服忌海藻

藥

大地黃丸 治產前後腰痛一切血疼兼治血氣虛四肢不舉

骨髓熱

熟地黃<sub>各二</sub> 當歸<sub>各二</sub>

右為細末煉蜜丸如雞子大每服一丸空心白湯嚼下

紫酒 治妊娠腰痛如折亦治常入卒腰痛者

大黑豆二合炒令香熟酒一大盞煮取七分去豆空心頓服

雜方

治胎動腰痛搶心或下血取葱白不拘多少濃煎汁飲之

一方用鹿角長六寸燒令赤酒中淬再燒再淬以勿碎為度取酒

飲之鹿角為末服方寸七

一方用葛蒲汁酒一升服之

一方用艾葉一把如雞子大以酒四升煮取二升分爲二服

○胎水腫滿 即子腫子滿子氣

產寶論曰妊娠腫滿山崩氣本弱因妊重虛土不尅水血散於四

肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀陳無擇云凡婦人病有  
風寒冷濕妊娠喜脚腫俗呼為蠶脚亦有通身腫滿心腹急脹名  
曰胎水

論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若中風寒  
邪氣及有所觸犯則隨邪而生病也凡妊娠經血壅閉以養胎若  
忽然虛腫乃胎中挾水水血相搏脾胃惡濕身之肌肉濕漬氣弱  
則肌肉虛水氣流溢故令身腫滿也然其由有自或因泄瀉下痢  
臟腑虛滑耗損脾胃或因寒熱瘧疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆  
能使頭面或手足浮腫也然水漬于胞兒未成形則胎多損壞及  
臨產日脚微腫者乃胞藏水少血多水出於外故現微腫則易生  
也宿有寒氣因寒令所觸故能令腹脹滿腫也

濟陰綱目 卷八 胎水腫滿

天德堂

子氣者因于  
而胎氣阻  
土虛不能制  
水故一香酒  
散足以療之  
然不服藥亦  
無害

產乳集論曰妊娠自三月成胎之後兩足自脚而漸腫腿膝以來  
行步艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水出  
者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝任經有血  
風未可妄投湯藥亦恐大畏甚者慮將產之際費力有不測之憂  
故不可不治於未產之前也古方論中少有言者元豐中淮南陳  
景初名醫也獨有論治此証方名初謂之香附散李伯時名曰天  
仙藤散也

薛氏曰前証若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛  
弱佐以四君子若面目虛浮肢體如水氣用全生白朮散如未腫  
用六君子湯脾虛濕熱下部作腫用補中益氣如茯苓若飲食失  
宜嘔吐泄瀉用六君子湯若胎足發腫用補中益氣指縫出水用

<p>天仙藤散 治胃虛弱兼四君子湯如未應用補中益氣湯若脾肺氣滯用加味歸脾湯佐以加味逍遙散</p>	<p>白朮散 治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰子腫</p>	<p>白朮 二錢 茯苓 一錢 陳皮 生薑皮 大腹皮</p>	<p>桑白皮 錢一</p>	<p>右到水煎服或為細末每服三錢米飲調下○本方去白朮名五皮散 或加水香</p>	<p>木通散 治妊娠身體浮腫四肢脹急小便不利</p>	<p>木通 香薷 紫蘇莖葉 枳殼炒 檳榔</p>	<p>條芩 各五分 木香 訶子皮 各三分</p>	<p>右到加生薑三片水煎食前服</p>	<p>濟陰綱目 卷八 胎前產後 聖 天德堂</p>	<p>葶藶散 治妊娠遍身洪腫</p>	<p>葶藶子 兩 白朮 兩五 茯苓 桑白皮 郁李仁 各二兩</p>	<p>右為粗末水六升煎取二升分三服小便利即瘥</p>	<p>鯉魚治懷妊身腫及胎氣不安食又不安氣利小便</p>	<p>千金鯉魚湯 治妊娠腹脹滿或渾身浮腫小便赤澀</p>	<p>當歸 白芍藥 各一錢 白茯苓 一錢 白朮 二錢</p>	<p>橘紅 五分 鯉魚尾</p>	<p>右作一服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚用汁一盞牛八生薑三片煎至一盞空心服胎水即下如未盡腹悶未除再合一劑服之</p>	<p>一方</p>	<p>澤瀉 葶藶 各二兩 茯苓 枳殼 白朮 各六兩</p>
--	------------------------------	-------------------------------	---------------	---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------	---	-----------	-------------------------------

<p>右到以水六升煮取二升半分溫二服</p>	<p>防已湯 治妊娠脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利</p>	<p>防已 一錢 桑白皮 炒 紫蘇莖葉 赤茯苓 各二錢 木香 五分</p>	<p>右到一服加生薑四片水煎服○如大便不通加枳殼檳榔</p>	<p>子滿 治妊娠遍身浮腫上氣喘急大便不通小便赤澀謂之</p>	<p>澤瀉 桑白皮 炒 木通 枳殼炒 檳榔</p>	<p>赤茯苓 錢一</p>	<p>右到一服加生薑五片水煎服</p>	<p>天仙藤散 治妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫至腿膝行步艱難喘悶妨食狀似水氣甚至足指間有黃水出者謂之</p>	<p>濟陰綱目 卷八 胎前產後 聖 天德堂</p>	<p>子氣</p>	<p>天仙藤 各一兩 香附子 炒 陳皮 甘草 烏藥</p>	<p>本香 各五分 方作木瓜</p>	<p>以下三方不其相違但都李與白朮補潤不同黃芩與乾薑今藥不同而旋覆散結痰杏仁潤肺氣亦略相以惟在用者擇之</p>	<p>右到每服五錢加生薑三片紫蘇五葉水煎日三服腫消止瘥</p>	<p>產寶方 療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少</p>	<p>茯苓 兩 杏仁 檳榔 各三錢 旋覆花 郁李仁 各一兩</p>	<p>右為粗末以水六升煮取二升去滓分溫三服小便通即瘥</p>	<p>崔氏方 療妊娠身體腫有水氣心腹急痛</p>	<p>茯苓 白朮 各四兩 旋覆花 兩 杏仁 黃芩 各三兩</p>	<p>右細切以水七升煮取二升半分溫三服忌桃李雀肉酢物</p>	<p>腎著湯 治妊娠腰脚腫</p>
------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------	--	---------------------------	-----------	-------------------------------	--------------------	---	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------



茯苓 白朮各二錢 乾薑 甘草各一錢 杏仁半錢  
右以酒水煎服

子和方 治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴

諸等五兩為末以熱水調服方寸七服

腹哭鐘鳴

產寶方 治小兒在腹中哭及孕婦腹內鐘鳴

用空房下風穴中土一塊令孕婦嚙之即止或為末入麝香少許酒調下二錢立愈然麝香開竅當酌量用之

補遺方 治孕婦腹中兒哭

用黃連濃煎汁母常呷之即止

一法 小兒腹哭者蓋臍帶上疔瘡兒含口中因娘婦登高舉臂

清陰綱目

卷八 婦人經產

聖藥

天德堂

脫出兒口以此作聲令妊娠曲腰就地如拾物仍入兒口即止

積聚

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞帝曰願聞其故

岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

丹溪方 治血塊如盤有孕婦難服峻劑此方至之

香附子 醋炙

桃仁 去皮尖

海粉 醋炙

白朮 雨

右為末麵糊丸服

清陰綱目卷八終

濟陰綱目卷之九

關中 武之望叔卿父耆著

武林 張文鼎仲章

西陵 汪 淇懷漪子箋釋

天都 查 望子

胎前門下

傷食

大全曰經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味若妊子飲食不節生冷毒物恣性食噉致傷脾胃故妊娠傷食最難得藥惟木香丸白朮散二方最穩提

薛氏曰東垣先生云脾胃之氣壯則過時而不饑多食而不傷蓋胃主司納脾主消化五臟之本也然食倍而傷者乃脾氣虛而不化若投以峻劑則脾胃復傷而胎亦損矣當審其所以因而調治

之若飲食停滯或肚腹作痛用平胃散腹滿泄瀉用六君子湯若脾氣下陷用補中益氣湯此藥藥氣且戒藥餌節飲食經云損其脾者調其飲食適其寒溫大凡脾胃虛弱飲食難化以白朮陳皮為末等分陳麴粗末煎服最善根水丸但可暫用枳實峻厲能耗真氣治者慎之

一妊婦因停食服枳朮丸腹腹不利飲食益少更服消導寬胸之劑其胎下墜急謂此脾氣虛而不能承載也用補中益氣及六君子湯中氣漸健其胎漸安又用八珍湯加柴胡升麻調理而痊

平胃散 治妊娠飲食停滯或肚腹作痛

右到加生薑三片棗一枚水煎服

嘔吐惡心加枳殼砂仁

吞酸噯腐加黃連三分吳茱萸二分

六君子湯 治脾胃虛弱飲食難化或腹滿泄瀉

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 陳皮 各一錢

右判加生薑三片棗一枚水煎服

停滯肉食加山查

停滯麪食倍加麥蘖

停滯糯米食用白酒麪一味

停滯米飲倍加穀蘖

魚腥所傷倍加陳皮

傷辛熱之物加黃連

濟陰綱目 卷九 傷食

傷生冷之物加砂仁木香如不應更加肉豆蔻補骨脂再不應

用四神丸

木香丸 治妊娠脾胃虛弱飲食不消肚腹膨脹或嘔吐泄瀉

木香 二錢 三稜 人參 白茯苓 各三錢

右爲末麪糊丸如菜豆大每服三四十九熱水下

白朮散 治妊娠脾胃虛弱氣不調和飲食易傷

白朮 炒 紫蘇 各一錢 人參 白芷 各七錢

川芎 訶子皮 青皮 各半 甘草 錢半

右每服二錢加生薑三片水煎服

俗謂絞腸痧

大全云夫妊娠忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡蓋邪惡之氣中于胎而傷人也所以然者血氣自養而爲精神之主若血氣

不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠病此亦致損胎也

薛氏曰前證當調補正氣爲善用金銀藤一味煎湯飲之

當歸散 治妊娠中惡心腹病痛

溫行惡氣

當歸 丁香 川芎 各三錢 青橘皮 吳茱萸 各半兩 去梗湯

右爲細末溫酒調下一錢無時

又方 生乾地黃 一兩 枳殼 木香 各七錢 半

右爲細末每服一錢酒調下

又方 苦梗 一兩 細 生薑 半兩

水煎服之

散滯湯 治癰惡氣傷胎肚痛手不可近不思飲食

青皮 三錢 黃芩 芍藥 歸尾 各一錢 天德堂

川芎 一錢 木香 五分 甘草 少許

右分二貼水三盞先煮半根兩大片至二盞去滓根入煎藥同

煎至一盞熱服

補遺方 治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或

吐衄血者

用熟艾如拳大煮汁頻服

一方用鹽一盞水二盞調和服以冷水噴之吐出即安

一方用蠶心土爲末每二錢井水調服白湯亦可

傷寒

張氏曰凡妊娠傷寒六經治例自同但要安胎爲主凡藥中有犯

胎者則不可用也如薑香正氣散十味芎蘇散參蘇飲小柴胡湯

之類有半夏能犯胎如用須主之若痰多咽逆必用之以半夏極則可如無沸湯泡七次去皮臍生薑自然汗出乾乃可用也凡川烏附子天雄側子肉桂乾薑大黃芒硝羌花甘遂大戟蜀漆水蛭蠱蟲桃仁牡丹皮乾漆代赭石瞿麥牛膝等類之物皆動胎之藥凡用必須斟酌仔細之大抵妊娠傷寒合用湯劑必加黃芩白木二味能安胎也或與此二味煎湯與之或為細末白湯調下二三錢亦佳如妊娠素喜弱者藥中四物湯佐之不可缺也且如用小柴胡去半夏加白木合四物湯用之可以保胎除熱也其効如神餘皆倣此用之則妙矣

萬壽齋云妊娠傷寒專以清熱安胎為主或汗或下各宜隨其五臟表裏所見脈證主治勿犯胎氣故在表發汗以香蘇散為主半

汗下和三法  
萬壽齋云  
表半裏則和解之以黃龍湯為主在裏則下之以三黃解毒湯為主此吾家傳之秘活人甚多如古方六合湯雖分治詳明猶不及此切當古方六合湯自表虛四物湯至四物大黃湯共計十五方詳見第一卷調經門四物湯加減條下

白木散 治傷寒熱病先以此安胎但覺頭痛發熱便可服二三服即瘥若四肢厥逆陰證也不可用

白木 黃芩 各等分 煎 瓦上炒

右細切每三錢加生薑三片大棗一枚水煎服

安胎阿膠散 治妊娠傷寒時氣先服此以安胎却以主藥開服

阿膠 炙 白木 炒 桑寄生 人參 白茯苓 各等分

右為末每服一錢用糯米飲調下日三服

香蘇散 凡妊娠傷寒勿論日數但見惡寒頭疼此主之

香附 炒黑 紫蘇 各二錢 陳皮 一錢 甘草 五分

右到加生薑三片葱五根煎服

頭痛加川芎白芷各一錢名曰正香蘇散

假令得肝脈其外證善濕面青善怒其三部脈俱浮而弦惡寒裏和謂清便自調也本方加羌活防風各一錢謂肝主風是膽受病也

假令得心脈其外證面赤口乾善笑其三部俱浮而洪惡寒裏和本方加黃芩石膏各一錢半謂心主熱是小腸受病也

假令得脾脈其外證善噦善思尺寸俱浮而緩惡寒裏和本方加白木防己各一錢半謂脾主濕是陽明受病也

假令得肺脈其外證面白善嚏善悲不樂欲哭其尺寸脈俱浮而清惡寒裏和本方加黃芪防風各一錢謂肺主燥是大腸受病也

假令得腎脈其外證面黑善恐其尺寸脈俱浮而濡惡寒裏和本方加附子炮一錢謂腎主寒是膀胱經受病也

附子犯胎忌之 用吳茱萸湯之

羌活湯 河間云解利傷寒不問何經所受雖不能盡解亦無壞證九益妊娠

羌活 二錢 白木 一錢 防風 川芎 各一錢 黃芩 一錢 甘草 一錢 細辛 三分

右到水煎服無時如無汗去白木用蒼朮加紫蘇亦可

黃龍湯 妊娠傷寒得之三五日後有惡寒發熱內有煩渴引飲

黃連湯即小柴胡湯加黃連而此白芷在和解故主之其加減法更妙

小便赤澀之證此邪在半表半裏也宜此方主之

柴胡二錢 黃芩一錢 人參 甘草各一錢

右加薑棗水煎服

如寒熱往來無汗口乾加葛根二錢去薑入葱白三根

如頭疼不止加川芎白芷各一錢去薑加葱白三根

如發熱有汗口渴加白朮括黃根各一錢半

如脈浮大有力大熱大渴本方人參白朮湯去薑棗

如心煩不得臥加白茯苓麥門冬各一錢

如嘔噦加半夏製白茯苓各一錢去薑

如胸膈滿痛加枳殼炒香附子炒黑川芎各一錢

如大便秘初加大黃五分得利則止不利加一錢以利為度

清陰綱目

卷九

木

天德堂

三黃解毒湯 姪娘傷寒五六日後表邪悉罷並無頭疼惡寒之

證止煩躁發熱大渴小便赤大便秘或利下赤水六脈沉實此

症邪在裏也宜此方主之

黃芩 黃連 黃蘗 山梔 大黃各等

右剉水煎服更隨五臟脈證加減

假令傷肝脈其內證煩滿消渴溲便難尺寸脈沉弦有力是肝

經本臟受病也本方加當歸一錢半甘草五分倍山梔

假令得心脈其內證煩躁心痛掌中熱而噤尺寸脈沉數有力

是心經本臟受病也本方加麥門冬一錢竹茹一團倍黃連

假令得脾脈其內證腹脹滿泄瀉其脈沉緩有力是脾經本臟

受病也本方加枳實炒黃芩各一錢半倍大黃

傷風自汗如頭暈和惡寒此方用當歸

黃芪解肌湯 治姪娘傷風自汗

人參 黃芪 當歸 川芎 甘草各半兩 芍藥六錢

右咬咀每服八錢水煎服○加蒼朮生地黃亦可

桂枝芍藥當歸湯 治婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜此

方

桂枝 芍藥 當歸各兩

右剉細每服一兩水煎服

清陰綱目

卷九

七

天德堂

芍藥湯 治婦人姪娘傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉者太陰

病也宜此方

芍藥 白朮 茯苓 甘草各一兩

右剉每服一兩水煎服

加減當歸六黃湯 治姪娘傷寒發汗後汗漏不止胎氣弱者

當歸身 黃芩 生地黃 黃芩

白芷 阿膠珠 炙甘草各等

右用淨小麥一握煎湯去麥下藥五錢煎七分溫服

加味黃芩湯 治姪娘傷寒下後協熱而利不止胎氣損者

黃芩二錢 白芍藥 白朮 白茯苓

炙甘草 阿膠各一

此竹葉五  
湯法也以  
阿膠生地易  
知母石打炒  
甚

右用才一盞半煎一盞後入阿膠再煎八分服

加味竹葉湯 妊婦汗下後熱不除者虛也此方主之

人參 麥門冬 炙甘草 阿膠 生地黃 各一

右加竹葉十二片粳米一合煎服

黃龍四物湯 治妊婦傷寒產後發熱者宜此方

柴胡二錢 黃芩一錢 人參 甘草

當歸 川芎 芍藥 地黃 各一

右判水煎服○若因於食者本方加枳實

加減四物湯 治妊婦傷寒熱極發斑狀如錦紋者

當歸 白芍藥 生地黃 黃芩 各一

右判水煎服入錢水煎服

濟陰綱目 卷九 傷寒

梔子大青湯 治妊婦傷寒發斑變為黑色

升麻 黃芩 梔子 各二 大青 杏仁 各半

右咬咀每服五錢水一盞半細切葱白三寸煎服

一方 治妊婦傷寒發斑忽黑小便如血胎欲落

梔子 升麻 各四 青黛 二兩 生地黃 二十

石膏 八兩 葱白 切一 黃芩 三兩

右用水煎分三服忌熱物○又以井中泥塗心下乾則易

護胎法 治傷寒熱病護胎

用白藥子不拘多少為末以雞蛋清調攤於紙上加碗大貼

臍下胎存處乾則以濕水潤之

護胎法 治孕婦一切有熱內外諸證

伏龍肝為末用井底泥調敷心下令胎不傷

○中風

大全論曰天四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若從其

鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名為虛邪賊害萬物人體虛

則中之若風邪客於皮膚入於經絡即頑痺不仁若入於筋脈

寒則變急熱則懈弛則弛縱痿軟若入臟腑則恍惚驚悸片成臟

命皆在背臟腑虛寒邪皆從命而入隨所傷臟腑經絡而為諸病

妊婦中風若不早治則令墮胎也

薛氏曰按機要云風本為熱熱勝則風動宜以靜勝其燥是養血

也治法須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮雖有汗

下之戒而有中風中腑之分中腑者多著四肢則脈浮惡寒拘急

濟陰綱目 卷九 中風

不中中臟者多著九竅則唇緩失音耳聾目昏便秘中腑者

宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治在經當以大藥養之此中

風之要法妊婦患之亦當宜此施治而佐以安胎之藥

防風散 治妊婦中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢急強

防風 羌活 桑寄生 各一 羚羊角屑 細辛 各半

甘菊花 漢防己 皮秦芫 各一 桂心 茯神 各半

右咬咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至一大盞去滓入竹

蘆半合攪勻溫服無時

生犀角散 治妊婦卒中風不語四肢強直心神憤憤

生犀角屑 麻黃 各一 防風 各半 羌活 當歸

人參 各半 葛根 赤芍藥 各半 秦芫 甘草 各半 石黃 一兩

右咬咀每八錢煎服法如前

防已散 治妊娠中風口眼喎斜手足頑痺。

防已去皮 羌活 防風各去 麻黃去節 松木節

羚羊角一兩 桂心 荆芥穗 薏苡仁 桑寄生

甘草各一兩

右咬咀每服五錢生薑五片水煎溫服不拘時

白蠶蚕散 治妊娠中風口喎心膈痰涎壅滯言語不得四肢強直。

白蠶蚕炒 天麻 獨活去蘆各 麻黃去節 烏犀角屑七

白附子炮 半夏湯洗七 天南星炮 各半 龍腦二錢半

右爲細末入研藥合勻每服一錢生薑薄荷湯調下不拘時日

濟陰綱目 卷九 中風 十 天德堂

三服

赤箭丸 治妊娠中風手足不隨筋脈緩急言語蹇澀皮膚不仁。

赤箭 草薢酒浸 麻黃去節 獨活去蘆 鼠粘子

熟乾地黄 羚羊角一兩 阿膠炒 防風去蘆

芎藭 當歸去 薏苡仁 五加皮 秦艽去蘆

漢防已去皮 柏子仁 酸棗仁 丹參去蘆各 秦艽去蘆

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如桐子大每服三十丸豆淋

酒送下食前服

白木酒 治妊娠中風口喎語言不得。

白木一兩 獨活一兩 黑豆一合

右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口喎者拗口灌

之得汗即愈

治妊娠因感外風如中風狀不省人事。

熟艾三兩陳米醋炒 冷極熱以綿帛裹熨臍下良久即省。

風痺即子瀉

大全云妊娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相搏發則

口喎背強名之曰瘕又云瘕其候胃悶不識人須臾自醒良久復

作謂之風瘕一名子痲一名子冒甚則反張。

薛氏曰前證若心肝風熱用鉤藤湯肝脾血虛加味逍遙散肝脾

鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲肝火風熱鉤藤散脾鬱痰滯

二陳薑汁竹瀝苦兼證相雜當參照子煩門。

丹溪治一婦人懷妊六月發瘵手足揚直面紫黑色合眼涎出昏

濟陰綱目 卷九 中風 十一 天德堂

憤不省人事半時而醒醫與震靈丹五十餘貼其疾時作時止無

減證直至臨產方自愈產一女子母皆安次年其夫疑丹毒

必作求治之診其脈浮取弦重取澀按至骨則沉實帶數時正二

月因未見其痛發正狀未敢與藥意其舊年瘵發時乃五月欲待

其時度此疾必作當審證施治至五月半其疾果作皆是午已兩

時遂教以自製防風通聖散用甘草加桃仁多紅花少或服或嘔

至四五十劑疾漸疎而輕後發爲疥而愈。

羚羊角散 治妊娠冒悶角弓反張名曰子痲風瘕

羚羊角銹 獨活 酸棗仁炒 五加皮 薏苡仁炒 防風

當歸 川芎 茯神去木 杏仁各五 木香 甘草各二

右咬咀加生薑五片水煎服

葛根湯 療妊娠臨月因發風瘧忽悶憤不識人吐逆眩倒少醒復發名曰子痼

葛根 貝母<sub>去</sub> 牡丹皮 防風 防己 當歸

川芎 白茯苓 官桂 澤瀉 甘草<sub>各二兩</sub>

石膏<sub>碎</sub> 獨活 人參<sub>各三兩</sub>

右咬咀每服八錢水煎服。○貝母令人易產若未臨月者以升麻代之忌海藻松菜酢物。○此方犯桂與牡丹不如羚羊角散之安

芎活湯 治子痼兼用產後逐惡血下胞衣

川芎 羌活<sub>各等分</sub>

剉水煎入酒少許溫服

濟陰綱目 卷九 風濕 十二 天德堂

芎活酒 治妊娠中風痙口噤四肢強直角弓反張

芎活<sub>去</sub> 防風<sub>去</sub> 黑豆<sub>一合</sub>

右前二味咬咀好酒五斤浸一宿每服用黑豆一合炒令熟投入藥酒一大盞候沸即住去滓分兩服灌之

○痙癰

薛氏曰痙者筋脈急而縮也癰者筋脈緩而伸也一縮一伸手足相引搖擗不已與嬰兒發搐相似謂之痙癰也此證多屬風熱風

此風皆本內熱故立方亦皆從內

主搖動也緊能言云心主脈肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相熾則為痙癰也治法若因風熱用鈎藤湯加柴胡山梔黃芩白朮以平肝木降心火養氣血若風寒上涌加竹瀝白朮夏若風邪急搐加全蝎僵蚕麝香氣血用八珍湯加鈎藤山梔

主若無力抽搐戴眼反折汗出如珠者肝絕也皆不治一按抽搐肢不能伸服葛根湯煉血之劑通尿痰甚四肢抽搐余謂肝火血燥用八珍湯加炒黑黃芩為主佐以鈎藤湯而安後因怒而發復作小便下血寒熱少寐飲食少思用鈎藤散如山梔柴胡而血止用加味逍遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥鈎藤散飲食進而漸安

鈎藤湯 方見胎動不安

子瘕

大全云孕婦不語非病也間有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則以為醫之功豈其功也哉黃帝問曰人有重身九月而瘕此為何也岐伯對曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當奈何

○欬嗽

大全云夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則咳嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其嗽不已則傳於胎妊娠嗽久不已則傷胎也

薛氏曰前證若秋間風邪傷肺用金沸草散冬間寒邪傷肺用人參平肺散春間風邪傷肺用參蘇飲夏間暑邪傷肺用六君子湯歸桔梗若血虛四物加桑白皮杏仁桔梗腎火上炎用六味九加五味子煎服脾胃氣

傷肺用參蘇飲若脾肺氣虛用六君子湯歸桔梗若血虛四物加桑白皮杏仁桔梗腎火上炎用六味九加五味子煎服脾胃氣

虛風寒所傷用補中益氣加桑皮杏仁結梗蓋肺屬辛金生於巳土嗽久不愈者多因脾土虛而不能生肺氣以致肺理不密外邪復感或因肺氣虛不能生水以致陰火上炎所致治法當壯土金生腎水為善

一姪娠嗽則便自出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中益氣湯以培土金六味丸加五味以生腎水而愈

一姪婦嗽嗽其痰上湧日五六碗許諸藥不應予以為此水壯為痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數劑而安

一姪婦因怒致嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯加山梔枳殼白木茯苓治之而愈但欲作嘔此肝侮脾也用六君子加升麻柴胡而愈

濟陰綱目 卷九 咳嗽 十四 天德堂

桔梗散 治姪婦肺癰咳嗽急不食  
天門冬 去心 赤茯苓 各一錢 桑白皮 桔梗 紫蘇 各五分 麻黃 三分 貝母 人參 甘草 各二分 一方有杏仁無貝母

右到加生薑水煎服

馬兜鈴散 治姪娠氣壅塞咳嗽氣喘  
馬兜鈴 苦梗 人參 甘草 貝母 各五分 桑白皮 陳皮 去白 大腹 黑豆 水 紫蘇 各一錢 五味子 二分

一方有枳殼無人參貝母桑白皮三味

右到一服加生薑三片水煎服

百合散 治姪娠風寒咳嗽痰多喘滿  
百合 紫菀 貝母 去心 白芍藥 前胡

赤茯苓 桔梗 各一錢 甘草 各五分  
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾溫服

紫菀湯 治姪娠咳嗽不止胎動不安  
紫菀 天門冬 去心 各一兩 桔梗 牛蒡 杏仁

桑白皮 甘草 各半 一方有防風五分  
右咬咀每服三錢加竹茹一塊水煎去滓入蜜半匙再煎一二沸溫服

○喘急  
呂滄洲治經履哈散侍人病喘不得臥眾作肺氣受風邪治之居診之氣口盛於人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經因告之曰病蓋得之毒藥動血以致胎死不下奔迫而上衝非風寒作

濟陰綱目 卷九 咳嗽 十五 天德堂

喘也乃用催生湯加芎歸煮二三升服之夜半果下一死胎喘即止哈散審囑曰病妾誠有懷以室人見嫉故藥去之眾所不知也眾慚而去

平安散 治姪娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脹痛  
川芎 木香 各一錢 陳皮 熟地黃 各一錢 厚朴 製炒 甘草 各一錢

乾薑 生薑 厚朴 製炒 甘草 各一錢

右作一服水二鍾入燒鹽一捻煎至一鍾不拘時服

桔梗湯 馬兜鈴散 並見前

○吐血衄血咳唾血  
大全云姪娠吐血者皆由臟腑有傷凡憂思驚怒皆傷臟腑氣逆於上血隨而溢心悶胸滿久而不已心悶甚者死姪娠病此多墮



胎也

薛氏曰前證若肝經怒火先用小柴胡加山梔生地次用前藥合四物後用加味逍遙散肝經風熱防風子芩丸心經有熱朱砂安神丸心氣不足補心湯思慮傷心妙香散胃經有火犀角地黃湯胃梁積熱加味清胃散鬱結傷脾加味歸脾湯肺經有火黃芩清肺飲

河潤生地黃散 治吐血衄血咯血渴血下血諸見血無寒皆屬於熱但血家證皆宜服此藥

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮 天門冬

黃芪 白芍藥 黃芩 甘草各等分

右咬咀每服一兩水煎服○如脈微身涼惡風每兩加桂半錢

濟陰綱目 卷九 天德堂

○如下血加地榆

局方必勝散 治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔血咯血

熟地黃 小薊并根 人參 蒲黃微炒

當歸去芦 芎藭 烏梅肉各一兩

右件搗羅為籠末每服五錢水煎溫服

○瘧疾

大全云妊娠瘧乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛則熱陰盛則寒陰陽相勝寒熱作其發實者由風邪客於風府循衛而下衛氣至一日一夜常大會於風府故發日必其發早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內上注于伏衝之脈其行九日出缺盆其氣既上故發更早其間日發者風邪

內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作也妊娠而發多傷及肺

薛氏曰前證因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審察飲食停滯用六君子加桔梗蒼朮藿香外邪多而飲食少用藿香正氣散外邪少而飲食多用人參養胃湯勞傷元氣用補中益氣湯若鬱怒所傷用小柴胡兼歸脾湯若木侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥仍參三陰三陽經而治之七寶散治男婦一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩三發或連日發或間日發或三四日一發不問塊瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者並皆治之

濟陰綱目 卷九 天德堂

常山 厚朴薑製 青皮 陳皮一不去白

甘草炒 板榔 草果去殼各等分

右咬咀每服半兩於未發隔夜用水酒各一盞煎至一大盞去滓露一宿再用水酒煎亦露一宿來日當發之早溫溫而東

先服頭藥少頃再服藥渣大有神効

準繩曰嘗治一妊婦六七個月患瘧先寒後熱六脈浮緊醫用柴胡桂枝無効子曰此非常山不愈衆醫難之越數日疾甚乃

從子治以七寶散一服瘧黃帝問曰婦人重身毒之奈何岐伯曰有故無殞帝曰何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止誠審藥物之性明治瘧之方何疑政治哉人參養胃湯 治妊娠瘧疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心身

痛面色青白脉弦遲者。驅邪散治證亦同。

半夏 厚朴 製 橘紅 各八分 蒼朮 一錢 藿香葉

草果 茯苓 人參 各五分 甘草 三分

右加生薑七片烏梅一個水煎服。

清脾湯 治妊娠瘧疾寒少熱多或但熱不寒。口苦舌乾。大便秘澀。不進飲食。脉弦數者。

青皮 厚朴 製 白朮 炒 草果 茯苓

半夏 黃芩 柴胡 甘草 各五分

右加生薑水煎服。

驅邪散 治妊娠停食。感冷發為瘧疾。

高良薑 炒 白朮 草果仁 橘紅

濟陰綱目 卷九 瘧疾 十八 天德堂

藿香葉 縮砂仁 白茯苓 各一錢 甘草 五分

右咬咀作一服。加生薑五片。棗一枚。水煎服。

柴胡散 治妊娠瘧疾。

柴胡 二錢 生大黃 二錢 生黃芩 一錢 甘草 一錢

右作一服。水煎。臨發日。五更溫服。取利為度。

又方 常山 石膏 各一兩 黃芩 甘草 各半兩 烏梅 七個

右細切。以水酒各一碗。浸一宿。平旦煎至一碗。去滓。分二服。臨發時服。

發時服。

右二方犯常山大黃吐下之劑。若六脉浮緊有力。中有頑痰積熱者。用之。所謂有故無殞也。其他療治方法。已備雜證門。若熱甚。恐致動胎者。亦如傷寒熱病治方。以白藥子。伏龍肝等。全以清之。

臍上下可也。

霍亂

大全云。飲食過度。觸冒風冷。陰陽不和。清濁相干。則之霍亂。其間或先吐。或腹瀉。吐利。是困於熱也。若頭痛。體疼。發熱。是夾風邪也。若風折皮膚。則氣不宣通。而風熱上衝。為頭痛。若風入腸胃。則泄利。其則手足逆冷。此陽氣暴竭。謂之四逆。妊娠患之多致傷胎也。

薛氏曰。前證若因內傷飲食。外感風寒。用藿香正氣散。若因飲食停滯。用平胃散。若果脾胃頓傷。陽氣虛寒。手足逆冷者。須用溫補之劑。治當詳審。毋使動胎也。

萬密齋曰。霍亂者。陽明胃經之病名也。蓋因平日五味肥醲。積成痰。七情鬱結。氣盛為火。傳於胃中。乍因寒。熱之感。邪正交爭。陰陽相混。故令心腹絞痛。吐利並作。揮霍變亂。故名霍亂。如邪在上。則嘔。則常心而痛。其吐多。邪在下。則瀉。則常腹而痛。其利多。邪在中。則其腹中痛。吐利俱多。吐多則傷氣。利多則傷血。血氣受傷。不能護養其胎。况邪氣鼓擊。胎元母壽。未有不殞者矣。此危惡之證。不可不亟治也。宜香蘇散。加藿香葉主之。

濟陰綱目 卷九 霍亂 十九 天德堂

成痰。七情鬱結。氣盛為火。傳於胃中。乍因寒。熱之感。邪正交爭。陰陽相混。故令心腹絞痛。吐利並作。揮霍變亂。故名霍亂。如邪在上。則嘔。則常心而痛。其吐多。邪在下。則瀉。則常腹而痛。其利多。邪在中。則其腹中痛。吐利俱多。吐多則傷氣。利多則傷血。血氣受傷。不能護養其胎。况邪氣鼓擊。胎元母壽。未有不殞者矣。此危惡之證。不可不亟治也。宜香蘇散。加藿香葉主之。

香附 炒 紫蘇 各二錢 陳皮 一錢 甘草 又

藿香葉 縮砂 各五分

右剉水煎服。如轉筋。加木瓜一錢。胎動不安。加白朮一錢。半。如夏月得之。加黃芩一錢。半。黃連一錢。香薷二錢。如冬月得之。加人參白朮各一錢。乾薑炮五分。

此方平正可法

此方甚良

回生散 治中氣不和霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮 去白

藿香 各五

右為末水煎溫服

七味白朮散 治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

白朮

人參

茯苓

甘草 炙

木香

藿香 各半

乾葛 一兩

右為末沸湯調服二錢吐瀉甚者加生薑汁

理中湯 治妊娠霍亂腹瀉四肢逆冷汗出脈虛弱者

白朮

人參

乾薑 炮

甘草 炙 各一錢

右到水煎服○甚者加熟附子五分

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不入

人參

厚朴 薑炙

橘紅 各二錢

當歸 炙

天德堂

乾薑 炮

甘草 炙 各一錢

右作一服加生薑三片棗一枚水煎服

白朮散 治妊娠霍亂腹瀉吐利不止

白朮 炒

益智仁

枳殼 炒

橘紅 各七

草豆蔻 皮 長薑 炒 各半兩

右為散每服五錢入生薑半分水煎去滓溫服

木瓜煎 治妊娠霍亂吐瀉轉筋悶絕

吳茱萸 湯洗 七次

生薑 切 各七

木瓜 竹刀切 一兩半

右細到水二盞煎一盞二分去滓分三服熱服○一方有懷香

七錢 甘草 炙 加紫蘇煎右四方用乾薑黃連黃芩俱大

此方切忌酒

此方甚良

溫之劑若發熱煩渴脈數陽證者服之即死宜用後方

竹茹湯 益元散

桂苓甘露飲

冬麥子湯 並治霍亂

○泄瀉

大云云妊娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞泄水穀不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃熟艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脈沉緊數用戊己丸和之暖腐不食胃脈沉緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化如豆汁用胃風湯寒冷臍下陰冷洞泄用理中湯治中湯伏暑煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便便利用不換金正氣散胃苓湯此四證之大略也

薛氏曰泄瀉若米食所傷用六君加穀蘖麴食所傷用六君加麥

濟陰綱目 卷九 泄瀉

二十一

天德堂

藥肉食所傷用六君加山查若兼寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六君加柴胡生薑兼嘔吐腹瀉手足逆冷乃寒水侮土六君加薑桂不應用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉果若作嘔不食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑桂若瀉在五更更侵晨飲食少思乃脾胃虛弱五更服四神丸日間服白朮散如不應或愈而復作或飲食少思急用八味丸補命門火以生脾土為善進士王徵之內懷妊泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其夫憂之強進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強俟脾胃自和宿滯自化飲食自進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲投降火藥余曰若然則胃氣益傷也經云損其脾者調其飲食適其寒溫後不藥

果愈

胃苓湯 治脾濕太過胃氣不和腹痛泄瀉水穀不化。此平胃散與五苓散合方也。

蒼朮 厚朴 陳皮 白朮 茯苓

猪苓 澤瀉 各一錢 甘草 五分

右加生薑三片、棗二枚、水煎食遠服。

不換金正氣散 治姙婦傷濕泄瀉。

蒼朮 厚朴 陳皮 藿香 半夏 甘草 各五分

右加薑棗煎服。

胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃米穀不下泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血或下魚腦日夜無度。

濟陰綱目 卷九 天德堂

人參 白朮 茯苓 當歸

川芎 芍藥 肉桂 各等分

右剉每服八錢入粟米一握水煎服。如腹痛加木香。

加味理中湯 治姙娠泄瀉。

人參 白朮 白芍藥 白茯苓 乾薑 黃連

木香 藿香葉 訶子肉 肉豆蔻 甘草 各一錢

右剉水二鍾生薑三片大棗二枚煎一鍾飢時服。

加味治中湯 治飲食過多脾胃之氣不足以運化而瀉。

人參 白朮 乾薑 甘草 各一錢

陳皮 去白 青皮 各七 砂仁 五分

錢氏益黃散 治姙娠泄瀉嘔吐腹痛手足厥逆。

陳皮 青皮 訶子肉 各五錢 丁香 二錢 甘草 三錢

右爲末每服三錢水煎服。

草果散 治臍腹虛寒腹痛泄瀉無度。

厚朴 薑汁拌 肉豆蔻 十個 草豆蔻 十個 炒三兩 煨

右每服三錢加生薑煎服。

痢疾

大金云。姙娠飲食生冷脾胃不能消化致令心腹疼痛若血分病則色赤氣分病則色白血氣俱病則赤白相雜若熱乘大腸血虛受患則成血痢也。

薛氏曰。治痢之法當參前篇其下黃水乃脾土虧損黃氣下陷也。當升補中氣若黃而兼青乃肝木剋脾土宜平肝補脾若黃而兼

白乃子令母虛須補脾胃若黃而兼黑是水反侮土矣必溫補脾

胃若黃而兼赤乃心母益子但用補中益氣若腸胃虛弱風邪客之。用胃風湯或胎氣不安急補脾胃而自安矣。凡安胎之藥當臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類。

地官胡成甫之內姙娠久痢自用消導理氣之劑腹內重墜胎氣不安又用阿膠艾葉之類不應余曰腹重墜下元氣虛也胎動不安內熱盛也遂用補中益氣而安又用六君子湯全愈。

靈仙翁治湯總兵夫人姙娠病痢不止翁診其脈虛而滑兩關若瀉此由胎氣不和相火炎上而有熱似痢是非痢也乃用黃芩白

朮以安胎四物生地黃以調血數劑而安。

白朮湯一名三 治孕婦下痢腹痛。

<p>白朮 黃芩 當歸各等分</p> <p>右咬咀每服三錢至四錢水二盞煎至一盞去渣溫服日夜三次。嗽者加桑白皮食後服之。</p>	<p>當歸芍藥湯 治妊娠腹中疝痛下痢赤白。</p> <p>白芍藥 白茯苓 當歸 川芎</p> <p>澤瀉各五錢 白朮七分</p> <p>右爲細末溫酒或米飲任意調服。一丹無川芎有條芍甘草</p>	<p>黃連湯 治妊娠下痢赤白膿血不止。</p> <p>黃連 八分 厚朴 製 阿膠 當歸</p> <p>乾薑 各六分 黃芩 艾葉 各四分</p>	<p>濟陰綱目 卷九 痢疾</p> <p>右爲細末空心米飲調下方寸匕日三服。</p> <p>蒙黃連丸 治妊娠下痢赤白絞道腫痛冷熱皆可服。</p> <p>乾薑 炮 黃連 縮砂仁 炮 川芎</p> <p>阿膠 蛤粉 白朮 各一兩 乳香 二錢 枳殼 去白雙 炒半兩</p> <p>右爲末用烏梅三個取肉入少醋糊同杵丸如桐子大每服四十九白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草湯下。</p> <p>一方有木香二錢</p>	<p>三黃熟艾湯 治妊娠挾熱下痢。</p> <p>黃連 黃芩 黃蘗 熟艾 各等分</p> <p>右到每服五錢水煎服。嘔加橘皮生薑</p> <p>歸蓄湯 治妊娠下痢腹痛小便澀滯。</p>
---	--	---	--	--

<p>黃芩 當歸 炮各一兩 糯米 一合</p> <p>右細切分四服水煎服。</p>	<p>大軍散 治妊娠下痢赤白灰色泄瀉疼痛垂死者。</p> <p>黑豆 二十粒 甘草 二錢半生 栗殼 二個去頂 炙各半</p> <p>右爲籠索作一服加生薑三片水煎食前服神效。</p>	<p>厚朴散 治妊娠下痢黃水不絕。</p> <p>厚朴 薑汁 黃連 各三兩 肉豆蔻 五個連皮用</p> <p>右到水煎徐徐服。一方肉豆蔻止用一枚。</p>	<p>鴨蛋湯 治婦人胎前產後赤白痢。</p> <p>生薑 年少者百錢老者三鴨 一個打碎入百錢重取自然汁 鴨 一個打碎入</p> <p>右二味煎至八分入蒲黃三錢煎至五七沸空心溫服立効。</p> <p>濟陰綱目 卷九 痢疾</p>	<p>二黃散 治妊娠下赤白絞刺疼痛。</p> <p>鷄子 一枚烏雞者佳 黃丹 十錢入鷄子殼內同黃攪勻以傾出清留黃用 厚紙糊牢泥固濟火上銀乾</p> <p>右研爲細末每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女。</p> <p>大小便不通</p> <p>大全云妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不利大小腸俱熱則大小便俱不通更推其因而藥之。</p> <p>薛氏曰前證若大腸血燥用四物湯加條芩桃仁大腸氣滯用紫蘇飲加杏仁條芩腸胃氣虛用六君子加紫蘇杏仁肝脾熱用龍膽瀉肝湯心肝虛熱用加味逍遙散加車前子。</p>
---	--	---	---	---

亞卿李浦汀側室妊娠大小便不利或用降火理氣之劑元氣反  
虛肝脈弦急脾脈遲滯視其面色青黃不澤余曰此鬱怒所致也  
用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散而安  
主政王天成之內。妊娠痢疾愈後二便不通其家世醫自用清熱  
之劑未効余診其脈浮大而瀼此氣血虛也朝用八珍湯加桃仁  
杏仁夕用加味逍遙加車前子而痊

大腹皮散 治妊娠大小便不通

大腹皮 赤茯苓

枳殼麩炒各一兩 甘草炙

右爲細末每服二錢濃煎葱白湯調下○一方剉作散入郁李

仁去皮尖一錢半水煎空心連服以通爲度如不通必六腑熱

秘用枳殼炒一錢半大黃炮二錢甘草炙一錢研爲細末作三

濟陰綱目 卷九 大小便不通

天德堂

服濃煎葱白湯調下

當歸散 治妊娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘大便難小

便澀產門腫

當歸 五分

赤茯苓

枳殼麩炒

白芍藥

川芎各一錢

白薑炮

木香煨

粉草各三錢

右用薑水煎服○氣弱枳殼減半○大便秘如蜜同煎

一方 治妊娠小便不通腹脇痞悶不思飲食

大黃

木通

檳榔各一兩

枳殼麩炒七錢半

訶黎勒四個去核

大腹子三枚

右爲末用童便一盞葱白二寸煎六分調服二錢

一方 治妊娠風氣大便秘澀

枳殼麩炒

防風二兩

甘草炙一兩

右爲末每一二錢空心用白滾湯調服日三次

又方 車前子一兩

大黃半兩

右爲末每服三錢蜜湯調服

又方 治虛羸大便秘

枳殼製

阿膠炒各等分

研滑石末妙

右爲細末煉蜜和劑杵二三千下丸如桐子大別研滑石末爲

衣溫湯下二十九中日來未通再服三十九止於五十九

葵子湯 治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利安胎

除熱

葵子二升

滑石四兩

此利數除熱

濟陰綱目 卷九 大小便不通

天德堂

右以水五升煮取一升去渣盡服須臾當下便愈

又方 葵子一合

川朴硝一兩

朴硝非妊娠

右每服三錢水煎溫服

豬苓散 療妊娠小便澀痛兼治胎水

豬苓五兩

去皮爲末白湯調方寸七加至二七三夜二不澀宜

轉下之服後藥

甘遂散 療妊娠子淋大小便並不利氣急已服豬苓散不瘥宜

服此下之

用泰山赤皮甘遂二兩爲末以白蜜二合和服如豆大一粒

覺心下煩得微下者日一服下之後還服豬苓散不得下日

兩服漸加至半錢以微利爲度此藥太峻不可輕用

右陳良甫氏所錄諸方今並存之內甘遂枳實非至是危不得已而為之不可輕用其他亦宜審訂用之仍味薛氏之說而參之以雜病諸方庶無悞也

○小便不通 轉胞 遺尿

大全云妊娠小便不通為小腸有熱傳於胞而不通耳若兼心肺氣滯則多喘急陳無擇云妊娠胎滿逼胞多致小便不利若心腎氣虛清濁相干則為諸淋若胞系了戾小便不通名曰轉胞若胎滿尿出名曰遺尿

丹溪云轉胞病胎婦稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之古方皆用滑利疎導藥鮮有應効因思胞為胎所壓轉在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起懸在中央胞系得疎水道自行

濟陰綱目

卷九 大小便不通

二十八

天德堂

然胎之墜下必有其由一日吳宅龍人患此脉之兩手似滿重取則弦左手稍和予曰此得之憂患滿為血少氣多弦為有飲血少則胞弱而不能自舉氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就下故喜墜遂以四物湯加參朮半夏陳皮生甘草生薑空心飲隨以指探喉中吐出藥汁候少頃氣定又與一貼次日亦然如是八貼而安此法果為的確恐偶中耳後有數人歷歷有効未知果何如耶仲景云婦人本肌盛頭舉身滿今反羸瘦頭暈中空減胞系了戾亦致胞轉其義未詳必有能知之者一婦人四十一歲妊娠九個月轉胞小便不出三日矣下急脚腫不堪存活來告急予往視之見其形瘠脈之右澹而左稍和此胞食而氣傷胎系弱不能自舉而下墜壓着膀胱偏在一邊氣急為其所閉所以水穀不

能出也轉胞之病大率如此予遂製一方補血養氣血氣既旺胎系自舉則不下墜方有安之理遂作人參當歸身尾白芍藥白朮地黃炙甘草半生薑煎濃湯四貼任其自飲至次早又與四貼藥直作一貼煎令頓飲之探喉令吐出次藥湯小便立通皆黑水後就此方加大腹皮枳殼青蔥葉縮砂仁二十貼與之以防產前後之虛果得就蓐平安產後亦健一婦人妊娠七八個月患小便不通百醫不能利轉加急脹診其脈細弱予意其血氣虛弱不能承載其胎故胎重墜下壓住膀胱下口因此溺不得出若服補藥升扶胎起則自下藥力未至愈加急滿遂令一老婦用香油塗手自產門入托起其胎溺出如注服急頓解一面却以人參黃耆升麻大劑煮服少少有急滿仍用手托放取溺如此三日後胎漸起小便如故

濟陰綱目

卷九 小便不通

二十九

天德堂

薛氏曰前證亦有脾肺氣虛不能下輸膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦有金為火燥脾土濕熱甚而不利者更當詳審施治  
司徒李杏岡仲子室孕五月小便不利諸藥不應余曰非八味丸不能救不信別用分利之藥肚腹腫脹以致不起  
儒者王文遠室患此小腹腫脹幾至於殆用八味丸一服小便滴瀝再以前丸料加車前子一劑即利肚腹頓空而安  
仲景云問曰婦人病飲食如故煩熱不臥而反得倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主之  
即八味丸方見虛勞每以酒下十五丸至二十九日再服

冬葵子散 治孕婦轉胞小便不通及男子小便不通皆効

冬葵子 山梔子炒 滑石各半 木通三錢

右剉一劑水煎空心溫服外以冬葵子滑石梔子爲末田螺肉搗膏或葱汁調膏貼臍中立通

全生茯苓散 治妊娠小便不通

赤茯苓 冬葵子各等分

右咬咀每服五錢水煎空心服○濟生方加髮灰少許極効

葵榆湯 治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂

葵子研 榆白皮切各一兩

右水煎分三服

獨聖散 治妊娠小便不通

濟陰綱目 卷九 小便不通

蔓荊子爲末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

歸母苦參丸 治妊娠小便難飲食如故

當歸 貝母 苦參各四兩

右爲末煉蜜爲丸如小豆大每服三丸加至十丸○男子加滑

石半兩

雜方 治妊娠卒不得小便

杏仁去皮尖炒黃搗丸如萊豆大燈心湯吞七粒○一方搗

杏仁入滑石末飯丸小豆大每服二十丸白湯下○一方滑

石爲末水和塗臍下○一方車前子搗汁調滑石末塗臍周

圍四寸熱易之○一方紫苑爲丸并華水調下二錢○一方

桑螵蛸搗末米飯服方寸七日三

○子淋

大全云妊娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊娠胞繫於腎腎間虛熱而成斯證甚者心煩悶亂名曰子淋也

薛氏曰前證若小便澀少淋瀝用安榮散若腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數或不利用生地

黃茯苓牛膝黃蘗知母芍藥甘草若頻數而色黃用四物加黃蘗

知母五味麥門冬參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥門

若陰挺痿痺而頻數用地黃丸若熱結膀胱而不利用五淋散若

脾肺燥不能化生宜黃芩清肺飲若膀胱陰虛陽無所主用滋腎

丸若膀胱陽虛陰無所化用腎氣丸

萬蜜齋曰子淋之病須分二證一則妊母自病一則子爲母病然

濟陰綱目 卷九 子淋

妊母自病又分二證或服食辛熱因生內熱者或自汗自利津液

燥者其子爲母病亦分二證或胎氣熱壅者或胎形迫塞者證既

不同治亦有別也大抵熱則清之燥則潤之壅則通之塞則行之

此治之之法也

五淋散 治孕婦熱結膀胱小便淋瀝

赤芍藥

山梔子各二錢 赤茯苓二錢

當歸一錢 子苓六分 甘草五分

右水煎服

一方加生地黃澤瀉木通滑石車前子各等分

子淋散 治妊娠小便澀痛頻數

麥門冬去心 赤茯苓 大腹皮 木通



甘草 淡竹葉

右野水煎空心服。一方無甘草大腹皮二味。

安榮散 治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋。

麥門冬 去心 通草 滑石 人參

細辛 各二 當歸 酒浸 燈草 甘草 各半

右為細末每服二錢煎麥門冬湯調下。

一方無滑石燈心有車前偏蓄。

此方恐滑石太重而滑胎若臨月可用若六七個月已前宜斟酌之。

加味木通湯 治妊娠養太厚喜食炙煨酒麪辛熱之物以致

內熱小便赤澀作痛者。

濟陰綱目 卷九子淋 王二 天德堂

木通 生地黃 赤芍藥 條苓 甘草 稍分

右到加淡竹葉十二片水煎服。

生津湯 治妊娠婦膏病自汗或因下痢後小便短少不痛者此津

液不足也。

當歸 甘草 各五錢 麥門冬 去心 通草

滑石 各三 人參 細辛 各一

右為細末每服六七錢燈心煎湯空心調服。

冬葵子湯 治妊娠素淡滋味不嗜辛酸病小便赤澀而痛者此

胎熱也此方主之。

冬葵子 一兩 赤芍藥 條苓 各半 赤茯苓 車前子 各三

右為末每服二錢水煎調服不拘時。如小便不通恐是轉側。

錢氏能便血上行故轉

加髮灰少許極効。

大腹皮散 治妊娠八九月胎形肥碩小便短少小便澀重惡

寒起則暈眩欲倒此胎氣逼塞膀胱之氣不行也宜此方主之。

赤茯苓 三錢 大腹皮 枳殼 各一錢 甘草 各一錢

右為末每服一錢濃煎葱白湯下。

地膚子湯 治孕婦小便澀數名曰子淋。

地膚子 車前子 知母 黃芩 赤茯苓 白芍藥

枳殼 各一錢 升麻 通草 甘草 各三分

右切一劑水煎服。

地膚大黃湯 治妊娠子淋宜下。

大黃 炒 地膚草 各三 知母 黃芩 炒 猪苓 赤芍藥

濟陰綱目 卷九子淋 王二 天德堂

通草 升麻 枳殼 甘草 各二

右到每服四五錢水煎服。

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食。

瞿麥穗 赤茯苓 桑白皮 木通 葵子 各一

黃芩 芍藥 枳殼 車前子 各半

右到每服四錢水煎服。

忘憂散 治妊娠心經蘊熱小便赤澀淋瀝作痛。

琥珀 不拘 萱草根 一握

右琥珀為細末每服五分濃煎萱草根調服。

補遺方 治胎前諸般淋瀝小便不通。

檳榔 赤芍藥 各分

右判每服五錢水煎溫服其效

一方治子淋小便數出或熱或痛及子煩

地膚草四兩以水四升煮取二升半分三服或新取地膚草搗取自然汁服亦可不獨治子淋凡小便淋閉服之無不効

雜方 治妊娠子淋

葵子一升以水三升煮取二升分再服一方葵根一把以水三升煮取二升分再服一方葵子七合為末水和服方寸七日三一方猪苓為末白湯調方寸七加至二七

遺尿

薛氏曰若脬中有熱宜用加味逍遙散若脾肺氣虛宜用補中益氣湯加益智若肝腎陰虛宜用六味丸

淋瀝編目

卷九 遺尿

王

天德堂

一妊婦遺尿內熱肝脈洪數按之微弱或兩太陽作痛脇肋作脹余以為肝火血虛用加味逍遙散六味地黃丸尋愈後又寒熱或發熱或悲怒前證仍作用八珍散逍遙散兼以清肝火養肝血而痊

白薇散 治妊娠尿出不知

白薇

白芍藥 各等分

右為末每服三錢食前溫酒調服

桑螵蛸散 治妊娠小便不禁

桑螵蛸 炙黃二枚

右為末每服二錢空心米飲調下

一方 白礬 牡蠣

右為末每服二錢酒調下

一方益智為末米飲下亦効

○尿血

按尿血之入皆從勞心動火中來  
大全云妊婦勞傷經絡有熱在內熱乘於血血得熱則流溢入子脬故令尿血也

薛氏曰前證因怒動火者宜小柴胡湯加山梔因勞動火者宜補中益氣湯因厚味積熱宜清胃散  
雜病 諸門 加犀角連翹甘草因肝經血熱宜加味逍遙散

一妊婦因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸乳間作脹飲食少用肝脈弦弱此肝經血虛而熱也用加味逍遙散六味地黃丸兼服漸愈又用八珍湯加柴胡丹皮山梔而痊

續斷湯 治妊娠下血及尿血

濟陰編目

卷九 尿血

王

天德堂

當歸 生地黃 各一兩

續斷 半兩

赤芍藥 二錢

右為末每服二錢空心米飲調下

一方 治妊娠尿血

阿膠

熟地黃 各等分

右為末空心粥飲調下二錢

蠶絲湯 治妊娠小便尿血

生薑 七片

蜜 半盞

白茅根 一握

右入水煎服

加減五苓散

本方去桂加阿膠炒同為末每服四錢用車前子白茅根濃煎溫服

雜方 用葵子一升研細水五升煮三升分溫三服

止血之劑

一 方用生艾一觔酒五升煮三升分三服。  
 一 方用生地黃一觔酒四升煮二升分三服。  
 一 方猪苓為末白湯調下一匙日三。  
 一 方白茅根燒着湯吞酒蒸黃連丸。  
 一 方治無故尿血。  
 龍骨一兩 蒲黃半兩

右為末每服二錢酒調日三服

○眼目

一 婦將臨月忽然兩目失明不見燈火頭痛眩暈頭眩不能轉頭諸治不瘳反加危困備得消風散服之病減七分獲安分娩其眼吊起人物不辨乃以四物湯加荆芥防風更服眼科天門冬濟陰綱目

不卷九眼目

天德堂

飲子二方間服目漸稍明大忌酒麪煎炙雞羊鷄鴨豆腐辛辣熱物并房勞此證因懷妊多居火間衣着太煖伏熱在內或酒麪炙燂太過以致胎熱也

天門冬飲子 治妊娠肝經風熱上攻眼目帶吊失明

天門冬 去心 知母 羌藟子 五味子  
 防風 去芦 茯苓 去皮 川羌活 去芦 人參 各一

右作一服水三鍾生薑三片煎至一鍾食後服

○脾燥悲傷

仲景云婦人脾燥悲傷欲哭象如神靈所作數人伸甘麥大棗湯主之

許學士云鄉里有一婦人數次無故悲泣不止或謂之有祟祈禳

惡鬼不愈矣

請禱備至終不應予忽憶金匱有一證云婦人脾燥悲傷欲哭象如神靈數人伸者且甘麥大棗湯予急令治藥盡劑而愈古人誠病制方種種絕妙如此

薛氏曰前證或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察

一 妊婦無故口悲用大棗湯二劑而愈後復患又用前湯佐以四君子加山梔而安

一 妊婦悲哀煩躁其夫謂之云我無故但自欲悲耳用淡竹茹湯為主佐以八珍湯而安

甘麥大棗湯 治婦人臟燥悲傷不止

甘草 三兩 小麥 一升 大棗 十枚

右以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

濟陰綱目 不卷九臟燥悲傷

天德堂

淡竹茹湯 治妊婦心虛驚悸臟燥悲傷不止又治虛煩甚効

麥門冬 去心 小麥 半夏 湯泡各 人參  
 白茯苓 各 甘草 五分

右作一服加生薑五片棗一枚淡竹茹一團如指太水煎服

一方 治胎臟燥悲哭及自笑自哭

用紅棗燒存性米飲調下

○妊病下胎

大全云妊婦羸瘦或疾疾病臟腑虛損氣血枯竭不能養胎致胎動而不堅固若終不能安者則可下之免害妊婦也

薛氏曰前證宜用腰腹背痛門方論主治其胎果不能安者方可議下慎之慎之

此藥能破血  
壯思之

此藥能破血  
壯思之

大中丞許慎微公向令金壇時夫人胎漏療治不止時延於上計  
公欲因其勢遂下之謀於余余謂令服佛手散以為可安即安不  
可安即下順其自然而已既數服公疑不決女科醫者檢方以  
進乃用牛膝一兩酒煎服謂牛膝固補下部藥耳用之何害公遂  
信而服之而胎果下余時有從母之戚未及知此知而馳至則聞  
盈庭皆桂麝氣蓋因胞衣未下女醫又進香桂散矣血遂暴下如  
大河決不可復止亟煎獨參湯未成而卒公哀傷甫定而余謂  
且諭余曰牛膝補藥而能墮胎何也余對曰生則宜而熟則補故  
破血之與填精如箭鋒相拄豈獨牛膝哉鹿角亦墮胎破血而煎  
為白膠則安胎止血因其熱而信其生此之謂處工公嗟恨無已  
余故特著之以為世戒

濟陰綱目 卷九 妊娠下胎 天德堂

桂心散 治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心 瓜蒌 牛膝 藟麥各五 當歸一錢

右剉水煎服

一方 單用牛膝一兩酒一鍾煎七分作二服

千金神造湯 婦人脈陰陽俱盛名曰雙驅若少陰微緊者血即  
凝濁經養不周胎即偏天其一獨生其一獨死不去其死害母  
失胎此方主之

蟹瓜一升 阿膠三兩 甘草二兩

右剉取東流水一斗先煮蟹瓜甘草至三升去滓下膠令烺頓  
服之不能分再服

下胎方 治難母因疾病胎不能安可下之

法用破散

取七月七日法麝香大盆四兩水二大盆煎取一盞三分  
去滓分溫三服立下

又方大麝五升清酒一斗煮二沸去滓分五服隔宿勿食但再服  
其子如糜母無疾苦千金不傳妙方

又方麥蘖一升為末和水煮二升服之即下神妙

又方附子二枚為末以淳苦酒和塗手足去之大良

又方取雞子一枚以三指攪置放雞子中服之立出

按陳良甫所列有牛膝湯桂心散諸方要全善皆不之取而獨取  
此數方其見卓矣

○防胎自墮

丹溪云陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞  
濟陰綱目 卷九 防胎自墮 天德堂

怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因熱火消物造化自然  
病源乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病情者也予見賈氏婦但  
有孕至三月左右必墮診其脈左手大而無力重取則滑知其血  
少也以其妙年只補中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯  
下黃芩末一錢服三四帖遂得保全其生因而思之墮因內熱  
而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正屬相火所  
以易墮不然何以黃芩熱艾阿膠等為安胎妙藥即好生之工幸  
無輕視

一婦年三十餘或經住或成形未具其胎必墮察其性多怒色  
黑氣是此相火太盛不能生氣化胎反食氣傷精故也因令住經  
第二月用黃芩白朮當歸甘草服至三月盡止藥後生一子

一婦住經三月後尺脈或滑或微弱其婦却無病知是子宮虛氣不全故陽不施陰不化精血雖凝終不成形至產血塊或產血胞一婦腹漸大如懷子至十月求易產藥察其神色其面雖與之藥不數日生白蟲半桶蓋由婦之元氣太虛精血雖凝不能成胎而為穢腐竊積之久濕化為熱濕熱生蟲理之所有亦須周十月之氣發動而產終非佳兆其婦不及一月而死濕熱生蟲譬之溝渠汚濁積久不流則諸蟲生於其間矣

汪石山治一婦長瘦色黃白性躁急年三十餘常思墮胎已七八見矣診其脈皆柔軟無力兩尺雖浮而弱不任尋按曰此因胎墮太多氣血耗其胎無滋養故頻墮譬之水涸而未枯土削而未倒也兄三月五月正屬少陽火動之時加以性躁而急發之故墮多

濟陰綱目 卷九 胎前自聖 四十 天德堂

在三五七月也宜大補陰湯去桂加黃蘗黃芩前服仍用研末蜜丸服之庶可保生服半年胎固而生二子

錢仲陽治一孕婦病醫言胎且墮錢曰婦首五臟傳養率六旬乃更候其月偏補之何必墮已而母子皆全

陳斗崑治一婦有胎四月墮下逾旬腹腫發熱氣喘脈洪盛面赤口鼻舌青黑陳診之曰脈洪盛者胎未墮也面赤心火盛而血乾也舌青口鼻黑肝既絕而胎死矣內外皆曰胎墮久矣復診色脈如前以蛇脫煎湯下平胃散加芒硝歸尾一倍服之須臾腹鳴如雷腰腹陣痛復一死胎隨下病亦愈

程仁甫治一婦年近四十稟氣素弱自去其胎五日內漸漸腹脹如鼓至心前上吐不能食周補藥不効診六脈微弱但只叫脹死

此乃損傷氣而作脹然急則治標若泥丹藥恐緩不及事用桃仁承氣加枳實厚朴倍硝黃煎服四分吐去其一。次早仍不通事急又服琥珀丸三錢至申時大通脹減但体倦四肢無力口不知味發熱再用參芪歸芍查木陳皮八劑而安

江應宿治汪錫壽三十五歲厥產誤服打胎藥下血如崩旬餘腹痛一陣即行或時真痛諸藥不効診得六脈數而微弦乃厥陰之火逆投四物換生地黃加阿膠炒黑山梔蒲黃一劑愈

薛氏云大抵治法須審某月屬某經育養而藥之

芎藭補中湯 治懷妊血氣虛弱不能衛養以致數月而墮名曰半產而損應得服此遂安全

芎藭 五味子 阿膠 乾薑 炮名 黃耆 去毒 當歸 浸

濟陰綱目 卷九 胎前自聖 四十 天德堂

白芍藥 白朮 錢半 人參 杜仲 去皮 木香 不見 甘草 五分

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

阿膠湯 治妊娠數墮胎小腹疼痛不可忍

阿膠 炙燥 熟地黃 焙 艾葉 炒 芎藭

當歸 切焙 杜仲 去粗皮 白朮 各一

右咬咀每服四錢桑三般水煎食前溫服

千金保胎丸 凡女人受孕經三月而胎墮者雖氣血不足乃中

衝脈有傷中衝脈即陽明胃經供應胎孕至此時必須節飲食

絕慾戒怒庶免小產之患服此可以保全

白朮 土炒 熟地黃 薑汁 杜仲 各四兩 當歸 酒洗 續斷 酒洗

阿膠 炒 香附米 同製 益母草 條苓 炒各 陳皮

此方極穩當

川芎 艾葉醋炙各一兩 砂仁炒五錢

右為細末煮棗肉為丸如桐子大每服百丸空心米湯下

杜仲丸 治妊娠三兩個月胎動不安防其欲墮宜預服之

杜仲去粗皮薑汁炒去絲

右為末棗肉杵丸桐子大每服七十丸米飲下

刪繁方 治妊娠懷胎數落而不結是或冷或熱百病之源

黃耆 人參 白朮 甘草 川芎

地黃 吳茱萸各等分一方有當歸乾薑

右為末空心溫酒調下二錢忌菘菜桃李雀肉醋物

婁氏曰按丹溪論俱是虛熱而無寒者今姑存此一方以俟施之於千百而一者也

○胎墮後為半產

天德堂

夫妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由妊婦衝任氣虛不能滋養於胎胎氣不固或擲撲閃墜致氣血損動或因熱病溫瘧之類皆令半產仲景謂寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下是也

又云半產俗呼小產或三四月或五六月皆為半產以男女成形故也或因憂恐悲哀暴怒或因勞力打撲損動或觸冒暑熱忌忌神散惡犯熱藥轉生他疾宜玉燭散和經湯之類便產須知云小產不可輕視將養十倍於正產可也又云半產即肌肉腐爛補其虛損生其肌肉益其氣血去其風邪其氣將養過於正產十倍無不平復宜審之

消氏曰小產重於大產蓋大產如粟熟自脫小產有如生採破其皮發傷其根蒂也但人輕忽致死者多治法宜補形氣生新血去瘀血若未足月痛而欲產者歸補中湯倍加知母止之若產而血不止人參黃芪湯補之若產而心腹痛當歸川芎湯主之胎氣弱而小產者參珍湯固之若產出過多而發熱者聖愈湯汗不止急用獨參湯發熱煩躁肉爛筋惕八珍湯大渴而赤脈洪而虛當歸補血湯身熱面赤脈沉而微四君加薑附東垣滋養發熱而夜安靜是陽氣自旺於陽分也晝安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰分也如晝夜俱發熱者是重陽無陰也當峻補其陰王太僕云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏發熱止時節而動是無水也如太熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止條忽

濟陰綱目 卷九 胎前自墮 四三 天德堂

往來時動時止是無水也若陽氣自旺者四物二連湯陽氣陷於陰者補中益氣湯重陽無陰者四物湯無火者八味丸無水者六味丸

一妊婦五月服煎紅丸墮胎腹中脹痛服破血藥甚手按之愈痛余曰此峻藥重傷脾胃受患用八珍倍參耆加半夏乳沒二劑痛止數劑全愈

史仲子室年甫二十因夜胎墮時咳服清肺解表喘急不寐請視余曰脾土虛不能生肺金藥重損之與補中益氣加茯苓半夏五味炮薑四劑漸愈再往視又與八珍加五味及十全大補湯而全愈

東垣云婦人分娩及半產漏下昏冒不省腹目無所知此蓋因血

暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其肺瞑目不省人事是陰血暴去不能鎮撫也血以虧損往往用滑石甘草芍藥之類乃甘辛大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷反為不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之幸而不死暴瀉氣血必天年又不知內經有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈見禁川寒涼藥也分婉半產本氣不病是暴去其血亡血補血又何疑焉補其血則神自安常時血下降亡今當補而升舉之心得血養而神不昏矣血若暴下是秋冬之

濟陰綱目 卷九 胎前白帶 四四 天德堂 令太旺令舉而升之助其陽則目張神不昏矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足也名全生活血湯生後諸症更於產後方論中下用之

人參湯 治半產後血下過多心驚體顫頭目運轉或寒或熱臍腹虛脹疼痛

人參 麥門冬 生乾地黃 當歸 芍藥 黃耆 白茯苓 甘草 右咬咀每服三錢水一盞煎七分食前溫服

人參黃耆湯 治小產氣虛血下不止 白芍藥 艾葉 阿膠

別錄謂人參能治心腹諸痛此用之甚虛痛也若受病則不宜矣 脾統血氣散血此方最妙

石作一劑水煎服 龍骨散 療因損娠下惡血不止 此重在龍骨不止故用之

龍骨 當歸 地黃 芍藥 地榆 乾薑 阿膠 艾葉 蒲黃 牛角 右為細末食前用米飲調下二錢

全生活血湯 治婦人分婉及半產漏下昏冒不省瞑目無所覺此因血暴亡心神無所養也用此補血升陽

升麻 白芍藥 防風 甘草 獨活 熟地黃 蔓荊子 細辛 石咬咀每服五錢煎至一盞去滓食前稍熱服

濟陰綱目 卷九 胎前白帶 四五 天德堂 ○已上治血下過多之劑

生地黃湯 治妊娠胎氣損動氣血不調或癰撲閃墜以致胎墮墮後惡露不盡腹中疼痛

生乾地黃 大黃 芍藥 白茯苓 當歸 細辛 黃芩 甘草 桂 右咬咀每服五錢水一盞半入生薑大棗拍碎同煎至一盞去滓不拘時溫服

當歸酒 治妊娠胎後血不出 當歸 芍藥 右咬咀每服三錢無灰酒一盞入生地黃汁合銀器內慢火煎至七分去滓溫服以惡血下為度

當歸酒 治妊娠胎後血不出 當歸 芍藥 右咬咀每服三錢無灰酒一盞入生地黃汁合銀器內慢火煎至七分去滓溫服以惡血下為度

當歸酒 治妊娠胎後血不出 當歸 芍藥 右咬咀每服三錢無灰酒一盞入生地黃汁合銀器內慢火煎至七分去滓溫服以惡血下為度

當歸酒 治妊娠胎後血不出 當歸 芍藥 右咬咀每服三錢無灰酒一盞入生地黃汁合銀器內慢火煎至七分去滓溫服以惡血下為度

當歸酒 治妊娠胎後血不出 當歸 芍藥 右咬咀每服三錢無灰酒一盞入生地黃汁合銀器內慢火煎至七分去滓溫服以惡血下為度

此不收藥  
入肝有血矣

烏金散 治妊娠墮胎後血不下兼治諸疾血病

好墨二兩折二寸挺子燒通赤用好醋一升  
煎七通又再燒通赤放冷另研為末

沒藥 研 麒麟竭 各二錢 麝香 一錢  
右為細末每服溫酒調下一錢七如血迷心用童便加酒調下  
二錢七

紅藍花散 治墮胎後血不出奔心悶絕不識人

紅藍花 微炒 男子髮燒存 京墨 燒紅 血竭 研  
右為細末以童便小半盞調二錢服之立効

白蜜酒 治墮胎後惡血不出

白蜜 二兩 生地黃 取汁 酒半盞  
右汁與酒共入銅器中煎五七沸入蜜攪勻分兩服服三劑百

瘰癧癰疽 瘰癧丸 治瘰癧後為牛瘰

瘰癧丸 治瘰癧後為牛瘰 早木 天德堂

病可愈

○已上治惡血不出之劑

當歸湯 治雄媛墮胎胞衣不出

當歸 切 牛膝 酒浸各 木通 研各  
冬葵子 炒 三 羅麥穗 一兩 滑石 二兩

右咬咀每服三錢水煎服未下再服以下為度

地黃湯 治胞衣不出

蒲黃 炒 生薑 切炒各 生地黃 半兩以銅  
右以無灰酒三盞於銀器內同煎至二盞去滓分三服未下再

作服

澤蘭湯 治胞衣不出

一方一變  
似化工

澤蘭湯 治胞衣不下  
右以水三盞先煎澤蘭至一盞半去滓入滑石末並油煎更煎  
沸頓服之未下更服

蒲黃酒 治胞衣不下

蒲黃 炒 槐子 十四枚  
右以酒三盞煎至二盞去滓分溫三服未下更服

○已上治胎衣不下之劑

當歸川芎湯 治小產後瘀血心腹痛或發熱惡寒

當歸 川芎 熟地黃 白芍藥 玄胡索 炒 紅花  
香附 陳皮 澤蘭 牡丹皮 桃仁 各等

右水煎入童便酒各小半盞服

瘰癧癰疽 瘰癧丸 治瘰癧後為牛瘰

若以手按腹愈痛此瘀血為患宜此藥或失笑散消之若按之  
不痛此是血虛宜四物參苓白朮

既曰冬痛則為血虛

當歸湯 治墮胎心腹冷痛

當歸 芍藥 白朮 阿膠 炒令  
甘草 炙 各 一方無白朮有人參

右咀每服三錢入艾葉糯米生薑同煎食前服

當歸散 治產後氣血虛弱惡露內停增寒發熱

當歸 白芍藥 炒 川芎 黃芩 炒各 白朮 五錢  
右為細末溫童便調下二錢

當歸補血湯 治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不眠脈滑

大而虛重按全無此脈虛血虛也若誤服白虎湯必死



此東垣方也病真虛者一服如神

此河間方也二味非寒熱心火不用

當歸 三錢

黃耆 一兩

右作一服水煎服

四物二連湯 治血虛發熱或口舌生瘡或發夜熱

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 胡黃連 宣黃連 各一錢

右作一服水煎服

○胎不長

大全云妊娠不長者因面宿疾或因失調以致臟腑衰損氣血虛弱而胎不長也當治其疾益其氣血則胎自長矣

薛氏曰前證更當察其經絡密其所因而治之

一妊婦胎六月體倦懶食面黃肺熱而胎不長因勞欲墮此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓二十餘劑脾胃漸健胎安而長

濟陰綱目 卷九 胎不長

聖人 天德堂

天地以六氣育之人身以六氣養之六氣者陰陽五行之氣也六氣不和則百病由是而生矣一妊婦因怒寒熱往來內熱肺熱脇痛嘔吐胎至八月而不長此因肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗梗病愈而胎亦長矣

安胎白朮散 治妊娠宿有冷胎墮不長或失於將理傷胎多墮

此藥補榮衛養胎氣

白朮 川芎 各一兩 吳茱萸 湯泡 甘草 炙 各一兩

右為細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷果菜

黃耆湯 治妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃耆 炒 白朮 炒 白茯苓 前胡 各一兩

人參 各七 川芎 甘草 各五分

此方以補血行結血皆所助其生長

右作一服水煎服

長胎白朮丸 治孕婦宿有風冷胎墮不長或將墮失宜助胎

氣多致損墮常服益血保胎調補衛生

白朮 川芎 阿膠 生地黃 各六錢

當歸 一兩 牡蠣 二分 川椒 三分

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸米飲下

人參 治妊娠胎不長宜服養胎

人參 白茯苓 當歸 柴胡 刺蘇 各一兩

厚朴 桑寄生 各一兩 枳殼 七錢 甘草 半兩

此方助生氣

右為細末煉蜜丸桐子大每服二十丸食前溫水下

○先期欲產過期不產

濟陰綱目 卷九 胎墮後為半產

聖人 天德堂

大全云婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者有經一二年乃至四年而後產者各依後治法

薛氏曰先期欲產者涼血安胎過期不產者補血行滯

一妊婦八個月胎欲墮似產臥久少安日晡益甚此氣血虛弱也朝用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯數劑而安

知母丸 治妊娠日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩

知母不拘多少為細末煉蜜丸如雞頭是大溫酒調下日三服

○一方丸如桐子大每飲下二十丸

槐子丸 治妊娠月數不足而似欲產腹痛者

槐子 各一兩

此方以治胎動不安

槐子 各一兩

酒同而一以  
以藥先酒下  
其分兩雖  
其藥則  
一也宜致想

右爲細末蜜丸如桐子大溫酒下二十九以痛止爲度

又方 取蒲黃篩過如棗核大以井花水調服

又方 搗葛蒲根汁一二升灌喉中

又方 梁上塵灶突墨同爲末空心溫酒服方寸七

加味四物湯 治過月不產者用此補血行滯

四物湯 香附 桃仁 枳殼 縮砂 紫蘇

右用水煎服即生

○鬼胎

大全云夫人臟腑調和則血氣充寔風邪鬼魅不能干之若榮衛  
虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也

薛氏曰前證因七情相干脾虛虧損氣血虛弱行失常道衝任乖  
濟陰綱目

違而致之者乃元氣不足病氣有餘也若見經候不調就行調補  
庶免此證治法以補元氣爲主而佐以雄黃丸之類行散之若脾

經鬱結氣逆者用加味歸脾湯調補之若脾虛血不足者用六君  
芎歸培養之肝火血耗者用加味逍遙散滋抑之肝脾鬱怒者用

加味歸脾道遙二藥兼服腎肝虛弱者用六味地黃丸

一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎證之藥不應余  
診視之曰面青脈滑寒熱往來肝經血病也面黃腹大少食體倦

脾經血病也此鬱怒傷脾肝之證非胎也不信仍用治胎散之類  
不驗余用加味歸脾道遙二藥各二十餘劑諸證稍愈彼欲速効

遂服通經丸一服下血昏憤自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用  
人參炮薑二劑漸愈

斬鬼丹 治鬼胎如抱一甕

吳茱萸 川烏一方作 秦艽 柴胡

白僵蚕 巴戟 巴豆 羌活 獨活 各

右爲末煉蜜丸如桐子大每服七丸蜜酒送下即出惡物而愈

○輕者去毒花巴豆巴戟

斑玄丸 治鬼胎或於妖魅狀如癰瘕一切氣血痛亦効

斑瘡 去頭足 玄胡索 炒各 三錢

右爲末糊丸酒下或爲末以溫酒調下半錢以胎下爲度

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黃 細研 鬼白 去毛 莽草 丹砂 細研

巴豆 油 領肝 各 蛇蛻 一條 炙黃 蜈蚣 一條 炙黃

濟陰綱目 卷之九終

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服二丸空心溫酒下日服後  
當利如不利加至三丸初下清水次下蟲如馬尾狀無數病極

者下蛇蟲或如蝦蟇卵雞子或如白膏或如豆汁其病即除  
枳實檳榔丸 治妊娠癰瘕癰塊及二者疑似之間久服安養胎

氣消散癰瘕兼寬膈進食

枳實 檳榔 黃連 黃柏 當歸 阿膠炒成 木香

右爲末水和丸如小豆大每服三十丸溫米飲下不計時日三  
服

濟陰綱目卷之十

關中 武之望叔卿父輯著 武林 徐弘衍孫文甫

西陵 汪 淇儋子評釋 天都 查 望于周父翁閱

臨產

○論臨產調理法

原自產圖此  
法也  
大全云凡妊娠至臨月當安神定慮時常步履不可多睡飽食過  
飲酒醴雜藥宜先貼產圖依位各鋪床帳預請老練穩婆備湯  
藥器物欲產時不可多人喧鬧惶惶但用老婦二人扶行及危物  
站立若見漿水腰腹痛甚起胎離其經令產母仰臥令兒轉身若  
兒頭向產門方可用藥催生坐草若心煩用水調服白蜜一匙覺  
饑喫糜粥少許勿令飢渴恐乏其力不可強服催藥早於坐草慎  
氣佐之

薛氏曰欲產之時覺腹內轉動即當正身仰臥待見轉身向下時  
作痛試握產母手中指中節或本節跳動方與臨盆即產矣若初  
覺不仰臥以待轉胞或未產而水頻下此胞衣已破血水先乾必  
有逆生難產之患若胎衣破而不得分娩者保生無憂散以回其  
血自然生息如血已耗損用八珍湯料一劑益母草半劑水數十  
碗煎熟不時飲之亦有得生者凡孕婦只腹痛未產也若連腰痛  
甚者將產也蓋腎候於腰胞繫於腎故也凡孕家宜預請有仁心  
知事穩婆當以恩結其心先與說知倘有生息不順只說未產或  
遇雙胎只說胎衣未下恐驚則氣散難生息余家親驗之大抵  
難產多患於鬱悶安佚當貴之氣治法雖云胎前清氣產後補血

之

除綱目

天德堂

不可專執若脾胃不實氣血不充宜預調神不然臨產必有患難  
○論臨產催生法

大全云大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎等  
藥或勢不得已則服之要云切不可坐早及令穩婆亂動手凡催  
必候脈痛胎轉向大法滑以流通滯滯若以驅逐開塞香以開  
下藥水破方可服太法滑以流通滯滯若以驅逐開塞香以開  
致逐血氣滯者行氣胞藥先破瘀困者固血  
丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

○論難產由於安佚氣滯

大全云婦人以血為主惟氣順則血和胎安則產順今富貴之家  
過於安逸以致氣滯而胎不轉或為交合使精血聚於胞中皆致  
產難若腹或痛或止名曰弄胎穩婆不悟入手試水致胞破裂乾  
清陰綱目

除綱目

天德堂

兒難轉身亦難生矣凡產直候痛極兒過產門方可坐草時當盛  
暑倘或血暈血滯當飲清水解之冬末春初產室用火和暖下部  
衣服尤當溫厚方免胎寒血結若臨月洗頭濯足亦致產難  
論難產由於氣虛不運

丹溪曰世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴奉養之家若  
貧賤辛苦者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其方為湖陽公  
主作也實非極至之言何也見有用此方者其難曰若子表妹苦  
於難產後遇胎孕則觸而去之予甚憫焉視其形肥勒於針指回  
思旬日忽自悟曰此正真湖陽公主相反彼奉養之人其氣必實  
耗其氣使平和故易產今形肥知其氣虛久坐知其不運必氣愈  
弱兒在胞胎用母氣不能運到當補其母之氣則兒健易產矣

此法最  
易得法

今其有孕至六七月來者遂以大全方紫蘇飲加補氣藥與數  
十貼因得見而其快後遂以此方隨母形色性稟時令加減與  
之無不應者因名其方曰達生散

○論難產由於血滯血乾

郭精中曰難產者因兒轉身將見枕血塊破碎與胞中收血壅滯  
兒身不能便利是以難產急服勝金散消其血使兒自易生陳無  
擇云多因兒未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而血水  
乾產路澁而兒難下宜先服催生如神散以固其血設或逆生橫  
產當用前法針刺之

大全云治胞漿先破惡水來多胎乾不得下須先與四物湯補養  
血氣次煎濃葱湯放冷令穩婆洗產戶須是款曲洗令氣上下通

濟陰綱目 卷十 臨產催生法

三 天德堂

楊子建十產論

一曰正產者婦人懷胎十月滿足忽腰腹作陣疼痛相似胎氣頓  
陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛教道挺進繼之漿破血出見自  
遂生

二曰傷產者蓋因人之生陰注陽定各有時日不可改易今有未  
產一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却無事是名試月非正  
產也但一切產母未有正產之候即不可令人抱腰產母亦不可  
妄亂用力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之婦却收產母  
虛亂用力兒身纔方轉動却破產母用力一逼使兒錯路忽橫忽  
倒不能正生皆緣產母用力不當所致也凡產母用力須待兒

此法最  
易得法

子

子順身臨過門戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力  
當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如  
糧苗助長無益而有害矣

三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛甚腰重發  
道挺進已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之或有經  
及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服  
藥以助產之正氣令兒速得下生

四曰凍產者冬月天寒產母經血得冷則凝以致兒子不能生下  
此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當  
滿房著火常有暖氣令產母背身向火令臍下暖則當暖血得  
熱則流散便見易生

濟陰綱目 卷十 臨產催生法

四 天德堂

如見此症  
用字未盡  
催之

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎  
氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭疼面赤  
昏昏如醉乃至不知人事

六曰橫產者見先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過  
也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰臥  
後令看生之人先推兒手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推  
上而正之或以指舉其耳而正之須是產母仰臥然後推兒直上  
徐徐正之候其身正煎催生藥一盞吃了方可用力令兒下生  
七曰倒產者產母胎氣不足間健不牢用力太早致令兒子不能  
回轉使直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入去  
不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順

母氣弱而倒  
產者當服補  
劑若用力早  
者又當別論



益氣湯產門不開氣血虛也用十全大補湯

地官李孟卿娶三十五歲女為繼室妊娠慮其產難索加味芍歸湯四帖備用至期果產門不開止服一帖頓然分娩

上舍張德之室產門不開兩日未生服前藥一劑即時而產上舍傳此方用之者無有不驗

一婦人分娩最易至四十妊娠下血甚多產門不開與前湯一劑又以無憂散勸許煎熟時時飲之以助其血而產

論胎死腹中

準繩云產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產難胞漿已破無血養胎枯涸而死故也須驗產母舌若青黑其胎死矣當下之

濟陰綱目 卷十 產難生法

大法寒者熱以行之熱者涼以行之燥者潤以潤之危者救其危下之

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢余意其胎必死今視其舌果青黑與朴硝半兩許服之隨下利水而愈

一婦胎死服朴硝而下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君為主佐以四物薑桂調補而愈

○臨產脈法 附驗看生死法

脈經云懷妊六七月脈寔太牢強弦緊者生沉細者死○脈勻細易產大浮緩氣散難產

脈訣云欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜半覺痛應分遲來朝日午定知生○身重體熱又頻舌下之脈黑復而反舌上冷

子當死腹中須遣母歸真面赤舌青細尋着母活子死定應難厚口俱青沫又出母子俱死總教機面青舌赤沫出煩母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛陳

臨月東胎方

東胎九 胎瘦易生服至產則已

白木

枳殼 去穢妙

右為末燒飯丸如桐子大八月一日食前服三五十九溫水下送生散 孕至八九個月內服十數帖甚好易產

大腹皮 三錢 人參 陳皮 紫蘇葉 各五

歸身尾

白木 各一 白芍藥 各一 甘草 各一

右切作一服入青慈五葉黃楊腦七個少脂瘦者不須用

濟陰綱目 卷十 產難生法

前服○或加枳殼砂仁○春加川芎○夏加黃芩○秋加澤瀉○冬加砂仁○氣虛倍參朮○氣寔加香附陳皮○血虛加當歸地黃○形寔倍紫蘇○性急多怒加黃連柴胡○熱甚加黃芩○濕痰加滑石半夏○食積加山查○食後易飢倍黃楊腦

○腹痛加木香官桂

又方 第九個月服

酒本 酒炒一兩 鹿胎人 白木 一兩 枳殼 炒

滑石 各七錢 半 鹿胎人 白木 一兩 枳殼 炒

右為末粥丸桐子大每服五十九空心熱湯下○氣寔人宜服多則恐損元氣

滑胎枳殼散 妊孕七八個月常宜服滑胎易產湖陽公主每產

累日不下南山道人進此方

商州枳殼 二兩 粉甘草 一兩

右為細末每服二錢百沸湯點服日三服。溫隱居如常服。木香各等分。許學士云枳殼性苦寒若單服之恐有胎寒胎痛之疾以地黃當歸蜜丸佐之可也。名內補丸。蓋枳殼散破氣有餘而內補丸補血不足也。

內補丸 治娠娠衝任脈虛補血安胎與枳殼散間服

熟地黃 二兩 當歸 一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十九溫酒或滾湯下

張氏方 治娠娠胎肥壅滯動止艱辛臨月服之縮胎易產兼治腸中諸疾下氣寬胸

濟陰綱目 卷十 婦人經產生法 九 天德堂

枳殼 五兩 甘草 一兩 香附子 三兩

右為末薑湯點服如丈夫婦人冷氣攻刺脇肋疼痛者用葱白三寸同煎服。婦人脾寒血氣成塊作刺熱酒調服。大小便不通白牽牛湯調服。

保生無憂散 治娠娠身居安逸口厭甘肥憂樂不常食物不節致胞胎肥厚根蒂堅牢或瘦人血少胎弱臨產難產入月服之則易生也

當歸 川芎 白芍藥 枳殼 木香

甘草 錢半 乳香 錢半 血餘 錢半

右作一服水煎入乳香血餘和勻不拘時服

瘦胎丸 瘦胎潤利易產臨入月服之神効

此方為要

通明乳香 另研 枳殼 一兩

難產催生方

三合濟生湯 以枳殼芍歸達生三方抽其精粹而成合此湯治臨產艱難雖一二日不下者服此自然轉動下生

當歸 三錢 川芎 枳殼 二錢 香附子 一錢

大腹皮 一錢 蘇葉 八分 粉草 七分

右用水煎待腰腹痛甚服之即產。一方加白芷一錢

佛手散 治娠娠因事仆跌子死腹中惡露妄行疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若子死腹中即便逐下若腹痛隨止于母俱安又治臨產艱難胞衣不下及產後血暈不省人事狀如

加白芷行血海之氣也

濟陰綱目 卷十 婦人經產生法 十 天德堂

中風血崩惡露不止腹中血刺疔痛血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或似瘧非瘧一切胎前產後危急狼狽垂死等證並皆治之。丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

當歸 三兩 川芎 四錢 各等分

右細剉分作四服每服先用水一盞煎將乾投酒一盞半煎五

七沸溫服如口噤不開灌之如人行五里許再灌一服盡此四

服便立產神驗。如產難倒橫子死腹中先用黑豆炒熟入白

水童便各一盞用藥四錢煎服。如胞產五七日不下垂死及

矮石女子交骨不開者加龜板并生青過婦人頭髮燒灰為末

每三錢酒調服

立時以文附不顯為陰虛或為至陰板則文錯相解故用之

產後諸症  
治諸產用力太過氣脈衰微精神困倦頭眩目昏口  
面青髮直不省人事

來建散

木香

神麴

陳皮

去白

麥蘖

黃耆

阿膠珠

白芍藥

芋根

甘草

各三錢

糯米

一合

生薑

一分

右剉細水煎挖口灌之連進為妙

月水不止崩漏等證

百草霜

白芷

各等分

右為末每服二錢以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒

煎進二服然血得黑則止此藥大能固血又免血涸甚妙○一

方加白滑石煎膏歸湯調下

濟陰綱目

卷十

天德堂

催生立應散

車前子

當歸

各一錢

冬葵子

白芷

各三錢

牛膝

一錢

大腹皮

枳殼

川芎

各二錢

白芍藥

一錢

右剉水煎熟入酒少許服立應

榆白皮散

治妊娠滑胎易生

榆白皮

甘草

各二錢

葵子

一兩

右為末每服五錢水煎服

一方用榆白皮焙乾為末臨月日三服方寸七分查經易

如聖散

紫蘇葉

當歸

各等分

右咬咀每服三五錢用長流水煎服無長流水以水煎服

催生散

白芷

滑石

伏龍肝

百草霜

各一錢

甘草

五分

右為細末用芎歸湯入酒童便各少許調服二次立効

催生飲

當歸

川芎

大腹皮

枳殼

各等分

白芷

各等分

右剉水煎服一方無大腹皮有益母草火麻仁

催生湯

桃仁

炒去

赤芍藥

牡丹皮

官桂

白茯苓

去皮各

一錢

右剉一劑水煎服

活水無憂散

專治十月已滿多因恣情及多製熱毒之物瘀血

相搏臨產橫逆之厄惶忙不謹觸死胎兒在腹服此一二貼即

濟陰綱目

卷十

天德堂

烏金丸

益母草

急性子

當歸

各四錢

陳枳殼

一兩

生地黃

蘇葉

右分作二服每服用水三碗先將魚入水坐火上略溫急取魚

出魚死則難取効矣後下藥煎至二碗臨服之時加入好酒一

茶匙每一碗和調烏金丸一類如死胎不下急取無根水再煎

藥相連服二次

烏金丸

一名七

聖散

實散

臨產腹痛方可服

當歸

玄胡索

香白芷

白礬

各等分

白礬

右為細末每服三錢燒酒調令紅滓酒調下臨臨產時一二服



不蓋氣力治  
右以水九升煮豆令熟去滓內膠令烱每服五合不覺更服不  
過三服即出

立產

一方 治難產累日氣力乏盡不得生此是宿有病者宜此方

阿膠二兩

赤小豆二升

右以水九升煮豆令熟去滓內膠令烱每服五合不覺更服不  
過三服即出

勝金散 產難蓋因兒枕破與破血異其子故難產但服此藥遂  
其敗血即自生逆生橫生並治之

麝香末一錢

鹽豉一兩以布裹  
了燒紅急研細

右每服一錢用秤鍾燒赤滓酒下

一方 治橫生先露手足

阿膠炒

滑石各一

冬葵子一合

清陰綱目 卷十 婦產衛生法

右每服四錢水煎連進二三服一方有酥油一兩

油蜜煎 治難產應藥胞乾胎不得下

用香油蜂蜜小使各一碗和勻銅鍋內慢火煎一二滾涼去  
沫調白滑石末一兩或益母草末攪勻頓服外以油蜂蜜於  
母腹臍上下摩之或油煎一盞服之亦可一方止用波

蜜小便能下難產

兔腦丸一名催 治難產及橫生逆產

兔腦一名催 治難產及橫生逆產

母丁香一錢

右研勻用兔腦和為丸如雞頭大陰乾油紙封裹每一丸破

水後溫水下即產男左女右手中彈藥出

此藥陶之  
明者

枳子引子 治產難或橫或倒胎爛腹中脹悶服之

生枳木一大握長一尺  
洗淨寸剉生用

甘草大者五寸  
剉五段

右用新汲水三升半入新磁瓶內以紙三重封緊文武火煎至  
一升半候產婦腰重痛欲坐草時溫飲一小盞便覺心下開舒  
如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最驗

催生如聖散

黃蜀葵子不拘多少焙乾為末熱酒調下二錢神効如無子

花亦可○若胎漏血乾難產痛極者并進三服良久腹中氣

寬胎滑即產須見正產候方可服之○如打撲死胎紅花酒

下○歌曰黃葵子炒七十粒細研酒調濟君急若還臨危產

難時免得全家俱哭泣

清陰綱目 卷十 婦產衛生法

催生如聖散 治橫生倒產

人參 乳香各一

辰砂二錢一方  
辰砂只用五分

右為末臨產時急用雞子清一個調藥末再用薑汁調開冷服

即時順產子母無恙

催生鉛丹 治橫逆難產

用黑鉛一錢將小銚子火上鎔化投入水銀一錢急攪結成

砂子傾出以熟絹衣角紐成丸子如萊豆大臨產時磨香水

吞下二九立下

三退散 治橫逆難產子死腹中

蛇退一條 蟬退十四 人退即男子頭髮  
右俱燒灰為末分三服酒調下

滑胎散 催生神効

益元散 一兩

蛇退 一條

煨退 全香

穿山甲 一片燒

男子亂髮 油熬化

右為細末用鹽水一碗和藥煎二沸入髮灰攪勻冷定服之立下

一方 治產不順

蛇脫 一條 香退 一張

右入新瓦瓶內鹽泥固濟火燒存性為末煎榆白皮湯調下一錢三服覺痛便生

一方 用蛇退一條全者燒灰入麝香一字酒調二錢面東服如橫生逆產以餘渣塗所出手足即順也

神効乳砂丹 治難產

濟陰綱目

卷十 產後生法

十五

天德堂

明乳香為末以猪心血為丸如桐子大珠砂為衣口乾每服

一丸嚼碎冷酒下良久未生再服○或以蓮葉蒂七個水煎

化服二丸良久未生再服

如胞漿先乾胎不得下急服大料四物湯滋其血氣并濃煎葱

湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却服前藥

如胎死不下用朴硝五錢滾湯調下或平胃散一服送下如胞

衣未下酒水服一丸即下

產門不開用加味芎歸湯和服二丸

此藥靈驗如神合時須五月五日午時極妙或七月七日三月

三日及月初上辰日亦可

一方乳香珠砂等分為末麝香酒調下

又方 通明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用冷水醋少許調

服扶立令兩手拿石燕子二個念經靈藥聖藥通行天下草

便生更無痛楚此法似迂用者云甚驗

一方乳香研細五月五日滴小丸如雞頭大每服一粒無灰酒下名開骨膏

一方 用大珠砂於端午晒起以百日為度研為細末取臘月男

脂髓丸如茶豆大欲產時飲下一丸良久便生其效男左

女右手手中握出晒珠砂不得着雨

如神散 催生累効靈驗於理固難通於事是殊効

用路上草鞋一雙取鼻梁上繩洗淨燒灰童便和酒調下三

錢一名千里馬此藥委是神奇

濟陰綱目

卷十 產後生法

十六

天德堂

小品方 療橫生倒產手足先出

用簷鐵刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當回順而

生

一方用鹽塗兒足底又可急搔灰之并以鹽摩產婦腹上即產

黃金散 治生產一二日難分娩者服之如神

真金箔大者五片小者七片以小磁鉢將水少許入紙入金

在內用指研勻後再添水至半盞一面先令一人伏產婦虛

坐又令一婦人用兩手大指按定產母兩肩上有井八前藥

溫服其胎即下○此催生聖藥如產月未足又能安之

勝金丹 治難產神効

敗鬼草葉頭一枝燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若

產母虛弱及素有冷疾者恐熱冷動氣即於銀器內重湯燉過後服

催生萬金不偶遇仙丹

草麻子十四粒 雄黃各一 蛇蛻一尺燒  
右為末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用極湯淋洗下  
安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以漏帛束之須臾生下急  
取去藥一丸可用三次

如聖膏 治產難併治胞衣不下兼治死胎

草麻子七粒去殼細研成膏塗臍心胞即下連洗去不則腸  
出却用此膏塗頂上臍自縮入○一方草麻子百粒雄黃一  
錢細研如上法塗之○一方草麻子三粒巴豆四粒各去殼

濟陰綱目 卷十 產後生法 十七 天德堂

人麝香研細貼在臍中歌曰三麻四粒脫衣袋研碎將來入  
麝香若有婦人遭產難貼在臍中兩分張

立聖丹 治產難極逆惡候死胎不下並治神驗

寒石四兩內二兩生 硃砂

右同研如深桃花色每用三分并華水調如糊糊以紙花剪如  
杏葉大攤上貼臍心候乾再易不過三上便產

治難產雜方 益母草搗取汁七合煎半頓服立下無新者以乾

者一大把水七合煎服

一方今產婦兩手各握石燕一枚須臾即下

一方妻母粉半兩溫酒調服入口即產萬不失一

一方注心為末童便酒調服一錢神効名救苦散

一方用伏龍肝研末每服一錢酒調下見頭帶土而下

一方臘月兔頭蝦為末葱白煎湯調服三錢立生

一方燒銅錢通紅放酒中依之

一方用魚膠一尺新瓦上煨灰陳醋調服立下

一方好墨新汲水濃磨服之墨水裏兒出

一方取弓弩弦以縛腰及燒弩牙令赤內酒中飲之皆取法於快  
速之義也

一方神麝木水服方寸七

一方赤小豆為末東流水服方寸七

一方當歸末酒調一錢服良久再服

濟陰綱目 卷十 產後生法 十八 天德堂

一方車軸脂吞大豆許兩九

一方紅莧菜與馬齒莧同煮熟臨產食之即下

一方車前子為末酒服二錢

一方取本夫裙帶五寸燒存性酒調服下

一方取槐樹東枝令產婦把之易產

一方用紫蘇煎湯調益元散服之即產

一方吞槐子十四粒即下

一方取槐子十四枚蒲黃一合納酒中溫服須臾不生再服之水  
服亦得

一方生薑汁生地黃汁各半升合煎熟頓服之

治交骨不開

龜殼散 治交骨不開不能生產

當歸 川芎 各一兩 敗壞板 一兩 婦人頭髮生髮者

右為散每服五錢水煎服約人行五里即生如胎死不下灼熱板亦可

○治胎死腹中

烏金散 治難產或熱病胎死腹中或因顛仆或從高墜下或房室驚指或臨產驚動太早觸犯禁忌或產時未到經行先下惡露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產母面赤舌青是其候也面青舌赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又有雙胎或一死一活其候難知臨時觀變可也

熟地黃 乾酒 燒真蒲黃 大當歸 交趾桂 楊芍藥

濟陰綱目 卷十 治胎死腹中

十九 天德堂

軍薑 去皮 粉草 各一兩 小黑豆 四兩 百草霜 五錢

右為末每用二錢米醋半合許沸湯六七分浸起溫服疑疑之際且進佛手散酒水合煎二三服探之若未死子母俱安若胎已死立便逐下的知其胎死進此藥後更進香桂散須臾如手推下常用催生更加好滑石末半兩葵子五十粒搗碎黃梓葉七八皮慈白二寸順流水煎湯調下蓋滑石能利小便梓葉行氣逐血慈白內通陽氣氣盛血行即產矣

香桂散 下死胎

麝香 五分 另研一方 官桂 三錢 為末一方 右和勻作一服溫童便酒或葱湯調服須臾如手推下此方比之用水銀等不損血氣○一方加白芷三錢○一方單用桂末

一錢童便調下名救苦散

平胃散 治死胎不下指申舌青脹悶口中作臭

蒼朮 米泔 陳皮 厚朴 各一錢 甘草 五分

右到一劑酒水各一盞煎至一盞投朴硝半兩再煎三五沸溫服其胎化血水下○或只用朴硝半兩研細以童便調溫服亦妙或用二錢以順流水調下

一方 治姙娠三五個月胎死在腹中不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮 各三兩 當歸 炒 一兩 滑石 七錢 瞿麥 葵子 炒 茯苓 粉草 黃芩 各半

右為饒末每服四錢水煎服

千金神造湯 治動胎及產難子死腹中並姙娠兩兒一死一生

濟陰綱目 卷十 治胎死腹中

二十 天德堂

服之令死者出生者安神驗

蟹爪 一升 甘草 一兩 阿膠 三兩

右三味以東流水一斗先煮蟹爪甘草得三升去滓次內膠令烊頓服之不能分再服若人因拘口內藥藥八即活煎藥作東向龜用葶蘇煮之

一方 治胎死腹中乾燥者背

葵子 一升 阿膠 二兩

右以水五升煮取二升頓服之未出再煮服

一方 治子死腹中可半生不下或半着脊骨在草不產血氣上盈母心面無顏色氣欲絕及治胞水早乾胎流不下

猪脂 一兩 白蜜 一升 淳酒 二升

<p>右三味共煎至二升服分溫二服不能服者隨多少緩服之</p> <p>一方 治胎死腹中或半產不下</p> <p>官桂 五錢 牡丹皮 川芎 葵子 各一錢二分</p> <p>右為細末每服三錢葱白湯下</p>	<p>半夏湯 治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及胞乾而不能產者</p> <p>半夏 一兩 桂 去皮七錢半 大黃 五錢 桃仁 三十個去皮炒</p> <p>右為末先服四物湯一二服次用此藥三錢生薑三片水煎服如未効次服下胎丸</p>	<p>下胎丸 治產難胞衣不出橫創者或見死腹中母氣欲絕者</p> <p>半夏 生 白飲 各半</p>	<p>濟陰綱目 卷十 治胎死腹中 二十 天德堂</p> <p>右為細末滴水丸如桐子大食後用半夏湯下三三九續加至五七九新加至五十九</p> <p>一方 治生產不順胎死腹中胎衣不下臨產危急妙</p> <p>蛇退 一條全者香 麝香 少許</p> <p>右為末童便酒各半盞調下一服即生效</p>	<p>霍亂奪命丹 治臨產暴然氣喘口翻面黑唇青沫出口中子母俱損兩臉微紅子死母活</p> <p>蛇退 一條九 香退 錢二 男子髮 燒灰 五分</p> <p>黑鉛 半 水銀 七分半 依 千里馬 取鞋鼻洗淨燒灰一錢</p> <p>右為末以豬心心血丸如桐子大金錢箔七片為衣每服二丸用倒流水灌下或入伏龍肝調下土著兒頭戴出為妙</p>
--	--	---	---	--

<p>宣明礪砂散 治胎死腹中不下</p> <p>礪砂 研細 當歸 各一</p> <p>右研極細只分作二服溫酒調下如重車行五里不下再服</p>	<p>牛膝丸 下死胎</p> <p>杜牛膝 兩 紫金藤 蜀葵根 各七錢 當歸 肉桂 各五錢</p> <p>右為末米糊為丸如桐子大礪砂為衣每服五十丸乳香湯送下</p>	<p>一方 治產難數日子死腹中不出母氣欲絕</p> <p>瞿麥 兩 通草 桂心 各三錢 牛膝 榆白皮 各四兩</p> <p>右細切用水九升煮取三升去渣分三服頓服即下○一方無榆皮有天花粉四兩大能墮胎</p>	<p>濟陰綱目 卷十 治胎死腹中 二十三 天德堂</p> <p>一字神散 治子死腹中胞衣不下胞破不生累有神驗</p> <p>鬼臼不拘多少黃色者去毛研為末以手指擦之如粉極細為度此藥不用羅每服三錢用無灰酒一盞煎至八分通口服立生如神</p>	<p>治死胎難方 用辰砂一兩以水煮數沸為末取酒服之立出</p> <p>一方真珠二兩為末酒調服盡立出</p> <p>一方葵子為末酒服方寸匕若口噤不開格口灌之藥下即活</p> <p>一方鹿角屑一兩熬五莖豆豉半合水煎服</p> <p>一方鹿角燒灰存性為末每服三錢溫酒調下</p> <p>一方水銀半兩桂木三錢溫酒調下粥飲亦得</p> <p>一方錫粉水銀各一錢東肉丸如大豆大吞下立出</p>
--	--	--	---	--

一方用雞子黃一個。生薑自然汁一合。調勻頓服。分晚後用薑薑子劑補之。

一方羅麥二兩。剉碎。水八盞。煎一盞。服未出再服。

一方蓮心黃土為末。酒調服二錢。

一方鍋底墨酒調服。

一方米麥赤小豆同煮。濃汁服立出。

一方紅花酒煮汁服二三盞。

一方以利斧煨赤置酒中。待溫飲之。其子自下。

一方用雌雞糞二十一枚。水二升五合。下米作粥食。即下。

一方用三家雞卵各一枚。三家鹽各一撮。三家水各一升。合煮令產婦東向飲之立出。

濟陰綱目

卷十 治胎死腹中

二十三 天德堂

一方取夫尿二升。煮令沸飲之。

一方以黃牯生薑塗母腹上立出。

一方以牛糞炒令大熱。入醋半盞。以青布包裹。於母臍上下熨之立下。

一方用烏雞一隻。去毛細切。水煎三三升。候湯通。用手用衣帛蘸摩腹中胎自出。

一方榆白皮煮汁服二升。

一方治有孕月數未足。子死腹中。母欲悶絕。取大豆三升。醋煮濃汁三升。頓服。

一方用瓜蒌根一味。煨為末。每服二錢。取順流水下。

濟陰綱目卷之十終

濟陰綱目卷之十一

關中 武之望叔卿父輯著 武林 張志聰隱庵父訂正

西陵 汪 洪儒翁子彥標 天都 查 望子周父察閱

○產後上

○論產後調理法

大全云。凡生產畢。飲熱童便一盞。不得便臥。宜閉目少坐。須臾上牀。宜仰臥。不宜側臥。宜豎膝。未可伸足。高倚牀頭。厚鋪褥褥。遮圍四壁。使無孔隙。免致賊風。及以醋塗鼻。或用醋炭及燒漆器。更以手從心擠至臍下。使惡露不滯。如此三日。以防血暈。血逆。不問腹痛。不痛。有病無病。以童便和酒半盞。溫服五七服。酒雖行。血亦不可多。恐引血入四肢。且能骨量。宜頻食白粥少許。一月之後。宜食

濟陰綱目

卷十一 產後上

天德堂

醫家語

此新產切實  
治法須知之

產後雖常大  
補亦宜審處

羊肉。猪蹄少許。仍慎言語。七情寒暑。梳頭洗足。以百日為度。若氣血素弱者。不計日月。否則患手足腰腿痠痛等證。名曰勞傷。最難治療。初產時。不可問是男是女。恐因言語而泄氣。或以愛憎而動氣。皆能致病。不可獨宿。恐致虛驚。不可刺舌。恐傷心氣。不可刷齒。恐致血逆。須血氣平復。方可治事。犯時。微若秋毫。成病重如山。揪可不戒哉。陳藏器云。產後汁與產婦服之。將產婦與產婦息如法。臟腑調和。庶無諸疾。若須先服黑神散。四物湯。四順理中丸。七寶散。若壯熱頭痛。此乳脈將行。用玉露散。頭目不清。是血逆。用清現散。粥食不美。是胃氣虛。用四順理中丸。

○論產後大補血氣為主  
丹溪曰。產後當大補血氣為主。雖有雜證。以未治之。○產後為補虛。



連兒臍。胞不出。卽不得以時斷臍。浴洗。令氣得見。則臍自落。舊法胞衣不出。恐損兒者。依法截臍而已。產處須順四時方向。并避五行禁忌。若有觸犯。多令產婦難產。

郭稽中論曰。胎衣不下者。何。答曰。母生子訖。流血入衣中。衣爲血所脹。故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘急者。難治。但與奪命丹以逐去衣中之血。血散脹消。胎衣自下。牛膝湯亦效。

薛氏曰。有因惡露入衣。脹而不能出。有因元氣虧損。而不能送出。其惡露流衣中者。腹中脹痛。用奪命丹。或失笑散。以消瘀血。緩則不救。其元氣不能送者。腹中不脹痛。用保生無憂散。以補固元氣。或用草麻子肉一兩。細研成膏。塗母右足心。衣下卽洗去。緩則腸

濟陰綱目 卷十一 產後上 四 天德堂

亦出如腸不收。仍用此膏塗臍頂。則腸自收。益母丸亦效。家人婦胎衣不落。胸腹脹痛。手不敢近。此瘀血爲患。用熱酒下失笑散一劑。惡露胎衣並下。

一產婦胎衣不出。腹不脹痛。手按之痛稍緩。此是氣虛。而不能送出。用無憂散而下。前證余詢諸穩婆云。宜服益母草丸。或就以產婦頭髮入口。作嘔。胎衣自出。其不出者。必死。授與前法甚効。

一產婦產後。面赤。五心煩熱。收血入胞。胞衣不下。有冷汗。思但去其敗血。其衣自下。遂用黑豆二合。炒透。然後燒紅。鐵秤錘。同豆淬酒。將豆淋酒化下。益母丹二丸。胞衣從血而出。餘證盡平。

奪命丹 治胞衣不下。蓋兒之初生。惡血流入衣中。爲血所脹。塞故不得下。須臾冲上。逼心卽死。急服此藥。

此即精中方 配服有神

黑附子炮五錢 牡丹皮一錢 乾漆炒烟盡二錢五分 右爲細末。用米醋一升。大黃末一兩。同煮成膏。和前藥爲丸。如桐子大。每服五七丸。溫酒下。

奪命丸治胞衣不下。並治胎死。

牡丹皮 桃仁 茯苓 赤芍 桂心各等分

右爲末。益母丸。彈子大。每一丸。醋湯化下。或葱白煎酒湯下。尤妙。

連進兩丸。死胎腐爛立出。

牛膝湯 治胞衣不出。臍腹堅脹急痛。卽殺人。服此藥。胞卽爛下。死胎亦下。

牛膝

澤麥各四兩 當歸尾 通草各六兩 滑石八兩 葵子五兩

一方有桂心二兩

濟陰綱目 卷十一 產後上 五 天德堂

右細切。以水九升。煮取三升。分三服。

牛膝散 治胞衣不出。腹中脹痛急。服此藥。腐化而下。緩則不救。

牛膝 川芎 朴硝 蒲黃各七錢半 當歸一兩 桂心五錢

右到每服五錢。加生薑三片。生地黃一錢。水煎服。

加桂芎歸湯 有胎衣不下。因產母元氣虛薄者。以此溫之。自下。

川芎 當歸各二錢 官桂四錢

右到一服。水煎服。

黑龍丹 治難產及胞衣不下。血迷血暈。不省人事。一切危急惡證。垂死者。但灌藥得下。無不全活。

當歸 五靈脂 川芎 良薑 熟地黃各二兩 砂鍋

內鐵絲掛。煎。百草霜 硫黃 乳香各二錢 琥珀

固濟火煨過。百草霜 硫黃 乳香各二錢 琥珀

用法先法服 法俱奇妙



花蕊石各一

右為細末醋糊丸如彈子大每用一二九炭火煨紅投入生麻自然汁浸碎以童便合酒調灌下

花蕊石散 治產後敗血不盡血迷血暈胎死腹中胎衣不下至死心頭煖者急用一錢化下即出其効如神

花蕊石 助 上色硫黃 研細 四兩各

右和勻先用紙泥封固瓦罐一箇入二藥仍封固陰乾如急用以火籠內炙乾用炭火煨赤去火次日取出研細每服一錢重便熱酒下

一方 胞衣不出

牛膝一兩 葵子一合

濟陰綱目 卷十一 產後上

右剉以水一升煮半升去渣分二服

千金備急丸 治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊

錦紋大黃一兩為細末用醋醋半升同煎如膏丸如桐子大溫醋湯下五丸或七丸須臾惡下即愈

胡氏法 治產後胞衣不下惟有花蕊石散一件最為要緊若鄉

居藥局遠者倉卒無之今有一妙法產訖胞衣不下稍久則血流胞中為血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤若有此證宜急斷臍帶以少物繫帶必用力牢固繫之然後截斷使其子血脈不潮入胞中胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人屢驗

治胞衣不下雜方

五靈脂為細末溫酒調下二錢

一方取小麥合小豆煮漿汁飲之立出

一方皂角刺燒為末溫酒調下一錢

一方蛇退燒為細末酒下二錢

一方黑豆一合炒熟入醋一盞煎三五沸去豆分三服酒煮亦可

一方取鹽內黃土一寸研細醋調勻納于臍中續煎甘草湯三四合服之出

一方墨三寸為末酒服

一方生地黃汁一升苦酒三合煖服之

一方龜突墨三指撮許以水苦酒調服立出

一方雞子一枚苦酒一合和飲之

濟陰綱目 卷十一 產後上

一方生男吞小豆七枚生女吞十四枚即出

一方浸苧水濃煮飲三碗立下

一方取產母鞋底炙熱慰大小腹上下二七次

一方取初洗兒湯服下一盞勿令產母知

一方款蘆實一個取子研細用酒重便各半盞相和煎至七分去滓溫服如無實根亦可

一方紅花一兩酒煮濃汁服

一方以鹿角鎔為屑研細三分煮葱白湯調下

一方凡欲產時必先脫常所着衣以籠籠胞衣自下仍易產

一方取夫單衣蓋井上立出

○血暈厥逆附

一、條法用心  
二、條法用心  
三、條法用心  
四、條法用心  
五、條法用心  
六、條法用心  
七、條法用心  
八、條法用心  
九、條法用心  
十、條法用心  
十一、條法用心  
十二、條法用心  
十三、條法用心  
十四、條法用心  
十五、條法用心  
十六、條法用心  
十七、條法用心  
十八、條法用心  
十九、條法用心  
二十、條法用心  
二十一、條法用心  
二十二、條法用心  
二十三、條法用心  
二十四、條法用心  
二十五、條法用心  
二十六、條法用心  
二十七、條法用心  
二十八、條法用心  
二十九、條法用心  
三十、條法用心  
三十一、條法用心  
三十二、條法用心  
三十三、條法用心  
三十四、條法用心  
三十五、條法用心  
三十六、條法用心  
三十七、條法用心  
三十八、條法用心  
三十九、條法用心  
四十、條法用心  
四十一、條法用心  
四十二、條法用心  
四十三、條法用心  
四十四、條法用心  
四十五、條法用心  
四十六、條法用心  
四十七、條法用心  
四十八、條法用心  
四十九、條法用心  
五十、條法用心  
五十一、條法用心  
五十二、條法用心  
五十三、條法用心  
五十四、條法用心  
五十五、條法用心  
五十六、條法用心  
五十七、條法用心  
五十八、條法用心  
五十九、條法用心  
六十、條法用心  
六十一、條法用心  
六十二、條法用心  
六十三、條法用心  
六十四、條法用心  
六十五、條法用心  
六十六、條法用心  
六十七、條法用心  
六十八、條法用心  
六十九、條法用心  
七十、條法用心  
七十一、條法用心  
七十二、條法用心  
七十三、條法用心  
七十四、條法用心  
七十五、條法用心  
七十六、條法用心  
七十七、條法用心  
七十八、條法用心  
七十九、條法用心  
八十、條法用心  
八十一、條法用心  
八十二、條法用心  
八十三、條法用心  
八十四、條法用心  
八十五、條法用心  
八十六、條法用心  
八十七、條法用心  
八十八、條法用心  
八十九、條法用心  
九十、條法用心  
九十一、條法用心  
九十二、條法用心  
九十三、條法用心  
九十四、條法用心  
九十五、條法用心  
九十六、條法用心  
九十七、條法用心  
九十八、條法用心  
九十九、條法用心  
一百、條法用心

大全云產後血暈者由敗血流入肝經以致眼黑頭旋不能起坐  
甚至昏悶不省人事謂之血暈以細酒調服神效最佳若作暗風  
中風治之誤矣血熱乘虛逆上奏心以致昏迷不省氣閉欲絕者  
服童便最妙然其由有三有用心使力過多而暈者有下血過多  
而暈者有下血少而暈者其暈雖同治之則異當審詳之下血多  
而暈者昏而煩亂而已當以補血清心藥下血少而暈者乃惡露  
不下上搶于心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥  
古法云產婦分娩訖預將秤錘或黃石子硬炭燒令通赤置器中  
急于牀上以醋沃之得醋氣可除血暈產後一月內時作爲妙崔  
氏云凡暈者皆是虛無血氣奔逆腹中空虛所致欲分曉者第一  
須先取醋醋以釜口鼻仍置醋于傍使聞其氣兼細細飲之此爲  
清陰綱目 卷十一 血暈下 天德堂

上法如骨痛即以醋熨面暈來即飲醋仍少與解之云云  
法燒乾漆令烟濃熏產母而即醒如無乾漆取舊漆  
郭稽中口產後血暈者何答曰產後血氣暴虛未得安靜血隨氣  
上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣  
冷醫者不識呼爲暗風若作此治證必難愈但服清血散即省  
薛氏曰產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神  
昏口噤或痰涎壅盛者急用失笑散主之若血下多而暈或神昏煩  
亂者大劑尋歸湯補之或芸薹子散或童子小便有痰加二陳湯  
若因勞心力而致者宜補中益氣湯加香附若因氣血虛極不省  
人事用清魂散惟以尋歸湯及大補氣血之劑凡產可用醋漆器  
熏或用半夏末冷水和丸入鼻孔中並無前患并溪先生云血暈

因氣血俱虛痰火之上宜以二陳導痰或加減硃砂安神丸以寧  
心冬湯下亦可大凡產後日眼瞶斜等證當大補氣血以治之  
以治痰若脾胃虛而不能固者用六君子湯至五個月當服安胎  
飲至八九個月再加腹皮黃楊腦如臨產時更宜服保生無憂  
散自無前患

家人婦產後小腹作痛忽牙關緊急灌以失笑散良久而醒又用  
四物加炮薑白朮陳皮而愈

一產婦因產飲酒惡露甚多患血暈口出酒氣此血得酒熱而妄  
行虛而作暈也以佛手散加乾薑二錢一劑而痊酒性慄悍八月  
及產後不宜飲恐致前證產室人衆喧嚷氣熱亦致此證  
奉化陸嚴治新昌徐氏婦病產後暴死但胸膈微熱陸診之曰此  
清陰綱目 卷十一 血暈 九 天德堂

血悶也用紅花數十斤以大鍋煮之候湯沸以木桶盛之將病者  
覆其上熏之湯氣微復加之有頃婦人指動半日遂甦此與前證  
宗治王太后之意同

仲景云產婦得胃其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以  
然者血虛而脈厥厥而必胃胃家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽  
上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗  
出陰陽乃復所以大便堅嘔不能食也小柴胡湯主之病解能食  
七八日更發熱者此爲胃實大承氣湯主之  
今按胃胃即脾也觀此則產後血暈有汗下和解三法當分表裏  
虛實精而別之

清魂散 產後血暈者氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神

故眼前生花極甚。令人悶絕。不知人口。噤神昏。氣冷。宜先服乾漆。或漆器燒烟。鼻中熏之。頻置醋炭房內。次進此藥。即醒。

澤蘭葉 人參各二錢半 川芎半 荆芥穗一 甘草二錢

右為細末。每服二錢。用溫酒熱湯各半。盞或入童便調急灌之下咽。眼即開。氣定即醒。

芎歸湯 治產後去血過多昏暈不醒

芎藭 當歸各二錢 附子半 羌活半 獨活半 熟地半 白芍半 川芎半 荆芥穗一 甘草二錢

右咬咀。每服四錢。水煎。熱服。不拘時。○如腹中刺痛。加酒炒白芍藥。甚者加桂心。○口乾煩渴。加烏梅麥門冬。○發寒熱。加乾薑白芍藥。○水停心下。微有嘔逆。加茯苓生薑。○虛煩不得眠。加人參竹葉。

濟陰綱目 卷十一 血暈 天德堂

保命集方 治產後血暈危困。此下多血虛也。補之。

當歸炒 赤芍藥炒 生地黃汁一大

右剉水煎。三五沸。溫服。如覺煩熱。去當歸。入童便半盞服之。○以上治去血過多昏暈之疾。

醋墨 纔產便服。免致昏暈。

松烟墨。或京墨。不拘多少。用炭火煨紅。以米醋淬之。再煨再淬。如此七次。研極細。纔產畢。即用一二錢。以童子小便調下。淡醋湯溫酒亦可。

獨行散 治產後血暈昏迷不省。冲心悶絕。

五靈脂半生半炒 為末。每服二錢。溫酒調下。入喉即愈。不愈。更加蒲黃炒等分。名失笑散。○一方加荆芥等分。童便調下。

奪命散 治產後血暈。血入心經。言語顛倒。健忘失志。及產後百病。

血竭 沒藥各等分

右為末。纔產下。便用童便與細酒各半盞。煎一二沸。調下二錢。良久再服。其惡血自下行。更不冲上。或只用白湯調下。

四味散 治產後一切諸疾。總方。分。一服尤妙。

當歸 玄胡索 血竭 沒藥各等分

右為細末。每服二錢。用童子小便一盞。煎六分。通口服。○如心膈寒。倍當歸。○氣悶喘急。倍玄胡索。○惡露不快。倍血竭。○心腹撮痛。倍沒藥。

黑神散 治產後惡露不盡。或胎衣不下。血氣致冲。心腹痞滿。或

濟陰綱目 卷十一 血暈 天德堂

臍腹堅脹。撮痛。及血暈神昏。眼黑口噤。產後瘀血諸疾。

當歸 芍藥 熟地黃 乾薑 桂心 蒲黃

甘草炙 黑豆炒去皮

右為細末。每服二錢。酒重便各半盞。同煎調服。○貴氏曰。黑神散。寒多及秋冬者。宜之。若性急形瘦。及夏月。宜審之。

紅花散 治產後血昏。血暈。血崩。及月事不勻。遠年乾血氣。

乾荷葉 牡丹皮 川歸 紅花 蒲黃各等分

右為細末。每服半兩。酒煎和渣溫服。○如胎衣不下。榆白皮湯調半兩立效。

鹿角散 治產後血暈。此乃虛火。載血漸漸。將上來。用鹿角燒灰。出火毒。研極細。用好酒童便調灌下。一呷。即醒。此物行血。

鬱金散 治產後血上冲心已死并下胎

鬱金燒存性為末每二錢醋醑一合調灌之立活

治血鬱雜方

產後血暈全不省人事極危殆者用韭菜切入有嘴瓶內煎

熱醋沃之以瓶口對產婦鼻孔熏之即醒

一方如覺暈即以醋嗅面醒來仍與醋細細呷之又以醋塗口鼻

并置醋于旁使常聞其氣

一方麒麟竭一兩細研為末非時溫酒調下二錢

一方紅花一兩搗為末分作二服酒二鍾煎取一鍾併服如口紫

幹開灌之速效

一方用紅花三兩新者無灰酒重便各半升煮取一盞服之

濟陰綱目 卷十一 血部 主 天德堂

一方用藕木三兩細剉水五升煮取二升分再服瘥無蘇木取緋

衣煮汁服之亦得以上俱破血輕劑

牡丹散 治產後血暈悶絕口噤則擗開口灌之

牡丹皮 大黃煨 芒硝各一兩 冬瓜子半合 桃仁三十個去皮尖

右剉每服五錢水三鍾煎至一鍾半去滓入硝又煎分二服

產毒一方 治產後心煩手脚煩熱氣力欲盡血暈連心頭硬及

寒熱不禁

接骨木破之如算子大一握以水一升煎至半升分溫二服

或小便數惡血不止服之即痊此木煎三遍其力一般此是

起死之方以上二方俱重劑

○以上治惡血攻冲昏暈之劑

荆芥散 治產後風虛血暈精神昏昧

荆芥一兩 桃仁炒五錢

右為細末溫水調下三錢○微喘加杏仁炒甘草各三錢

一方治產後血暈用荆芥穗為末童便調下二三錢極妙

一方用多年陳荆芥穗燈烟上燎焦黑存性每服三錢童便少酒

調下極妙

按此乃肝熱

生風之候由血虛而肝急也藥宜有散

取雞子一枚去殼取清以荆芥末二錢調服仍依次調治荆芥氣虛人不

○以上治風虛血暈之劑

倉公散 治產後血厥而目

濟陰綱目 卷十一 血部 主 天德堂

瓜蒂 藜蘆 白礬各一雄黃半

右為末每用少許吹鼻取嚏內服白微湯

白微湯 治產後胃弱不食脈微多汗亡血發厥等證

白微 當歸各六錢 人參三錢 甘草一錢

右切分作二帖水煎服

○以上治血厥之劑

○惡露不下

大全云夫惡露不下者由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞絡挾于

宿冷或產後當風取涼風冷乘虛而搏于血則壅滯不宜積留在

內故惡露不下也

薛氏曰前證若惡露不下用失笑散若氣滯血凝用花藍石散

<p>一產婦患前證服峻厲之藥惡露隨下久而昏憤以手護其腹全 日此皮氣復傷作痛故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補 之而愈</p>	<p>此產後溫行 正藥白芍藥 酒炒亦無妨</p>	<p>起枕散 治產後惡血不行心腹及兒枕作痛甚危 當歸 白芍藥 酒炒各 川芎 錢 官桂 玄胡索 牡丹皮 蒲黃 炒 五靈脂 炒 沒藥 錢 白芷</p>	<p>此以心神煩 因故不用藥 藥而加重便 以引下</p>	<p>荷葉散 治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶 乾荷葉 二 鬼箭羽 桃仁 劉寄奴 蒲黃 各一 右為末每服三錢以童便一大盞薑一片生大黃一分槌碎 同煎至六分熱服</p>	<p>既用大黃得 用白木豈得 已之心加酒 同煎桃仁后 入又酒法之 妙</p>	<p>濟陰綱目 卷十一 惡露不下 西 天德堂 通源飲 治產後惡露不通心慌昏沉寒熱交攻 歸尾 大黃 各三 白朮 木通 各一 紅花 五 桃仁 三十 燭另入</p>	<p>此方寒熱並 同惡露而下 燒炒為末 調生薑黃汁 酒服</p>	<p>廣濟方 療產後惡露不下 川牛膝 大黃 各二 牡丹皮 當歸 各一 芍藥 蒲黃 桂心 各一</p>	<p>保命集方 治婦人惡血不下 當歸 羌花 炒等</p>	<p>右為細末每服三錢酒調下</p>	<p>右為末以生地黃汁調酒服方寸七日二服血下愈</p>
--	----------------------------------	---	--	---	--	---	--	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------------

<p>又用好墨醋淬末童便酒下 沒藥丸 治產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆 痛如錐刺非常此由冷熱不調或思慮動作氣所壅遏血畜經 絡</p>	<p>此水雖非真 不得已不敢 用</p>	<p>當歸 兩 芍藥 桂心 各半 桃仁 去皮尖 炒研 沒藥 研各二 龜蟲 去翅 水蛭 炒焦各 三十枚</p>	<p>黑龍丹 見前胎 衣不下</p>	<p>右為末醋糊丸如豌豆大醋湯下三九</p>	<p>治惡血不下雜方</p>	<p>一方用蒲黃三兩炒水三升煮取一升頓服 一方用益母草搗絞汁每服一小鍾入酒一合溫服</p>	<p>濟陰綱目 卷十一 惡露不下 五 天德堂</p>	<p>一方用麻子五升酒一升浸一宿明且去滓溫服一升不瘥再服 一升</p>	<p>○血露不絕</p>	<p>大全云夫產後惡露不絕者由產後傷于經血虛損不足或分解 之時惡血不盡在于腹中而臟腑挾于宿冷致氣血不調故令惡 露淋漓不絕也</p>	<p>薛氏曰前證若肝氣熱而不能主血用六味地黃丸若肝氣虛而 不能藏血用逍遙散若脾氣虛而不能攝血用六君子湯若胃氣 下陷而不能統血用補中益氣湯若脾經鬱熱而血不歸源用加 味歸脾湯若肝經怒火而血妄行用加味四物湯若氣血俱虛用 十全大補湯若肝經風邪而血沸騰用一味防風丸</p>	<p>以下諸方失 載當立書 其方</p>
---	------------------------------	--	------------------------	------------------------	----------------	---	----------------------------	---	--------------	---	---	------------------------------

產後忌考藥 而此方用之 亦血崩者無 忌耳

考肺加芍藥湯 治產後血崩眩暈不知人事

川芎 當歸 芍藥各等

右咬咀每服四錢水煎熱服○一方加黃芩白朮

加味四物湯 治產後血崩如豆汁紫黑過多者

川芎 當歸 芍藥 生地黃 蒲黃 阿膠

右水煎服

一方 癰疽後七八日惡露不止

敗醬草 當歸各六 芍藥 續斷各八 川芎

竹茹各四 生地黃 炒乾十

右細剉以水二升煮取八合空心頓服

齊陰綱目 卷十一 惡露不止 未 天德堂

○已上補虛之劑

加味四物湯 治產後月餘經血淋瀝不止此陷下者舉之也

當歸 川芎 白芍 熟地 白芷

升麻 各一 血餘炭 另入

右剉水煎服

余族弟婦產後半月離身過勞下血傾盆急以求救余用此藥

千金方 治產後惡血不盡或經月或半歲者

升麻三兩清酒五升煮取二升半分溫再服

○已上升提之劑

烏金散 治產後血迷血暈敗血不止淋瀝不斷臍腹痛頭目

昏眩多汗無力及崩中下血不止

諸病皆從血 血不止則此 方之妙不在 止而在行行 止而血不止 矣治崩者宜 如此言

妙在地黃為 君

麒麟竭 男子亂髮灰 松墨 收 百草霜 當歸

肉桂 赤芍 延胡索 鯉魚鱗 各等分

右為末每服二錢空心溫酒調下

一方 治產後惡血不絕崩血不可禁腹中絞痛氣急

亂髮 燒一阿膠 二代赭石 乾薑 各三 乾地黃 四

馬蹄殼 燒一個 牛角觔 酥炙 五兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九空心水飲下日二

服

豆淋酒 治產後猶有餘血水氣者

黑豆五升熬令烟盡投磁器內以酒一斗淬之飲蓋豆淋酒

治汚血又能發表也

齊陰綱目 卷十一 血崩不止 七 天德堂

蒲醋飲子 治新產壓血逐敗滋新此藥治血神效又非黑神散

之可比也月內每日一二服尤良及癰一切惡露與血

真蒲黃不拘多少熬米醋令稠和藥成膏每服 湯子大食

前醋湯化開服

一方用蒲黃二兩水煎頓服

一方 療產後泄血不止無禁度及治腹痛胸膈悶

薑黃為末酒服方寸七日三四服

胡氏曰薑黃治惡露不止

○以上行汚血之劑

牡蠣散 治產後惡露淋瀝不斷心悶短氣四肢之弱頭目昏重

五心煩熱面黃體瘦

牡蠣粉各二錢 川芎 熟地 茯苓 龍骨各二錢

當歸各二錢 續斷 艾葉 人參 五味子

地榆各一錢五分 甘草五分

右剉分二帖，加生薑三片，棗一枚，水煎食前服。

○此收澁之劑，虛脫者宜用。

○血崩不止

陳氏曰：產後血崩者，何？答曰：產後傷耗經脈，未得平復，勞役損重，致血暴崩淋瀝不止。或因酸鹹不節，傷氣，氣弱亦變崩中。若小腹滿痛，肝經已壞，為難治。急服固經丸止之。

陳無擇評曰：血崩不是輕病。產後有此，是謂重傷，恐不止酸鹹不節而能致之多，因驚憂怒，臟氣不平，或產後服斷血藥早。

濟陰綱目 卷十一 血崩不止 本 天德堂

致惡血不消，鬱滿作堅，亦成崩中。固經丸自難奏效。不若大料煮芩薊湯，加芍藥，候定續次，隨證諸藥治之，為得。

薛氏曰：前證若血滯，小腹脹滿，用失笑散，血少小腹虛痛，芩薊湯，肝火血多，行加味逍遙散。脾鬱不統血，加味歸脾湯。脾氣虛不攝血，補中益氣湯。厚味積熱傷血，清胃散加槐花。風熱相搏傷血，四君子加防風枳殼。

一產婦血崩，小腹脹痛，用破氣行血之劑，其崩如湧，四肢不收，惡寒嘔吐，大便頻瀉，余用六君加炮薑乾薑，四劑稍愈，又以十全大補三十餘劑而痊。

一產婦血崩，因怒其血如湧，仆地口噤，目斜，手足抽搐，此肝經血耗生風，余用六味九料一劑，諸證悉退，但食少體熱，佐以四君柴

胡牡丹皮而愈。

芩歸加芍藥湯 治產後血崩，眩暈不知人事。

方見前惡露不絕。

加味四物湯 治產後血崩如豆汁，紫黑過多者。

方見前惡露不絕。

奇效四物湯 治產後血崩素有熱者。

方見血崩門。

乾熟地黃散 治產後崩中頭目旋暈，神思昏迷，四肢煩亂，不知人事。

熟乾地黃 黃耆 伏龍肝 赤石脂各一兩 當歸七錢

川芎 阿膠 艾葉 白朮 人參 甘草各半兩

濟陰綱目 卷十一 血崩不止 九 天德堂

右咬咀，每服四錢，生薑三片，水煎溫服。

阿膠丸 治產後崩中，下血不止，虛羸無力。

阿膠 赤石脂各兩半 續斷 川芎 當歸 丹參

甘草各一兩 龍骨 鹿茸 炙 烏賊魚骨 龜甲各一兩

右為細末，煉蜜丸如桐子大，空心溫酒下二三丸。

瑞蓮散 治產後惡血崩漏，狀如涌泉。

瑞蓮一百枚 棕櫚燒存性 當歸各一兩 官桂半兩 枳殼一兩

川芎 鯉魚鱗各七錢 赤石脂一兩

右為細末，每服三錢，煑生薑酒調服，如未止更進一服，或兼時

血崩無藥可治，但進三服即止。

固經丸 治產後血氣未復而有房事及勞役傷損，致血暴崩，或

溫經之劑  
脫以發下元

此方惟心氣  
弱者宜之

心指日遷  
則與尋常之  
病不同矣當  
于血分求之

淋瀝不止

艾葉 赤石脂 補骨脂 木賊 各半 附子 一枚 炮  
右為細末 糊丸 桐子大 每服二九 溫酒或米飲下  
千金方 治產後崩中下血不止  
蒲蒲 一兩半 剉酒二鍾 煎一服 去渣 分三服 食前下

心痛

天全云 產後心痛為陰血虧損 隨火上冲 心絡名曰心胞 絡痛宜  
大岩蜜湯治之 若寒傷心 經名曰心心痛 朝發夕死 夕發朝死 無  
藥可救

薛氏曰 前證若陽氣虛寒 用岩蜜湯溫之 痰血上冲 用失笑散散  
之 血既散而痛仍作 用人參湯補之 大凡心腹作痛 以手按之却  
不痛 此血虛也 須用補養之劑

一產婦患前證 昏憤口噤 冷汗不止 手足厥逆 用六君子加附子  
一錢 以通其陽 二劑頓甦 又以十全大補湯 養其血氣 而安  
一產婦患前證 手不敢近腹 用失笑散一服 瘀血而愈 次日復  
痛 亦用前藥而安

一產婦患前證 用大黃等藥 其血雖下 復患頭痛 發熱惡寒 次日  
昏憤 自以兩手堅護其腹 不得診脈 視其面色青白 余謂脾氣虛  
寒而痛也 用六君子湯加蘇桂而痛止 又用八珍湯加蘇桂而安  
大岩蜜湯一名 治素有宿寒 因產大虛 寒搏于血 血凝不散  
上冲心之絡脈 故作心痛

熟地黃 當歸酒 獨活 吳茱萸 白芍

乾薑

桂心 不見 小草 各一 細辛 甘草 各五  
右剉水煎服 或云熟地黃泥胎 安能去痛 合用生乾地黃  
失笑散 治產後惡血上攻 心腹疼痛 欲死及兒枕痛 或牙關緊  
急 一服可愈

蒲黃 炒 五靈脂 各一  
右為細末 作一服 用醋調膏 入水一盞煎服

金黃散 治惡血上冲 心腹作痛 或發熱作渴  
延胡索 蒲黃 各一 桂心 二 右為末 酒調服

火龍散 治產後氣滯心痛  
茴香 炒 川練子 炒 各 艾葉 諸妙 右為末 水煎服

伏龍肝散 治產後惡物不出 上攻心痛  
海陰綱目 卷十一 心痛 辛 天德堂

赤伏龍肝研細 每服三五錢 溫酒調下 瀉出惡物立止  
一方 治產後惡血冲心 痛氣悶欲絕  
用桂心三兩 搗為細末 向胆汁和丸 如櫻桃大 每服二九 熱  
酒調下 不拘時

一方 治產後血不盡 心腹痛  
荷葉炒 令香 為末 水煎下方寸七

○腹痛 並小腹痛  
薛氏曰 產後小腹作痛 俗名兒枕塊 用失笑散行散之 若惡露  
既去而仍痛 用四神散調之 若不應用八珍湯 若痛而惡心 或  
欲作嘔 用六君子湯 若痛而泄瀉 用六君子湯送四神丸 若  
泄瀉痛而後或後重用補中益氣湯送四神丸 若胸膈飽脹 或

按腹痛原文 尚有數症 曰 因氣滯用五 因血滯用五 因寒用五 因熱用五 因虛用五 因實用五 因加木香 因加木香



<p>因陽氣虛弱用四君當歸炮姜用六君當歸炮姜</p>	<p>發熱惡風血虛用白虎加參湯惡風白虎</p>	<p>因虛寒用四逆散或重溫者兩劑之幸勿誤也</p>	<p>因虛寒用四逆散或重溫者兩劑之幸勿誤也</p>	<p>因虛寒用四逆散或重溫者兩劑之幸勿誤也</p>
<p>惡食吞酸或腹痛手不可按此是飲食所致用二陳加山查白朮以消導若食既消而仍痛或按之不痛或更加頭痛煩熱作渴惡寒欲嘔等證此是中氣破傷宜補脾胃為主○若發熱腹痛按之痛甚不惡食不吞酸此是瘀血停滯用失笑散治之○若止是發熱頭痛或兼腹痛按之却不痛此屬血虛用四物加炮薑參朮以補之○如發渴用白虎氣弱用黃耆血刺痛則用當歸腹中痛則加芍藥宜詳察脈證而用之</p>	<p>一產婦腹痛發熱氣口脈大余以為飲食停滯不信乃破血補虛反寒熱頭痛嘔吐涎沫又用降火化痰理氣四肢逆冷泄瀉下墜始悔問余曰何也余曰此脾胃虛之變證也法當溫補遂用六君子加炮薑二錢肉桂木香各一錢四劑諸症悉退再用補中益氣</p>	<p>濟陰綱目 卷十一 腹痛 一婦人產後腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不甘懷抱久鬱患爾唇麻而盜汗如雨竟夜不敢寐神思消憊余曰氣血虛而有熱用當歸六黃湯內黃芩黃蘗炒黑一劑汗頓止再劑全止乃用歸脾湯八珍散兼服元氣漸復而愈</p>	<p>一產婦小腹作痛服行氣破血之藥不效其脈洪數此瘀血內滯為膿也以瓜子仁湯二劑痛止更以太乙膏下臍而愈產後多有此病縱非難用之更效</p>	<p>一產婦小腹痛小便不利用薏苡仁湯二劑痛止更以四物加紅花桃仁下瘀血而愈大抵此證皆因榮衛不調或瘀血停滯所致若脈洪數已有膿脈但數微有膿脈遲緊乃瘀血下之即愈若腹</p>

<p>口乾有渴想是寒氣乘虛而聚非真寒症也不然何</p>	<p>以羊肉羹愈</p>	<p>既曰惡露不盡不大便而躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則讕語至夜即愈宜大承氣湯主之熱則裏結在膀胱也</p>	<p>者何蓋熱結在膀胱故宜大承氣也</p>	<p>以上數段言惡露不盡</p>
<p>脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜用蠟蜜丸太乙膏及托裏散</p>	<p>一產婦小腹作痛有塊脈芤而澀以四物加玄胡紅花桃仁牛膝木香治之而愈</p>	<p>一產婦後小腹患痛服瓜子仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化為膿最難治療若流注關節則患骨疽失治多為敗證</p>	<p>一婦人寒月中產後腹大痛覺有塊百方不治一人教以羊肉四兩熟地黃二兩生薑一兩水煎服之三次愈</p>	<p>一婦人經水來比常度過多不止遂用瀉藥止之致腹作痛此乃氣血凝滯也用失笑散二服而愈</p>

余按金匱所治重在傷寒裏實不重在惡露故其證皆指實熱言當以無太陽證句及結膀胱句玩之便得其意後案專主惡露言故與前方不同不可一律看也

大全云以惡露不盡腹痛及兒枕心腹刺痛小腹疼痛寒疝分爲四門由母胎中宿有血塊產後不與兒俱下而仍在腹作痛謂之兒枕其惡露下不快而作痛者胎中原無積聚不爲兒枕也若惡露已盡或由他故腹痛如仲景枳實芍藥散證或由血虛腹痛如仲景當歸生薑羊肉湯證自當別論故復臚列諸名方于後若服枳實芍藥散不愈仍當求責瘀血也故下瘀血諸方附焉而補虛諸方終之不復立寒疝條

加味四物湯 治產後惡露不盡腹痛  
濟陰綱目 卷十一 腹痛 諸 天德堂  
當歸 川芎 芍藥 熟地黃各一 香附 炒  
五靈脂 炒二味另爲末各一錢臨服調入  
右到一服水煎服○痛甚者加桃仁泥四分

海藏方四物湯加玄胡索沒藥白芷治產後敗血作痛  
一方四物湯加苦棟 一方四物湯加玄胡索  
當歸蒲延散 治產後血癰作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦  
當歸 八分 桂心 芍藥 炒 血竭 蒲黃 炒各六分  
延胡索 炒四分

右爲末每服二錢空心酒調下

玄胡索散 治產後惡血攻刺腹痛及一切血氣刺痛不論新舊虛實皆可服之

當歸 酒 玄胡索 赤芍藥 蒲黃 炒 桂皮 乳香 沒藥 各等分

右研爲細末每服三錢溫酒調空心服  
延胡散 治產後兒枕腹痛

延胡索 當歸 各一 赤芍 錢五 肉桂 半 蒲黃 炒 琥珀 各二 紅藍花 二

右爲末每服二錢童便酒調食前服  
烏金散 治惡露敗血走刺心腹兒枕痛坐臥不得餘血不快

川芎 七錢半 燒熟 黑附子 半枚 炮 去皮膜

濟陰綱目 卷十一 腹痛 諸 天德堂  
右爲細末每三錢童便和酒調服痛止血下方佳服

地黃散 治產後惡血不盡腹中疝痛  
生地黃 炒 當歸 炒各一兩 生薑 五錢切碎新瓦上炒令焦黑

右爲細末薑酒調下二錢空心服○一方加蒲黃爲丸  
四神散 治產後瘀血不消積聚不散作塊心腹切痛

當歸 乾薑 炮 川芎 赤芍 炒各等分

右爲末每服二錢溫酒調下  
黑神散 治產後血塊痛

熟地黃 一斤 陳生薑 半斤 右二味拌勻同炒乾爲末每服二錢烏梅湯調下常服酒調丹溪方 治產後血塊痛發熱

<p>五靈脂<small>炒四錢</small> 牡丹皮 沒藥 滑石</p>	<p>右研細分五帖 豆淋酒下之食前服</p>	<p>卷荷散 治產後血上冲心 血刺血暈 氣腹痛惡露不快 諸症皆治之</p>	<p>初出卷荷 紅花 當歸<small>各一</small> 蒲黃<small>炒</small> 牡丹皮<small>各半</small></p>	<p>右爲細末 每服三錢 空心鹽酒調下</p>	<p>荷葉散 治產後惡露不下 腹中疼痛 心神煩悶</p>	<p>乾荷葉<small>二</small> 劉寄奴 蒲黃<small>各一</small> 桃仁<small>炒半兩</small></p>	<p>右吹咀 每服四錢 童子小便一盞 生薑三片 生大黃一分 煎至六分 熱服不拘時 一方有鬼箭羽</p>	<p>隱居澤蘭湯 治產後惡露腹痛 或胸滿少氣</p>	<p>澤蘭<small>少</small> 生地黃 當歸 芍藥<small>炒</small> 生薑<small>各</small></p>	<p>甘草<small>分五</small> 大棗<small>個四</small></p>	<p>右剉水煎服</p>	<p>又方 治產後下血不盡 腹內堅痛不可忍</p>	<p>當歸 芍藥 桂心<small>各二</small> 桃仁<small>一百二十粒製</small></p>	<p>右水六升 煮二升 溫分二服 未差加大黃</p>	<p>又方 治產後惡露不盡 結聚小腹疼痛</p>	<p>當歸<small>七錢</small> 香附<small>子製一兩</small> 赤芍 青皮 木香</p>	<p>桂心 琥珀 沒藥<small>各半</small></p>	<p>右爲細末 以烏豆淋酒調服二錢</p>	<p>產寶湯 治產後餘血作痛 兼塊者</p>
--	------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	------------------------------	---	---	----------------------------	--	--	--------------	---------------------------	--	----------------------------	--------------------------	---	----------------------------------	-----------------------	------------------------

<p>桂心 薑黃<small>各等</small> 右爲細末 酒調方寸七 血下盡妙</p>	<p>延胡索<small>一名三聖散</small> 治產後臍下痛 並腰疼</p>	<p>延胡索 桂心<small>各半</small> 當歸<small>一兩</small> 右爲細末 熱酒調下二錢</p>	<p>香桂散 治產後臍下疼痛不止</p>	<p>當歸 川芎<small>各二錢半</small> 桂心<small>半兩</small></p>	<p>右爲細末 分爲三服 每服酒一盞 煎三五沸 更入童便少許 煎至七分 溫服 甚者不過再服 卽愈</p>	<p>當歸血竭丸 治產後惡露不盡 結聚成塊 心胸痞悶及臍下堅痛</p>	<p>當歸 血竭 芍藥 蓬朮<small>炮各二兩</small> 五靈脂<small>四兩</small></p>	<p>右爲細末 醋糊和丸 如梧桐子大 每服五十丸 食前溫酒送下</p>	<p>當歸養血丸 治產後惡露不盡 結聚成塊 小腹疼痛及惡露不快 臍下急痛連及腰脚疼痛</p>	<p>當歸 赤芍 牡丹皮 延胡<small>各二</small> 桂心<small>一兩</small></p>	<p>右爲末 煉蜜丸 如桐子大 空心酒下三四十九丸 痛甚者細嚼下</p>	<p>紫金丹 治產後惡露不快 腰腹小腹痛 如刺時作寒熱頭痛 不思飲食 亦治久有瘀血 月水不調 亦可療心痛</p>	<p>五靈脂<small>水淘去土石 煨乾炒爲末</small> 眞蒲黃<small>各等</small></p>	<p>右以好米醋調五靈脂 慢火熬成膏 次以蒲黃末 攪和 在如櫻桃大 每服一丸 水與童便各半 煮煎至七分 令藥化 溫服之 少頃再一服 惡露卽下 久有瘀血 成塊 月信不和者 並用酒壓下</p>	<p>玉燭散 治產後惡露不盡 臍腹疼痛 大便燥結 時發寒熱</p>
---	---	--	----------------------	---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	---	--	-----------------------------------

此方治產後血暈  
四物合承氣  
主之善藥走  
血之

當歸 川芎 赤芍 熟地 大黃 朴硝 甘草  
右作一服水煎食前溫服○諸方治敗血作痛皆用此則  
流通之理惟此一方却是涼劑蓋為敗血凝滯發熱大便燥結  
者設也非大便燥結者慎不可用

一貴內產後  
腹小如胎  
腹痛不能食  
此方三服而  
愈

枳實芍藥散 金匱云產後腹痛滿不得臥此方主之  
枳實炒令黑 芍藥各等  
右杵為散服方寸匕日三服並主癰腫瘰癧下之

此仲景方也  
又為過少不  
利藥

下瘀血湯 產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹  
中有乾血着臍下宜此方  
大黃二兩 桃仁二十枚 蟅蟲二十枚  
右三味末之煉蜜和為四九以酒一升煎一丸取八合頓服之

脈肝者即驚  
血之下也新  
血二字非

新血下如豚肝  
保命方 治血暈血結或聚于胸中或偏于小腹或連于脇肋四  
物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭羽紅花延胡各一兩同為末  
加下四味煎調沒藥散服

千金桃仁芍藥湯 治產後腹痛  
蟅蟲二錢土 水蛭一錢 麝香許 沒藥  
右為末入前藥調服血下痛止則服一服

桃仁 芍藥 川芎 當歸 桂心 乾漆  
甘草各二兩  
右細切水八升煮二升半分三服

○以上治瘀血腹痛之劑皆當劑宜斟酌用之

增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱惡露停滯亦令寒熱  
但看小腹急痛為異

當歸 白芍 川芎 人參 甘草  
乾薑二兩

右咬咀每服四錢薑三片水煎無時熱服

獨聖散 治產後血虛腹痛  
當歸一味為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

當歸散 治產後陰血虛弱或氣滯血凝以微發熱腹痛或腹脇  
脹滿

當歸 乾薑各等  
右剉每服三錢水煎服

定痛散 治產後惡血不止  
當歸 芍藥各二錢 肉桂一錢  
右切作一服水酒各一盞半加生薑五片煎一盞服

當歸中湯 治婦人產後虛羸不足腹中刺痛不止吸吸少氣  
或苦小腹中急痛引腰背不能飲食

當歸 芍藥 桂枝 甘草 生薑  
大棗十二枚

右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日令盡○若大虛加  
飴糖六兩湯成內于火上緩令飴消○若去血過多筋傷內動

不止加地黃六兩阿膠二兩合八味湯內阿膠服之

羊肉湯 治產婦脾虛為寒邪所乘以致腹痛及寒月生產寒氣

人于產門臍下脹滿手不可犯

精鷄羊肉四兩 當歸 川芎各半 生薑一兩

右以水十盞酒三盞煮至四盞分四次空心服加蔥鹽亦可

衍義云一婦人產後寒月寒氣入產門臍下脹滿手不得犯此寒痼也醫當治之以抵當湯謂其有瘀血耳予教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減作二服愈

千金方 治產後餘疾腹中絞痛瘦之不下食

當歸 黃芪 芍藥各六錢 乾地黄 白木各八分

桂心 甘草各四分 大棗十四枚

右咬咀木二升煮八合空心服忌生冷

○以上治虛寒腹痛之劑

濟陰綱目 卷十一 腹痛 天德堂

生料五積散 治產後內有餘血外感寒邪相搏而腹痛

蒼朮二錢 麻黃去根 橘紅 枳殼各六分 桔梗二分

厚朴 乾薑炮各 當歸 白芍 川芎

白茯苓 半夏 白芷 肉桂 甘草各三分

右加薑蔥水煎服

○右方治寒邪腹痛之劑非真受寒氣者不可輕用

○脇脹痛

脇脹痛由脇肋停水所致見何足痛用蠶水壅痞與氣相搏積在脇肋故令脇肋脹滿氣與水相激故令痛也

薛氏曰前症若肝經血瘀用玄胡索散若肝經氣滯用四君青皮

柴胡若肝經血虛用四物參朮柴胡氣血俱虛用八珍柴胡若腎水不足不能生肝用六味先若肺金熱盛剋制肝木用瀉白湯仍

參前論主之

一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛余以為氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯而寒熱漸退此症苟非用薑桂辛溫助脾肺以行藥勢不惟無以施功而反助其脹矣

乾地黄湯 治產後兩脇滿痛兼除百病

乾地黄 芍藥各三兩 當歸 蒲黃各二兩 桂心六兩

甘草兩 生薑五兩 大棗二十枚

右咬咀以水一斗煮取二升半分服日三

濟陰綱目 卷十一 腹痛 天德堂

經效方 治產後肝經氣滯不平脇脹腹痛或寒熱往來內熱喘

當歸一兩 芍藥半 苦梗 枳殼各八分

桂心 青木香 柴胡各六分

右剉水煎服

蘇葛湯 療產後惡露不下血氣壅滯脇脹痛不下食

蘇木 紫葛各十 芍藥 當歸各八 桂心

蒲黃各六 生地黃汁

右咬咀以水二升煎七合下蒲黃分兩服

經效方 理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥各 當歸各 延胡索 蒲黃各四 荷葉蒂枚

行血為主

右水二升煎取八合後入蒲黃空心分二服

當歸散 治產後腹痛脇肋脹滿

當歸 乾薑 各等分

右爲末酒服三錢水煎入鹽醋少許食前熱服一方酒服

廣濟方 療產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微利

厚朴 人參 當歸 茯苓 甘草 各六分

陳皮 生薑 各四分

右咬咀以水二升煎取八合去滓分溫服

抵聖湯 治產後腹痛脇肋脹滿或嘔吐者

赤芍 半夏 澤蘭葉 陳皮 人參 甘草 各等分

右咬咀每服四錢薑五片水煎溫服

濟陰綱目 卷十一 腰痛

○腰痛

大全云腎主腰脚。產後腰痛者爲女人腎位繫于胞。產則勞傷腎氣損動。胞絡虛未平復而風冷客之。冷氣乘腰故令腰痛也。若寒冷邪氣連滯背脊則痛久未已後忽有娠必致損動。蓋胞絡屬腎。腎主腰故也。

薛氏曰前證真氣虛邪乘之者用當歸黃芪湯或十全大補湯爲

主佐以寄生湯如不應用十全大補加附子

一產婦腰痛腹脹善噎諸藥皆咽余以爲脾虛血弱用白朮一味

炒黃每劑一兩米泔煎飲時匙許四劑後漸安百餘劑而愈

當歸黃芪湯 治產後失血過多腰痛身熱自汗

當歸 黃芪 白芍 各二兩

此方治氣血虛者不宜服

以上七方並

此方治氣血虛者不宜服

右咬咀每服六錢加生薑五片水一盞半煎至一盞溫服不拘時

玄胡四物湯 治血癖腹痛及血刺腰痛

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各七錢半

玄胡索 酒煮 右爲細末每服三錢酒調下

如神湯 治產後瘀血腰疼

延胡索 當歸 桂心 各等分 右水煎服

又如神湯 即生料五積散 逐敗血去風濕

五積散方見前腹痛條

廣濟方 治產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉

敗醬 當歸 各八分 川芎 芍藥 桂心 各六分

濟陰綱目 卷十一 腰痛

右咬咀水二升煎取八合分溫二服忌葱

寄生防風湯 治產後風邪頭眩腰痛不可轉側四肢沉重行步艱難

獨活 川芎 芍藥 炒黃 桂心 續斷 各等分

生薑 桑寄生 各六分 當歸 防風 各八分

右剉水煎服

桃仁湯 治產後惡露方行忽然漸少斷續不來腰中重痛或流注兩股痛如錐刺此由血滯于經絡不即通之必作癰疽宜桃

仁湯恐有癰者預服五香連翹湯

桃仁 去皮 蘇木 生地 各半 蠶蟲 去翅 炒 各三錢

右每服三錢水煎空心熱服惡露下即住服

既為瘀血何以只用五香行氣藥為病血于氣也射者分兩也

五香連翹湯 治產後瘀血腰痛作癢

木香 丁香 沉香 乳香 射香 升麻

獨活 桑寄生 連翹 木通各二兩

右為產末每服五錢水煎入竹瀝少許服

○頭痛

大全云夫頭者諸陽之會也凡產後五臟皆虛胃氣虧弱飲食不克穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上炎于頭陽實陰虛則令頭痛也○又有產後敗血頭痛不可不知黑龍丹言之甚詳

薛氏曰前證若中氣虛用補中益氣湯加荳蔻子若血虛用四物加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎

產後腹痛

天德堂

一產婦患頭痛日用補中益氣湯不效已三年矣稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加附子一錢數劑不發

一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥余謂腎水不能生肝木而血虛用六味丸加五味子兩月而瘳

郭茂桐婢金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無聯息間每頭痛甚欲取大石壓良久漸足心痛作則以十指抓臂血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剗取之如是十日不已眾醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服乃瞑目寢如平時至清晨下一行約三升許如蝗蝻子

三疾減已刻又行如前則頓愈矣此虫咬痛也不如用殺虫藥更神效

一奇散 治產後血虛頭痛

當歸 川芎各二錢半

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

普烏散 治產後氣滯頭痛

天台烏藥 大川芎各等分

右為細末每服三錢燒紅秤鍾淬酒調服

芎附散 治產後氣虛頭痛及敗血作梗頭痛諸藥不效者

川芎 大附子一箇去皮臍切四片拌酒醋一

右為末每服二錢清茶調服

加減四物湯 治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛

蒼朮一兩 羌活 川芎 防風 香附炒

白芷各一兩 石羔二兩 細辛一兩 當歸 甘草各五錢

右到每服一兩水煎服無時○如有汗者知氣虛頭痛也加芍藥三兩桂一兩半生薑煎○如熱痰頭痛加白芷三兩

兩知母一兩○如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑三片煎服

○遍身疼痛

大全云產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脈流散遇氣弱則經絡肉分之間血多流滯累日不散則骨節不利筋脈急引故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若鑿以為傷寒治之則汗出而筋脈動傷手足厥冷變生他證但服起痛散除之

薛氏曰前證若以手按而痛甚者是血滯也用四物炮薑紅花桃仁

澤蘭補而散之若按而痛稍緩是血虛也用四物炮薑人參白朮

按法甚妙

治產後血虛頭痛

治產後血虛頭痛

治產後血虛頭痛

補而養之

一產婦身腹作痛。發熱不食。煩躁不寐。盜汗脇痛。服解散祛血之藥。不時昏倒。六脈洪大如無用。補中益氣加炮薑半夏一劑。頓退。三三又劑。寢食甘美。但背強而痛。用八珍散大補湯調理而安。一產婦遍身頭項作痛。惡寒拘急。脈浮緊。此風寒之證也。用五積散一劑。汗出而愈。但倦怠發熱。此邪風去而真氣虛也。用八珍湯調理而痊。

一婦六月產後。多汗入倦。不敢袒被。故汗出被裏冷。則浸漬得風。濕疼痛。遂以羌活續斷湯數服而愈。

逐痛散 治產後氣弱血滯。筋脈拘攣。要背強直。遍身疼痛。

當歸 官桂 白朮 黃芪 獨活 牛膝

濟陰綱目 卷十一 遍身疼痛 天德堂

此方根氣弱來故用藥

生薑各五錢 甘草 非白各三錢 右咬咀。每服五錢水煎服。加桑寄生半兩九佳。

五積散 治產後身痛。兼感寒傷食。

方見前腹痛條。與四物湯各半服之。穩當。

加味四物湯 治產後血虛身痛。

當歸 川芎 人參 芍藥 熟地 白朮

乾薑 右剉作一服水煎服。

大前方 治產後遍身青腫疼痛及眾疾。

牛膝 大麥蘖各分。

右爲細末。以新瓦罐子中填一重麥蘖。一重牛膝。如此填滿。用鹽泥固濟。火煨過赤。放冷研爲散。但是產後諸疾。熱酒調下。二

令人心曠

錢

○脚氣

大全云。產後熱。脚氣上。轉爲脚氣者何。答曰。產臥血虛。生熱。復因春夏取涼過多。地之蒸氣。因足履之。所以着爲脚氣。其狀熱。悶。凝。驚。悸。心煩。嘔吐。氣上。皆其候也。可服小續命湯。方見後。兩三劑。必愈。若醫者誤以逐敗血。藥攻之。則血去而疾愈增矣。

陳無擇評曰。脚氣固是常病。未聞產後能轉爲者。往讀千金。見產婦多有此疾之語。便出是證。文辭害意。蓋可見矣。設是熱。悶。氣上。如何便服續命湯。此藥本主少陽經中風。非均治諸經脚氣。要須依脚氣方論。陰陽經絡調之。此涉專門。未易輕論。既非產後要病。更不繁引。

濟陰綱目 卷十一 脚氣 天德堂

準繩云。陳無擇雖有此論。然小續命湯。加減與之用。無不效。故百問云。寒中三陽所患。必小續命湯主之。加生薑。汁更快。暑中三陰所患。必熱小續命湯。桂附子。減。大煩躁者。紫雪最良。予取百問中。加減治如無紫雪。用真薄荷煎冷水。嚼下。集云。諸方必與附子。薛氏曰。前證當補氣血爲主。佐以小續命湯。寄生湯。如不應。用大

防風湯。

一產婦患前證。或用獨活寄生湯而痊。後復作。服前湯。其汗如水。更加口噤。吐痰。余用十全大補湯。倍養血氣。漸愈。後飲食日少。肌體日瘦。吐痰如湧。此命門火衰。脾土虛寒。用八味丸。及加味歸脾湯。諸證漸退。肌肉漸生。

獨活寄生湯 治肝腎虛弱。或久居濕冷之地。或洗足當風。濕毒



內攻兩腰。縱經。變痛痺弱。或皮肉紫破。足膝重。又專治產後脚氣。

川獨活三兩 桑寄生如無以續斷代 杜仲炒 牛膝去酒浸

細辛 官桂不見火 白茯苓 防風

川芎 當歸 人參 熟地黃酒洗

芍藥 秦艽各二兩 甘草炙

右咬咀。每服四錢。薑五片。水煎溫服。

大防風湯 治陰虛邪襲。腿膝腫痛等證。

防風 附子炮 牛膝酒浸 白朮炒 羌活 人參

肉桂 黃芪炒各一錢 川芎 熟地黃各一錢 芍藥炒

杜仲姜汁炒 甘草炙

濟陰綱目 卷之十二 腳氣

右到水煎服 卷之十二 終

濟陰綱目卷之十二

關中 武之望叔卿父輯著 武林 朱長春承家訓

西陵 汪 洪憺子箋釋 天都 查 望子 歸 蔡 闕

○外感風寒

李氏曰。產後外感。離牀太早。或換衣。感風。令人下部。令人寒熱似

瘧。頭疼。不眠。血虛者。芍歸湯。加人參。紫蘇。乾葛。血氣虛者。補虛湯。

加陳皮。乾薑。寒熱甚者。熱料五積散。熱不止者。黃龍湯。主之。如體

盛發。熱惡寒。及瘧痢者。小柴胡湯。合四君子。四物湯。加黃芩。台三

分。散切。不可以傷寒治法。若誤服熱藥。過多。熱證大見。久而便閉

者。柴胡破瘀湯。或四物湯。加大黃。芒硝。暫服。即調補之。

良方曰。產後外感風寒。發熱。頭痛。身疼。雖如傷寒。時氣。當用麻黃

湯。陰綱目 卷之十二 外感風寒 一 天德堂

亦不可。輕易。如早起。勞動。為寒所傷。則漸漸惡寒。翁翁發熱。頭項

肩背骨節皆痛。至七八日。乃差。若大便堅。作嘔。不能食。用小柴胡

湯。加生薑。地黃。

吳氏曰。新產後。患傷寒。不可輕易發汗。蓋有產時。傷力。發熱。去血

過多。發熱。惡露。不去。發熱。三日。蒸乳。發熱。或有早起。勞動。飲食。停

滯。一皆發熱。狀類傷寒。要在仔細。詳辨。切不可。輕便。發汗。大抵產

後。大血。空虛。若汗之。則變崩。傷肉。咽。或傷胃。昏迷。而不省。或風搖

搦。而不足。或大便閉。澀。而難去。其害非輕。切宜詳審。凡有發熱。且

與四物湯。以川芎。當歸。為君。最多。白芍。藥須炒過。酒蒸。熟地。黃佐

之。如發熱。加軟苗。柴胡。人參。乾薑。炮之。最効。蓋乾薑。之辛熱。能引

血藥入血分。氣藥入氣分也。且能去惡。養血。有養生陰。最之道。以

等分法乃著  
守法

仲景所謂中  
風即今人所  
謂傷風也  
傷者從仲景  
方也

以竹葉乾薑  
湯君為面赤  
而喘也然不  
用血藥而用  
參桂中風  
也此雖大法  
須用其方  
附子亦須  
用

邪氣虛入外  
而也若中風  
不可治矣  
即白亦須從

熱治熱。深合內經之旨。予嘗用之。取効如神。故錄以勸。如有惡露  
未盡者。益母丸黑神散必兼用之。若門虛少食者。必加白朮茯苓  
有痰喘逆者。必加陳皮半夏。其餘六經。各條治例。皆同。但中必  
加四物湯為主。乃養血務本之要也。

大全云。凡產後發熱頭痛身疼。不可便作感冒治之。此等多是血  
虛。或敗血作梗。宜以平和之劑與服。必効。如玉露散。或四物湯加  
北柴胡等分煎服。若便以小柴胡湯。及竹葉石膏湯之類。竟不救  
者多矣。

產後中風。數十日不解。頭微痛惡寒。時時有熱。心下悶乾嘔。汗出  
雖多。陽旦證耳。可與陽旦湯。即桂枝湯  
方見傷寒。

加味芍歸湯。治產後血氣虛。外感風寒。頭疼。增寒壯熱。

濟陰綱目 卷十二 外感風寒 二 天德堂

當歸 川芎 各二錢 人參 紫蘇 乾葛 各一錢

右劉加生薑三片。水煎服。

竹葉湯。治產後中風發熱面赤。喘而頭痛。

竹葉 葛根 防風 桔梗 桂枝

人參 甘草 各一兩

右咬咀。每服五錢。棗一枚。薑五片。水一盞半。煎一盞。去滓服。溫

覆使汗出。若頭項強。用大附子半錢。煎藥。湯去沫。嘔者加半夏

一錢。

○中風

大全云。夫產後中風者。由產時傷動血氣。勞損臟腑。未曾平復。早  
起勞動。致使氣虛。而風邪乘虛入之。故風邪冷氣。客于皮膚經絡。

本氣為主

但疼痺。虛之。不任小氣。大凡筋脈挾寒。則急。急則解。解則緩。  
虛弱若入諸藏。恍惚驚悸。隨其所傷。臟腑經絡而生。皆  
邪積中。論曰。產後中風者。何答曰。產後五七日內。強力下床。或一  
月之內。傷于房室。或懷憂怒。擾盪中和。或因食生硬。傷動氣。得  
病之初。眼澀口燥。肌肉羸。漸至腰脊筋急。強直者。不可治。此乃  
人作非。偶爾中風所得也。

薛氏曰。前證果外邪所屬。形氣不足。病氣有餘。當補元氣。為主。稍  
佐以治病之藥。若強力不休。月內入房。屬形氣俱不足。當純補元  
氣。多有復甦者。若誤投風藥。乃促其危也。

丹溪曰。產後中風。口眼喎斜。必用大補氣血。然後治療。當以左右  
手脈。分其氣血多少。以治切。不可作中風治。而用小續命湯。及發

表治風之藥。

濟陰綱目 卷十二 中風 三 天德堂

大全云。產後下血過多。虛極生風者。何答曰。婦人以榮血為主。因

產血下太多。氣無所主。唇青肉冷。汗出。目眩神昏。命在頃刻。此

虛極生風也。宜急服濟危上丹。若以風藥治之。則誤矣。

薛氏曰。前證若心脾血氣俱虛。用大補湯。如不應。加附子。鈞藤。鈞

若肝經血虛。用逍遙散。加鈞藤。經云。脾之榮在唇。心之液在汗。若

心脾二藏虛極。急用參附湯救之。

一婦人患前證。用諸補劑。四肢逆冷。自汗泄瀉。腸鳴腹痛。余以陽

氣虛寒。用六君子加薑附各五錢。不應。以參附各一兩。始愈。良久

不服。仍腸鳴腹痛。復灸關元穴百餘壯。及服十全大補湯方効。

大全云。產後中風。口燥者是血氣虛。而風入于頸項。夾口之筋也。

反張在百脈  
太陽及百脈  
二種果爲  
風中不能  
用藥治之  
子四物不  
配用

手三陽之筋結入于頰。產則勞損。故胸仍于筋脈。風者卡之。其三陽之筋脈。則偏持之。筋得風。冷則急。故令口噤也。

大全云。產後角弓反張者。是體虛受風。風入諸陽之經也。人之陰陽經絡。周環于身。風邪乘虛入于諸陽之經。則腰背反折。變急如角弓之狀也。

薛氏曰。前證因氣血耗損。腠理不密。汗出多多而思者。虛象也。宜固氣血爲主。佐以木方。丹溪曰。產後當大補氣血。爲先。雖有他症。以未治之。如惡寒發熱等症。乃氣血虛甚之極也。宜大劑參耆歸朮肉桂以培養之。如不應。急用炮附子。再不應。用人參一兩。炮附子二三錢。名參附湯。倘有未應。乃藥力未能及也。宜多用之。

小續命湯 治產後中風。身體緩急。或頑痺不仁。或口眼喎斜。牙齦陰綱。用。卷十二中風。天德堂。

防風 麻黃 黃芩 芍藥 人參 川芎 防己 肉桂 附子 杏仁 炒各五分 甘草 炙四分

右剉加生薑水煎溫服。○有熱去附子減桂一半。○有汗去麻黃加葛葛○骨節煩疼去附子加芍藥○精神恍惚加茯神遠志○煩心多驚加犀角○嘔逆腹脹加人參半夏○骨間疼痛加附子宮桂○臍寒下痢去防風黃芩加附子白朮○煩悶大便澀去附子加芍藥入竹瀝○盛冬初春去黃芩。

華陀愈風散 治產後中風口噤牙關緊急手足痠痲如角弓狀亦治產後血暈不省人事四肢強直或心眼倒藥吐瀉欲死此藥清神氣通血脈其効如神。

和氣味辛  
不寒不熱  
散不傷氣  
不寒和且  
血分風邪  
以豆酒或  
便飲服火  
外不可言  
產後血暈  
方也

荆芥穗 指迷方加當歸等分

右爲末每服三錢黑豆酒調服或童子小便亦可口噤者開灌之或吹鼻中皆効○李時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散藥下可立効陳氏方名爲古今散通存敬方用古老錢煎湯服各一捻金許叔微本方云此藥委有奇効神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事皆用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然皆驗產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成宜服此藥也戴氏證治要訣名獨行散實似道悅隨抄呼爲再生丹

血風湯 治產後諸風變急或痿弱無力 隨抄呼爲再生丹

秦艽 羌活 防風 白芷 川芎 芍藥 當歸 熟地 白朮 茯苓 各等

右爲細末每服三錢溫酒調服一半煉密丸如桐子大每服五七十丸溫酒下

防風湯 治產後中風背項強急胸滿氣短

防風 獨活 各去 葛根 各五 當歸 人參 白芍 甘草 炙各 二兩

右咬咀每服八錢水一盞半棗二枚煎一盞溫服

雲岐方 治產後中風半身手足不遂言語蹇澀恍惚多忘精神不定

獨活 當歸 芍藥 防風 川芎

玄參 天麻 各五錢 桂心 三錢

右咬咀以水八升煮取二升半分爲三服覺効更作一劑又作九每服二十九○如有熱加葛根五錢○有冷加白朮五錢○有氣證加生薑一兩半○手足不遂加牛膝一錢半草薢三錢黃耆四錢○腹痛加芍藥當歸各七錢半○不食加人參五錢玄參一兩○若寒中三陰所患必冷小續命湯加薑煎○若暑中三陽所患必熱小續命湯去附子減桂一半加薄荷煎

防風羊角湯 治產後氣血不足風邪所襲肢體攣痛背項強直

防風 兩 赤芍 炒 桂心 各半 羚羊角 川芎

羌活 當歸 酸棗仁 炒 牛蒡子 炒各二錢

右剉每服四錢水煎服

濟陰綱目 卷十二 中風 六 天德堂

川芎散 治產後中風身背拘急有如繩束

川芎 羌活 羚羊角屑 酸棗仁 炒

芍藥 炒黃各 桑白皮 一兩 防風 去蘆一兩二錢

右剉每服一兩水煎日進三服

濟危上丹 治產後去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出目

頭昏命在須臾此虛極生風也急服此藥若以風藥治之則誤矣

乳香 五靈脂 硫黃 玄精石 以上各另研極細

阿膠 炒 蛤粉 卷柏 生 桑寄生 陳皮 等分

右將前四味同研勻入石臼內微火炒再研極細後入餘藥末用生地黃汁丸如桐子大每服五十丸食前溫酒或當歸湯下

此方以獨活一味而治風則妙矣于治虛則本也五

獨活 兩半 大豆 升 酒 三升

右先用酒浸獨活煎二三沸別炒大豆令極熟焦爛出以酒沃之去渣每服一二合許得少汗則愈日夜數服一以去風一以消血結如妊婦折傷胎死在腹中服此即產○一方無獨活只用大豆炒焦淋酒服

獨活酒 治產後中風

獨活 斤 桂心 兩 秦艽 兩五

右三味咬咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能多飲隨性服

雞矢酒 治產後中風及百病並男子中一切風神効

濟陰綱目 卷十二 中風 七 天德堂

烏雞糞 炒黃 大豆 升 妙令

右二味以清酒三升乘熱先淋雞糞次淋大豆取汁每服一升溫服取汗病重者凡四五服無不愈

交加散 治產先後百病兼治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚爲癥產後中風並宜服之

生地黃 一升 研取 生薑 十二兩 研

右將地黃汁炒生薑滓生薑汁炒地黃滓各稍乾焙爲細末每服三錢溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後尤不可離

一物獨活湯 治產後中風虛人不可服他藥者此藥及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煎服

川獨活 三兩 細切以水三升煮取一升分服飲酒者亦可酒

水煎○白鮮皮亦依獨活法

羌活散 治產後中風語謬四肢拘急

羌活三兩為末每服五錢水酒各半煮服

右產後中風用續命湯及羌活發散之藥必詳氣血以四物四君子相與各半停對分兩服之可也

○發瘧 一作瘧

郭稽中曰產後汗出多而變瘧者因產後血虛腠理不密故多汗出遇風邪搏之則變瘧也口噤不開背強而直如發瘧瘧者狀搖頭馬鳴身反折須臾又發氣息如絕宜速幹口灌小續命湯稍緩即汗出如雨手摸空者不可治也

薛氏曰產後發瘧因去血過多元氣虧極或外邪相搏以致牙關

濟陰綱目

卷十二 中風 八 天德堂

緊急四肢瘧強或腰背反張肢體抽搐若有汗而不惡寒者曰柔瘧無汗而惡寒者曰剛瘧由亡血過多筋無所養而致故傷寒汗下過多潰瘍膿血大泄多患之乃敗證也急以十全大補湯大補血氣如不應急以附子或保無虞若攻風邪死無疑矣

夷堅志云杜王治郝質子婦產四日瘧瘧眼弓背反張王以為瘧病與大豆紫湯獨活湯而愈政和間余妻方分娩猶在瘧中忽作此證頭足反接相去幾二尺家人驚駭以數婢強拘之不直適記所云而藥草有獨活乃急為之召醫求至連進三劑遂能直腰至即愈矣更不須用大豆紫湯古人處方神驗屢矣

陳臨川曰凡產後口噤腰背強直角弓反張皆名曰瘧又名曰瘧古人察有汗無汗以分剛柔陰陽而治今產後諸書有中風口噤

一門又有角弓反張一門其實一也如增寒發熱有煩傷寒皆不論及豈可只以一二藥治之

按素問有瘧字而無瘧字仲景太陽經有瘧病而無瘧字則今書中瘧字乃瘧字傳寫之誤也夫勁瘧二字諸體諸聲而瘧之病狀有項背勁急反張之相則從瘧字無疑若瘧字于義莫解故當以瘧字為正且寒主收引風寒在太陽經而項背強直者太陽筋病也諸方皆主續命從仲景論矣郭氏不問產後虛實邪之有無而繫宗之似乎一偏至薛氏又為產後亡血過多非急用十全大補不可若攻風邪死無疑矣又一見也及夷堅志案以大豆紫湯獨活湯而愈者則又主于風矣是續命亦不為妄但本方有麻黃附子于氣血兩虛之人不可輕用而郭氏論

續命湯

卷十二 中風 九 天德堂

又有速瀉之說稍緩即汗出如雨反不以麻黃為忌何其語之切也二說均不可廢臨證之際詳之可也

方見前中風

小續命湯 治產後汗多變瘧口噤背強或搖頭馬嘶不時舉發氣息如絕

陳臨川云陳無擇評因產後汗出多變瘧亦令服小續命湯此又難信既汗多如何更服麻黃官桂防已黃芩連不若大豆紫湯為佳局方大聖散亦良藥也愚觀朱奉議云凡剛柔二瘧小續命湯並可加減與之若柔瘧白汗者去麻黃加葛根之說朱奉議必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦不可偏見曲說有妨古人之意

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風痲痺背強口噤直視煩熱服緊大者不治

方見前中風

大豆湯 治產後卒中風發瘧倒悶不知人及娠姪挾風兼治在尋諸疾

大豆五升炒 葛根 獨活各一兩 防已六兩

右咬咀每服五錢酒二盞煎至一盞半去渣溫服不拘時日三服

一方 治產後中風諸弊癱瘓自汗出者及餘百疾

獨活八兩 當歸四兩

右咬咀以酒八升煮取四升去滓分四服日三夜一取微汗

十 天德堂

若中氣者加桂心二兩不遑更作

羚羊角飲子 治產後氣實腹中堅硬兩脇脹滿心中煩熱渴欲飲水飲成剛瘧中風之疾

羚羊角半兩 防風 羌活 桔梗並去 敗醬各八錢

桂心 柴胡 大黃酒浸過 各

右咬咀每服五錢水一大盞半同煎至一盞去渣溫服不拘時

更服地黃酒用地黃切一升炒令黑甕瓶中下熱酒三升密封

口煮令減半任意服之

防風當歸散 防風 川芎 當歸 地黃各五錢

右剉每服一兩水三盞煎至一盞溫服

婁氏曰續命湯大豆紫湯舉卿古拜散太陽厥陰藥也邪實服

浮弦有力者固宜但產後血氣大虛之人不宜輕發其表但用防風當歸散治之為妙

○瘕瘕

薛氏曰瘕者筋脈拘急也瘕者筋脈張縱也經云肝主筋而藏血

蓋肝氣為陽為火肝血為陰為水前證因產後陰血去多陽火熾

盛筋無所養而然耳故瘕瘕膿水過多金瘡出血過甚則陽隨陰

散亦多致此治法當用八珍加丹皮鈎藤以生陰血則陽火自退

諸證自愈如不應當用四君芍歸丹皮鈎藤以補脾土蓋血生于

至陰至陰者脾土也故少兒吐瀉之後脾胃虛損亦多患之乃虛

家也無風可逐無痰可消若屬陽氣脫陷者用補中益氣加蒼桂

陽氣虛敗者用十全大補加桂附亦有復生者此等證候若肢體

痿痺脈微細者此為真狀若脈浮大發熱煩渴此為假象惟當固

本為善若無力抽搐戴眼反折汗出如珠流者皆不治

一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸肢體痿軟汗出如水余謂

前藥辛香耗散真氣廢理虛而津液妄泄也先用十全大補湯加

五味子補實勝理收斂真氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸

愈用逍遙散大補湯調理而痊

一產婦先胸膈乳內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺

左三部脈弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養經先用加味

逍遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸諸證悉愈

一婦人發熱遺尿自汗面赤或時面青飲食如故肝脈弦緊余曰

此肝經血燥風熱名瘕也肝主小便其色青入肝則赤法當滋陰

此即愈風湯  
治產後中風牙關緊急不省人事口吐涎沫手足痙攣

血清肝火。遂用加味逍遙散。不數劑。諸證悉退而安。

一婦人產後。血風患此。以小續命湯。數服而安。

產後因虛。傷風痙攣。同傷寒表證。未傳入裏。宜服防風湯。

防風湯。治風虛發熱。項背拘急。肢體不隨。恍惚狂言。來去無時。

不自覺悟。亦治脚氣。緩弱甚効。此藥溫和不虛人。

秦艽。獨活。麻黃。桂枝。白芍。黃芩。當歸。羌活。防風。升麻。

防己。白朮。石膏。白芍。黃芩。當歸。羌活。防風。升麻。

人參。甘草。各一。

右為盆末。每服四錢。水二盞。生薑七八分。煎至一盞。去滓。取

清汁六分。入麝香末少許。食後。臨臥。帶熱服。

華陀愈風散。方見前中風。

治產後中風牙關緊急不省人事口吐涎沫手足痙攣

當歸。荆芥。各一。

右為細末。每服二錢。水一盞。酒半盞。煎至半盞。灌之。如牙關緊

急。擰開微灌之。但下咽即生。屢用。救人。大有神效。

增損柴胡湯。治產後感冒。手足痙攣。遍潮皆周。

柴胡。黃芩。人參。甘草。半夏。各一。

黃芪。石膏。知母。各一。

右咬咀。分二服。水二盞。生薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

秦九湯。前證已去。次服此藥。去其風邪。

秦艽。芍藥。柴胡。防風。黃芩。各一。

人參。半夏。甘草。各一。

此方采肝去

此方采肝去

石改咀作二帖。每帖加生薑三片。水煎。食遠服。

○拘攣

大全云。產後中風。筋脈四肢攣急者。是氣血不足。臟腑俱虛。月內

未滿。起早勞役。傷風。虛損未復。氣血所乘。風邪。初客于

皮膚。經絡。則令人頑痺不仁。麻木。少氣。風氣入于筋脈。挾寒。則攣

急也。

薛氏曰。肝屬木。而主筋。前證若肝經風熱。血燥。用加味逍遙散。如

不應。當用六味地黃丸。以補腎水。經云。風客淫氣。精乃亡。邪傷肝

也。傷筋。則難。治之。

一產婦。產後。患此。此氣血虛。而自熱也。用十全大補

湯而安。

治產後中風牙關緊急不省人事口吐涎沫手足痙攣

一產婦。手麻。服愈風丹。遍身皆麻。神思倦怠。余謂氣血虛弱。用十

全大補。如神。蓋數劑。其氣又數劑。及逍遙散而痊。

治一切筋骨拘攣疼痛。蓋因風濕所傷。氣血凝滯。經絡

不行。所致。其效如神。

羌活。片子薑黃。甘草。海桐皮。各一。

當歸。赤芍。白朮。各一。

右切作一服。加生薑三片。水煎。去滓。磨沉香末少許。入內。溫服。

上藥食後。服以下痛食前。

治產後中風。四肢筋脈疼痛。學急背項強急。

羌活。羌活。當歸。酸棗仁。羚羊角。各一。

防風。牛黃。桂心。赤芍。各一。

此即愈風湯

利便也

親薛氏所言  
亦先治風后  
補要得其  
厥

右咬咀每服八錢水煎服不拘時

薛氏曰前方如不愈當用八珍湯更不應用十全大補湯

防已膏 治產後中風四肢筋脈身骨麻痺

漢防已 半斤 茵芋 兩五

右咬咀用酒五升浸藥一宿取猪脂肪一斤文武火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處以熱手不住摩膏上千遍

○不語

本論所重在  
散而七珍  
散不用破血  
之味為其本  
于虛

大全云人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉于心竅神志不能明了又心氣通于舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服七珍散

薛氏曰經云大腸之脈散舌下又云脾之脈是動則病舌不強不

濟陰綱目 卷十二 拘攣 天德堂

能言又云腎之別脈上入于心繫舌本虛則不能言竊謂前此石

心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱加味逍遙散加

防風白芷脾經風熱秦朮升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風

白芷脾氣鬱結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡加鉤藤鈎

脾受土侮六君加升麻白芷鈎藤鈎肝脾血虛用佛手散脾氣虛

用四君子氣血俱虛八珍湯如不應獨參湯更不應急加附子

補其氣而生其血若竟用血藥則誤矣

一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱肺熱肢體倦怠飲食

不進用加味歸脾湯為主佐以七珍散而愈後因怒不語口噤腰

背反張手足發搐或小便見血面赤或青或黃或時兼赤余曰面

青肝之本也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加鈎藤

拘攣尋遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

李氏曰有臨產服湯藥過多胃濕使然者熱料五積散六君子湯

○痰熱迷心不語者導痰湯或痰氣鬱滯閉目不語者用孤鳳散

七珍散 治產後虛弱多致停積敗血閉于心竅神志不明又心

氣通于舌心氣閉塞則舌亦強故令不語

人參 石菖蒲 生地黃 川芎 各一 細辛 錢

防風 辰砂 另研各 五錢

右為細末每服一錢薄荷煎湯調服

胡氏孤鳳散 治產後閉目不語

生白礬為末每服一錢熱水調下

一方 治產後不語

濟陰綱目 卷十二 拘攣 天德堂

人參 石蓮肉 不去 石菖蒲 各等

右剉每服五錢水煎服

逐血補心湯 產後失音不語者心肺二竅為血所侵又感傷風

故也

當歸 一錢 赤芍藥 生地黃 桔梗 蘇葉 前胡

茯苓 防風 牛胆南星 黃連 枳實 紅花 各一

人參 升麻 各七 半夏 一錢 甘草 五分

右剉加生薑三片水煎空心服

○狂言謔語

大全云產後語言顛倒或狂言謔語如見鬼神者其源不一須仔細辨證用藥治療產後驚風語言亂道如見鬼神精神不定者研



好殊砂調酒下龍虎丹。方見三九作一服兼琥珀地黃丸服之。

一則因產後心虛敗血停滯上干於心而狂言獨語者當在乍見

鬼神條求之○二則產後厥虛心神驚悸志意不安言語錯亂不

自覺知神思不安者當在驚悸條求之○三則宿有風寒因產心

虛氣弱腰背強面或歌哭噴笑言語亂道當作風癰治之當在心

驚中風條求之○四則產後心虛中風心神恍惚言語錯亂當在

中風恍惚條求之○五則產後多因敗血迷亂心經而顛狂言錯

錯亂無常或暈悶者當于本卷血暈類求之○六則因產後感冒

風寒惡露斷然不行憎寒發熱如瘧者目明了暮則語語如見鬼

狀當作熱入血室治之宜琥珀地黃丸及四物湯只用牛黃散黃

加北柴胡等分煎服如不退者以小柴胡湯加生乾地黃如黃芩

清陰綱目 卷十二 天德堂

分兩劑服愈雖然以上諸症大抵胎前產後自有專門一定之法

毫髮不同如產後首當逐敗生新然後仔細詳辨疾證不可妄立

名色自生新意加減方藥大宜對證依古法施治未有不效者也

薛氏曰前證當固胃氣為主而佐以見證之藥若一千攻痰則誤

矣

一產婦形體甚倦時發譫語用栝子散稍愈又用加味歸脾湯而

愈又因怒為狂言脇痛小便下血用加味逍遙散以清肝火養肝

血頓瘥又佐以加味歸脾湯而安

一靈三聖散 治產後敗血冲心發熱狂言奔走服虛大者

乾荷葉 生乾地黃 牡丹皮 生蒲黃另研各二錢

右前三味濃煎湯調入蒲黃末一服即定

奪命湯 產後血入心經語言顛狂健忘失志

方見前血暈

調經散 治氣血虛損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩燥如

見鬼神或言語謔妄

沒藥 琥珀并細桂心各一赤芍藥炒 當歸酒浸各一錢

細辛二錢 麝香少許

右為細末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服○或用蘇合香

丸一錢以童便調服即醒

栝子仁散 治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語乍見鬼神

栝子仁 遠志 生地黃格 人參 當歸

桑寄生 防風 琥珀另研 甘草炙各等分

清陰綱目 卷十二 天德堂

右為龍末先用白羊心一個切片以水三盞煮取清汁七分入

藥末五錢煎至六分服

妙香散 治產後心神顛倒語言錯亂如見鬼神

乾山藥 白茯苓 茯神去木 黃芪 遠志去心各一兩 人參

甘草 桔梗各五錢 辰砂三錢 木香二錢 麝香一錢

右為末每服二錢溫酒調服○一方用生乾地黃當歸二味煎

湯調服立效

高金散 治產後三五日或半月之間忽狂言亂語目見鬼神等

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃 白朮 遠志肉

茯神去木 羌活 酸棗仁 辰砂另研 防風 香附子各二錢

神效

牛夏錢白正 陳皮各一錢 人參 麥門冬一名 牛膝  
 天麻 全蝎各一錢 甘草一分  
 右剉作二服 薑三片 葱三枝 入金銀同煎服  
 四物補心湯 治產後言語恍惚 顛倒錯亂  
 當歸 川芎 白芍藥 生地黃 白朮  
 半夏 桔梗 茯神各四錢 陳皮三錢 甘草一錢  
 右剉為散 分作六服 每用薑三片 水煎空心服 〇有熱加酒炒  
 黃連二錢 無熱不用  
 聖神膏 治失血過多 心神昏悶 言語失常 不得睡卧  
 辰砂 乳香 酸棗仁 炒 人參 茯苓 各一錢 琥珀七錢  
 右為末 每服一錢 燈心末煎湯調服 或蜜丸 彈子大 薄荷煎  
 湯化下一丸  
 琥珀地黃丸 治心血虛 而言語謬妄  
 琥珀 玄胡索 糯米炒 當歸 蒲黃 炒四錢  
 生地黃 生薑 各二錢  
 右地黃生薑各另搗汁 留渣 以生薑汁炒地黃渣 地黃汁炒生  
 薑渣 各乾與前四味俱為末 煉蜜丸如彈子大 每服一九 當歸  
 湯煎下  
 〇類症  
 大全云 痰產後因驚 敗血冲心 昏悶發狂 如有鬼祟 宜用局方大  
 聖澤蘭散 加好辰砂研令極細 每服加一字 許煎酸棗仁湯調下  
 一服可安

薛氏曰 前證乃血虛 神不守舍 非補養元氣不可 仍參後各門互  
 用  
 一產後患前證 或用大澤蘭湯而愈 後又怔忡 妄言 其案云 用  
 茯苓散 補其心虛 續息 又用八珍 加參 補其氣 愈  
 一產婦亦患此證 用化痰安神等藥 病益甚 神思清 愈  
 脾而氣不足 用大劑參朮 歸茯神 酸棗仁 四斤餘而安 乃以歸  
 脾湯五十餘劑而愈  
 大聖澤蘭散 治婦人血海虛冷 久無子息 及產後敗血冲心中  
 風口 噤子死腹中 劈開口灌藥 須臾生下 便得無恙 治產後  
 中攻刺疼痛 橫生逆產 胎衣不下 血暈血癖 血滯血崩 血入  
 肢一應血藏有患 及諸證風氣 或傷寒吐逆 咳嗽寒熱 往來  
 濟陰綱目 卷十二 狂言諸語  
 身生瘡 頸痛惡心 經脈不調 赤白帶下 乳生惡氣 胎藏虛冷 數  
 曾墮胎 崩中不定 因此成痰 室女經脈不通 並宜服之 常服煖  
 子宮和血氣 悅顏色 退風冷 消除萬病 兼療丈夫五勞七傷 虛  
 損等病  
 澤蘭葉 石膏 研各二兩 生地黃 一兩 當歸 川芎 芍藥  
 燕莢 甘草 炙 各七錢 肉桂 錢半 厚朴 姜汁 白茯苓  
 防風 細辛 吳茱萸 湯洗 卷柏 柏子仁 微 枯梗 各一  
 黃芪 人參 白朮 丹參 五味子 川椒 去目 炒 白薇  
 川烏頭 炮去 乾薑 炮 藥本 苗 白芷 錢半 白薇  
 阿膠 碎 炒 燂 兩  
 右為細末 每服二錢 空心臨卧熱酒調下 若急疾 不拘時 日三

服

抱胎九 治產後過驚發狂或週經行發狂

水銀二兩 黑鉛一兩 硃砂一兩 乳香一兩

右將黑鉛入鉢內火鎔開下水銀攪結成砂子下硃砂乳香乘

熱用椰子槌研勻丸如雞頭質大每服一九空心薄荷湯下得

睡勿驚覺覺來即安○妙香散亦善

辰砂遠志九 治產後中風驚狂起卧不安或痰涎上湧

石菖蒲 遠志 人參 茯神木 辰砂各三

川芎 山藥 鐵粉 細辛 麥門冬 心

大麻 半夏 南星 白附子 各一

右為末薑汁煮糊丸如葉豆大別以硃砂為衣每服三十九隔

濟陰綱目 卷十二 狂言詬詈 辛 天德堂

臥驚湯下 加味八珍湯 產後顛狂乃血虛神不守舍非補養元氣不可用

此或茯苓散歸脾湯 人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎

芍藥 熟地黃 遠志 茯神各二

右剉加姜棗水煎服

○乍見鬼神 與前症在諸語門參看

大全云心主身之血脈因產傷以耗血脈致心氣虛其敗血停積

上于于心心不受觸遂致心中煩躁卧起不安乍見鬼神言語顛

錯醫人不識呼為風邪如此為治必不得愈但服調經散每服加

龍腦一捻得睡即安

夢在加龍腦

薛氏曰前證若敗血停滯用調經散若血虛發熱用  
若心血虛損用聖仁散大抵此證皆心脾血少所致故  
氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附即見鬼穴可愈其或不  
起多因驚痰降火攻伐之過也

一產婦患前證或用調經散愈而復作仍服前藥並建  
朝寒暑熱余朝用八珍湯夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

雲岐治產後發熱狂言奔走脈虛大者四物湯加柴胡如不愈加

甘草柴胡生地黃等分煎服亦可

調經散乃見前諸語諸

琥珀散 治產後痰血攻心迷悶妄言見鬼

人參 茯神 生地黃 阿膠各七 硃砂 各一

濟陰綱目 卷十二 狂言詬詈 辛 天德堂

甘草 琥珀 鐵粉 麝香 各一錢

右為細末每服三錢用金銀煎湯調下

茯神散 治產後血邪心神恍惚言語失度坐卧不安

茯神 去木 人參 黃芪 赤芍藥 牛膝

琥珀 研 龍齒 研各七 生地黃 半兩 桂心 半兩

右為末每服三錢水煎服

一方 治產後血暈心迷狂亂恍惚如見鬼

生薑母草 三台根 生地黃汁 二合 童便 一合 雞子清 三

石同煎三四沸後入雞子清攪勻作一服

○驚悸 大全云產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪

所乘也。或恐懼憂怕。令心氣受于風邪。邪搏于心。則驚不自安。若驚不已。則悸動不定。其狀目睛不轉。而不能動。診其脈動。而弱者驚悸也。動則為驚。弱則為悸矣。  
薛氏曰。按人之所主者。心之所主者。血。心血一虛。神氣不守。此驚悸所由作也。當補氣血為主。

一產婦患前證。二度服琥珀地黃丸。局方妙香散。隨效。再患服之。其證益甚。而脈浮大。按之如無。發熱惡寒。此血氣俱虛。用十全大補。加味歸脾二湯。各百餘劑。而愈。後遇驚恐。勞怒復作。仍服前藥。加味四物湯。治產後血少。怔忡無時。

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 茯神 去木各一錢

遠志 去心 酸棗仁 炒各七分

濟陰綱目 卷十二 驚悸

主 天德堂

右咬阻水煎食遠服

白茯苓散 治產後心神驚悸。言語失常。

白茯苓 人參 熟地黃 各一兩半 黃芪 當歸

白芍藥 遠志 去心 麥門冬 去心 桂心 甘草 各一兩

石菖蒲 桑寄生 各七錢半

右咬阻。每服八錢。水一大盞。半生薑五片。棗三枚。竹葉三七片。煎至一大盞。去滓。溫服。無時。

熟地黃散 治產後心神驚悸。神思不安。

熟地黃 黃芪 白薇 龍齒 另研各一兩

茯神 去木 人參 羌活 遠志 肉桂 各七錢

桂心 防風 甘草 各半兩

此藥以酒為引。治風邪。

乘之耶

右咬阻。每服五錢。水一大盞。半生薑五片。棗三枚。煎至一大盞。去滓。溫服。不拘時。一方無黃芪。有荆芥。

產乳七寶散 初產後服之。調和血氣。補虛安。心神鎮驚悸。

當歸 川芎 人參 白茯苓 桂心

羚羊角 燒存 硃砂 水飛各一錢 乾薑 一錢

右為細末。每服一錢。用羌活豆淋酒調下。不飲酒。用清米飲調下。○如覺心煩。熱悶。以麥門冬。去心。煎湯調下。○若心下煩悶。而痛。用重便調下。○若覺心煩。熱悶。即減薑。桂心。寒却加之。○腹痛。加當歸。○心悶。加羚羊角。○心虛。氣怯。加桂心。○不思飲食。或惡心。加人參。○虛煩。加茯苓。○以意斟酌。日二夜一服之。

人參散 治產後臟腑虛。心怔驚悸。言語錯亂。

濟陰綱目 卷十二 驚悸

主 天德堂

人參 麥門冬 去心各八錢 茯神 遠志 去心 獨活

防風 生地黃 甘草 炙 天竺黃 另研 龍齒 另研

朱砂 水飛各半兩 白薇 各一錢 龍腦 另研 麝香 另研各一錢

右為細末。每服二錢。薄荷酒調下。不拘時。

琥珀散 治血虛驚悸。少寐。及產後敗血停。留少腹作痛。

辰砂 另研 沒藥 琥珀 並研 當歸 分

右為細末。每服二錢。空心。日午。臨臥。白湯調下。

茯苓散 治產後狂語。志意不定。精神昏亂。心氣虛。風邪所致。

茯苓 一方用 生地黃 各三錢 遠志 白薇 龍齒 各二兩

人參 防風 獨活 各二錢

右為末。以銀一斤。水一斗五升。煮取七升。下諸藥。煮取三升。溫

妙在月銀二

既不宜大汗  
何以用羌活  
二兩所乘信  
也下竹瀝一  
升妙甚

分三服忌食豬肉生冷○一方加荆芥二兩甘草二兩緩半  
一方治產後多虛羸弱若大汗利皆至于死此重虛故也若中  
風語謬昏悶不知人者宜服此

人參 茯苓 羌活 遠志 大棗 各二兩 竹瀝 一升

右用水六升煮取二升下竹瀝更煎二升半分三服

歸脾湯 治產後血氣大虛心神驚悸怔忡不寐或心脾傷痛坐  
臥少食或憂思傷脾血虛發熱

人參 黃芪 炒 白朮 炒 白茯苓 龍眼肉

當歸 遠志 炒 酸棗仁 炒 各五 甘草 各五

右加薑棗煎服○如柴胡牡丹皮各加味歸脾湯

遠志丸 治產後臟虛不足心神驚悸志意不安腹中急痛或時  
驚悸綱目

卷十二 天德堂

怕怖夜臥不寧

遠志 炒 麥門冬 炒 黃芪 當歸 炒 人參

白朮 獨活 白茯苓 桂心 栝子仁

山茱萸 石菖蒲 熟地黃 鍾乳粉 阿膠 碎 各

右為細末煉蜜和搗五七百下丸如桐子大每服三十丸溫酒  
送下不拘時日進三服

白茯苓丸 治產後心虛驚悸神志不安

白茯苓 熟地黃 各一兩 人參 桂心 遠志 炒

石菖蒲 栝子仁 琥珀 各半兩

右為細末煉蜜和搗二三百下丸如桐子大每服三十丸不拘  
時粥飯送下

此溫補法于  
虛寒者宜之  
然心虛則熱  
收于內則熱  
藥又溫則助

○恍惚  
大全云產後中風恍惚者由心主血血氣通于榮衛臟腑通行經  
絡產則血氣俱傷五臟皆虛榮衛不足即為風邪所乘則令心神  
恍惚不定也

薛氏曰前證當大補血氣為主而佐以後方為善蓋風為虛証之  
假象也固其本源諸病自退若專治風則速其危矣

一產婦患前證盜汗自汗發熱面黃白四肢畏冷此氣血  
俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾湯始愈後因勞  
怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽動小便自遺余謂肝火熾盛用十  
全大補加鉤藤山梔而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈

千金方 治產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆因心虛所致  
故用如是耳

濟陰綱目 卷十二 恍惚

茯苓 芍藥 當歸 桂心 甘草 各

麥門冬 生薑 各一兩 大棗 三十

右為散用水三升煎取一升去滓分作兩服

經效方 療產後心虛恍惚志意不定煩躁恍惚

茯苓 當歸 芍藥 人參 麥門冬 各

酸棗仁 炒 黃芩 甘草 白鮮皮 各二兩 大棗 七枚

右為散末水二升煮取七合去滓溫服

琥珀散 治產後中風恍惚語澀心神煩悶四肢不隨

琥珀 茯苓 茯神 各一兩 遠志 炒 石菖蒲 人參

黃芪 麥門冬 各一兩 芎藭 赤芍 防風

獨活 桑寄生 羚羊角屑 各半 甘草 錢半

真產後中風  
者且之苦曰  
虛風所為則  
不宜用風藥  
矣

右咬咀每服五錢水煎溫服不拘時

遠志散 治產後中風心忪恍惚言語錯亂煩悶睡臥不安

遠志 去心 防風 去毒 當歸 茯神 去木 酸棗仁 炒

麥門冬 去心 桑寄生 獨活 去毒 羚羊角屑 桂心 各七錢半

甘草 炙 右咬咀每服五錢水煎服

天麻丸 治產後中風恍惚語澁四肢不隨

天麻 防風 羌活 去毒 朱砂 水飛 各一兩 僵蚕 炒 七

乾蝎 炒 五靈脂 炒 白附子 炮 各半兩 雄雀 炒 牛黃 二錢半

右為細末糯米飯為丸如梧子大每服三十丸薄荷酒送下日進二服

濟陰綱目

卷十二 恍惚

主

天德堂

辰砂遠志丸 主產後中風消風化痰安神鎮心

辰砂 遠志肉 甘草 石菖蒲 人參 茯神 去木 各

川芎 山藥 麥門冬 去心 細辛 天麻

半夏 南星 白附子 鐵粉 各一兩

右為末薑汁煮糊丸如菰豆大別以碎砂為衣每服三十丸夜臥生薑湯下

濟陰綱目卷之十二

濟陰綱目卷之十三

關中 武之望叔卿父輯著 白嶽 趙文選子垣氏訂正 西陵 汪 淇濟濟子箋釋 天都 查 望子周父纂問 產後下

虛煩

此產後血虛 虛煩 大云云餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便并解心下及臥 太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可

薛氏曰四物湯加茯神遠志治產後虛煩十全大補湯尤効論見 也其味苦酸 發熱條

陳氏曰尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知產後 與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死

濟陰綱目

卷十三 虛煩

十

天德堂

金黃散 治產後惡血衝心時發煩躁

玄胡索 消黃 各半 桂心 二錢

右為細末烏梅煎湯調下二錢

荷葉散 療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉 一兩 延胡索 二兩 地黃汁 二合

右用水二升煮二味取六合下延胡索分三服空心服忌肉食

川芎散 療產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛

川芎 生乾地黃 白芍 枳殼 各等

右為末酒調方寸七日二服

集驗方 產後血氣煩悶

此方清新簡切  
以上四方有一方  
妙用細玩之  
真如山陰道  
上行令人不  
忍捨去  
讀治症語便  
知用藥宜溫  
所謂藥者熱  
之留者行之  
也  
以煩躁二字  
似不宜用然  
藥則利通血  
不快便是瘀  
血衝心而如  
此溫行破血  
之藥必不可  
少者也又烏  
論其煩而不  
用藥藥哉  
連讀數方各  
早如相如化  
下天乃有難  
補也  
此方又有利  
之補血林之  
藥汁勿誤雜  
治煩躁者大  
同而較詳被  
切實切切如  
陳白術諸藥  
藥人皆能之  
有奪天之力  
方有異方有

生地黃汁 清酒各一  
右二味相和煎一沸分爲兩服  
經効方 療產後氣虛冷搏於血而氣結滯上衝心腹脹滿  
當歸 川芎 桂心 吳茱萸  
陳皮 生薑各一 白芍二  
右咬咀以水三升煮取一升去滓空心服  
沒藥丸 治產後心胸煩躁惡血不快  
沒藥 蠶蠶 延胡索 當歸  
乾漆炒 桂心 牛膝 牡丹皮 乾薑各等  
右爲細末醋煮麴糊丸如桐子大煎麴湯下十九至十五丸  
治血氣煩悶雜方  
濟陰綱目 卷十三 產婦  
生藕汁飲二升効竹瀝亦得  
一方陳白梅槌碎煎湯飲  
一方用蒲黃隔紙炒每服一錢東流水煎湯下  
用失笑散亦佳  
一方療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕用羊血  
一盞頓服若不定更服立効  
○已上治餘血奔心之劑  
人參當歸湯 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內渴以致  
心煩短氣白汗頭痛  
人參 當歸 熟地黃 門冬去心 肉桂各二  
白芍藥炒二錢半

神德無涯矣  
此方以四物去  
用熟地黃氣  
也肉桂助其  
十也但此藥  
藥力多亦須  
煎而以便水行  
藥始之清心煩  
氣之清心煩  
血熱生地尤  
在肉桂所當  
去也  
此方以水煎  
心麥門竹葉除  
后草大麥銀  
交其子供爲  
甘母亦良法也  
本方更宜有  
腎寒之方而  
濟陰綱目  
卷十三 虛損  
主  
夫德堂

右用水二鍾梗米一合竹葉十片煎至一鍾食遠服○血熱者  
者加生地黃二錢  
竹葉湯 治產後短氣欲絕心口煩悶  
竹葉切 麥門冬去心 小麥升 甘草各一升  
大棗 十二枚  
右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去渣納餘藥煮取三升去  
渣溫服○虛悸加人參二兩○少氣力加糯米五合  
甘竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣  
甘竹茹升人參 麥門冬去心茯苓 甘草各一升黃芩  
右咬咀以水六升煮取二升去渣分三服日三  
雞白湯 治產後胸中煩熱逆氣  
雞白 半夏 人參 甘草各一升 括蘖根兩

麥門冬半 熱甚加知母石膏  
右咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜二  
芍藥梔子湯 治產後虛煩不得眠  
芍藥 當歸 梔子 香豉合牛  
白芍 當歸 梔子 香豉合牛  
右用水二鍾半先煮前三味得二鍾內香豉煮取一鍾半去滓  
分二服溫服 此雖云岐法不若  
仲景酸棗湯爲當  
○以上治血氣虛煩之劑  
仲景二物黃芩湯 婦人在草薢自發露得風四肢苦煩熱頭痛  
者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之  
黃芩一兩 苦參兩 乾薑黃四兩

且具。宜羊。易。頭。芝。耶。易。次。食。無。未。者。用。人。於。二。後。養。明。各。一。

石蓮肉各七  
分半 一方加遠志石菖蒲各  
錢



方 治產後中風煩渴。

人全云凡產後忽冒悶汗出不識人

薛氏曰：前證曰大虛宜固元氣為主。其汗不止必變柔痙。東垣先  
生云：婦人分娩及半產，瀉下昏目，頭暈，蓋因血暴亡而火上熾，但  
補其血則神自安。若常時血下，當補而升舉其氣，陽得此而神安  
則目明矣。今立一方以補手足厥陰之血，兼益陽氣，名曰全生活  
血湯。

**黃耆湯** 治產後虛汗不止  
黃耆二 白朮 防風 熟地黃 牡蠣粉  
白茯苓 麥門冬 去心 甘草 各五分

右切作三服，加大棗一枚，水煎服。

**麻黃根散** 治產後虛汗不止  
當歸 黃耆 麻黃根 牡蠣粉

**濟陰綱目** 卷十主自汗 八 天德堂

人參 甘草 各五分

右剉每服四錢，水煎服。

**止汗散** 治產後盜汗不止，一應汗多者，皆可服  
牡蠣粉 小麥麩 各等分

右和勻，煮生豬肉汁調下二錢，無時。

**黃歸二黃湯** 治產後自汗盜汗，胃氣虛弱，服別藥則嘔吐不能  
當歸 黃耆 各一 麻黃根 半

右咬咀，每服三錢，水煎服。一方無麻黃根，用白芍藥。

**當歸六黃湯** 治血氣虛，盜汗不止  
當歸 黃耆 熟地黃 生地黄 黃蘗

黃芩 炒 黃連 炒 各

右水煎服。○不應加入參、白朮。○心血不足，加酸棗仁。  
**人參湯** 治產後諸虛不足，發熱盜汗  
人參 當歸 各等

右為末，以猪腰子一隻，去脂膜，切小片子，以水三升，糯米半合  
葱白兩條，煮米熟，取清汁一盞，入藥二錢，煎至八分，溫服不拘  
時。

**參附湯** 治陽氣虛，自汗惡寒，或手足逆冷，大便自利，或臍腹  
疼痛，吃逆不食，或汗多發瘧等証  
人參 附子 炮五錢

右作一服，加薑棗水煎，徐徐服。

**著附湯** 治陽氣虛，脫惡寒自汗，或口噤痰湧，四肢逆冷，或吐瀉  
濟陰綱目 卷十主自汗 九 天德堂

腹痛，飲食不入，及一切虛寒等証  
黃耆 一兩 附子 炮五錢

右作一劑，加薑棗水煎，服如不應，倍加附子，方得全濟。

**千金方** 治產後風，虛汗出，小便短少，四肢拘攣，難以屈伸  
甘草 附子 炮 桂心 芍藥 各一

右剉每服三錢，加生薑四片，棗一枚，水煎服，忌豬肉冷水生葱  
等物。

**全生活血湯** 治產後自汗盜汗，頭暈，四肢無力，口  
乾，頭暈，行步艱側  
升麻 芍藥 熟地黃 柴胡 防風  
羌活 獨活 葛根 甘草 各一

○發執

卷十三

+

天德堂

消伯仁治一產婦惡露

卷二十一 發願

上

天寶三

宜再服過一日復大熱如火復與前劑潛加參黃煎連服二三服熱退身涼而愈。

丹溪曰產後發熱用參木黃氏陳皮當歸川芎炙甘草兩處轉則加茯苓淡滲之其熱自除。重則加乾薑或云大熱而用乾薑何也。曰此熱非有餘之邪熱乃陰虛生內熱耳蓋乾薑能入肺分利肺氣又能入肝分引衆藥生血然不可獨用必與補陰血藥同用此造化自然之妙非天下之至神其孰能與於此耶。

王節齋云凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治法用四物湯補陰血而以炙乾薑之辛溫從治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過食飲食傷滯而致發熱者血虛則不効矣但遇產後發熱者須審問食何飲食有無傷積若有胸膈

濟陰綱目 卷十三 發熱 三 天德堂

飽悶噯氣難食泄瀉等證只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法。

丹溪方 治產後發熱

當歸 川芎 黃耆 人參 白朮

白茯苓 各一錢 甘草 各五分

右剉水煎服○熱甚加乾薑

加味四物湯 治產後陰虛血弱發熱

當歸 川芎 白芍 熟地黃 白茯苓 各一錢

右水煎服○熱甚加乾薑○虛煩加茯神遠志

抽薪散 治產後血虛發熱

當歸 熟地黃 各四錢 乾薑 一錢

右剉一劑水煎服。治產後諸虛不足發熱盜汗。

人參散 治產後諸虛不足發熱盜汗。

方見前自汗。

人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱令

人心煩短氣自汗頭痛。

方見前虛煩。

加味逍遙散 治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡。

當歸 白芍 乾葛 各二錢 生地黃 四錢

黃芩 各一錢 柴胡 一錢 人參 麥門冬 各九分 烏梅 二個

甘草 六分

右剉散分作二服用水一鍾煎七分空心服。

濟陰綱目 卷十三 發熱 三 天德堂

犀角飲子 治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾燥

犀角 麥門冬 白朮 各半 柴胡 一兩 枳殼 一兩

地骨皮 生地黃 當歸 人參 茯苓

黃耆 黃芩 甘草 各七錢

右咬咀每服四錢入生薑二片浮麥七十粒同水煎

三合散 治產後日久虛勞發熱即四物四君子

當歸 川芎 白芍 熟地黃 白朮

白茯苓 黃耆 各一錢 人參 柴胡 各一錢 黃芩

半夏 甘草 各五分

右作一服加生薑三片紅棗二枚水煎食前服。

何為敗血入肺  
則肺則寒  
也肺主氣  
氣不和而  
寒乍熱產後血氣虛損陰陽則乍寒陽勝則乍熱陰陽相來則或  
寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺  
則熱入於脾則寒若誤作瘧疾治之則誤矣陰陽不和宜用桂枝四  
物湯敗血不散宜奮命升又問二者何以明之時有刺痛者敗血  
也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減  
陳無擇評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止  
入脾肺二臟耶大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱  
只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解  
則休過再會而復作大調經散五積散入煎煎佳  
薛氏曰產後寒熱因氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之証經云虛  
則發熱陽虛則惡寒若兼大便不通尤屬氣血虛弱切不可用  
發表降火若寸口脈微各陽氣不足陰氣上入於陽中則惡寒須  
用補中益氣湯尺部脈弱各陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱  
用六味地黃丸大抵陰不足陽在從之則陽內陷而發熱陽不足  
陰在從之則陰上入而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭故  
惡寒而發熱也當用八珍湯若病後四肢發熱或形氣倦怠此元  
氣未復濕熱乘之故耳宜補中益氣湯若飢熱大渴引飲目赤面  
紅此血虛發熱用當歸補血湯若認爲實則誤矣  
一產婦惡寒發熱用十全大補加炮薑治之而愈但飲食不甘肢  
體倦怠用補中益氣而安又飲食後犯惡寒發熱抽掣咬牙難  
候其脈視其面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾土  
故內外俱寒

飲食停滯而作用六君加木香一劑而安  
一產婦惡寒發熱余欲用八珍加炮薑治之其家知醫以爲風寒  
用小柴胡湯余曰寒熱不勝乃氣血虛之不信仍服一劑不出  
止語語不絕煩熱作渴肢體抽掣余用十全大補湯二劑並其脉  
洪大重按如無仍以附子四劑稍緩數劑而安  
吳夢山治一婦人產後去血過多食後有腹痛身痛寒熱如瘧  
左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻食飲失火也二苦因虛而得  
宜發正祛邪遂以茯苓補心湯去地黃知母羌活黃芩三服汗  
出身涼其患漸差然後以八物湯調理半月後全愈一婦產後惡  
露未盡瘀血入絡又感寒邪身熱如瘧即以生料五積散五帖惡  
露自下而寒熱除  
濟陰綱目 卷十三 往來寒熱 五 天德堂  
又一婦產後惡露未盡因起抹身寒氣客於經絡乍寒乍熱脉緊  
而弦以葱白散二帖安  
一少婦初產四日治物傷脾胃但覺身分不快嘔逆飲食少心煩  
滿悶時或腹脇刺痛晨惡寒晚潮熱夜則恍惚譫語則抽掣頭  
類風狀變異多端諸醫莫測或作虛風或云血凝實熱用甘溫而  
行血以果涼退實熱如此半月不効汪至見醫補虛亦謂補其  
脉而緊遂令按之小腹急痛知瘀血未盡也思患者大勢惡露  
已下未必還有餘血偶因寒涼所傷瘀血停滯下焦日久客於經  
絡所以發生諸證須得大調經散倍入琥珀化諸惡血成水其患  
方愈遂合前藥服之五日後行惡水斗許臭不可近思人覺後病  
勢漸減然後以人參養榮湯數十帖月餘如初

<p>此藥小兒服之，治產後往來寒熱，及日久虛勞，微有寒熱，脈沉而數。</p>		<p>柴胡四物湯 治產後往來寒熱，及日久虛勞，微有寒熱，脈沉而數。</p>	
當歸	川芎	白芍	熟地黃 各一錢
人參	黃芩	半夏	甘草 各三錢
右剉每服一兩水煎服。			
<p>增損柴胡湯 治產後虛弱，寒熱如瘧，飲食少，腹脹。</p>		<p>柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮</p>	
<p>川芎 白芍 炒各等分</p>		<p>右咬咀，每服八錢，加生薑五片，棗二枚水煎服。</p>	
<p>增損四物湯 治產後陰陽不和，乍寒乍熱，如有惡露未盡，停滯胞絡，亦能令人寒熱，但小腹急痛為異。</p>		<p>當歸 芍藥 川芎 人參 乾薑 各一錢</p>	
<p>甘草 兩 右咬咀，每服四錢，加生薑三片水煎服。</p>		<p>釋曰：此方治陰陽不和，乍寒乍熱之寒熱，不治惡露未盡，血滯胞絡，小腹急痛之寒熱，宜詳之。</p>	
<p>更生散 治產後去血過多，或不止，或眩暈，眼暗，口噤，發熱，增寒。</p>		<p>人參 當歸 熟地黃 各一兩 川芎</p>	
<p>荆芥穗 上燒過 乾薑 炒黑各三錢</p>		<p>右剉水煎，空心服。如血大下不止，加龍骨赤石脂各火煨等分，每二錢同煎藥，服外以五倍子末津調，臍中即止。</p>	
<p>大調經散 治產後血虛，惡露未消，氣為敗濁，凝滯，紫衛不調，陰陽相乘，增寒發熱，或自汗，或腫滿，皆氣血未平之所為也。</p>		<p>天德堂</p>	

<p>下三味六面煎，發藥并血去下，不止者不用。</p> <p>此方重在解毒，未病而飲神之，用所引湯，也。此方如神，治在喉痛，大渴飲之，此方更在傷風，一服即愈。</p> <p>小柴胡加生地黃湯 治產後往來寒熱，而脈弦者，少陽也。</p> <p>柴胡 兩 黃芩 五錢 人參 三錢 半夏 兩 生地黃 兩</p> <p>梔子 枳殼 炒各半兩 大棗 三枚</p> <p>右剉，加薑棗水煎服。</p>	<p>加減烏金散 治產後寒熱似瘧。此治錯雜之邪。</p> <p>厚朴 柴胡 黃芩 麻黃 羌活</p> <p>草果 半夏 各二錢 當歸 川芎 白芍</p> <p>熟地 陳皮 茯苓 桔梗 各一錢 桂枝</p> <p>蒼朮 白芷 枳殼 各一錢 甘草 九分</p> <p>右剉為散，分作兩服，每服用水一鍾半，薑三片，葱三根，煎至一鍾，不拘時服。有汗多，當歸川芎白芍藥熟地黃。有脹多，厚朴陳皮。有熱多，柴胡黃芩。有寒多，蒼朮草果桂枝。有痰多，半夏桔梗茯苓。有頭痛多，川芎白芷羌活。有瀉去，枳殼甘草不用。有餘血塊在腹，作潮熱疼痛，加三稜莪朮多用玄胡索八角，蘆香。遍身痛，加羌活獨活。寒熱往來，加黃芩柴胡。</p>	<p>黃龍湯 治產後傷風，熱入胞室，寒熱如瘧，及病後勞復，餘熱不解。</p> <p>柴胡 四錢 黃芩 八分 人參 八分 甘草 各一錢</p> <p>右作一服水煎服。</p>	<p>大豆 一兩 牛 茯神 一兩 真琥珀 一錢</p> <p>炒去皮 茯苓 兩 真琥珀 一錢</p> <p>右為細末，每服二錢，濃煎烏豆紫蘇湯下。</p>
--	--	--	---

產後惡寒壯熱一夜三五度惡語口中生瘡時時乾嘔困之悶絕

人參 獨活 白鮮皮 葛根 防風

青竹茹 遠志 各一 茯神 二兩 白蘗 二兩半

玄參 三兩 竹瀝 一升

右取銀一觔水一斗五升煮取七升而諸藥重煮取三升分溫

三服忌魚酒濕麵等

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯脇心煩悶

知母 三兩 芍藥 黃芩 各二 桂心 甘草 各一

右咬咀用水五升煮取二升半分三服○一方不用桂心用生

地黃

濟陰綱目 卷十三 瘧疾 六 天德堂

○瘧疾

更氏曰產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜紫胡四物湯

補道云產後瘧疾熱多寒少者清脾飲寒多熱少者清胃湯

不已者七寶飲截之

薛氏曰產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或鬱怒

傷脾或暑邪所伏皆係飲食用六君加桔梗蒼朮香如外邪多

而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用人參養胃湯飲

食勢役用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑虛寒用六

君加黃桂元氣脫陷急加附子大凡久瘧多屬元氣虛寒氣血

則寒血虛則熱胃虛則惡寒陰火下流則寒熱交作或吐瀉下食

腹痛煩渴發熱諸語或手足逆冷寒戰如慄雖見自汗當補其病

自退若誤用清脾截瘧之類多致不起

一產婦患瘧熱作渴胸膈脹滿遍身作痛三日不食嘔酸暖氣

此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神麴山查四劑而不作

酸乃去神麴山查又數劑而飲食進其大便不通至三十五日計

進飲食七十餘碗腹始悶令用豬膽汁導而通之其熱不甚燥

一產婦患瘧久不愈百病蜂起其脈或洪大或微細或弦或沉

伏難以名狀用六君加炮薑二十餘劑脈證稍得又用參朮煎膏

佐以歸脾湯百餘劑而瘧

一產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣兼服

百餘劑而愈一瘧用藥百餘劑世間豈有此治法此非藥之効

乃病久自息耳丹溪立瘧用藥如此殊可笑

草果飲子 治產後瘧疾寒熱相半者或多熱者

半夏 赤茯苓 甘草 草果 炮去 川芎

陳皮 白芷 各二 青皮 白豆蔻 紫蘇 各二

乾薑 四錢

右咬咀每服三錢加生薑三片棗一枚水煎當發日侵早連服

二服無有不安者

生熟飲子 治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻 草果仁 厚朴 生用 半夏 陳皮

甘草 大棗 生薑 各分

右八味剉碎和勻一半用生一半用熟紙裹煨令香熟去紙與

生者和勻每服五錢水煎食前一服食後一服



清脾飲 治產後瘧疾熱多寒少者。  
人參養胃湯 治產後瘧疾寒多熱少者。  
七寶飲 治產後瘧疾久而不已者以此救之。  
方俱見胎前瘧疾。  
○瘧勞  
大全云產後瘧勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平復不滿  
日月氣血虛弱將養失所而風冷客之風冷搏于氣血則不能溫  
于肌膚使人虛之勞倦乍卧乍起顏色憔悴食飲不消風冷邪氣  
兩感於肺肺受微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受於  
風邪流注臟腑須臾頻發時有益汗寒熱如瘧有脾煩悶四肢不  
舉沉重着床此則瘧勞之候也

瘧陰綱目 卷十三 瘧勞 二千 天德堂  
又曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞思慮致令虛癰喘之寒熱  
如瘧頭疼自汗肢體倦怠咳嗽痞逆腹中絞刺名曰瘧勞  
薛氏曰按前證當扶養正氣為主用六君子湯加當歸若脾肺氣  
虛而咳嗽口乾用補中益氣加麥門五味若因中氣虛而口乾頭  
暈用補中益氣加蔓荊子若肝經血虛而肢體作痛用四物參朮  
若因肝腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味丸加五味子若  
因脾虛血弱肚腹作痛月經不調用八珍湯倍加白朮若因脾虛  
血燥皮膚癢痒用加味逍遙散大抵此證多因脾胃虛弱飲食減  
少以致諸經疲憊而作當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所  
倚賴其病自愈矣仍參虛損發熱方論諸治

汪氏治一婦產未滿月因怒氣血流如水三日大止隨又勞苦四  
按治大無力  
則似於瘧  
甚屬於虛  
明通所治  
果明通治  
必非無力也  
請詳之  
即十全大補  
之變所少者  
白朮甘草  
以茯苓為君  
香腰為佐  
心腎交熱  
也  
所建中者  
建中土也  
藥甘草易老  
為有甲已化  
土之象加肉  
桂以治瘧  
虛寒癰喘  
黃連建中湯  
黃耆  
肉桂各一  
白芍二  
甘草七  
黃耆建中湯 治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛  
黃耆 肉桂各一 白芍二 甘草七  
瘧陰綱目 卷十三 瘧勞 二千 天德堂  
右到每服五錢用薑棗水煎服日三次虛甚加附子  
當歸建中湯 治產後勞傷虛羸不足腹中疼痛呼吸少氣小腹痛  
拘急痛連腰背時自汗出不思飲食產訖直至月滿一日服  
人身壯強健  
當歸四 白芍六 桂心三 黃耆一兩  
右到每服四錢加薑棗水煎入飴糖一塊再煎稍熱服○如崩  
中衄血加阿膠地黃  
加味佛手散 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰  
當歸 川芎 黃耆 柴胡 前胡 各一  
右咬咀每服五錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各二枚  
生薑一片煎服○如有痰不用烏梅



藥之相應也 治產後日久虛勞而脈浮大者  
 柴胡四物湯 治產後日久虛勞而脈浮大者  
 方見前往來寒熱  
 三合散 治產後日久虛勞 鍼灸服藥俱無効者  
 方見前發熱  
 雲岐熟地黃散 治產後勞傷皆由體虛氣力未壯勞復所起四  
 肢煩疼時發寒熱不思飲食  
 熟地黃 人參 白芍 白茯苓 白朮  
 續斷 黃耆 當歸 川芎 五味子  
 桂心 各七錢半  
 右咬咀每服四錢生薑三片棗一枚水煎服○大千方有麥門  
 冬七錢半○一方無桂心五味續斷有柴胡黃芩半夏各七錢  
 半  
 黃耆丸 治產後勞傷寒熱進退頭目眩痛骨節痠疼氣力羸乏  
 黃耆 紫甲 當歸 白芍  
 桂心 續斷 牛膝 菴菴 栝子仁  
 沉香 枳殼 各七錢半 五味子 熟地黃 各半  
 右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十丸食後粥飯下  
 石子湯 治產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛面色痿黃  
 各曰辟勞  
 猪石子 雙去脂 香豉 一方無此葱 梗米  
 當歸 白芍 各二兩  
 右咬咀分兩劑每劑用米三合煮取一小碗去滓分三服○廣

濟方無白芍有人參○許仁則方無香豉有生薑二兩桂心一  
 兩葱白止一兩  
 人參薑中散 治產後勞傷皆由在產內未滿白日體中虛損血氣尚  
 弱失於料理或勞動作傷致成羸勞其狀虛羸乍起乍臥飲食  
 不消時有咳嗽頭中昏痛發軟無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊  
 拘急沉困在牀服此大効  
 黃耆 龍甲 各一兩 牛膝 七錢 人參 白茯苓  
 當歸 白芍 桑寄生 麥門冬 熟地黃  
 桃仁 桂心 甘草 各半 續斷 二錢  
 右為細末每服先以猪腎一對去筋膜以水兩大盞生薑半兩  
 棗三枚煎至一盞去術留清漿然後用藥末二錢葱白三寸烏  
 梅一箇荆芥五穗煎至七分去滓空心晚食前溫服神効  
 胡氏牡丹散 治產後虛羸發熱自汗欲變羸勞或血不所引  
 候不調或寒熱羸瘦  
 當歸 白芍 人參 五加皮  
 地骨皮 各半 牡丹皮 三錢 桂心 沒藥 各二錢  
 右為細末每服二錢水酒各半盞如不飲酒只用水一盞開元  
 錢一枚麻油鹽之同煎七分去滓通口服煎不得撻喫不得吹  
 黃耆煎散 治產後勞傷肌膚黃瘦面無顏色或爾寒壯熱四肢  
 痠疼心煩頭痛  
 龍甲 黃耆 牛膝 當歸 白芍 熟地黃  
 人參 白茯苓 麥門冬 桑寄生 桂心 甘草 各半

右爲細末每服用鴉石子一對去脂膜切破先以水一盞入煎半分，斟三枚，煎至七分，去石子，煎盡却下藥五錢，更煎至四分，去滓，空心晚食前溫服，二滓並煎。

○產後虛弱

產後虛弱，產後虛弱，皆由產後虧損血氣所致，須當慎起居，節飲食，六七日情調養百日，庶保無疾。若中年及難產者，毋論日期，必須調養，平復方可涉喧，否則氣血復傷，虛脫之證作矣。

○產後虛弱

卷十三 虛弱

天德堂

薛氏曰：前產虛弱，氣血者，用八珍湯，飲食傷胃者，用四君子湯，停食傷脾者，用六君子湯，勞傷元氣者，用補中益氣湯。若嘔氣覺有藥味者，此藥復傷胃也，但用四君子湯，徐徐少飲，以調脾胃。若胃氣一健，血氣自生，諸證自愈矣。

大守云：冷勞者，產後則血氣勞傷，臟腑虛弱，而風冷客之，冷搏於血，氣血氣不能溫於肌膚，使人虛乏疲頓，致羸損不平復，若久不平復，風冷入於子臟，則胞臟冷，使人無子。

薛氏曰：前證若血氣虛弱，用八珍湯，血氣虛寒，用十全大補湯，胃氣虛弱，用補中益氣湯，脾氣虛弱，用六君子湯，命門火衰，用八味湯，肝脾血虛，用加味逍遙散，肝脾鬱怒，用加味歸脾湯，諸虛湯，治產後一切雜病，只大補氣血爲主。

人參 白朮 黃耆 川芎 陳皮 各五  
甘草 右劉加生薑三片，水煎服。○熱輕倍加茯苓，熟  
其加枳殼乾姜二分。

黃耆 當歸 川芎 熟地黃 各等  
黃耆 爲藥爲補虛之要藥。

右劉每服四錢，水煎服。○氣虛加參，未茯苓甘草，○微熱加乾  
薑。○白汗多者，少用川芎，勿用茯苓，倍加參，黃耆，○口渴加  
五味子，麥門冬。○腹痛者，非白芍不可，雖新產亦用，但以酒炒  
不妨。

十全大補湯 治產後血氣未復，形體虛弱，發熱惡寒，不能飲食。  
濟陰綱目 卷十三 虛弱 三五 天德堂

人參 白朮 茯苓 黃耆 當歸  
川芎 白芍 熟地黃 肉桂 甘草 各五

右劉加生薑五片，棗三枚，水煎服。  
黃耆羊肉湯 治產後雖無疾，但覺虛弱，兼心腹痛，卽宜服之。

肥羊肉 神當歸 五兩 黃耆 四兩 生薑 六兩  
右先以水一斗煮羊肉取汁八升，後下三味，煮取二升五合，分  
爲四服。○若覺惡露不盡，加桂三兩。○惡露下多，加川芎三兩。

○有寒加藥一兩。○有氣加細辛二兩。○有熱加生薑黃連  
二合。

釋曰：所加五法，分兩多寡，皆有意義。若川芎之清，惡露下多，陰  
中升陽，也有氣之加細辛，辛以散肝也，條可類推。

黃雌鷄湯 治產後虛羸腹痛

小黃雌鷄一隻去翅足頭 當歸 白朮 熟地黃

桂心 黃芩 芍藥

右先以水七鍾煮鷄至三鍾每用汁一鍾藥四錢煎日三服

產寶方 治產後虛羸不生飢肉

黃芩 當歸 白芍 人參 桂心

甘草 川芎 生薑 大棗

右九味用水七升煮三升分溫三服

一方 治產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不止

黃芩 當歸 人參 生薑 淡豉

豬膏 粳米 薤白

濟陰綱目 卷十三 天德堂

右以水一斗五升先煮豬膏取六升下諸藥煮取二升分爲三服

又方 豬膏一雙煮入葱或作臘如常食之

○宿悶

郭稽中曰問產後口乾痞悶者何答曰產後榮衛大虛血氣未定

食難太早胃不能消化麵毒結聚於胃脘上熏胸中是以口乾燥

渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬不得一但服

見脫丸則愈

釋曰爲食難者之戒南人甚少於諸飲食皆能致疾不必拘於

一麵也

陳無擇評曰產後口乾痞悶未必只因食麵或產母內積憂煩外

傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調之可也心煩宜四

物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱者屬何經當隨經爲治

難以備舉飲食所傷見脫丸却能作湯

薛氏曰前證若宿食停滯用六君枳實神麴若因肉食所致更加

山查若因魚鱸之類再加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔

此脾胃受傷用六君子湯或噤酸暖腐加炮薑作湯更加升麻如

不應佐以四神丸或間用補中益氣湯

一婦人食煎黍煩渴痞悶腹痛大便若去不去服消導之藥不勝

飲食日減飢饉日瘦半年矣余謂此食積爲患用大酒麴炒爲末

溫酒調服二錢俄而腹鳴良久仍下痞而愈

一婦人食魚肝腹痛此病諸藥不應用陳皮白朮等分爲末以陳

濟陰綱目 卷十三 天德堂

皮湯送下數劑而愈

見脫丸 治產後血氣虛弱飲食停積口乾煩悶心下痞痛

黃芩 草澄茄 良薑 三稜 蓬朮

人參 陳皮 等分

右爲細末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛取餘汁煮麴丸如桐

子大每服三五丸蘿蔔湯或白湯下

○腹脹

郭稽中曰產後腹滿悶嘔止不定者何答曰敗血散於脾胃脾受

之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐

逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干更傷正

氣疾愈難治但服抵聖湯則愈

薛氏曰：前證若敗血傷於胃，宜用前方。若飲食停於脾，宜用之。  
 若加厚朴，若飲食傷於胃，宜用六君子湯。大凡損其脾胃，節其飲食為善。  
 一產婦患前證，或用抵當湯，敗血已下，前證益甚，小腹堅硬，似欲去後，余謂此脾氣虛而下陷，用補中益氣湯，加炮薑溫補脾氣，血抵當湯太峻，似非產後所宜，昨兼用之。  
 既如故，又用六君子湯而安。  
 抵當湯 治產後腹脹滿悶，嘔吐不定，蓋敗血入於脾胃，而脾不能運化，故胃不能納，以致嘔吐腹脹等症。薛氏曰：此赤芍藥、半夏、澤蘭葉、陳皮、白人參、甘草、五分。石作一服，加生薑三片水煎溫服。○惡露過多者，去澤蘭葉，藥倍加陳皮生薑。  
 濟陰綱目 卷十三 天 天德堂  
 香砂養胃湯 治產後嘔吐，飲食不下，腹脹者，此敗血攻於脾胃之間，日久成反胃之症。  
 半夏 白朮 陳皮 茯苓 厚朴 香附子 各八分  
 人參 蒼朮 砂仁 檳榔 草果 各五分 甘草 四分  
 石劉加生薑三片烏梅一箇水煎服。  
 如味六君子湯 治飲食停滯于脾，以致腹脹嘔吐。  
 人參 白朮 茯苓 甘草 炙甘草 陳皮 去白  
 半夏 湯泡厚朴 姜製各七分 大厚朴 一錢  
 石劉加生薑三片水煎服。  
 如味平胃散 治產後腹脹。  
 厚朴 炒 蒼朮 炒 陳皮 甘草 人參 各一

石劉水煎服。  
 紫金丹 治產後衝胸中有物狀如噎氣。  
 代赭石 礞石 各等分  
 右為細末，醋糊丸，如桐子大，每服三五十丸，酒下，胸中痛加當歸湯下，久服治血癖。  
 又方  
 代赭石 桃仁 各等分 大黃 半兩  
 右為末，薄荷水打糊丸，如桐子大，每服三五十丸，溫水下，無時。  
 樟柳根 大戟 一兩 甘遂 一兩  
 右為極細末，每服二三錢，熱湯調下，取大便宜利為度，此主水。  
 濟陰綱目 卷十三 天 天德堂  
 氣之聖藥也 此藥峻利  
 ○浮腫  
 郭精中曰：產後四肢浮腫者，敗血乘虛停積，循經流入四肢，留注日深，却還不得，腐壞如水，故令面黃，四肢浮腫，醫人不識，便作水氣治之，投以甘遂大戟等藥，以導其水，夫產後必虛，又以藥虛之，是謂重虛，往往多致夭枉。但服小調經散，血行腫消，則愈。  
 陳無擇曰：產後浮腫多端，有白懷腫，腫至產後不退者，亦有產後失於將理，外感寒暑風濕，內則喜怒憂驚，血與氣搏，留滯經絡，氣分血分，不可不辨。要當隨所因脈證治之，小調經散治血分固效，但力淺難憑，不若吳茱萸湯、枳朮湯、導滯散、大調經散，皆要藥也。又論曰：夫產後勞傷血氣，腠理虛，則為風邪所乘，邪搏於氣，不得

宜越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便差也

潔古云如產後風寒在表面四肢浮腫宜局方七聖丸白湯下日加以利為度如浮腫至膝喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多也如浮腫又頭痛目加羌活川芎謂風多也如只浮腫止七聖丸本方服

東垣云中滿分清丸見腫用四物湯吞之

丹溪云產後腫必用大補氣血為主少助以蒼朮茯苓使水自利薛氏曰前證若寒水侮土宜養脾肺若氣虛浮腫宜益脾胃若水

氣浮腫宜補中益氣當參雜證本門主治

一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫余謂中氣不足用補

濟陰綱目

卷十三

天德堂

中益氣湯方用六君子湯而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸此

湯不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸而愈

一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒余謂脾肺虛寒用六君加

薑湯而泄瀉愈用補中益氣而脾陽健

杜氏治張宜徽侍寵產後半月忽患浮腫急召產科醫治經半月

不差病勢轉劇召杜治之杜至曰諸醫作何病張曰皆云水氣浮

腫杜曰非也且水氣發咳嗽小便澀是也今愛寵小便不澀不作

咳嗽惟手足寒乃血藏虛氣塞不通流面生浮腫遂用益血和氣

藥治之旬日病去七八經半月全愈所用之藥乃靈苑方牡丹散也其方云治血虛風虛冷今產科家多用此藥治產後諸病如神

更名捐金湯者是也壯升散

一婦產後四肢浮腫寒熱往來蓋因敗血流入經絡參入四肢氣

喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脇疼痛遂用旋覆花湯散汗諸報

腫服小調經散用澤蘭便煎湯調下腫氣漸消

大調經散 治產後腫滿喘急煩渴小便不利

方見前往來寒熱

小調經散 治敗血乘虛停積流入經絡四肢浮腫

沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸各一

細辛 麝香各五

右為細末每服五分薑汁溫酒各少許調服

經驗方 治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

濟陰綱目

卷十三

天德堂

乾漆 大麥芽 各等

右各為細末以新瓦礫子中鋪一重麥藥一重乾漆如此填滿

用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散但是產後諸疾熱酒調下

二錢

白木湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實 兩 白木 三兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服腹中裏即消

散也

正脾散 治產後遍身浮腫及治婦人大病後脾氣虛弱中滿腹

脹等症

蓬莪朮 香附子 童便 茴香 甘草 陳皮 各等

右為細末每服二錢燈心草木通湯下

小調中湯 治產後一切浮腫但用此藥無不效者

茯苓 當歸 白芍藥 陳皮 白米 一錢

右切作一劑煎湯調後藥末

沒藥 琥珀 桂心 細辛 麝香 各五分

橘皮酒 治產後肌浮以此行氣

橘皮為末每服二錢酒調服

丹溪方 婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此體虛而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中導水行氣可也

白木 二兩 陳皮 兩 川芎 半兩 木通 六錢 茯苓 三錢

右用水煎下與熟光二十五九

濟陰綱目 卷十三 等腫 三 天德堂

李觀政 治產後虛腫滿促利小便則愈

生薑 三兩 白麵 三兩 大半夏 七枚

右以生薑汁搜麵與半夏為七餅子煨熟為末水調一匙小便利為效

張氏方 治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉 防己 各等分

右為末每服二錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可

漢防己散 治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防己 獨活 枳殼 桑白皮 各一兩 商陸 甘草 各七錢

右為末每服四錢生薑三片水煎空心溫服

七聖丸 治產後風氣壅盛面目四肢浮腫涕唾稠粘咽乾口燥

心脇脹滿大便秘小便赤

肉桂 去 川芎 大黃 檳榔 木香 各半

羌活 郁李仁 去皮各一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸食後溫湯下○山嵐瘴地最宜服量虛實加減○如浮腫又頭痛骨痛加羌活川芎謂風多也○如只浮腫此用本方

加味吳茱萸湯 治婦人臘氣本虛宿挾風冷胸膈滿腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄瀉不止少氣羸困及因生產臟氣暴虛邪冷內勝宿疾轉增

吳茱萸 一兩 乾薑 桂心 防風 細辛 當歸 牡丹皮 赤茯苓 半夏 桔梗 麥門冬 甘草 各半

濟陰綱目 卷十三 等腫 三 天德堂

右為末每服四錢水煎食前熱服

加味八物湯 治產後遍身浮腫氣急潮熱

人參 白茯苓 熟地黃 小蘗香 各三錢 白木 各四錢 當歸 白芍 香附子 各五錢 柴胡 黃芩 甘草 各一錢

右剉散分作六七服每服如生薑三片水煎空心熱服盡此藥方服調經丸○若肚痛加延胡索乾漆枳殼各三錢○若嘔吐惡心加良薑砂仁各二錢○若手足麻痺加肉桂一錢半○若咳嗽加五味子款冬花杏仁

加減金匱腎氣丸 治肺腎虛腰痛重脚腫小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱脹其効如神此證多因脾胃虛

熟地黃四兩酒拌搗膏  
白茯苓三兩  
山藥  
山茱萸  
澤瀉

牡丹皮  
牛膝  
車前子  
官桂  
附子

右爲求和地黃煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空心白湯下

大全云夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積爲陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚兼陽氣陽性浮動故痛無常處產後血氣傷于臟腑臟腑虛弱爲風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也  
薛氏曰前證乃真氣虧損邪氣乘之況產後得之尤當固其氣爲

濟陰綱目  
卷十三 積聚  
三十四  
天德堂

主若求旦夕之效而改其邪則速其危矣當參前雜証積聚諸方論治之。

一產婦腹中似有一塊或時作痛而轉動按之不痛面色痿黃痛

則自肺而滲於諸此用氣虛而血凝也不信乃用破血行氣

痛益甚。其動無定。又謂之爲血。當用破血。駢逐之藥。痛攻冲脇。

肝腹尤甚益信爲血髓確服下血等藥去血甚多形氣愈虛肢節

聞各結小杉隱於肉裏以爲蟄子畏藥而走於外余曰肝藏血而

養諸筋此因肝血復損筋涸而攣結耳蓋肢節胸項皆屬肝膽部

分養其脾土。補金水以滋肝血。則筋自舒。遂用八珍湯逍遙散歸

脾陽加減調治而愈。

歸月空不歸。兩刃暗長小。更盡帶。復中一鬼作。前或上文。協集。

女川經之書下持用用ノ在源河用口一坊不病馬一正甲里

或下攻小腹發熱晝熱惡寒肌膚枯燥飲食無味殊類癰症久留

不嫌余謂肝脾血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯隨症互服而

愈

大全云新產後有血與氣相搏而痛者謂之瘀血之言假也謂其  
清淨無定處也此由風令血氣不恬然血下則少故致

此病不急治，則多成積結，妨害月水，輕則不通，重則不通也。

王氏曰：前證乃寒邪乘客氣血，藉此月經來而血周也。當銷養

周中。聖道。受。皇。泰。為。善。維。聖。云。任。承。之。為。男子。為。七。指。文。

胃氣疏利月經實結盡者爲言黃芩云仁用六兩身二爲一疳方

十盤飛水宮。前後各誦道之。

治後諸積不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥片 黃芩 茯苓六兩 茯苓兩

濟陰綱目

卷十二

精微

天德堂

右劉散每服半兩水煎溫服日

四神散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

當歸去瘀生新 川芎 赤芍藥 乾薑各分

右爲細末每服一錢食前同溫酒調服

治血虛作痛。臍下脹滿。或月經不行。發熱體倦。

苦寒 方寒 寒心 血得 痛真

五明堂抄  
富商  
方藥  
木川  
血毒  
五小  
此首  
周下

有篇末每册一鈐空，心繫酒誦下

治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四時

癰腫煩疼

桂心  
當歸  
赤芍  
牡丹皮  
沒藥  
檳榔

乾漆樹膠 青皮各七錢半 厚朴製 三稜鹽 玄胡索 大黃

\_\_\_\_\_

桃仁 去皮 微甲 一兩

右為細末，煉蜜丸，如桐子大，每服三四十九，食前溫酒下。

產後方 瘀血腹痛無定處

童便三升 生地黃汁 生薑汁 各一

右先煎前三味，約三分減，二次下薑汁，慢火煎如稀飴，每服取一合，煖酒調下。

千金方 療血瘕

生乾地黃 烏賊魚骨

右為細末，空心溫酒調服二錢七。

○產後

大全云：產後霍亂氣血俱傷，臟腑虛損，或飲食不消，胸胃風冷，所

濟陰綱目 卷十三

三六

天德堂

錢陰陽不順，清濁相干，氣亂於腸胃之間，其邪相搏，冷熱不調，上

吐下痢，故曰霍亂也。經云：渴而飲水者，五苓散主之；不欲飲水者，

中丸大段虛冷者，加附子來復丹亦妙。

薛氏曰：一產婦停食霍亂，用霍香正氣散之類，已愈後胸腹膨脹，

飲食稍過，即嘔吐，或作瀉。余謂此脾胃俱虛，用六君子湯加木香，

治之漸愈。後因飲食失調，兼患霍亂，胸腹大痛，手足逆冷，用

附子散又用八味丸以補土母而康。設此痛無補法，而用辛散或

用平補之劑，必致不起。

一產婦吐瀉，喉酸面目浮腫，此脾氣虛寒，先用六君子湯益氣為主，

佐以越鞠丸而嘔酸愈，又用補中益氣加半夏而脾胃康。

四主散 治一切霍亂吐瀉極效

方見胎前霍亂

五苓散 治霍亂渴而飲水者

白朮 茯苓 猪苓 各一錢 澤瀉 二錢 桂 三分

右剉作一服，水煎服

理中丸 治脾胃虛寒，嘔吐泄瀉，飲食少，忌肚腹膨脹

人參 白朮 乾薑 炮 甘草 各一錢

右為末，米糊丸，如彈子大，每服一丸，嚼細白湯下

白朮散 治產後霍亂吐瀉，腹痛煩渴，手足逆冷，或大便不實

白朮 橘紅 麥門冬 去心 人參 乾薑 炮 各一兩 甘草 兩

右剉，每服四錢，水煎服

溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

濟陰綱目 卷十三

三六

天德堂

人參 白朮 當歸 草豆蔻仁 乾姜 各一

厚朴 姜製 兩半

右為末，每服三錢，水煎服

附子散 治產後霍亂不止，手足逆冷

附子 炮 桂心 吳茱萸 炮 丁香 當歸 白朮

人參 橘紅 甘草 各一兩

右為細末，每服二錢，粥飲調服

高良薑散 治產後霍亂吐利，腹中疝痛

高良薑 當歸 草豆蔻仁 各等

右為細末，每服二錢，用粥飲調下

○右二方，非真寒不可用



有虛寒者  
之別焉  
主病之藥  
獨有之藥

藿香正氣散 治外感風寒內停飲食頭眩寒熱或霍亂吐瀉  
作瘧疾

藿香一錢 桔梗炒 大腹皮 紫蘇 茯苓 白朮炒  
白芷 半夏麴 陳皮 厚朴 各一錢 甘草五分  
右剉加薑棗水煎服

求復丹 治伏暑吐瀉身熱脈弱其效如神倉卒間須用此藥

硝石一兩同硫黃火上微炒用柳木條攪拌砂子不可火大 舶上硫黃

太陰玄精石 各一兩 五靈脂 砂 青皮 陳皮 各二兩

右爲末醋糊丸如小豆大每服三十丸空心米飲下○易簡方

云硝石性寒佐以陳皮其性疎快硫黃性熱若作煖藥以止瀉誤矣蓋用啖食生冷或胃暑熱之氣中脘閉結揮霍變亂

濟陰調日 卷十三 天德堂

非此藥不能通利三焦分理陰陽其功甚效而速

一方 治吐逆不受湯藥者

伏龍肝爲細末每服三錢米飲下

○嘔吐

夫全云大胃爲水穀之海水穀之精以爲血氣榮潤臟腑因產則臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸胃燥澀其氣則逆故嘔逆不下食也

薛氏曰前證若因飲食過時用四君子湯飲食過多用六君子湯

飲食過時而兼勞役用補中益氣若因飲食停滯用人參養胃湯

散肝木侮脾土用六君子湯胃氣虛寒加炮薑木香寒水侮土用黃

散肝木侮脾土用六君子湯肝火熾盛命門火衰不能生土用八味丸

嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯

此病應生一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日少前症愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味逍遙散加味歸脾湯以次調理而痊

吞酸丸 治產後嘔不止者

丁香 辰砂 另研各五靈脂一錢

右香脂先研後入砂再研勻用狗膽或豬膽丸如鷄頭大每服一丸生薑陳皮湯磨下

蒲黃散 治產後三四日惡露不下嘔逆吐熱

蒲黃 治產後三四日惡露不下嘔逆吐熱

濟陰綱目 卷十三 天德堂

芍藥二兩 當歸 知母 生薑 蒲黃 各二兩

紅花 荷葉心中蒂 生地黃汁 一盞

右咬咀水二升煎至一升去渣下蒲黃煎數沸空心分三帖

橘紅半夏湯 治產後胃虛嘔逆

橘皮 半夏 甘草 各一兩 藿香 三兩

右剉每服五錢加生薑五片水煎服

開胃散 治產後胃虛嘔吐胸滿不食

人參 訶子 甘草 各一兩

右剉每服五錢加生薑五片水煎服

薑朮散 治產後更無他疾但多嘔逆不能食

白朮 一兩 生薑 半兩

右剉作一服酒水各二升煎取一升分三服  
 石蓮散 治產後胃寒咳嗽嘔吐不食或腹作脹  
 石蓮肉 半兩 白茯苓 兩 丁香 半兩  
 右爲細末每服三錢用薑湯或米飲調下日三服  
 錢氏益黃散 治脾胃虛寒水反來侮以致嘔吐不食或肚腹作  
 痛或大便不實手足逆冷等症  
 陳皮 兩 青皮 兩 訶子肉 兩 甘草 錢 丁香 各二錢  
 右爲細末每服四錢水煎服  
 加味四君子湯 治產後嘔逆不已  
 人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 陳皮  
 藿香 砂仁 各等分  
 右剉每服四錢加生薑三片棗一枚水煎溫服  
 濟陰綱目 卷十三 嘔吐 早 天德堂  
 大全云夫五臟六腑俱稟氣於胃而肺爲主氣之總司若產後致  
 傷氣血則嘔膈氣損而風冷搏之肺因氣逆而上則吃逆矣又脾  
 虛氣冷胃中伏寒因食熱物冷熱相擊氣厥而不順則吃逆也脾  
 者主中焦爲三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰陽氣虛使榮  
 衛氣厥逆則致生斯病也經云吃噎者胃寒所生服藥無效者灸  
 期門三壯必愈期門穴乃胃之大絡  
 薛氏曰前證屬胃氣虛寒之惡候如用後方未應急投參附湯亦  
 有復生者  
 丁香散 治產後心煩咳噎不止

丁香 白豆蔻 伏龍肝 一兩  
 右爲細末每服一錢煎桃仁吳茱萸湯調下如人行五里再服  
 薑桂散 治產後嘔逆三日不止欲死  
 肉桂 五錢 薑汁 三合  
 右剉同煎服三合以大火炙手摩令背熱時時塗藥汁盡妙  
 羌活散 治吃逆  
 羌活 附子 炮 茴香 炒 各 白豆蔻 各二錢  
 石爲末每服二錢水一盞鹽一捻煎十數沸熱服一服止  
 一方 治產後吃逆  
 乾柿一個切碎以水二盞煎六分熱呷  
 一方 治產後吃逆三五日不止  
 陳壁壘三五個水煎呷瘥即瘥子窠  
 補遺治產後吃逆橘皮湯及大小橘皮湯皆效  
 右諸方當審寒熱虛實用之如寒者宜丁香薑桂散實者宜  
 竹茹實者宜香附橘皮虛者宜人參甚則附子佐之誤施則噎  
 膈之悔慎之  
 〇咳嗽  
 大全云肺主諸氣產後肺虛外邪易感少有微邪便成咳嗽故或  
 風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若產後咳嗽雖太早而咳嗽者  
 難治  
 郭稽中曰產後血氣不運咳嗽者何答曰產後咳嗽多因食熱過  
 壅滯或熱病或有氣塊以時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱口

乾或時頃睡醒氣虛肢體無力宜服局方黑神散五錢  
加蘇煎服

薛氏曰產後咳嗽若因陰血虛者用四物加參朮陳皮枳殼若因  
肺氣傷者用四君加芍歸桔梗因陰火上炎者六味地黃丸加參  
朮因風寒所感者補中益氣加桔梗紫蘇若瘀血入肺發喘兼口  
鼻出血氣或鼻出血者急用二味參蘇散亦有得生者然所患  
悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根本胃氣一虛五臟失所百病生  
焉但患者多謂脾理不密所致殊不知經云肺傷者金生于巳土  
若脾土一虛則不能生金故脾理不密外邪易感法當壯土金生  
腎水以制火獨善若不補其虛而直治其病則誤矣

李氏曰產後咳嗽多是瘀血入肺二母散加杏仁杏仁入參茯苓  
湯陰綱目卷十三  
天德堂

旋覆花湯 治產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅盛鼻塞聲重有  
汗者不具服

旋覆花 麻黃 赤芍藥 荆芥穗 前胡 茯苓  
半夏 五味子 甘草 杏仁 炒各等分

右咬咀每服四錢生薑三片棗二枚水煎食前溫服  
集驗方 療產後感冒風寒咳嗽多痰

甘草 桔梗 各一錢 款冬花 一錢 麥門冬 一錢 生地黃 一錢  
豆豉 一錢 葱白 一握

右咬咀水煎服取八合去滓食後分兩服  
二母散 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽不已

知母 貝母 白茯苓 人參 各二錢 桃仁 去尖 各一錢  
右咬咀作一服水煎食後服

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽或腹滿不食而浮  
氣逆等證

人參 白朮 炒 白茯苓 甘草 炙 陳皮 各二錢  
右剉一劑加薑水煎服

經效方 治咳嗽多痰唾粘氣急

前胡 五味子 紫苑 貝母 各二錢 桑白皮 各二錢  
茯苓 各二錢 淡竹葉 二十片

右咬咀水二升煎取八合去滓食後分兩服  
濟陰綱目卷十三  
天德堂

方 治產後咳嗽氣喘

百部根 苦梗 各六分 桑白皮 二十分 乾百合 赤茯苓  
右咬咀水二升煮取七合去滓食後分兩服

釋曰以上六方先以散邪為第一以散中兼涼血清心為第二  
清肺補氣利氣行瘀為第三補土生金為第四而第五第六一  
則散而收之一則清而飲之數方之內治嗽之法初中末三治  
補瀉兼施先後不紊能推廣之以治雜症之咳嗽亦無不可集  
方者其藥上藥王歟

○喘急

郭稽中曰產後喘極危多死也

此方實謂之聖方也

行脉中衛行脉外相隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血虛弱  
 衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若遇喘不  
 快敗血停凝上薰于肺亦令喘急但服命丹不見喘血去喘自  
 定

陳無擇曰產後喘急固可畏若是敗血上薰於肺則可畏效每  
 命丹若感風寒或因憂思飲食鹹冷等致病者每命丹未可均濟  
 况孤陽絕陰乎若榮血暴絕宜大料黃散薄湯亦可救傷風寒  
 宜旋覆花湯性理變發宜小調經散用桑白皮杏仁煎湯調下傷  
 食宜服見現丸五積散等藥

薛氏曰前證若脾肺氣虛弱用六君桔梗若兼外邪更加紫蘇若  
 中氣虛寒用補中益氣加炮薑肉桂若陽氣虛脫更加附子若喘  
 血入肺急用二味參蘇飲

濟陰綱目 卷十三 婦人 天德堂

一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣虛脫用參附  
 湯四劑而愈

蒲江吳輝妻孕時足腫七月初旬產後二日洗浴即氣喘但坐不  
 能臥者五個月惡風得燥稍寬兩關脉動尺寸皆虛百藥不效用  
 牡丹皮桃仁桂枝茯苓散實厚朴桑白皮紫蘇五味瓜蒌仁  
 煎湯服之即愈三服得臥其痰如失然作汚血感寒治之也

奪命散 治產後敗血衝心胸滿上喘合有煩躁

方見前血暈

一參蘇飲 治產後血入於肺而喘欲死者

右用水二碗煎蘇末取汁一饒調入參末隨時加減服  
 旋覆花湯 治產後傷風寒喘嗽痰涎壅盛

此治風寒

方見前咳嗽

此治飲食

見現丸 治產後傷風飲食而喘者

此治肺虛

方見前痞悶

五味子湯 治產後喘促脈浮而厥

此補肺祛寒

五味子 炒 人參 杏仁 各二錢 麥門冬 去心 陳皮 各一錢

右加生薑三片棗三枚水煎服

六君加失笑散 治產後喘急不能臥痰與血雜湧而上此脾胃  
 氣虛而敗血乘之也服此立止

六君子料六錢加生薑三片水煎服調入蒲黃五錢脂各炒

濟陰綱目 卷十三 婦人 天德堂

五分攪勻溫服少頃再服再入蒲黃末服神效余一日生  
 兩門京想道其妻產後數喘促不能臥痰與血交湧而上日  
 夜兩人共坐側身壅絕乞救察之無暇檢方書以意度之  
 新產後血氣未定大虛弱損故虛痰壅盛而敗血乘之軍  
 六君子加失笑散一服痰血俱消喘亦立止次日來謝云諸  
 病皆去止不能食再與參苓白朮散二帖  
 全愈對症之藥神効如此故特附於此

大補湯 治產後百日外面青浮腫唇口氣急有汗乃大虛之證  
 急宜服此

當歸頭 大川芎 大白朮 白芍藥 白茯苓 人參多  
 黃芪多 五味子 熟地黃 乾薑上 甘草少

右剉散水煎服此帖不退即加川芎木香另磨入服有鴨加  
 訶子肉豆蔻栗殼

○鼻衄

郭稽中曰產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脈之海起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產後氣虛血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑氣起及鼻衄此緣產後虛熱變生此症胃絕脈脈不可治○經脈方云急取肺經一穴并產婦頂心髮兩條繫繫中指節上即止無藥可治亦補脈之一端也

薛氏曰按胃脈俠口繞承漿鼻準屬脾土鼻孔屬肺金謂胃虛肺損氣脫血死之證急用二味參蘇飲加附子五錢亦有得生者

汪石山治一婦人產後血逆上行鼻衄口乾心躁舌黑蓋因瘀血上升遂用益母丸二丸童便化下鼻衄漸止血漸通

李氏曰此產後虛熱所致犀角地黃湯救之

加味參蘇飲 天德堂

人參二兩 蘇耒二兩 附子五錢

右剉水煎服

濟陰綱目卷之十三

濟陰綱目卷之十四

關中 武之望叔卿父著輯 武林 薛 芳汝撰

西陵 汪 洪懋簡子箋評 天都 查 望子周撰

○泄瀉

郭稽中曰產後腹痛及泄利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於胃腹散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞瀉腸鳴或下赤白肛腸脹或痛走不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之禍不旋踵謹之謹之

陳無擇評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云飲冷當

類別有三方

薛氏曰產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛不能消食當雷而治之若米食所傷用六君加穀蘖若麪食所傷用六君子加麥蘖若肉食所傷用六君加山查神麴九兼嘔吐皆加藿香若兼嘔酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用六君加柴胡炮薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾土真氣宜加木香肉果若脾土虛寒當用六君子加木香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及四神丸若命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便滴瀝肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補脾腎利水道若腎

氣虛弱而四肢浮腫。治須補胃為主。若久而不愈。或非飲食所傷。而致。乃屬腎氣虧損。蓋胞胎主於任。而繫於腎。况九月十月。乃腎與膀胱所養。必用四神六味八味三藥。以補腎。若用分利導水之劑。是虛其虛也。

一產婦瀉痢。發熱作渴。吐痰甚多。肌體消瘦。飲食少思。或胸膈痞滿。或小腹脹堅。年餘矣。余以為脾胃瀉。朝用二神丸。夕用六君子。三月餘而痊。

一婦產後泄瀉。兼嘔吐。痰涎。面目浮腫。此脾氣虛寒。先用六君子。炮薑為主。佐以越鞠丸。而嘔酸愈。又用補中益氣。加茯苓半夏而脾胃康。

一產婦泄瀉。年餘。形體骨立。內熱。自汗盜汗。口舌糜爛。日吐痰三碗。許脈洪大。重按全無。此命門火衰。脾土虛寒。而假熱也。吐痰者。乃脾虛不能統攝歸源也。用八味丸補火。以生土。用補中益氣湯。兼補肺金。而脾胃健。

一產婦腹痛後重。去痢無虞。形體倦怠。飲食不進。與死為鄰。此脾胃俱虛。用四神丸。十全大補湯而愈。但飲食難化。肢體倦怠。用補中益氣而康。

一婦人五月患痢。日夜無度。小腹墜痛。發熱惡寒。用六君子湯送香連丸。二服漸愈。仍以前湯送四神丸。四服全愈。至七月終。急情嗜臥。四肢不收。體重節痛。口舌乾燥。飲食無味。大便不實。小便頻數。酒尿惡寒。棲棲不樂。此肺與脾胃俱虛。而陽氣虛寒。不伸也。用升陽益胃湯而痊。

汪石山治一婦產後滑泄。勺水粒米弗容。時即泄下。如此半月餘。眾皆危之。或用五苓散。平胃散。病益甚。汪診之。脈皆濡緩。而弱。曰此產中勞力。以傷其胃也。若用湯藥。愈滋胃瀉。非所宜也。今以參苓白朮散。除砂仁。加陳皮。肉豆蔻。煎薑。調服。旬餘而安。

調中湯 治產後腸胃虛怯。冷氣。寒之腹。脇刺痛。泄瀉不止。

良薑 當歸 肉桂 不見白芍 川芎

附子 地黃 人參 甘草 各一兩

右咬咀。每服五錢。水煎服。

登慈理中丸 治產後元氣虛弱。膈腹疼痛。泄瀉不止。又治男子脾胃虛弱。久泄不止。

人參 白朮 乾薑 甘草 肉豆蔻 丁香 木香 砂仁 白茯苓 白扁豆 各四錢

右為細末。煉蜜丸。每服四五十丸。空心米飲下。酒煮麴糵花亦可。

神効參香散 治產後脾胃虛寒。泄瀉洞下。及痢疾日久。穢積已盡。滑瀉不止。此收瀉如神。

人參 木香 各二兩 肉豆蔻 陳皮 墨栗殼 各一兩

右為細末。每服一錢。七清米飲調下。食遠服。

萬應已亥。余自金陵內人。十二月產。難經宿。始覺。旬日。洞瀉。以米飲調服。下痢。即止。此真起死回生之藥也。

○痢疾 大全云。產後痢疾者。由產勞傷。臟腑不足。日月未滿。虛乏未復。或

黃赤為熱  
之熱此古  
人之論自  
問出而不  
五色均不  
為熱也今  
同歟大藥  
於傷冷久  
為熱故者  
多而寒者  
未可執以  
求之為害

若果麻大無  
力可不溫  
而乃用黃  
極虛極痛  
去也故從  
不從其為  
凡聖藥不  
能治此以  
黃赤一白  
本藥代茶  
庶無小患

勞動太早或誤食生冷。若行起太早則外傷風冷乘虛入於腸胃。若誤食生冷則難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變為痢也。若血滲入大腸則為血痢難治世謂之產子痢也。得令則白或如魚腦得熱則赤黃或為膿血。若令熱相搏則下痢赤白或膿血相雜。若下痢青色則極冷也。若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛更加久痢不止無力瘦乏愈見虛弱謂之虛痢下痢又有產後氣血不順而下痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則調之滑者澀之虛者補之水穀不分者當利小便。若產婦情性執着不能寬解須當順其氣未有不妥者也。薛氏曰前證白屬氣分而赤屬血分也其論詳見瀉利。

一產婦食雞子腹中作痛面色青黃服平胃二陳更下痢腹脹服濟陰綱目卷十開胃湯

流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木剋侮所致用補中益氣加木香吳茱萸漸愈又用八珍大補兼服調經理愈。

一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒冷熱與血交擊滯下純血極痛其脈大無力口乾用黃芩芍藥湯三服而安。

產後下痢作渴者水穀之精化為血氣津液以養臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止反溢水氣脾胃既虛不能剋水水自流溢浸漬皮膚則令人腫但止其渴痢則自痊。

薛氏曰痢證若渴而不喜飲食屬胃氣虛不能生津液宜用七味白朮散夜間發熱口渴屬腎水弱而不能潤宜用六味丸並佐以益氣湯以滋化源。

此以四物湯救急散治產後赤白痢腹中絞痛

白芍 阿膠 艾葉 熟地黃各一 當歸

甘草各三 右咬咀水煎分二服空心飲

加味四君子湯治產後赤白痢神効

人參 白朮 白茯苓 甘草 黃耆各一

聖藥穀去蒂

右劉水煎 以上三方治虛滑

白頭翁加甘草阿膠湯治產後下痢虛極脈經作熱痢重

白頭翁 甘草 阿膠 黃連 黃蘗

秦皮 去皮各 槐連四物湯治產後熱滑血痢臍腹疼痛

當歸 川芎 赤芍藥 生地黃 槐花 炒

黃連一錢御米殼去蒂五分

右劉水煎服

黃連丸治產後熱滑赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連 黃芩 黃柏 梔子仁 阿膠

蒲黃各一當歸二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸米飲下日三夜

以上三方治熱滑

此方以三黃解毒為主非真熱勿用

之

神功參香散 治痢疾日久。積積已少。腹中不痛。或微痛不發。但滑瀉不止。乃收功之復藥也。

方見前泄瀉。

一方 治產後血瀉不禁。血作痛。兼塊。以寒清。

桂心 乾薑 各等

右為末。空心酒調服。方寸七。

以上三方。治寒滑。

神仙感應丸 產後固無積。痢多有因。食草味早。亦作瀉痢。百無一生。非此方不能救之。三二服立止。不然荏苒日月。致不救也。如不因食。重者不可服。

神麴 一人參 枳殼 乾薑 去積 赤石脂 熟地

濟陰綱目 卷十四 泄瀉 太 天德堂

白米 各二

右為細末。每服三錢。空心米飲調下。

連翹丸 治產後久病。赤白痢。蓋因脾胃不和。氣滯積聚所致。心腹脹滿。乾嘔酸心。飲食不下。胸膈噎塞。脇肋疼痛。危困者。

連翹 陳皮 法 京三稜 各錢 肉桂 不見 檳榔

牽牛子 取頭 蓬朮 青皮 去白 各 肉荳蔻 麝香 好墨 各半

右為細末。麝香丸如桐子大。每服三十丸。米飲下。或用水煎服亦可。

以上三方。治積痢。

三聖散 治產後下血痢不止。

烏魚骨 燒綿灰 血餘灰 各等分

右為細末。每服一錢。煎石榴皮湯調下。熱服。

一方 治產後痢。日五十行者。

取木裏黃。黃芩。炒黃。急以水沃之。令稀。調得所服之。即愈。

治產後諸痢雜方

取蒼耳葉。搗汁。半盞。日三四溫服。

一方 煮雞白食之。

一方 羊腎脂。炒雞白。空心食之。

一方 敗龜板一枚。米醋炙研為末。醋湯調下。

治產後血痢雜方

一方 用阿膠二兩。以酒一升半。煮一升。頓服。

一方 用生馬齒莧。搗汁。二大合。煮一沸。下蜜一合。調頓服。

以上雜治方

必効方 療產後痢。而渴飲無度數。

麥門冬 烏梅 各二十

右細剉。水一升。煮取七合。細呷。

經効方 療產後久痢。津液涸渴。不止。

龍骨 厚朴 茯苓 黃耆 麥門冬 人參 各八

生薑 大棗 各十

右細剉。以水一大斗。煮取七合。空心分兩服。

錄驗方 療產後痢。日久。津液枯竭。四肢浮腫。口乾舌燥。

冬瓜一枚。黃泥糊厚五寸。煨爛。熟去皮。絞汁服之。痊。

七味白朮散 治產後痢。津液竭渴。不止。



方見前渴  
以上治痢疾發渴

○大便秘澀

郭稽中曰產後大便秘澀者何答曰產後水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中悶脹者此乃屎在臍臍以其乾澀未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱投之寒藥則腸消陰衰變證百出性命危矣

薛氏曰前證因去血過多失腸乾澀不可計其日期飲食數多而用藥通之必待腹滿覺脹欲去不能者乃結在直腸宜用猪膽汁瀉之若服苦寒疎通之劑反傷中氣或愈加難通或通而不止或成痞證也若去血過多者用十全大補湯若血虛火燥者用加味濟陰綱目

四物湯氣血俱虛者用八珍湯雖數日不通飲食如常腹中如鼓仍用八珍加桃仁杏仁治之若泥其日期飲食數多而通之則誤矣

一產婦大便不通七日矣飲食如常腹中如鼓余曰飲食所入雖倍常數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十一日腹滿欲去用猪膽汁潤之先去乾糞五七塊後皆常糞而安

一產婦大便八日不通或用通利之藥中脘脹痛飲食甚少或云通則不痛痛則不通乃用蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎復傷用六君加吳茱萸肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然多致不起

一產婦大便秘結小腹脹痛用大黃等藥致吐瀉不食腹中自痛

余用六君子如木香炮薑治之而愈

一婦人大便秘澀諸藥不應苦不可言令飲人乳而安

李氏曰產後大便閉者芎藭湯加防風枳殼甘草秘澀者麻子仁丸或蘇麻粥蓋產後去血多則鬱冒鬱胃則汗多汗多則大便閉皆血虛也

調導散 治婦人產前產後大便不通

當歸 川芎 防風 枳殼各四 甘草二

右取咀每服一兩用生薑三片棗一枚水煎溫服忌動風物

麻仁丸 治產後去血過多津液枯竭不能轉送大便閉澀

大麻仁 研如 枳殼 剉碎 人參 各一 大黃 兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九空心溫酒米飲任下

濟陰綱目 卷十四 大便秘澀

通漸加丸數不可太過

評曰產後不得利者百無一生去血過多臟燥大便秘澀則回當滑之大黃似難輕用唯慈涎調服茶為丸復以臘茶下之必通

產後固不可輕用大黃然大腸秘結不通或惡露不出不得大黃以宣利之勢必不通但利後即當以參善日米甘草及芎藭等藥大劑調補之不然元氣下脫後將不可救矣

滋腸五仁丸 治產後血氣虛損大腸閉澀傳道艱難

杏仁 去皮 桃仁 如上製 柏子仁 五 松子仁 一錢

郁李仁 各一兩 一方加當歸稍五錢

右五仁另研為膏合橘皮末和勻再研煉蜜丸如桐子大每服

三十九加至五十九食前清米飲下

阿膠枳殼丸 治產後大便秘澀

二味有見

阿膠 枳殼各等分

右為末煉蜜丸如桐子大。滑石末為衣。溫水下二十九。未通再服。

麻蘇粥 婦人產後有三種痰鬱胃則多汗。汗多則大便秘。故難用藥。惟麻子蘇子粥最為穩當。

蘇子 大蘇子各半

右研極細用水再研。取汁一盞分三次煮粥啜下。

本事方云。此粥不惟產後可服。大抵老人諸虛風秘皆宜服之。備有一人。每年八十四忽爾腹痛頭疼。惡心不食。召醫數十。皆用補脾進食治風清利頭目等藥。數日雖愈。全不入食。其主憂惶。余辯說前藥皆誤矣。此證正是老人風秘。臟腑壅滯聚於胸中。則腹脹惡心不思飲食。又上至於顙。則頭痛神不清也。若臟腑流暢。諸疾悉去矣。予命作此粥。兩服而氣泄。先下結糞如胡桃者十餘枚。後漸得通利。不用藥而自愈矣。

胡桃者十餘枚。後漸得通利。不用藥而自愈矣。

天德堂

皆用補脾進食治風清利頭目等藥。數日雖愈。全不入食。其主憂惶。余辯說前藥皆誤矣。此證正是老人風秘。臟腑壅滯聚於胸中。則腹脹惡心不思飲食。又上至於顙。則頭痛神不清也。若臟腑流暢。諸疾悉去矣。予命作此粥。兩服而氣泄。先下結糞如胡桃者十餘枚。後漸得通利。不用藥而自愈矣。

胡桃者十餘枚。後漸得通利。不用藥而自愈矣。

胡桃者十餘枚。後漸得通利。不用藥而自愈矣。

胡桃者十餘枚。後漸得通利。不用藥而自愈矣。

胡桃者十餘枚。後漸得通利。不用藥而自愈矣。

兵部手集方 治產後秘結不通。膨滿氣急。坐卧俱難。

用大麥蘖炒黃為末。酒下一合神効。

○大小便不通

大全云。產後大小便不通者。本腸胃挾熱。因產後血水俱下。津液燥竭。腸胃痞澀。熱氣內結於腸胃。故令大小便不通也。

薛氏曰。治一婦。大小便不通。諸藥不應。將危矣。令飲牛乳。一日稍

通三日而痊。人乳尤善。

通氣散 治產後大小便不通

陳皮 蘇葉 枳殼各等分 木通各等分

右剉散。每服四錢。水煎溫服。立通。

桃仁散 治膀胱氣滯血澀。大小便閉。

桃仁 葵子 滑石 檳榔各等分

右為細末。每服二錢。空心葱白湯調下。

枳殼丸 治產後大小便澀滯

木香 枳殼 蘇子 麻仁 炒 大黃各一兩

右為末。煉蜜丸如桐子大。每服三十九。溫水送下。食後如飲食不化。亦宜服之。

不化亦宜服之

齊陰綱目 卷十四 大便秘澀

一方 治產後大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 牡蠣 生地黃

芍藥各一兩

右為細末。空心米飲調服。方寸七。忌麵蒜。

金鑰匙散 治產後大小便不通。腹脹等證。

滑石 蒲黃各等分

右為細末。酒調下二錢。

○遺尿

薛氏曰。產後遺尿。若脾腎虛弱。用還少丹。仍以補中益氣湯為主。寒加肉苁蓉補骨脂。或四神丸。若脾腎虛寒。用八味丸。兼四神

丸。仍佐以前二方。按產後遺尿。乃腎氣不固。宜五味子散主之。

一產婦大便不實。飲食少思。五更或清晨遺尿。此中氣虛寒。脾胃不能主此方。

不足用補中益氣。送四神丸而痊。

一產婦小便出糞。名大小腸交。乃氣血俱虛。失行常道。先用六君子二劑。又用五苓散一劑而痊。尋常腸交亦可用。

補遺方 療產後遺尿不知亦治遺尿。

白蘇 芍藥各七

右為末酒調服方寸七。

集驗方 療產後遺尿亦治男子。

枯礬 牡蠣各七

右為末酒調服方寸七。日三服。

加味補中益氣湯 治脾胃虛寒大便不禁。

黃耆 人參 白朮 甘草 當歸 補骨脂 各五

陳皮 升麻 柴胡 肉荳蔻

右剉一劑水煎服。

還少丹 治脾胃虛弱遺糞。

肉蓯蓉 遠志 茴香 巴戟 乾山藥

枸杞子 熟地黃 石菖蒲 山茱萸 牛膝

杜仲 楮實子 五味子 白茯苓 各三

右為末用棗肉百枚同煉蜜丸如桐子。每服五七十丸。空心溫酒或鹽湯下。日三服。

四神丸 治脾胃虛弱。大便不實。或五更作瀉。

破故紙 吳茱萸 肉豆蔻 五味子 各一

右為末用大紅棗四十九枚。生薑四兩。切碎。同棗用水煮。姜取棗肉和藥。丸桐子大。每服五十九丸。空心鹽湯下。

五味子散 治腎泄。

右炒香熟研為細末。每服二錢。陳米飲調下。

廣濟方 治產後遺糞亦治男子。

取故燕窩中草燒為末。以酒調下。半盞。

○淋濁

大全云。產後諸淋。因熱氣客於脬中。內虛則頻數。熱則小便澀痛。故謂之淋。○又有因氣虛挾熱。熱邪搏血。滲入胞中。血隨小便而出。為血淋者。

婦人血虛。則中則未也。如交感亦登。滲入而來。即

三因論曰。治諸產前後淋。其法不同。產前當安胎。產後當去血。如其令熱。當石氣淋等。為治則一。但請其虛實而用之。若麥精也。最是產後要藥。雖當究其所因。則不失其機要矣。

薛氏曰。按前證若膀胱虛熱。用六味丸。若陰虛而陽無以化。用滋腎丸。蓋土生金。金生水。當滋化源也。仍於淋瀝頻數門調治。

一產婦小便淋瀝。或時自出。用分利降火之劑。二年不愈。余以為肺腎之氣虛。用補中益氣湯。六味地黃丸而痊。

牙根湯 治產後諸淋。無問冷熱。膏石氣結。悉主之。

白茅根 瞿麥 白茯苓 各二 葵子

人參 各一錢 蒲黃 桃膠 滑石

甘草 各六分 紫貝 一箇 石首魚腦 砂 一箇

此方其後

治石淋要藥

○劉分二貼，加生薑三片，燈心二十根，水煎服，或為末，每服一錢，木通煎湯調下，如氣壅閉，木通橘皮煎湯調下。

滑石散 治產後熱淋

滑石一兩二錢半 通草 車前子 葵子各一兩  
石為末，以漿水調服，方寸七，至三七為妙。

滑石通淋散 產後小便澀澀不通者，因血熱積於小腹，經水不利，忿食熱毒之物而成淋澀，故也。

赤茯苓 澤瀉 木通 黃連 滑石各八分

白木 瞿麥 山梔子 車前子各等分 滑石一分

右剉，加燈心十二莖，水煎，空心熱服。

石韋散 治婦人小便卒淋澀

濟陰綱目 卷十四 淋濁

石韋 黃芩 木通 榆白皮 葵子

瞿麥 甘草各等分

右咬咀，每服八錢，加生薑三片，水煎，食前溫服。

加味四物湯 諸淋皆屬於熱，用此累効。

當歸 川芎 赤芍藥 生地黃 甘草梢

杜牛膝 木通各一錢 桃仁五箇 滑石一錢 水香

右剉，水煎服。

一方 產後後淋，小便痛及血淋。

白茅根五分 瞿麥 車前子各二錢 鯉魚齒一百枚

通草 冬葵子各一錢

右以水三升，煮取一升，入魚齒末，空心服。

張氏方 療產後小便不通，淋澀。

陳皮一兩，去白為末，空心溫酒調下二錢，一服便通。

療卒不得小便方

杏仁十四枚，去皮尖炒為末，和次頓服。

灸臍法 治產後小便不通，腹脹如鼓，悶亂不醒，蓋緣未產之前，內積冷氣，遂致產時，尿胞澀，功不順。

用鹽填臍中，却以葱白和去鹽皮十餘根，作一縛，切一指厚，安臍上用大艾炷，滴葱餅上，以火灸之，覺熱氣入腹內，即時便通神驗。

積冷者用此所謂氣化則能出矣

○小便數

大全云：夫產後小便數者，乃氣虛不能制故也。

○小便數

薛氏曰：前證若因惡露不盡，以致胞損，而小便淋澀者，用八珍湯以補氣血。若因膀胱氣虛，而小便頻數，當補脾肺。若膀胱陰虛，而小便淋澀者，須補脾腎。

濟陰綱目 卷十四 淋濁

一產婦小便頻數，時忽寒戰，乃屬脾肺虛弱，用補中益氣，如山藥為主，佐以桑螵蛸散而愈。後患發熱，晡時盜汗，自汗，月水不調，用加味逍遙散而安。

一產婦患前證，吐痰發熱，日晡作渴，此膀胱陰虛，用補中益氣湯及六味丸而愈。又患痢後，小便頻數，手足俱冷，屬陽氣虛，用煎湯及八味丸而愈。

桑螵蛸散 治產後陽氣虛弱，小便頻數及遺尿。

桑螵蛸一兩 鹿茸一兩 黃耆三錢 牡蠣一兩 人參一兩

一產婦患前證，吐痰發熱，日晡作渴，此膀胱陰虛，用補中益氣湯及六味丸而愈。又患痢後，小便頻數，手足俱冷，屬陽氣虛，用煎湯及八味丸而愈。

桑螵蛸散 治產後陽氣虛弱，小便頻數及遺尿。

桑螵蛸一兩 鹿茸一兩 黃耆三錢 牡蠣一兩 人參一兩

一產婦患前證，吐痰發熱，日晡作渴，此膀胱陰虛，用補中益氣湯及六味丸而愈。又患痢後，小便頻數，手足俱冷，屬陽氣虛，用煎湯及八味丸而愈。

桑螵蛸散 治產後陽氣虛弱，小便頻數及遺尿。

桑螵蛸一兩 鹿茸一兩 黃耆三錢 牡蠣一兩 人參一兩

一產婦患前證，吐痰發熱，日晡作渴，此膀胱陰虛，用補中益氣湯及六味丸而愈。又患痢後，小便頻數，手足俱冷，屬陽氣虛，用煎湯及八味丸而愈。

厚朴 赤石脂

右為末每服二錢空心粥飲調下

外臺方無厚朴石脂有甘草生薑

栝蒌湯 療產後小便數兼渴

栝蒌根 人參各三兩 黃連 桑螵蛸 甘草炙 生薑各二兩

右細切用水七升煮二升半分三服忌豬肉冷水

補遺方 療產後小便數及遺尿

益智仁為末米飲調服

○小便不禁

陳氏曰婦人產後產理不順致傷膀胱遺尿無時

丹溪云嘗見收生者不謹損破產婦尿將致病淋瀝遂成廢疾

日有徐婦年壯難產得此因思肌肉破傷在外者宜可補完胞雖

在腹恐亦可治遂診其脈虛甚予曰難產之由多是氣虛產後血

氣尤虛試與峻補因以參耆為君芎歸為臣桃仁陳皮黃耆茯苓

為佐煎以猪羊胞中湯極饑時飲之但劑小率用一兩至一月而

安益令氣血驟長其胞自完恐稍緩亦難成功矣

薛氏曰前證若脾肺陽虛用補中益氣湯加益智若肝腎陰虛用

六味地黃丸若肝腎之氣虛寒用八味地黃丸

一產婦小便不禁二年不愈面色或青赤或黃白此肝脾氣虛血

熱用加味逍遙散為主漸愈佐以六味地黃丸而痊後因怒小便

自適大便不實左目頻緊面色頻赤仍用前散佐以六君子湯以

此治虛熱

此命門藥也專主補小便虛寒者宜之

妙在有破血之藥

清肝火生肝血培脾土而痊

千金方 治產後小便不禁 白薇 芍藥各等分

右為末溫酒調下方寸七日三服

又方 治產後小便不禁 桑螵蛸生兩 龍骨一兩

右為末每服二錢粥飯調下

雞內金散 治產後溺淋失禁

用雄雞膽一具並腸洗燒為末溫酒調服方寸七

黃濟方 療產後小便不禁

用雞尾毛燒灰存性酒調下一錢七日三服

黃耆當歸湯 婦人產後尿不禁面微浮略發熱於午後此膀胱

為坐婆所傷

黃耆 歸身尾 芍藥各一兩 白朮一兩 人參

陳皮各五錢 甘草炙少許

右水煎熱服之

固脾散 治婦人臨產時傷手脾破小便不禁

黃絲絹自然黃者藥貴者不用取三尺以黃

蜜酒一白茅根 馬尾勃二錢 黃蠟半兩

右用水二升再煎至二盞空心頓服服時飲氣服之不得作聲

如作聲無効

補脾飲 治產後傷動脾破終日不小便但淋瀝不乾

生熟絹黃色者 白牡丹根皮 白芨各二錢

右用水一碗煎至絹爛如錫服之勿作聲作聲無効

丹皮破血白

黃濟方

以下七方悉有至理效之本草乃良方不能盡錄其有係心會意者當自得之

婦人血

諸病者細面唇黃脈微上肌羸瘦血止血馬功藥厚濁之類

○小便出血

大全云產後小便出血者因氣血虛而熱乘之血得熱則流散於胞內故血隨小便出

以歸脾而愈  
血不攝血  
血不攝血  
血不攝血

薛氏曰一產婦尿血面黃腸脹少食此肝木乘脾土也用加味道遙補中益氣兼服而愈後為懷抱不樂食少體倦驚悸無寐血仍作用加味歸脾湯二十餘劑將愈或於衆論服犀角地黃湯諸證復作仍服前湯而愈

血餘散 治產後小便出血

亂髮不拘多少湯洗淨燒灰研為末米飲調服方寸匕

滑石散 治產後小便出血

滑石 研 髮灰 分等

右為末每服一錢生地黃汁調下

天德堂

崔氏方 療產後血滲入大小腸

合一大 車前草 一升

右相和煎沸分兩服

補遺方 治產後小便出血

川牛膝去蘆水煎服

又方

生地黃汁 升 生薑自然汁 合

右相和服之

○大便出血

薛氏曰產後便血或飲食起居或六淫七情以致元氣虧損陽絡

外傷治法若因膏粱積熱用加味清胃散若因醇酒積熱用花柳

醒湯若因怒動肝火如味小柴胡湯若因鬱結傷脾如味歸脾湯

若因思慮傷心妙香散若因大腸風熱四物加側柏槐花若因大

腸血熱四物加蒼連槐花若因腸胃虛弱六君加升麻柴胡若因

腸胃虛寒六君加肉蔻木香若因元氣下陷補中益氣如茯苓半

夏若因胃氣虛弱用六君升麻若因血虛用四君升麻若因氣血

俱虛用八珍柴胡升麻大凡元氣虛弱而發熱者皆內真寒而外

假熱也但用六君子或補中益氣如炮姜溫補脾氣諸證悉退若

四肢畏冷屬陽氣虛寒急加附子病因多端當臨症制宜庶無誤

矣 一產婦產後下血諸藥不愈飲食少思肢體倦怠此中氣虛弱用

補中益氣加吳茱萸炒黃連五分四劑頓止用歸脾湯治之而愈

一婦人怒則便血寒熱口苦或胸脇脹痛或小腹痛悶此肝木乘

脾土用六君子加山梔柴胡而愈又用補中益氣加味逍遙二藥

而不復作 一婦人久下血在產前屬脾胃虛寒用補中益氣湯加連炒吳茱

加味清胃散 治因膏聚積熱便血

當歸身酒浸一錢 黃連 生地黃酒浸 升麻各錢

牡丹皮半錢 石膏三錢

右剉水煎服。一方無石膏有犀角連翹甘草。的奇散。治產後惡露不行餘血滲入大腸洞瀉不禁下青黑物亦驗。

用荊芥大者四五穗於盞內。然火燒成灰。不得犯油火。入藥香少許研勻。沸湯一兩呷調下。此藥雖微能愈大病幸勿忽之。

產後陰下有物脫出。產腸不收。

三因方云。婦人產後勞力努極。致陰下脫。若脫肝狀及陰下延。

濟陰綱目 卷十四 大便出血

主 天德堂

遍迫腫痛或舉動房勞。皆能發作。清水續續。小便淋瀝。

丹溪云。一婦人三十餘歲。生女二日後。產戶下一物如手帕。下有

帕尖。約重一觔。予思之。此因胎前勞乏傷氣。或肝後所致。邪毒血

不甚虛耳。其時得天寒。恐冷乾壞了。急與炙黃耆半錢。人參一錢。

白朮五分。當歸一錢半。升麻五分。三帖連服之。即收上。得汗通身

乃安。但下齋沾腐處。乾者落一片。約五六兩重。益脂膜也。食進得

眠。診其脈皆瀟。至暑弦。視其形却實。與白朮芍藥各半錢。陳皮一

錢。生薑一片。煎二三帖以養之。

一婦人產子後。陰戶中下一物。如合鉢狀。有二岐。其夫來求治。予

思之。此子宮也。必氣血弱而下墜。遂用升麻當歸黃耆大料。一帖

與之。半日後。其夫復來曰。服二次後。覺響一聲。視之已收。陰戶訖

但因經宿乾着席上破一片。如掌心大。在席某處。在案某處。破不可復生。予思之。此非腸胃乃胎前也。肌肉破尚可復完。血充盛。必可生滿。遂用四物湯。加入人參與一百帖。三年後復有子。治子宮下。用黃耆一錢半。人參一錢。當歸七分。升麻三分。甘草二分。作一帖。水一鍾。煎至五分。去滓。食前服。却用五倍子末。泡湯洗。又用末傳之。如此數次。宜多服藥。永不下。

一婦產後。水道中出肉線一條。長三四尺。動之則痛。飲絕先服失笑散。數次。以帶皮姜二觔。研爛入清油二觔。煎油乾。為度。用絹兜起。肉線。出於水道。以前薑煎之。冷則製之。六日夜。縮其大半。二六日。即盡入。再服失笑散。芍歸湯。調理之。如肉線斷。則不可治矣。

陰陰綱目 卷十四 大便出血 主 天德堂

當歸黃耆散 治產後陰脫。謂陰戶脫下也。

當歸 白芍 黃耆 人參各二錢 升麻五錢

一方有甘草無芍藥

右剉作一劑。水煎。食前溫服。外用五倍子。泡湯洗。又用末傳之。

加味八珍湯 治產後生腸不收

八珍湯錢 黃耆錢 防風 升麻各五錢

右剉一服。水煎。服外。以荊芥黃耆。搗皮煎湯。薰洗。

加味四物湯 治因產用力過多。陰門突出

四物湯錢 龍骨另研少許 龍服人

右剉水煎服。陰痛者。加藥本。防風。去龍骨。

當歸散 治陰脫。又名爛疳

<p>當歸 黃芩 各二兩 白芍 一兩 明皮 燒存性 半兩 牡蠣 煅 二兩</p>	<p>右為末每服二錢溫酒米湯任意調下忌登高舉重</p>	<p>硫黃散 治產後努力太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出通</p>	<p>山腫痛舉動房勞皆能發作清水續續小便淋瀝</p>	<p>硫黃 烏賊魚骨 各半 五味子 二錢</p>	<p>右為末搽患處日三易</p>	<p>烏椒湯 治陰下挺出</p>	<p>蜀椒 一方不 用此味 烏頭 白芨 各半</p>	<p>右為末以方寸七綿裹納陰中入三寸腹中熱易之一日一度</p>	<p>明且乃復着七日愈</p>	<p>寸金散 治婦人子腸下不收</p>	<p>濟陰綱目 卷十四 大便出血</p>
<p>蛇林子 韶腦 葫蘆巴 紫稍花 各等</p>	<p>右為末每服五七錢煎水半碗淋洗之三二遍為効</p>	<p>復元湯 治產後子宮不收</p>	<p>荊芥穗 藿香葉 臭椿皮 各等</p>	<p>石咬咀煎湯薰洗子宮即入</p>	<p>一方 有臨產子腸先出產後腸不收名曰盤腸瘰癧花瘰</p>	<p>治法命產母仰臥却用好米醋半盞和新汲水七合攪勻忽</p>	<p>與產母面或背每一嚥令一縮三嚥三縮腸則盡收此良法也</p>	<p>一方 產腸出俗用冷水洗母面其腸自收此法虛弱之人切不可用恐驚怯成病或即脫絕以此方治之</p>			

<p>用草麻子四十粒一方云去殼研爛蜜酒煮之</p>	<p>如收子即以水洗去項上草麻</p>	<p>又方 治腸出久而不收為風吹乾不能收者</p>	<p>以磨刀水少許火上溫過以潤盤腸仍煎好磁石湯一杯</p>	<p>產母飲之自收</p>	<p>丹溪方 產後腸不收</p>	<p>用香油五筋煎熱盛盆候溫坐油盆中約一頓食時以皂角</p>	<p>末吹入鼻中噤作立上妙</p>	<p>雜方 治盤腸產</p>	<p>半夏為末搗鼻中腸自上</p>	<p>一方全蝎不拘多少為末口噙水鼻內搯之立効</p>	<p>濟陰綱目 卷十四 大便出血</p>
<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>



<p>一法婦人陰挺出四肢淫瀝身少海主之<small>一作</small></p> <p>一法婦人胞胎門落頻不收常濕後神開玉泉<small>身交</small></p>	<p>又法三泉房開三寸<small>多隨年</small></p> <p>女人陰門令腫笑服來<small>三十</small></p>	<p>○產門不開肺痛</p> <p>薛氏曰玉門不開氣血虛弱也用十全大補湯腫脹痛肝經虛熱也加味逍遙散若因憂怒肝脾氣血傷也加味歸脾湯若因暴怒肝火血傷也龍膽瀉肝湯</p>	<p>一產婦玉門不開發熱惡寒用十全大補加五味子數劑而乘熱退用補中益氣加五味子數劑而玉門閉</p> <p>清陰綱目 卷十 附 大便閉血</p>	<p>一婦人脾胃素弱兼有肝火產後玉門腫痛寒熱作渴嘔吐不食外敷大黃等藥內用驅利之劑腫及於臂諸證蜂起此真氣虛而邪氣盛也先用六君子以固腸胃次用補中益氣以升陽氣不致劑而全愈</p>	<p>一產婦患此失治腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒暮熱自汗盜汗半年矣用補中益氣湯加茯苓半夏膿水漸少飲食漸進又用歸脾湯共五十餘劑而愈</p>	<p>一產婦玉門不開小便淋瀝腹內一塊攻走腸下或脹或痛用加味逍遙散加車前子而愈</p> <p>一婦人子宮腫大二日方入損落一片殊類猪肝面黃體倦飲食無味內熱補熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸證悉愈</p>
---	---	--	--	--	--	---

<p>復生行</p> <p>十全大補湯 治產後血氣大虛陰門不開發熱惡寒</p> <p>本方加五味子水煎服</p>	<p>硫黃湯 治產後玉門開而不閉</p> <p>硫黃四兩 吳茱萸 兔絲子 各二兩 蛇床子</p> <p>右剉碎服四錢水一碗煎湯類洗之白効</p>	<p>飲陰法 治新產後陰腫下脫及產門不合</p> <p>新石灰半升先放在腳盆內後以沸湯衝入乘熱於上薰之候溫用手搦清者沃淋之未効日再用</p>	<p>當歸湯 治產後腹中風冷腫痛</p> <p>當歸 獨活 白芷 地榆 各三兩 敗醬 半斤 金雞</p>	<p>清陰綱目 卷十 附 大便閉血</p> <p>一婦人各三</p> <p>右剉碎以水一斗半煮取五升適冷暖洗陰日三</p>	<p>一方 治婦人子宮大痛不可忍並產後生腸不收</p> <p>五倍子 白礬 各等分</p> <p>右為末溫酒泡洗乾粉亦可</p>	<p>桃仁膏 治產後陰腫妨悶</p> <p>桃仁去皮 五倍子 枯礬 各等分</p> <p>右為末研桃仁膏拌勻傳</p> <p>一方單用桃仁去皮尖研細四五次抹之</p> <p>萬應丸 治產後小戶痛不可忍</p> <p>知母 去皮炒為末煉蜜丸如彈子大每服一丸清酒一盞</p>
--	--	--	--	---	--	---



為主而此以  
王瓜根桂心  
通血脈有令  
熱不同金銀  
氣血之劑而  
甘草一味又  
起於法外矣

土瓜根 漏蘆各三 通草兩 甘草二  
右剉碎以水八升煎取二升分溫三服一方加桂心並為末  
酒服方寸七

胡桃散 治婦人少乳及乳汁不行  
核桃仁去皮十 穿山甲 一錢  
右搗和一處黃酒調服

皂角散 治乳汁不通及乳結硬疼痛

皂角粉 蛤粉

石為末每服二錢熱酒調服○歌曰婦人吹乳意如何皂角燒  
灰蛤粉和熱酒一杯調八字須臾核散笑呵呵

張氏方 滋益氣脈藥酒行津液

藥酒 藥酒行津液

葵子炒 縮砂各等

右為細末每服二錢熱酒調下

雜方 下乳汁

栝蒌子洗淨炒令香熟瓦上揀令白色為末酒調下一錢合  
面臥少時再服

一方瓜蔓一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫飲一升日三

一方土瓜根為末酒調下一錢日三服

一方三稜三箇水二碗煮散一碗洗之取汁下為度妙

一方穿山甲洗淨一兩灰炒燥為細末酒調服方寸七治產乳無  
汁亦治乳結癰腫

○已上治乳滯不行之劑

加味四物湯 治氣血虛乳汁不通

當歸 川芎 白芍藥 生地黃 木通

王不留行 天花粉各等

右剉一劑同獐蹄肉四兩煎湯二鍾入藥同服先將葱湯  
頻洗乳房

玉露散 治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便滯

此藥涼膈壓熱下乳

人參 白茯苓 當歸各五 芍藥七 川芎

桔梗炒 白芷各一甘草五分

右咬咀水煎食後服○如熱甚大便秘加大黃炒三分

當歸補血加葱白湯 治產後無乳

當歸二 黃芩一 葱白根十

右剉水煎服

通脈散 治女人乳少

當歸 天花粉 木通 牡蠣 穿山甲

右為細末用猪蹄湯入酒少許調服

通乳湯 治乳後氣血不足經血衰弱乳汁減少

猪蹄下節 通草二 川芎一 穿山甲十四片 甘草一

右用水五升煮汁飲之忌生冷避風寒夜臥不宜失寐更以葱  
湯頻洗乳房

一方治乳汁不通

當歸 穿山甲 五錢 天花粉 王不留行

甘草各三錢

右爲細末每服三錢猪蹄湯或熱酒調下其乳即通

猪蹄湯 治婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁

猪蹄一隻 通草四兩

右將猪蹄淨洗依食治法次用水一斗同通草浸煮得四五升

取汁飲之未作二料

立効散 下乳汁

粳米 糯米各半 高菰子一合煎 生甘草兩

右研細用水二升煎取一升去淨分三服立下

又方 治乳汁少

瓜蒌根 薄荷幹身各等

羊肉補形湯 引經通滯

右爲麤末先啖羊蹄汁一碗次服藥後再啖葱絲羊羹湯少許

立効

鍾乳散 治乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕少成鍊鍾乳粉研

細濃煎漏蘆湯調下二錢

雜方 有人乳汁不行已十七日請藥無効遇有人送赤豆一斗

送時常煮粥食之當夜乳脉通行

一麥門冬不拘多少去心焙爛末以酒磨犀角約一錢許煖調

二錢服之不過兩服乳汁便下

○已上治乳少不行之劑

○乳汁自出

大全云產後乳汁自出者乃是胃氣虛所致宜服補藥以止之若

以論虛實

乳多溢滿急痛者溫昂熨之產寶有是論却無方以治之

有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未嘗論及

薛氏曰前證氣血俱虛用十全大補湯肝經血熱用加味逍遙散

肝經怒火用四物柴梔梔連肝脾鬱怒用加味歸脾湯

一產婦勞役忽乳汁如湧昏眩吐痰此氣虛而嗽也當以湯參

湯而避更以十全大補湯數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹

或無兒飲脹痛增寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗

散血氣如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之

漏蘆散 方見前

免懷湯 欲摘乳者用此方通其月經則乳汁不行

當歸尾 赤芍藥 紅花酒 牛膝酒浸各五錢

右剉水煎服

一方 治婦人血氣方盛乳房作脹或無兒食乳要消者服此立

消

麥芽二兩炒熟水煎服○一方炒爲末煎四物湯調服即止

○吹乳癰腫

大全云產後吹乳者因兒喫乳之次忽自睡着爲兒口氣所吹令

乳汁不通蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道傷結疼痛亦有不疼不

痛腫硬如石者總名曰吹乳若不急治腫甚成癰潰有至死者連

服皂角散括膿散傳以天南星散更以手揉之則散

薛氏曰前證用藥切不可損其氣血

立方有法用  
聚有決不可  
不達

丹溪云乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養或爲  
忿怒所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故痰不通而  
汗不得出陽明之熱沸騰故熱甚而化濃亦有所乳之子胸有滯  
痰口氣熾熱含乳而腫熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛  
揉令稍軟吮令汁透自可消散矣此不治必成癰疽治法疎厥陰  
之滯以青皮清陽明之熱以細研石膏行汚濁之血以生甘草節  
消腫導毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或  
湯或散如減隨意消息然須少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫  
處其功尤捷彼柯工喜於自衛便棄用鍼刀引惹拙病良可哀憫  
李氏曰婦人之乳男子之腎皆性命根也

初起煩渴嘔吐者應胃熱也甚則毒氣上衝咽膈妨礙寒熱者  
清陰綱目

卷十

天德堂

肝邪也此皆表證宜不換金正氣散如天花粉能止渴嘔定寒熱  
咽隔有碍者甘桔湯加生薑或護心散如演後見此四證爲虛  
飲食厚味忿怒憂鬱以致胃火上蒸乳房乳汁化爲濁濃肝經氣  
滯乳頭竅塞不通致令結核不散痛不可忍初起便宜隔蒜灸法  
切忌鍼刀能飲者一醉膏加葛歸各一分一服兩服即効不能飲  
者瓜蒌散  
結核亦有因氣血虛弱被外感內傷以致痰瘀凝滯而成核者俱  
以正貝散爲主血虛合開物湯更加參朮柴胡升麻氣虛合四君  
子湯更加芍藥歸朮升麻思傷脾者歸脾湯加瓜蒌根貝母白  
芷連翹甘草節水酒各半煎服  
有肝火結核應痛甚者清肝解鬱湯

吹乳因乳子膈上有痰口氣熾熱含乳而腫熱氣吹入乳房凝滯  
不散作痛初起須忍痛揉令稍軟吸令汁透自可消散不散宜益  
元散冷湯或井水調一日一夜服三五次自解重者解毒湯  
煎服之挾氣者正貝散單青皮湯外用漏蘆爲末水調敷之又有  
乳汁不行奶乳脹痛者湧泉散

核久內服作痛外腫堅硬手足不近謂之乳癰此乃乳毒內聚  
散內托升麻湯或復元通氣散如漏蘆虛者托裏消毒散將酒  
乳間出黑頭瘡頂下作黑眼者內托升麻湯已潰寒熱者內托十  
宣散少食口乾者補中益氣湯痛熱內熱者八物湯加五味子  
虛嘔者六君子湯加香附砂仁胃寒嘔吐或瀉者六君子湯加乾  
薑藿香遇勞腫痛者八物湯倍參蒼歸木遇怒腫痛者八物湯加  
清陰綱目

卷十

天德堂

山梔  
王揭菴曰隆慶庚午予自秋間歸則亡妹已病蓋自七月乳時  
不散八月用火鍼取膿醫以十全大補湯與之外敷鐵符散不効  
反加喘悶九月產一女潰勢益大而乳房爛盡迺及胸腋濃小稠  
粘出膿幾六七升略無飲勢十一月始歸就醫改用解毒和平中  
劑外搽生肌散龍骨寒水石等劑膿出不止流膿所及即腫泡潰  
膿兩傍紫黑瘡口十數胸前腋下皆腫潰不可動側其勢可畏余  
謂產後毒氣乘虛而熾宜多服黃蘗解毒補血益氣生肌而醫不  
敢用十二月月中旬後益甚瘡口愈餘諸藥及試不効始改用尋藥  
時腰微粘滯黃檗葉煎湯沃之頓爽乃治一方名黃蘗托裏湯  
黃蘗之甘溫以排膿益氣生肌爲君甘草補胃氣解毒爲歸身印

血生血爲臣升麻爲根。爲足陽明本經藥。及連翹防風皆散結疎經。瓜蒌仁單結子解去腫。皂角刺引至消處。白芷入陽明。批腰長肌。又用川芎三分及白桂枝藥爲引。用每劑入酒一盞煎。送白芷霜九頭腹解毒。時藥水補粘方盛未已。不可遽用收澀。藥理宜追之。以聖膏鏡子外按。明自膿水頻稀。痛定膿解。始有向安之勢。至辛未新正。患處皆生新肉。有紫腫處。俱用忍與法。隨手消散。但近腋足少陽分。尚未飲。乃加柴胡一錢。青皮三分及信川。膏膿水將淨者。即用搜風散。搜之。元膏後遂全安。

康熙爲廣德幸。事張王甚謹。後授溫條。左乳生癰。繼又胸膈間結。核大如拳。堅如石。在再半載。齒療莫効。已而牽掣臂腋。微於肩。痛延特甚。急禱王廟下。夢聞語曰。若要安。但用生薑自然汁製香附。服之。覺呼其子。檢本草視之。二物治證相符。訪醫者亦云有理。遂用香附子去毛。薑汁浸一宿爲末。二錢米飲調方數服。膿膿流出。腫硬漸消。自是獲愈。

一婦人稟質性燥。懷妊三載。在乳內結一核。按之微痛。以連翹飲子二十餘劑。少遲。更以八珍加青皮香附。梧梗貝母二十餘劑而消。

消毒飲 治吹乳吹癰并便毒。如增寒壯熱。或頭痛者。先服人參敗毒散一二劑。方可服此藥。如無前證。即服此二三劑。或腫不消。宜服托裏藥。

當歸 白芷 青皮 法 貝母 柴胡  
天花粉 殭蠶 金銀花 各三

總解毒藥。加大黃以治便毒者。亦有脈腐汚濁之血也。此專行厥陰氣血凝滯之藥。

連翹飲子 治乳癰

連翹 瓜蒌仁 川芎 皂莢刺 橘葉  
青皮 甘草節 桃仁 各二

右作一服。水煎食遠服。如已破者。加參黃當歸未破者。加柴胡升麻。

一方 治血脈凝注不散。結成吹乳。乳癰。痛腫不可忍者。

天花粉 金銀花 皂角刺 穿山甲 當歸尾  
白芷 稍 瓜蒌仁 貝母 甘草節  
右到酒煎服。

方 治婦人乳中結核。

升麻 連翹 青皮 甘草節 瓜蒌仁  
右作一服。水煎食後細細咽之。

內托升麻湯 治婦人兩乳間出黑頭。瘡頂陷下。作黑眼。並乳癰初起亦治。

升麻 當歸身 葛根 連翹 黃藥  
黃藥 牛旁子 甘草 各肉桂 分五  
右作一服。水一鍾。酒半鍾。煎食後服。

清肝解鬱湯 治肝經血虛風熱。或肝經鬱火傷血。乳內結核。或爲腫潰不愈。凡肝經經血氣不和之證。宜用此藥。

人參 茯苓 熟地黃 芍藥 貝母 心  
山梔 各 白木 當歸 各一錢 柴胡

<p>傷火也八 同白木非氣 者不宜 此方在破</p>	<p>世丹皮 川芎 陳皮 各八分 甘草 五 右水煎服 一方 乳藥破則少有生者必大補或庶幾耳 人參 黃耆 白朮 當歸 川芎 連翹 白芍 甘草節 右到水煎服○一水青皮瓜其無白朮○乳岩小破加柴胡 一方 治乳硬痛 當歸 甘草 各三錢 沒藥 一錢 右作一服水煎入酒少許飲 金銀花散 治乳腫不行結成癰腫疼痛不可忍者 金銀花 當歸 黃耆 甘草 各二錢 丹溪方 治乳腫痛 青皮 石膏 連翹 皂角刺 炒 黃藥子 當歸 木通 各一錢 生甘草 三分 右作一帖水煎入好酒些少同煎服 一方 治乳癰癰勢欲腫 石膏 煨 樺皮 煨 瓜蒌 青皮 甘草節 右到水煎服 一方 治乳有核 南星 貝母 甘草節 瓜蒌 各一錢 連翹 兩 右以水煎入酒服</p>
--	---

<p>通氣散 復元通氣散</p>	<p>治婦人乳癰及一切腫毒 木香 茴香 青皮 穿山甲 酥 陳皮 白芷 甘草 漏蘆 貝母 各等分 右為細末每服三錢好酒調下 治乳癰方 青皮 瓜蒌 樺皮 連翹 桃仁 各一錢 皂角刺 甘草節 右水煎服○如破後加參耆 神效瓜蒌散 治婦人乳癰乳岩神效 黃瓜 煨 煨 當歸 生甘草 各五錢 乳香 沒藥 各三錢 右作一劑用酒三碗於磁石器中慢火熬至碗半分為 食後服如有乳岩使服此藥可杜絕病根如毒氣已及 為黃水毒未成則內消疾甚者再合一服以愈為度 與此間服神効但於瓜蒌散方減去當歸加紫色皂角刺一兩 六錢是也 究源五物湯 治癰疽發背乳癰通用 括實 皂角刺 煨 沒藥 乳香 甘草 各一錢 右到用酒三升煎取二升時時飲之痛不可忍立止 括實散 治吹乳 乳香 括實 各一錢 右到用酒煎服或為末酒服二錢外用南星生薑湯洗</p>
----------------------	--

摘香散 治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍也

夜神藥因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之

陳皮去白乾麝香 麝香一分

右研勻酒調下二錢被蓋汗出即愈

補遺方 治吹乳結實腫痛

陳皮二錢 甘草一錢

右剉水煎分兩次服用荊芥羌活獨活煎湯熏洗即愈

一方 治乳癰

夜明砂 瓜蒌炒 阿魏

右爲末飯丸酒吞下

通和湯 治婦人乳癰疼痛不可忍者

穿山甲炮 木通各 自然銅半兩 天德堂

此方無分面  
大陰以夜  
砂爲君以  
結血也瓜  
爲臣以消  
痰也阿魏  
佐散聖藥

右爲末每服二錢熱酒調下食遠服

二灰散 治產後乳汁不泄結滯不消熱毒

蔓荊子燒 皂角刺燒各

右爲末每服二錢溫酒調下無時

夜陰散 治吹乳乳癰

蜘蛛三枚 紅棗三枚

右每棗一枚入蜘蛛一箇夾於內炒熟口嚼喫用燒酒送下未

成者立消已成者立潰

獨勝散 治婦人吹乳初覺身熱頭疼寒熱及胸乳腫硬是其候

也服之能令下乳汁通血脈立能自消

白丁香真者

右爲末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服

一方 治婦人吹乳硬腫身發熱增寒疼痛難忍不進飲食者服之良驗

鹿角一兩 放火煨存性研細分作二服先將末藥五錢入鍋

次下無灰酒一碗滾數沸倒碗內乘熱盡飲臥服汗出即

安

一方用鹿角剉爲細末酒調二三錢服亦効

一方用鹿角於礪石上磨取白汁塗之乾又塗

勝金丹 治吹乳結核不散腫痛者神効亦治乳岩

百齒霜煎乾

右用無根水先如雞頭子大以黃丹爲衣每服一丸或二丸好

酒下如不飲酒白湯下不可化開亦不可令病人知極有効驗

一方 治乳癰及無名腫毒初起

用五葉藤一名五龍爪不拘多少生薑一塊好酒一碗搗爛

去渣熱服汗出爲度仍以渣敷

敷乳方

天南星 皂角刺燒 半夏生各 白芷 草烏

直鹽一分

右爲細末多用葱白研取汁入蜜調敷若破口用膏藥貼

葱熨法 治吹乳乳癰登時立消

用連根葱一大把搗爛成餅一拃厚攤乳上用瓦罐盛灰火

此藥行厥陰

此方無分面

砂爲君以

結血也瓜

爲臣以消



覆忍上須更汗出即愈

一方 治吹奶

金銀花 天蕎麥 紫葛藤各等分

右以醋煎洗患處立消如無蕎麥葛藤二味只金銀花亦可

一方 治乳癰

大黃 鼠糞新者各一分黃連二分

右三味搗爲末以黍米粥清和傳乳四邊痛止即愈無黍米粟米粳米亦得

柳根製法

治乳癰二三百日衆療不瘥但堅紫色青

用柳根削取上皮搗令熟熬令溫盛若練囊中熨乳上乾則易之一宿即愈

齊陰綱目

卷廿四 吹乳癰腫

雜方 治吹乳癰

用新栢葉一握洗淨以朴硝一勺同入臼內杵之旋加清水

紐取自然汁半碗先以病人飲三兩口仍用鷄翎蘸汁掃於患處中間留一眼四邊頻頻掃之其腫自消

一方用生地黃搗汁塗之一日三五次立効

一方用生山藥搗爛敷上即消消即去之遲則肉腐

一方採嫩桑葉研細米飲調攤紙花貼患處

一方用蒲公英搗爛會患處神妙

一方用天南星爲末以溫酒調塗

一方以益母草爲末調塗或生搗爛用之

一方治吹乳用桑樹蛙屑飯搗成膏貼之

一方用遠志酒煎服浮傳患處

一方用野椒桑和藥一同搗膏敷患處

一方用厚朴子加附子酒吞下

一方治乳癰用牙痛藥有性研爲細末以醋調塗貼乳上

右韃底石乳患處貼於左韃底神効忌金石採熨

一方治乳癰初發用貝母爲末每服二錢溫酒調下即以兩手覆按於乳上垂乳良久自通

一方用真麻皮爲末酒服方寸七睡醒已失

一方用蒲公英忍冬藤酒煎服即欲睡是其効也

一方單用蒲公英煮汁飲及封之立消

齊陰綱目

卷十四 吹乳癰腫

雜方 治吹乳用猪牙皂角去皮弦蜜炙爲末酒調服之

一方用大車頭燈油垢丸如桐子大每服五十九溫酒下

一方螞蟥去足用盞燒存性爲末每服二錢黃酒下

一方用黍子一合黃酒下即散

一方治吹乳未成膿者用鼠糞二十一粒研爲細末冷水調服効

○妬乳

夫妬乳者由新產後兒未能飲致乳不洩或乳脹捏其汁不盡皆

令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大渴引飲半強掣痛手不得近

是也初覺便知以手捏去汁更令傍人助吮引之不爾或作瘡有

膿其勢盛必成癰也輕則爲吹乳妬乳重則爲癰雖有專門不

可不知

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡瘡之黃汁出者新起

如乳

百療不差動經年月名爲妬乳宜以赤龍皮湯天麻湯洗之  
物湯飛鳥膏及飛鳥散始作者可傳以黃芩漏蘆散黃連胡

有餘有馬之

連翹散 治產後妬乳并癰實者下之

連翹 升麻 玄參 芍藥 白欬 防風 射干

杏仁 芒硝 大黃 甘草 各一

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

瓜蒌散 治乳初結脹不消令敗乳自退

瓜蒌 生半個半 粉草 生半塊半

右到用酒二碗煎服少頃痛不可忍即搜去敗乳臨臥再一服

順所患處乳側臥於床上令其藥行故也無生薑用麥芽

濟陰綱目 卷十四 妬乳

一方 治乳妬

黃芩 白欬 芍藥

右爲末以漿水飲服半錢七日三若至乳汁結者即持去左乳

汁若右乳汁結者可將去右乳汁

赤龍皮湯 治妬乳

謝皮三升水一斗煮五升夏冷洗秋冬溫之分以洗乳

天麻湯 治妬乳亦洗浸濕黃爛熱瘡痒疽漏陰使小兒頭瘡

天麻草五升以水一斗半煎取一斗隨寒溫分洗乳以殺痒

也洗畢傳膏散

飛鳥散 治乳頭生瘡及諸熱浸淫丈夫陰腫痒濕小兒頭瘡疳

蝕等瘡並以此傳之

維粉 燒砂作水銀上黑 枯礬 三兩

右二味篩爲細末以油煎和之令如脂以博乳者日三有汁可

乾疹

黃連用分背 治乳瘡並諸濕痒黃爛肥瘡

黃連 二兩 胡粉 二兩 水銀 一兩 同研

右三味相和皮異然按之自和合也雖不成一家且得水銀細

散入粉中以傳乳瘡

一方 治妬乳生瘡

蜂房 猪甲中土 車轍中土 各等

右二味爲末苦酒和傳之

鹿角散 治婦人乳頭生瘡汁出疼痛欲灰不可忍

濟陰綱目 卷十四 妬乳

鹿角 三分 甘草 一分

右二味爲末和以鷄子黃於銅器中置溫處炙上傳之日再即

愈神驗不傳

雜方 治妬乳乳癰

燒白蛇爲灰和以猪膏塗之太良

一方 葵莖及子搗篩爲末酒服方寸七即愈

一方 鷄屎乾爲末酒服方寸七須與三服愈

一方 馬溺之立愈

一方 取楊米搥二枚炙令熱以絮及故帛榆乳上以搥更互熨之

瘡止已用立効

一方 皂角十條以酒一升揉取汁硝石半兩煎成膏傳之

一方蔓荊子搗爛酒服仍以洋敷患處

一方用赤小豆酒研爛溫服洋封患處

一方仙人草草一握小酒糟一塊生薑一大塊同研爛入桂末少許炒酒服洋毒患處

一方治乳頭裂破

用丁香為末傳之○一方用秋茄子裂開者陰乾燒存性水調塗之

補遺方 治婦人乳頭小淺瘡爛痒

用芙蓉花或葉乾為末搽之

○乳巖

○丹溪云婦人不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累肝氣消沮肝氣積逆遂成隱核如盤棋子不痛不痒十數年後方為

卷十四 乳巖

天德堂

陷名曰乳巖以其痛形嵌凹似巖穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理

佐婦年十八歲時曾得此證審其形脉稍實但性急躁使自街所難者從姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑

兩月而安

此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與帶乳相搏而成又有滯乳

因見口氣吹噓而成又有拘急氣凝滯而生者服石膏燒燉皮瓜

一婦年六十厚味熱氣而形實多妬夏無汗而性急忽左乳結一

清黃

小核大如棋子不痛自覺神思不佳不知食味幾半月以人參調青皮甘草末入生薑汁細細呷一日夜五六次至五七日消矣此乃妬岩之始不早治隱至五年十年已後發不痛不痒必如乳下潰一瘻如巖穴出膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得於夫者有之婦人以夫為天失於所天乃能生此此謂之巖者以其如穴之嵌岬空洞而外無所見故名曰巖患此者必經久淹延惟此婦治之早正消患於未形餘者皆死凡十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安

○錢氏曰婦人乳岩始有核腫如盤棋子大不痛不痒五七年方成瘡初便宜多服疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之凹或如人口有唇赤汁膿水浸淫胸腹氣攻疼痛

卷十四 乳巖

天德堂

用五灰膏去蠹肉生新肉漸漸收斂此疾多生於憂鬱憤念中半婦人未破者尚可治成瘡者終不可治宜服十六味流氣散

○薛氏曰乳岩乃七情所傷肝經血氣枯槁之證大抵鬱悶則肝氣阻肝氣逆遂成隱核不痛不痒人多忽之最難治療若一有此

宜戒七情遠厚味解鬱結更以養血氣之藥治之庶可保全否則不治惟一婦服益氣養榮湯百餘劑血氣漸復更以木香餅炙之

喜其謹疾年餘而消餘不信乃服剋伐行氣之劑如流氣飲敗重散反大如覆碗自出清膿不飲而殺

○李氏曰有鬱怒傷肝脾結核如盤棋子大不痛不痒五七年後

外腫紫黑內漸潰爛名曰乳巖滴盡氣血方外患用十六味流氣飲及單青皮湯兼服虛者只用清脾解鬱湯或十全大補湯更加

清心靜養。厥可。延。月。經。年。以。後。必。於。乳。下。潰。一。穴。出。膿。及。出。年。無。夫。婦。人。來。允。速。惟。初。起。不。分。通。何。經。絡。急。用。葱。白。寸。許。生。半。夏。一。枚。隔。爛。爲。丸。如。茨。實。大。以。綿。塞。之。如。患。左。塞。右。鼻。患。右。塞。左。鼻。二。宿。而。消。

青皮散 治乳巖初起如驚棋子不痛不痒須趁早服之免致年久潰爛。

青皮 甘草

右爲末用人參煎湯入生薑汁調細細呷之一日夜五六次至消乃已。○年少婦人只用白湯調下。

十六味流氣飲 治乳岩

當歸 川芎 白芍藥 黃芩 人參 官桂

濟陰綱目 卷十四 乳巖 天德堂

厚朴 桔梗 枳殼 烏藥 木通 檳榔

白芷 防風 紫蘇 甘草

右剉一劑水煎食遠臨臥頻服外用五灰膏去其毒肉生新肉

漸漸收斂 五灰膏見 ○乳癰如青皮

益氣養榮湯 治抑鬱及勞傷血氣頸項兩狹或四肢腫硬或軟而不赤不痛日哺微熱或潰而不斂並皆治之

人參 白朮 炒各 茯苓 陳皮 貝母 香附子

當歸 酒 川芎 黃耆 炒 熟地黃 酒 芍藥 枳梗

甘草 炒 各 錢

右剉一劑加生薑三片水煎食遠服○胸痞或人參熟地黃各三分○口乾加五味子麥門冬○往來寒熱加軟柴胡地骨皮

○膿清加人參黃耆○膿多加川芎當歸○膿不止加人參黃耆歸○肌肉遲生加白芷官桂

木香餅 治一切氣滯結腫或痛或悶胸及風寒所傷作痛並治

木香 五 生地黃 兩

右木香爲末地黃碎膏和勻量患處大小作餅置腫處以熱熨

火熨之

○乳癰

芎歸湯 治產後瘀血上攻忽兩乳伸長細小如腸直過小腹痛不可忍名曰乳癰危證

川芎 當歸 各一 兩

右用水煎濃湯不時溫服再用二劑逐旋燒烟安在病人面前

濟陰綱目 卷十四 乳巖 天德堂

桌子下令病人曲身低頭將口鼻及兩乳常吸烟氣未盡前再用一料則瘀血消而乳頭自復矣若不復舊用此法貼頂上片時收即洗去

濟陰綱目卷之十四 終

濟陰綱目十四卷

大學士英廉家藏本

國朝武之望撰汪淇箋釋之望字叔卿自署閩中人

淇字澹漪一字右子錢塘人是書所分門目與證

治準繩之女科相同文亦全相因襲非別有所發

明蓋卽王肯堂書加以詳釋圈點以便檢閱耳

# 保生碎事一卷

〔清〕汪淇輯

中國科學院圖書館藏清雍正天德堂刻濟

陰綱目附

附《四庫全書總目·保生碎事

一卷》提要

保生碎事 清陰慈刻外編

西陵 詹淵子汪 撰石于氏論定

姪 汪開楚友熊氏 全叅

汪 錦鎮如氏

詹淵子曰。嘗觀刻女傳曰。古之婦人。妊子。坐立寢食。視聽言動。皆要循術合矩。如太任之性端一。誠莊惟德之行。及娠文王。未嘗不以胎教爲重生。子卒爲周宗。其理可不驗歟。今之孕婦。未諳古法。爲夫者。情以胎教之理論之。俾婦善調。固其本。以達其支。非惟無墮失之患。抑且生子形容端正。才器過人矣。

又曰。人稟陰陽之氣以生。藉父精母血以成其形。人始胎。一月如

露珠。二月似桃花。三月男女分。四月形象具。五月五臟生。六月

保生碎事 保嬰經驗方

一 清陰慈刻外編 天德堂

六。胎成七月。闕緩通八月。遊其魂。九月三轉身。十月受氣足。始生。所以古人云。有孕不再房。養子痘疹稀。以慎重其胎也。世人不謹。歟。今幼科醫書多種。自有尚門。余集祇錄。唯地時至七日內之事。採其最要者。簡而當詳。而明有先後。原委切要。著明其良法。實實可防患于未然耳。朽。年已踰甲。志在守庚往。却家緣。務病山寺。向梓證道。并地理碎事。諸刻。以求政四方。此亦不過切吾初之婆心焉耳。

保嬰經驗方

夢生方

○初生不能發聲。謂之夢生。切不可斷臍。以綿衣包兒。用大油紙。燃燭。將待。回方可斷也。

○將胞衣連帶用火炙令煖氣入兒腹取一箇用青布裹頭口  
一伶俐女人拿住貓頭向兒耳邊以口咬破貓耳貓大呼一  
聲兒即醒矣

○初生無啼是肛門爲脂皮所塞用簪通開  
○外感痰要云兒生不啼由產難少氣也取臍帶向身却將之令  
氣入腹仍呵至百度自啼矣又以葱白徐徐鞭之亦妙

○萬補湯生汁入口即活  
○生兒啼聲不出及聲不轉者舌下有膜如石榴子或口中上腭  
有泡速以指爪摘斷之用葦刀子割之亦可微有血出即活  
若血出過多者燒斷髮同猪脂塗之

○小兒因產難產下不哭微有氣者以本父母真氣度之即活  
保生碎事 保嬰經驗方 二 胎前產後切要 天德堂  
試口法

○嬰兒在胎口有熱物蓋胎毒也生下啼聲未出急用軟帛拭  
臍指拭盡貴在神速遲則嚙下伏之於心過天行時氣久熱  
不除乃乘于心心主血脉得熱而流溢于胃胃主肌肉發  
出于外成瘡疹之毒世之小兒無可免者不知病源在此若  
依此法庶可免矣

○產家要訣云予見有挖出血餅切開色成五彩舉家大喜謂必  
無慮患矣而竟以患痘死者且口血雖嚙必入腸胃大便一  
通其血亦去豈有徑投極下之處伏于裏大石腎之中藏蓄  
不動久而後發者哉太醫院友收齊先生辨之甚悉謂痘之  
所主皆屬心火斯言足破千古疑案及思古方用黃連甘草

抹兒口以解胎毒者豈非瀉心之藥也乎

甘草法  
○凡妊娠臨月預辦好甘草指許一節拍碎以水二碗煮煎一  
殼以綿裹蘸令兒吮之若吐出惡物爲佳服一蜆殼不吐即  
不須服不問小兒虛實皆可服之

黃連法  
○臨產時先以黃連五錢甘草二錢五分熬濃汁生下即與二三  
匙再加硃砂細末調汁抹兒口中打盡腹中舊屎次用硃砂  
硃砂法

○葛氏明後方云先用甘草黃連拭口吐其惡汁稍定更與硃砂  
安神定魄用好硃砂一大豆許細研水飛過煉蜜一蜆殼許  
保生碎事 保嬰經驗方 三 胎前產後切要 天德堂  
和硃砂成膏旋抹口中非獨鎮心安神亦解惡毒若面色青  
白啼聲不響即不須服

藏衣法  
○凡年遊自虎殺神在太歲後一位如太歲在卯則白虎在寅若  
產及藏衣犯之子母皆不利

斷臍法  
○產家要訣云兒出胎洗後方斷臍帶則不傷水生癰斷臍須持  
汁令盡否則寒濕入腹或作臍風又須于近臍四五寸處以  
線繫繫以帛包裹以口咬斷蓋結緊則見血不貫于胞衣自  
然離臍而腸胃下即成延緩數日亦無大害口咬則斷臍  
不犯乎刀剪自無冷氣內侵可免腹中帶痛之虞如或天時

寒濕坐草艱難母子勞傷元氣者先紮臍帶以油紙燒斷令氣緩入兒腹中此又為同生起死之妙法近用新艾炙臍亦妙所留臍帶不可太長太長則難乾而傷肌且恐引外風為臍風亦不可太短太短則通內而傷臟或致成腹瀉而夜啼只以兒之足掌長短為度乃酌中之法千金論云須令兒足趾上為度

○造道集云見始生宜淨洗則燥血不留于指路之間可令皮膚光澤然後剪臍乃初生之帶也剪之宜長一尺有二用粗線縛緊剪不長多生臍風縛不緊陰間虛腫

○繆仲淳廣筆記云見初生不可剪臍帶三朝用麪和水成薄餅置兒腹穿臍帶於麪上將新艾火炙臍帶近臍處或三炷或

保生粹事 保嬰秘訣方

五七炷須下帳避風灰畢仍將臍帶紮好聽其自脫至七日方脫者元氣足也

○凡兒生下每日夜將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內如齒邊有白點即以指爪或細針挑破取桑樹內汁薄薄塗之永無驚風撮口之患

製臍法

○千金論云臍臍須令白練探軟方四寸新綿厚半寸與烏等同合之緩急得中急則令兒吐乳不可輕解解時開戶下帳冬

間用火令帳內溫暖仍以溫粉敷之若臍不乾燒絳帛敷之枯者五龍骨黃丹為末敷之亂髮燒灰敷之亦可或云黃柏末敷妙

臍風方

○張機論云嬰兒斷臍後宜用厚帛裹臍若乳母不慎或因浴水久次兒尿糊中未換漏氣所侵或當風解視七日內遂有此疾令兒臍腫多啼不能乳哺即成臍風也

○臍腫當隨輕重重者灸二三十次輕者但汁出多啼用當歸末和胡粉敷之常用熱絮熨之

○初生七日內面赤喘急啼聲不出名曰撮口臍風齒齦上有小泡如粟米狀急以溫水蘸青軟帛或綿裹指輕輕擦破即開口不須服藥

○白爛垂者四枚炒去絲嘴為末密調敷臍內即愈

○繆仲淳云撮口之症必先大便熱須用生犀角及真羚羊角磨和蜜汁飲之有效急則用太黃二甘草二煎服

保生粹事 保嬰秘訣方

口噤方  
○慈白一寸破四片乳汁蒸爛之

浴兒方  
○北方生子多不洗浴初生下但以舊綿拭淨直至三四歲出痘後方浴或大小便處略以水指抹之故北方人較南方壯實不徒風氣然也若畢竟欲浴取益母五兩剉細煎滾溫溫浴之不生瘡疥又可祛寒氣風濕

○產家要訣云兒初出胎浴洗湯內宜入食鹽少許洗畢拭乾以膩粉一錢許研細摩其遍身及兩脇然後襁裹既不畏風又散諸氣今南方三朝方洗將襁裹之兒又復解開多致感冒



驚風蓋洗三雖云古禮而防患實在變通只依前法出胎便洗自是穩當

○保生要方云小兒初生候浴水不得且以綿絮包裹大入懷中暖之浴後仍當如此雖暑月綿絮亦宜漸漸去之乍離母腹未可冒寒氣也預煎湯湯以漸貯之臨時熱洗不犯生水則兒不生瘡

### 乳兒方

○保生要方云小兒初生若多睡勿強與乳自然長而少病

○顛顛經云夏中盛熱時乳母浴後便與兒乳使兒成胃母亦白痢定息良久熟揉乳之可也

○千金論云乳兒不可過飽滿而溢則成嘔吐大飽以空乳吮之保生要方云保嬰經論方云小兒初生不可過飽

即消若乳來猛取出再乳凡初乳時須常捏去宿乳夏不若熱乳令兒嘔逆冬不去冷乳令兒咳嗽母與兒臥以臂枕之令乳與頭平則兒不噎母欲寐即奪其乳恐睡熟則不知飽足而成嘔吐也

○小兒精要云夜間乳兒須乳母起坐抱兒乳之

○母有娠乳兒必患胎黃母大醉乳兒必患驚熱母傷飽乳兒必患喘急母新房乳兒必患泄瀉母大怒乳兒必患癲狂母新吐乳兒必患虛羸

○瑣碎錄云兒睡忌乳母鼻風吹額門成風疾

### 哺兒方

○葛氏肘後方云兒生三日應開腹助穀神壯胃氣用粟米煮熟

研如乳汁與兒大豆許慎不可與雜藥

○乳者如也哺者食也乳後不得與食哺後不得與乳乳食相雜難以克化大則成癖小則成積疳氣自此始矣

○或云小兒無傷乳法即乳滿而溢亦不為害惟與食相併則乳異食不化遂結成痰癖是傷食非傷乳也故小兒以乳為主三歲後方可食糕粥五歲外方可食葷腥則一生永無脾胃之疾而孫真人葛氏巢氏聖濟經皆云三口即當用哺以助穀神導腸胃是在為母者細審兒之虛實而調劑之

### 乳兒方

○巢氏病源云小兒始生肌膚未實宜單衣不宜暖衣暖則筋骨緩弱易發瘡瘍宜舊絮不宜新綿新則汗出表虛易受寒邪保生要方云保嬰經論方云小兒初生不可過飽

即地氣尤宜見風日不見地氣風日則肌膚柔脆易得損傷嘗見富貴之家重襦疊被日在懷抱中雖數歲亦不能行而田舍小兒終日暴露或飢或寒絕無他病譬如草木生於深山峻谷及大澤中容易合抱至園圃奇材具并縱加培壅多有秀而不實者豈貴賤之理有異哉

○小兒精要云初生小兒不得用油膩手糊嬰春忌覆頂嬰足忌飲冷食水冬忌火炙衣被要得小兒安常受飢與寒真至言也

○又云小兒腸胃脆窄若稠粘乾硬酸鹹辛辣一切魚肉水蟲蟲麪燒炙燥炒煎燂俱是發熱難化之物皆宜禁絕婦人無知畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及語云惜兒須惜食

記之記之

○養子真訣云。吹熱莫暖。冷。吹軟莫暖。硬。吹少莫吹多。真妙法也。  
○又云。乳子須調護。看承莫縱馳。乳多終損胃。食舊即傷脾。食厚

非為益。衣單政所宜。無風煩見日。舉臂順天時。

夜啼方

○雞蕪塗兒臍中。極佳。男雌女雄。

○初生夜啼。用燈花燒灰。塗乳或用燈花四五丸。捻爛以燈湯

化下。即安。

○井邊草。或雞窠中草。安母臥席下。勿令母知。極妙。

○牛甲為末。調敷臍上。即安。

○黃連五分 人參五分 甘草五分 竹葉二十

保生藥事

保嬰經方

八寶陰慈切外編 天德堂

作二劑。每劑加薑一片。水煎服。

○兒月內啼者。用真牛黃飛神砂極細末。各五厘。塗兒舌上。立止。

稀痘方

○脂帶乾落。安淨瓦上。四圍以炭炙之。止令烟盡。勿使成灰。取起

以碗覆地上。良久出灰。弄研極細。每一分加辰砂半分。共研

次日以乳汁調敷乳上。令兒食乳。隨一日內作二三次服盡。

永不生瘡疹。即生亦少。或云。兒生一十三日服之。未知何說。

○產家要訣云。早嘗得方士秘傳。出胎稀痘。小金丹一方。不惟鍊

心解毒。痘瘡必稀。更能助胃辟邪。斷除百病。予曾製而試驗

矣。方用箭頭砂一兩五錢。敵如茶豆粒大。以黃連甘草各二

兩。河水五碗。於新砂鍋內。文武火同煮。一日水乾。則旋添之。

煮。研末。更煎甘草湯。飛去黑脚。止取隨水過者。一兩半。黃

三錢。此藥市賣。多假。須有厚質。長輕。且有香氣者。乃真。川

大黃。細紋者。切六片。以粗紙厚。貼於高。清酒內。泡。時。或

團。灰。火中。烘。乾。又。泡。又。烘。如。此。七。次。取。出。以。紙。攤。淨。地。上

一宿。出。火。氣。研。末。三。錢。燈。心。白。色。者。以。水。和。漿。粉。採。湯。曬。乾

或。焙。乾。慈。研。為。極。細。末。入。水。再。研。加。水。漂。取。浮。者。晒。乾。用。二

錢。粉。草。去。皮。研。末。二。錢。右。五。味。共。研。勻。煉。蜜。和。劑。分。作。三。十

丸。乘。濕。以。金。箔。為。衣。黃。蠟。為。槌。母。令。泄。氣。可。以。久。收。凡。嬰。兒

出。胎。未。曾。吃。乳。之。先。用。江。西。淡。豆。豉。以。河。水。熬。取。濃。汁。少。許

用。前。丸。一。粒。指。研。如。稀。糊。盛。以。小。杯。坐。於。湯。碗。中。不。時。抹。兒

口。內。既。吃。乳。後。即。抹。乳。上。亦。可。只。用。一。丸。胎。毒。盡。從。大。小。便

保生藥事

保嬰經方

九寶陰慈切外編 天德堂

消。癰。而。去。其。聖。藥。也。但。若。牛。黃。難。得。真。耳。此。而。不。真。雖。用。弗

効。矣。

○又方云。小兒能吃食。取冷蜜薑水。以頭窠雞子。每日投一個在

內。七。日。投。完。第。八。日。取。第。一。個。起。來。洗。淨。煮。熟。與。小。兒。吃。依

次。吃。完。不。特。稀。痘。竟。可。不。出。矣。

○又曰。隨有濟陽綱目及慈幼綱目。即能行世。謹此預白。

保生碎事一卷

大學士英廉家藏本

國朝汪淇撰是書又名濟陰慈幼外編錄小兒墮地時至七日內醫療之事如拭口斷臍浴兒稀痘各法寥寥數則大約取其便於檢用非保嬰之全書也卷末一條云隨有濟陰綱目及慈幼綱目卽鐫行則是書之成猶在濟陰綱目之前其慈幼綱目自謂卽證治準繩之幼科加以評釋今未見其本

# 成方切用二十六卷

〔清〕吳儀洛輯

山東省圖書館藏清道光二十七年瓶花書

屋刻本

附《四庫全書總目·成方切用

十四卷》提要

原序

內經醫之奧旨也諸方醫之粗迹也近代時醫相率以方授受而求經論者無之舍奧旨而務粗迹安望其術之神良乎雖然方亦何可廢也方以立法法以制宜譬之工倕匠心獨創斷未有備規矩而爲之者特神而明之存乎其人焉耳古昔方書得人乃傳扁鵲倉公皆稱禁方秘不輕授所以漢時以前成方絕少而仲景爲方之祖也仲景以後方書充棟無如製方者日益多而註方者不少槩見宋成無己始將仲景一百十三方論而註之使觀者知其端緒漸得解會但循文訓釋仲景之良法精義不能盡徹迄明興始有吳鶴臯之醫方考因病分門詞旨明成方切用

原序

爽海內盛行但搜採不無闕略近日汪訥菴倣成氏吳氏之意而擴充之採輯古方名曰集解先詳受病之由次解用藥之意碩論名言採搜甚富然不能無承訛襲愆之說且於新方總未採錄均未可以語全書也洛不揣愚陋取吳氏汪氏所輯而增改之得古今良方凡一千三百餘首稟諸經以觀其合訂之證以發其微題其端曰成方切用以所錄皆取切於時用之方而尤期用方者之切於病情也何則邇來風氣寢薄人之稟受遠不及古故方有宜古不宜今者設起仲景於今日將必有審機察變損益無已者而謂錄方可不切於時用乎且病有標本先後治有緩急逆從醫貴通變藥在合宜苟執一定之方以應無

窮之證未免實虛虛損不足而益有餘反致殺人者多矣用方之切於病豈易易哉然則如之何而後可曰研窮乎靈樞素問而經義無不通也詳求夫望聞問切而證因莫能遁也深悉於氣味陰陽而藥性剖其微也夫然後經之以法緯之以方從斯集而合離變化焉自迎刃而中其肯綮矣

乾隆辛巳中冬月長至日澉水吳儀洛遵程書於硤川之利濟堂

成方切用

原序

十一

凡例

古人因病立方加減出入俱有深意若不明其受病之由與用方之所以能治其病之故而槩執方以治之其不至於誤世殃人者幾希茲集病情方意互相闡發庶便資用若每方皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前後間見詳略不一或釋制方之意或擬加減之法讀者彙觀而統會之可也

人身一小天地也當天地初開氣化濃密則受氣常強及其久也氣化漸薄則受氣常弱嘗考五帝之壽咸踰百歲三王之後及百者鮮矣故東漢之世仲景處方輒以兩計宋元而後東垣丹溪不過錢計而已豈非深明造化與時偕行者與

成方切用

凡例

一

今去宋元又遠元氣轉薄所以臨證施治多事調養專防尅伐多事溫補痛戒寒涼此今時治法之變通也若執成方或矜家秘惟知盡劑不顧本元惟知古法不審時宜則輕病即重重病即死矣有利濟之心者宜加戰兢焉

一咸無已所註仲景之方不過循文訓釋而已近世如方中行喻嘉言周揚俊輩於仲景傷寒論俱有發明而喻氏尤能闡發其精義故本集採錄獨多

一吳鶴皋之醫方考門分七十則嫌其多方凡七百首每證不過數方則嫌其少如五積散逍遙散皆不入選不無闕略近日汪詒菴醫方集解門分二十有一正方三百有奇附方之

數過之但專錄古方未及新方茲集門分二十有六古方新方共一千三百餘首似已足盡醫家之法其有未備學者其神明而推廣之比例而善用之得矣

一集中所分門類醫學始於靈素故首列內經之方而人之由生全賴夫氣故先治氣血者所以配氣故次理血今人血氣虧者甚多故次補養而大虛者防滑脫故次瀉固及受病則有汗吐下三法故次發表涌吐攻裏又有宜緩攻者故次消導若病在半表半裏法當和解故次和解又有表證未除裏證又急者當表裏交治故次表裏而受病之因多起於六淫故次風寒暑濕燥火而病有因痰者故次除痰有因蟲者故成方切用

凡例

二

次殺蟲至於婦人小兒癰瘍眼目各有顛科茲集欲便於用故每科略取數方以備採擇又錄救急之方以應倉卒末附勿藥元詮以為衛生之方使人知病有勿藥之治真有方而具無方之妙已

### 方制總義

靈樞刺節真邪篇曰真氣者所受於天與穀氣并而充身也即元氣也人稟陰陽五行以生氣以成形是所受於天者也而所受於天之真氣必與後天未穀日生之氣合并以充周於身然後得以運行而不息焉是故上有膻中之氣所以通呼吸而統攝諸氣以主一身之治節者也此其運布在肺中有水穀之氣所以執中央以運四旁而升降清濁腐飲食以養營衛者也此其轉輸在脾胃下有丹田之氣所以吸引胸中之氣下行以歸於宮而精氣互根以爲三焦之本者也此其藏納在腎氣聚則生氣散則死醫欲活人當先識此爲第一義耳

素問疏五過論曰治病之道氣內爲寶循求其理求之不得過在表裏凡治病者當先於元氣之在內者而珍重之循法度以復察其過之在表在裏以治之斯無誤也○按氣有外氣天地之六氣也有內氣人身之元氣也唯元氣充實則六淫之外邪不能侵犯故人之所賴強壯而巳即如本篇始末所言及終始等篇皆倦倦以精氣重虛爲念先聖惜人元氣至意於此可見矣

總義

一

素問陰陽應象大論曰陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也治病必先求其本萬事萬變皆機論治爲尤切故凡治病者必求其本或本於陰或本於陽知病所由生而直取之乃爲善治所以凡因病而致逆因逆而致變因寒熱而生病因病而生寒熱者但治其所生之本原則後生諸病不治自愈所以得陰脈而見陽證者本陰標陽也得陽脈而見陰證者本陽標陰也若更治其標而不治其本則死矣○先病爲本後病爲標脈爲本證爲標○白病多生於本六氣之用則有生於標者有生於本者太陰寒水本寒標熱少陰君火本熱標寒其治或從本或從標審寒熱而異施也少陰火從火化爲本太陰陰上從陰化爲本其治但從火淫之本相火從火化爲本太陰陰上從陰化爲本其治但從火淫之本相陰風木本從風化爲本厥陰風爲本厥陰爲標其治不從標本而從乎中者中見之氣也蓋陽明與太陰爲表裏其氣互通於中故燥金從濕土之中氣爲治厥陰與少陽爲表裏其氣互通於中故風木從相火之中氣爲治

之氣以定治爾若太陽少陰等五為中見之氣者然其或寒或熱標本甚明可以不求之於中而求之於外治其本中滿與大小便不通治其標蓋中滿則藥食之氣不能行而臟腑皆失所稟故無暇治其本先治其標二便不通乃危急之候諸病之急無急於此故亦先治之舍此則無有治標者矣至於病氣之標本又自不同病發而有餘必受他臟他氣先治其本不使標不使累及本臟本氣為善也。凡病有標本更有似標之本似本之標若不辨陰陽逆從指標為本指本為標指似標者為標似本者為本迷亂經常倒施鍼藥殺人如麻矣

素問至真要大論帝曰氣有多少病有盛衰治有緩急方有大

小願聞其約奈何 五運六氣各有太過不及故曰氣有多少人

大小亦必隨其輕 岐伯曰氣有高下病有遠近證有中外治有

輕重適其至所為故也 上下則病有遠近在裏日中在表日外

必及於病至之所而不可過亦不可不及也 大要曰君一臣

成方切用 總義

土

二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣

六偶之制也 大要大約也主病之謂君君當倍用佐君之謂臣

即古所謂複方也故君一臣二其數三君二臣三其數五皆奇

之制也君二臣四其數六君三臣六其數八皆偶之制也奇方

為陽而輕偶方為陰而重故曰近者奇之遠者偶之汗者不以偶下者不以

奇用偶方上為陽故用奇方用其輕而緩也遠者為下為陰故

不以奇陽升不能降下也汗者不以偶陰沉不能達表也下者

之根則氣味之陰陽又豈後於奇偶哉故下文復言之此其微

意正不止於品數之奇偶而實以發明方制之義爾。舊本云

汗者不以奇下者不以偶而王太僕註云表汗藥不以偶方泄

下藥不以奇制是註與本文相反矣然王補上治上制以緩補

註得理而本文似誤今改從之。奇音其補上治上制以緩補

下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄適其至所此之謂也

補上治上制以緩欲其雷布上部也補下治下制以急欲其直

達下焦也故欲急者須氣味之厚欲緩者須氣味之薄若制緩

方而氣味厚則峻而人患用急方而氣味薄則柔而不前病所

唯緩急厚薄得其宜則其病至之所而治得其要矣

遠而中道氣味之者食而過之無越其制度也 言病所有深遠

設用之無法則藥未及病而氣味在中道而止矣故當以食為

助而使其無遠弗達是過之也如飲酒吸粥以助藥力之類由

此類推則服食之疾徐根柢之升降以及湯膏丸散各有宜

故云無越其制度也王冰曰假如病在腎而心氣不足服藥宜

急過之不以氣味飼心腎藥凌心火復益衰矣餘上下遠近例

同完素曰聖人治上不犯下治下不犯上治中不犯上下遠近例

故曰味伐無過命曰大惑好古曰治上必妨下治中必妨下

黃帝以治肺必妨脾用從容以治腎必妨心服乾薑以治中必

食後之自然總宜食遠後服之食後服之食後服之食後服之

皆受納於胃胃氣散精於脾脾復傳精於肺肺主治節然後分

布臟腑是胃乃人身分金之運也未有藥不入胃而能入於肺亦

必滋陰補氣以上蒸於肺未聞心藥飲至心間而始入於肺藥

欲至肺間而始入於肺也若上膈之藥食後服之胃氣先為別食

所填塞必待前食化完方能及後藥是欲速而反緩矣且經脈

成方切用 總義

土

在肉理之中藥之精粕如何得到其所到者不過氣味爾若云

上膈之藥須令在上下膈之藥須令在下則治頭之藥必須在

顯明易見者也不可不正其誤 是故平氣之道近而奇偶制

小其服也遠而奇偶制大其服也大則數少小則數多則九

之少則二之 平氣之道平其不平之謂也如在上為近在下為

各存奇偶相兼之法如方奇而分兩偶方偶而分兩奇皆互用

之妙也故近而奇偶制小其服小則數多而遠而奇偶制大其服

分兩輕分兩重則性力薄而化及近處也遠而奇偶制大其服

大則數少而止於二蓋少則分兩重分兩重則性力專而直達

深遠也無過病兼用之法若病近而大其制則藥勝於病是

謂誅伐無過病遠而小其制則藥不及病亦猶風馬牛不相及

爾上文云近者奇之遠者偶之言法之常也此云近而奇

偶遠而奇偶言用之變也知變知常則其應用不窮矣 奇之

不去則偶之是謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫

涼反從其病也 此示人以圓融通變也如始也用奇奇之而病

不去此其必有未合乃當變而為偶奇偶迭用







氣虛之中焦氣運欲散則更虛其下欲補下則滿甚於中治  
不知本而先攻其滿藥入或減藥過依然氣必更虛病必漸甚  
乃不知少服則資壅多服則宣通峻補其下以疎散其中則下  
虛自實中滿自除此塞因塞用之法也如大熱內蓄或大寒內  
凝積聚滯瀉利不止寒濕者以熱下之熱滯者以寒下之此  
通因通用之法也以上四治必伏其所主者制病之本也先其  
所因者求病之由也既得其本而以真治真以假對假其始也  
治類似同其終也病變則異矣是為反治之法故可使破積積  
堅氣和而病必除帝曰善氣調而得者何如岐伯曰逆之從之逆  
已也○塞入聲帝曰善氣調而得者何如岐伯曰逆之從之逆  
而從之從而逆之疏氣令調則其道也氣調而得者言氣本調  
言其治法亦無過逆之從而已其間有宜主治逆而佐從之  
者有宜主治從而佐逆之者皆所以疏泄其邪氣而令其調和  
此治氣調而病  
於中者之道也

素問至真要大論帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君  
佐君之謂臣應臣之謂使非上下三品之謂也主病者對證之  
要藥也故謂之

成方切用

總義

若君者味數少而分兩重賴之以為主也佐君者謂之臣味數  
稍多而分兩稍輕所以臣君之不迫也應臣者謂之使數可出  
入而分兩更輕所以備通行向導之使也此則君臣佐使  
之義非上下三品如下文善惡殊貴之謂也○使去聲帝曰  
三品何謂岐伯曰所以明善惡之殊貴也前言方制言處方之  
言藥性善惡故有上中下之殊神農云上藥為君主養命以應  
天中藥為臣主養性以應人下藥為佐使主治病以應地故在  
本草經有上中下三品之  
分此所謂善惡之殊貴也

素問至真要大論帝曰病之中外何如岐伯曰從內之外者調

其內從外之內者治其外從內之外者內為本從外之內

之外而盛於外者先調其內而後治其外從外之內而盛於內

者先治其外而後調其內病雖盛於標治必先其本而後可愈

本中外不相及則治主病也此猶律家二罪俱發科其重也○

按此篇即三因之義也如金匱要略曰千般疾難不越三條一  
者經絡受邪入臟腑為內所因也二者四時九氣血脈相傳壅  
塞不通為外皮膚所中也三者房室金刃蟲獸所傷也故無擇  
著三因方為內有內因有外因有不內外因蓋本於仲景之三條  
而仲景之論實本諸此帝曰善病之中外何如答以前問病之中外  
陰陽治法之詳也岐伯曰調氣之方必別陰陽定其中外各守  
其鄉內者內治外者外治微者調之其次平之盛者奪之汗之  
下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利方法也陰陽三陰三陽也  
鄉各安於其所也微者謂之調小寒之氣和之以溫小熱之氣  
和之以涼也其次平之謂大寒之氣平之以熱大熱之氣平之  
以寒也盛者奪之謂邪之甚者當直攻而取之如甚於外者汗  
去之是謂隨其所利也○別必列切

素問五常政大論帝曰有毒無毒服有約乎約度也禁服篇曰

成方切用

總義

也囊滿而弗約則輸泄岐伯曰病有新久方有大小有毒無毒  
方成弗約則神與弗俱岐伯曰病有新久方有大小有毒無毒  
固宜常制矣病重者宜大病輕者宜小無毒者  
其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去  
其九藥性有大毒常毒小毒無毒之分去病有六分七分八分  
於病則反傷其正而生他患矣故當知約制而進止有度也○  
王氏曰大毒之性烈其為傷也多小毒之性平和其為傷也少常  
毒之性減大毒之性烈一等加小毒之性一等所傷可知也故至  
約必止之以待來證爾然無毒之藥性雖平和而久之則氣  
有偏勝必有偏絕久攻之則臟氣偏弱穀肉果菜食養盡之無  
使過之傷其正也穀肉果菜食養以盡病邪勿以毒藥盡病邪  
也如臟氣法時論曰毒藥攻邪五穀為養五果為助五畜為益  
五菜為充者是也然毒藥雖有約制而飲食亦貴得宜不可使  
之太過過則不盡行復如法如此而猶有未盡則再行前  
反傷其正也不盡行復如法以漸除之寧從乎慎也必先

歲氣無伐天和五運有紀六氣有序四時有令陰陽有節皆歲  
歲氣變遷而妄呼寒熱則邪正盛衰無所辨無盛盛無虛虛而  
未免犯歲氣伐天和矣天枉之由此其為甚  
遺人天殃邪氣實者復助之盛其盛矣正氣奪者復攻之虛其  
遺人天殃虛矣不知虛實妄施攻補以致盛者愈盛虛者愈虛  
遺人天殃則病氣日甚  
遺人天殃無致邪無失正絕人長命  
遺人天殃盛其盛是致  
遺人天殃邪也虛其虛  
遺人天殃是失正也重言之所以深戒夫伐天和  
而絕人長命以見歲氣不可不慎也

厥陰風木司天年巳亥風淫所勝平以辛涼  
王註云厥陰氣未為佐  
盛熱故以涼藥平之  
以甘苦以甘緩之以酸瀉之風為木氣金能勝之故平以辛涼  
過於辛恐反傷其氣故佐以甘  
苦勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之  
以酸瀉之者木之正味其瀉以酸也  
○清反勝之治以酸溫  
左以甘苦或氣有不及則金之清氣反能勝之故當治以酸溫  
急苦以  
溫金也

成方切用

總義

少陰火君司天年子午熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之  
火氣水能勝之故平以鹹寒佐以苦甘勝鹹所以防鹹之過  
也苦能泄所以去熱之實也熱盛於經而不散者以酸收之  
○寒反勝之治以甘溫佐以苦酸辛或氣有不及則水之寒氣  
甘能勝水溫能制寒也佐以苦酸辛寒得苦而溫得  
辛而散且火為水勝則心苦緩故宜食酸以收之

太陰土司天年丑未溼淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以  
淡泄之溼為土氣燥能除之故平以苦熱酸從木化制土者也  
苦從火化也以淡泄之者淡能利氣也  
氣法時論曰脾苦溼急食苦以瀉之是也  
溫佐以甘辛以汗為故而止溼鬱於上而成熱者治以苦溫苦  
以和中辛以散鬱也則溼熱  
之在上以微汗如故而止矣  
○熱反勝之治以苦寒佐以苦酸  
苦寒所以祛熱熱勝則  
亡陰液故佐以苦酸

少陽相火司天年寅申火淫所勝平以鹹冷佐以苦甘以酸收之以  
苦發之以酸復之熱淫同水能勝火故平以鹹冷苦能瀉火之  
而散越者以酸收之火鬱而雷伏者以苦發之然以發  
去火未免傷氣故又當以酸復之而火熱二氣同治也  
○寒反  
勝之治以甘熱佐以苦辛或氣有不及與上  
文寒勝熱淫大同

陽明燥金司天年卯酉燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之  
燥金能勝之平以苦溫從火化也佐以酸辛酸能  
生津辛能潤燥也燥結不通則邪實於內故以苦下之  
○熱反  
勝之治以辛寒佐以苦甘辛寒所以潤燥散熱  
苦甘所以瀉火生金  
太陽水司天年辰戌寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之  
足水散寒苦甘可以勝水以鹹  
○熱反勝之治以鹹冷佐以苦  
辛或氣有不及則熱反勝之故治以鹹冷抑  
辛大邪也佐以苦辛苦能泄熱辛能散熱也

成方切用

總義

厥陰風木在泉年寅申風淫於內治以辛涼佐以甘苦以甘緩之以  
辛散之治以辛涼佐以甘苦以甘緩之俱與上文司天治  
○清  
反勝之治以酸溫佐以甘苦以辛平之治以酸溫佐以甘苦俱  
平之者木之正味其補以  
辛金之正味其瀉以辛也

少陰火在泉年卯酉熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以  
苦發之治以鹹寒佐以甘苦以酸收之俱與上文司天治  
○寒  
反勝之治以甘熱佐以苦辛以鹹平之此與上文司天反勝大  
味其補以鹹水之  
正味其瀉以鹹也  
太陰土在泉年辰戌溼淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以  
淡泄之此與司天  
○熱反勝之治以苦冷佐以鹹甘以苦平之

或氣有不及則火之熱氣反能勝之故當治以苦冷抑火邪也佐以鹹甘鹹寒制熱甘溫補上也以苦平之即苦冷之義

**少陽相火在泉** 巳亥 火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以苦發之火相

畏火也故宜治以鹹冷苦能泄火辛能散火故用 ○寒反勝之

以爲佐以酸收之以苦發之義與上文熱淫治同

**治以甘熱佐以辛苦以鹹平之** 或氣有不及與上文

**陽明燥金在泉** 午 燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之燥

金氣火能勝之治以苦溫苦從火化也佐以甘辛木受金傷以

甘緩之金之正味以辛瀉之也燥結不通則邪實於內故當以

苦下之按上文燥淫所勝佐以酸辛與此甘辛稍異又如六元

正紀大論子午年陽明在泉亦云下酸溫皆與此不同考之藏

氣法時論曰肺苦氣上逆急食苦以 ○熱反勝之治以平寒佐

泄之用酸補之辛瀉之正此之謂也

**以苦甘以酸平之以和爲利** 或氣有不及則熱反勝之治以平

寒必助其慘故但宜平寒抑其熱爾佐以苦甘所以瀉火也以

發平之金之正味其補以酸也以和爲利戒過用也即平寒之

意 成方切用 總義 主

**太陽寒水在泉** 丑未 寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以

**辛潤之以苦堅之** 寒爲水氣土能勝水熱能勝寒故治以甘熱

氣法時論曰腎苦燥急食辛以潤之腎欲 ○熱反勝之治以鹹

**堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之也** 或氣有不及則熱反勝之故治以鹹冷

冷佐以甘辛以苦平之 抑火邪也佐以甘辛甘瀉火而辛能散

也以苦平之者水之正味其補以苦也 ○王氏曰此六氣方治

與前淫勝法殊貫其云治者瀉客邪之勝氣也云佐者皆所利

所宜也云平者補已弱之正氣也 ○時珍曰司天主上半年天

氣司之故六淫謂之所勝上淫於下也故曰平之在泉主下半

年地氣司之故六淫謂之於內外淫於內也故曰治之當其時

而反得勝已之氣謂之反勝 ○按六氣盛衰不常有所勝時有

所復王氏亦曰凡先有勝後必復詳見至真大要論欲深達者

當究心焉 ○按以上所論乃五運六淫之氣每歲年辰而變

遷者也又凡一歲之主氣始於大寒日交厥陰風木之初氣次

至春分日交少陰君火之二氣次至小滿日交少陽相火之三

氣次至大暑日交太陰濕土之四氣次至秋分日交陽明燥金

之五氣次至小雪日交太陽寒水之終氣每氣各主六十日六

氣分主四時歲歲如常故曰主氣客氣布行天令以加臨於主

氣之上斯上下相召而病變生矣 ○時珍曰經云必先歲氣毋

伐天和又曰升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之故春夏月宜加

辛溫之藥以順春升之氣夏月宜加辛熱之藥以順夏浮之氣

長夏宜加甘苦辛溫之藥以順化之氣秋月宜加酸溫之藥

以順秋降之氣冬月宜加苦寒之藥以順冬沉之氣所謂順時

養氣而養天和也經又云春省酸增甘以養肝氣夏省苦增辛

以養肺氣長夏省甘增酸以養脾氣秋省辛增酸以養肝氣冬

省酸增甘以養腎氣此則不伐天和而又防其太過所以體天地

之大德也味者捨本從標春用辛涼以伐水夏用鹹寒以抑火

秋用苦溫以泄金冬用辛熱以潤水謂之四時藥味背素問逆順

之理以夏月伏陰冬月伏陽推之可知矣雖然月有四時口有

四時或春得秋病夏得冬病皆由明之

成方切用 總義

主

成方切用總目

內經方 靈樞方五 附方六 素問方七 附方五

寒痹方

季春痹方

目不瞑方

猛疽方

萬氏方

肘後方

千金二方

陳文中方

心鏡方

敗疵方

成方切用

總目

鼓脹方

范汪方

普濟方

何大英方

正傳方

醫鑑方

脾痺方

血枯方

陽厥方

酒風方

尸厥方

五疫方

治氣門 正方一十三 附方二十七

栝樓薤白白酒湯

栝樓薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

四獸飲

十味人參散

又六君子湯

七味白朮散

三白湯

六神散

八珍湯

十全大補湯

大防風湯

成方切用

總目

溫經益元散

補中益氣湯

益胃升陽湯

升陽順氣湯

參朮益胃湯

調中益氣湯

調營養衛湯

順氣和中湯

補中益氣加黃蘗生地湯

代赭旋覆湯

升陽益胃湯

補脾胃瀉陰火升陽湯

橘皮竹茹湯

又橘皮竹茹湯	丁香柿蒂湯	丁香散	四磨湯	五磨飲	舉元煎	獨參湯 見救急門	保元湯 見嬰兒門	參朮膏 見補養門	成方切用 總目	理血門 正方二十一 附方三十四	四物湯	知藥四物湯	坎離丸	三黃四物湯	元戎四物湯	補肝丸	神應養真丹	四神湯	婦寶丹
	又丁香柿蒂湯										滋陰降火湯	二連四物湯	三黃補血湯	治風六合湯	治氣六合湯	防風當歸散	艾附暖宮丸	歸芎湯	
										三									

生地黃連湯	抵當湯	抵當丸	桃仁承氣湯	桃仁承氣對子	蒼朮地榆湯	芍藥地榆湯	芍藥湯	導滯湯	秦朮白朮丸	成方切用 總目	秦朮當歸湯	秦朮防風湯	麻黃人參芍藥湯	當歸補血湯	槐花散	加減四物湯	又槐花散	欬血方	龍腦雞蘇丸	犀角地黃湯
玉燭散		代抵當丸									秦朮羌活湯	秦朮蒼朮湯				槐角丸	當歸和血散			
										四										

加味犀角地黃湯	歸脾湯	酸棗仁湯	人參養營湯	養心湯	還元水	迴輪酒	獨聖散	清咽太平丸	小蓴飲子	成方切用	復元羌活湯	補陰益氣煎	四生丸	當歸六黃湯	補養門	八味地黃丸	十補丸	右歸丸	右歸飲	六味地黃丸
										總目					正方六十	附方二十七				
										五										

知藥八味丸	都氣丸	八仙長壽丸	滋腎生肝丸	人參補氣湯	抑陰腎氣丸	疏肝益腎湯	左歸丸	左歸飲	一陰煎	成方切用	加減一陰煎	二陰煎	三陰煎	四陰煎	五陰煎	七寶美髯丹	大補元煎	滋陰大補丸	打老兒丸	五福飲
										總目										
七味地黃丸	加減八味丸	益陰腎氣丸	滋陰腎氣丸	加味地黃丸	九味地黃丸	滋水清肝飲				木										

七福飲	黑地黃丸	大營煎	小營煎	虎潛丸	補益丸	參朮膏	兩儀膏	天真丸	貞元飲	成方切用	三才封髓丹	三才湯	當歸地黃飲	人參固本丸	地黃醴	參乳丸	頓乳取粉法	歸腎丸	天王補心丹	贊化血餘丹
					龍虎濟陰丹					總目		鳳髓丹								
										七										

孔聖枕中丹	養元粉	大補陰丸	斑龍丸	又斑龍丸	元武豆	龜鹿二仙丹	二至丸	蟠桃果	扶桑丸	成方切用	羊肉湯	益氣聰明湯	秦朮鼈甲散	黃耆鼈甲散	人參黃耆散	秦朮扶羸散	百合固金湯	補肺湯	補肺阿膠散	紫苑湯
										總目										
										八										



王母桃

玉屏風散

黃耆湯

川芎湯

妙香散

參苓白朮散

休癰飲

何人飲

四君子湯

見治氣門

歸脾湯

見理血門

人參養營湯

見理血門

成方切用

總目

九

十全大補湯

見治氣門

八珍湯

見治氣門

生脈散

見消暑門

當歸補血湯

見理血門

瀉固門

正方二十四

附方四

赤石脂禹餘糧湯

桃花湯

訶子散

河間訶子散

鞏隄丸

真人養臟湯

脫肛方

牡蠣散

柏子仁丸

固真丸

金鎖固精丸

珍珠粉丸

苓朮菟絲丸

治濁固本丸

祕元煎

成方切用

總目

十

固陰煎

茯菟丹

菟絲煎

水陸二仙丹

黏米固腸糕

惜紅煎

桑螵蛸散

人參檮皮散

玉關丸

四神丸

見祛寒門

豬苓丸

二神丸 見祛寒門

如聖散 見經帶門

撲汗法

表散門 正方二十七 附方三十八

桂枝湯

疏邪實表湯

桂枝甘草湯

桂枝加附子湯

桂枝附子湯

桂枝新加湯

桂枝加芍藥湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝加厚朴杏仁湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝二麻黃一湯

成方切用

總目

十一

桂枝二越婢一湯

桂枝加黃耆湯

桂枝五物湯

栝樓桂枝湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃加朮湯

麻黃附子湯

甘草麻黃湯

三拗湯

大青龍湯

小青龍湯

小青龍加石膏湯

葛根湯

桂枝加葛根湯

葛根加半夏湯

葛根解肌湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

升麻葛根湯

柴葛解肌湯

柴胡升麻湯

九味羌活湯

十神湯

成方切用

總目

十二

神朮散

白朮湯

大無神朮散

局方神朮散

許學士神朮散

九製蒼朮散

葱豉湯

連鬚葱白湯

人參敗毒散

倉廩散

硝黃敗毒散

敗毒加黃芩湯

連翹敗毒散

荆防敗毒散



當歸承氣湯	大黃甘草湯
破棺丹	
大陷胸湯	
白散	
小陷胸湯	
大陷胸丸	
十棗湯	
三化神佑丸	小胃丹
赤金豆	
三物備急丸	
成方切用	總目
備急散	圭
太平丸	
礪砂丸	
敦阜丸	
木香檳榔丸	
木香導氣丸	
百順丸	
枳實導滯丸	
倒倉法	
霞天膏	

蜜煎導法	
豬膽導法	
鹽合草烏導法	嚮薑導法
大螺着小腹法	
梔傷寒結胸法	又法
附子瀉心湯	見瀉火門
大黃黃連瀉心湯	見瀉火門
抵當湯	見理血門
桃仁承氣湯	見理血門
感應丸	見祛寒門
成方切用	總目
久痛丸	見祛寒門
天台烏藥散	見祛寒門
竹葉薰法	
蘿蔔菜薰法	
消導門	正方一十九 附方三十三
枳朮丸	
枳朮湯	半夏枳朮丸
橘半枳朮丸	橘皮枳朮丸
木香枳朮丸	香砂枳朮丸
木香乾薑枳朮丸	木香人參乾薑枳朮丸

消飲丸	三黃枳朮丸
麴蘖枳朮丸	
平胃散	
除溼湯	和解散
藿香平胃散	人參養胃湯
加味平胃散	厚朴溫中湯
對金飲子	
和胃飲	
保和丸	
小保和丸	大安丸
成方切用	總目
芍藥枳實丸	
痞氣丸	
伏梁丸	肥氣丸
息賁丸	賁豚丸
十香丸	
枳實消痞丸	
廓清飲	
健脾丸	
益氣健脾丸	養榮健脾丸
理氣健脾丸	舒鬱健脾丸

化痰健脾丸	清火健脾丸
和中健脾丸	妙應丸
寬中進食丸	
解肝煎	
排氣飲	
葛花解醒湯	
大和中飲	
小和中飲	
鼈甲飲	
小分清飲	方見燥淫門
成方切用	總目
資生丸	
神香散	
佐關煎	見祛寒門
抑扶煎	見祛寒門
和解門	正方二十九 附方二十二
小柴胡湯	
柴胡去半夏加栝樓根湯	柴胡桂枝乾薑湯
柴胡合桂枝湯	柴胡加龍骨牡蠣湯
厚朴生薑半夏甘草人參湯	柴胡飲子
柴胡桔梗湯	柴平湯

清鎮丸	柴胡四物湯
調經湯	小前胡湯
柴胡雙解散	
芍藥甘草湯	
白朮芍藥湯	
黃芩湯	
黃芩加半夏生薑湯	黃芩芍藥湯
外臺黃芩湯	
黃連湯	
溫膽湯	
成方切用	總目
十味溫膽湯	九
越鞠丸	
逍遙散	
八味逍遙散	黑逍遙散
藿香正氣散	
藿薷湯	
六和湯	
三解湯	
清脾飲	
薑茶飲	

梅蜜飲	
痛瀉方	
甘草黑豆湯	
正柴胡飲	
柴陳煎	
柴芩煎	
一柴胡飲	
二柴胡飲	
三柴胡飲	
四柴胡飲	
成方切用	總目
五柴胡飲	干
歸柴飲	
蘆根湯	
陰陽水	
栝樓薤白白酒湯	見治氣門
半夏瀉心湯	見瀉火門
甘草瀉心湯	見瀉火門
生薑瀉心湯	見瀉火門
表裏門	正方一十四 附方六
大柴胡湯	

大前胡湯	柴胡加芒硝湯	葛根黃連黃芩湯	桂枝加大黃湯	防風通聖散	雙解散	五積散	五積交加散	參蘇飲	扶苓補心湯	成方切用	香蘇飲	三黃石膏湯	麻黃白朮湯	冰解散	茵陳丸	柴苓飲	四逆散	祛風門 正方七十一 附方二十二	侯氏黑散	風引湯
					祛風至寶丹				芎蘇飲	總目										
										三										

防已地黃湯	頭風摩散方	桂枝芍藥知母湯	烏頭湯	礬石湯	朮附湯	越婢加朮湯	小續命湯	麻黃續命湯	白虎續命湯	成方切用	附子續命湯	羌活連翹續命湯	千金大續命湯	大秦朮湯	地黃飲子	天麻丸	稀薤丸	活絡丹	三生飲	牽正散
								桂枝續命湯	葛根續命湯	總目	桂附續命湯	錄驗續命湯								
										圭										

星附散	青州白丸子	貝母栝樓散	竹瀝湯	稀涎散	滌痰湯	清心散	涼膈散	排風湯	二丹丸	成方切用	正舌散	轉舌膏	消風散	清空膏	愈風丹	解風散	東垣胃風湯	胃風湯	獨瘰湯	改容膏
					方見除痰門					總目										
										重										

順風勻氣散	搜風順氣丸	不換金丹	資壽解語湯	羌活續斷湯	獨活寄生湯	祛風至寶丹	防風通聖散	獨活湯	三因白散子	成方切用	史國公藥酒方	通痹散	十味劉散	桂枝五物湯	烏頭粥	人參補氣湯	慈苡仁湯	加味六君子湯	三聖散	治風六合湯
						方見表裏門	方見表裏門			總目				方見表散門						方見理血門
										重										



桂枝人參湯

小建中湯

漿水散

子 52—485

黃耆建中湯

十四味建中湯

八味大建中湯

樂令建中湯

養中煎

白通加人尿豬膽汁湯

附  
註  
湯

薑附白通湯

附薑歸桂湯

附薑歸桂參甘湯

辛溫平補湯

成方切用

# 總目

甘寒補氣湯

益元湯

回陽救急湯

栝樓瞿麥丸

中滿分消湯

溫胃飲

四神丸

神丸

五味子散

澹寮四神丸

烏頭赤石脂丸

五君子煎

感應丸

九痛丸

黃芽丸

導氣湯

附子粳米湯

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

天台烏藥散

成方切用

# 總目

薏苡仁附子散

四維散

疝氣方

梔附湯

鎮陰煎

橘核丸

歸氣飲

暖肝煎

補火丸

金液丹

來復丹

素

半硫丸	靈砂丹
二氣丹	返陰丹
破陰丹	百問方
黑鉛丹	
黑錫丹	
五德丸	
七德丸	
唐鄭相國方	
青娥丸	喝起丸
復陽丹	
成方切用	總目
三氣飲	羌
壽脾煎	
一炆丹	
九炆丹	
聖朮煎	
消暑門	正方二十 附方二十四
消暑丸	
黃連消暑丸	
小半夏茯苓湯	方見燥淫門
四味香薷飲	

黃連香薷飲	二香散
三物香薷飲	五物香薷飲
六味香薷飲	十味香薷飲
縮脾飲	
大順散	
來復丹	方見祛寒門
枇杷葉散	
冷香飲子	
桂苓甘露飲	
又桂苓甘露飲	
成方切用	總目
清暑益氣湯	補肝湯
黃耆人參湯	
清燥湯	
二妙散	三妙散
六一散	
益元散	雞蘇散
碧玉散	清六丸
溫六丸	三生益元散
吳萸六一散	黃耆六一散
五苓散	方見燥淫門
	幸

竹葉石膏湯 方見薄火門

人參白虎湯 方見薄火門

生脈散

五味子湯

補氣湯

水煎鹽丸

大黃龍丸

潑火散

總論消暑諸方

燥淫門

正方二十七

附方二十九

成方切用

總目

五苓散

四苓散

蒼朮五苓散

元戎五苓散

桂苓丸

茯苓白朮湯

春澤湯

二朮四苓湯

茯苓琥珀湯

藟苓湯

補氣丸

茯苓湯

圭

豬苓湯

茯苓甘草湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

腎着湯

小半夏加茯苓湯

小半夏湯

大半夏湯

越婢湯

加味腎氣丸

防己黃耆湯

防己茯苓湯

成方切用

總目

舟車丸

滑川散

疏鑿飲子

實脾飲

五皮飲

麥門冬湯

大分清飲

小分清飲

革藓分清飲

縮泉丸

圭

琥珀散	
茵陳蒿湯	
茵陳三物湯	茵陳將軍湯
升陽除溼防風湯	
禹功散	
羌活勝溼湯	
羌活除溼湯	升陽除溼湯
東垣升陽除溼湯	
大橘皮湯	
八正散	
成方切用	總目
防己飲	
當歸拈痛湯	
蒼朮丸	
平胃散	見消導門
潤燥門	正方二十八 附方七
麥門冬湯	
炙甘草湯	
清燥救肺湯	
通幽湯	
當歸潤肺湯	

濟川煎	
潤腸丸	
活血潤燥丸	潤燥湯
又潤腸丸	
決津煎	
韭汁牛乳飲	
活血潤燥生津湯	
甘露飲	
桂苓甘露飲	小甘露飲
消渴方	
成方切用	總目
地黃引子	
治久嗽方	
瓊玉膏	
麻仁蘇子粥	
桑白皮等汁十味煎	
滋燥養營湯	
白茯苓丸	
文蛤散	
黃耆湯	
宜明黃耆湯	

宜明麥門冬飲子	
易老麥門冬飲子	
豬膏湯	
豬膏金銀花酒	
豬膏髮煎	
人參白虎湯	方見瀉火門
竹葉石膏湯	方見瀉火門
甘麥大棗湯	
瀉火門	正方五十四 附方四十七
黃連解毒湯	
成方切用	總目
三黃金花丸	梔子金花丸
大金花丸	蘗皮湯
三補丸	梔子蘗皮湯
三黃瀉心湯	三黃丸
附子瀉心湯	
大黃黃連瀉心湯	
半夏瀉心湯	
甘草瀉心湯	生薑瀉心湯
白虎湯	
人參白虎湯	白虎加蒼朮湯

桂枝白虎湯	化斑湯
柴胡石膏湯	
竹葉石膏湯	
又竹葉石膏湯	
白頭翁湯	
甘桔湯	
甘草湯	甘桔防風湯
如聖湯	訶子清音湯
枳桔湯	桔梗湯
又桔梗湯	
成方切用	總目
保陰煎	
滋腎丸	
療腎滋本丸	黃蘗滋腎丸
大補丸	潛行散
升陽散火湯	
火鬱湯	節菴升陽散火湯
抽薪飲	
徙薪飲	
龍膽瀉肝湯	
東垣龍膽瀉肝湯	又龍膽瀉肝湯

清流飲

涼膈散

當歸龍薈丸

化陰煎

瀉青丸 方見祛風門

人參瀉肺湯

瀉白散

黃芩一物湯

東垣加減瀉白散

謙甫加減瀉白散

成方切用

# 總目

第

清金丸

寶鑑加減瀉白散

左金丸

又柴連丸

連附六一湯

瀉心湯

約陰丸

導赤各半湯

消毒犀角飲

蓮子清心飲

服蠶煎

普濟消毒飲

成方切用

總目

美

約營煎

紫雪

碧玉雪

人參清肌散

人參散

白朮除溼湯

石膏散

玉泉散

清骨散

一母散

戊己丸  
抑青丸

元參升麻湯	陽毒升麻湯	消斑青黛散	蒼耳散	辛夷散	玉屑無髮散	腎熱湯	綠豆飲	香連丸	黃連丸	成方切用	雪漿漿	大清飲	除痰門	正方三十一	附方二十一	苓桂朮甘湯	二陳湯	陳皮半夏湯	半夏茯苓湯	二陳加梔連生薑湯	導痰湯	加味二陳湯
										總目								桔梗半夏湯	茯苓半夏湯	砂枳二陳湯	順氣導痰湯	溫中化痰丸
										彙												

三聖丸	生薑半夏湯	潤下丸	二賢散	順氣消食化痰丸	金水六君煎	金沸草散	半夏白朮天麻湯	六安煎	和胃二陳煎	成方切用	括痰丸	礞石滾痰丸	竹瀝達痰丸	清膈煎	茯苓丸	控涎丹	辰砂散	寧志膏	三子養親湯	常山飲	橘皮湯
										總目											
									苓朮二陳煎	罕											



截瘧七寶飲

滌痰湯

星香散

牛黃丸

貝母丸

清肺飲

清氣化痰丸

蘇子降氣湯

定喘湯

七氣湯

成方切用

總目

三因七氣湯

四七湯

白金丸

百花膏

加味百花膏

六君子湯

見治氣門

六味地黃丸

見補養門

八味地黃丸

見補養門

殺蟲門 正方一十

烏梅丸

溫臟丸

集効丸

蠟蟲丸

使君子丸

癩肝丸

掃蟲煎

化蟲丸

消渴殺蟲方

雄檳丸

經帶門 正方二十一 附方七

成方切用

總目

溫經湯

膠艾湯

方見胎產門

柏子仁丸

升陽舉經湯

東垣升陽舉經湯

固經丸

通瘀煎

連附四物湯

四物加芩朮湯

熱六合湯

四物加芩連湯

寒六合湯

聖

氣六合湯	風六合湯
正氣天香散	
調經飲	
毓麟珠	
啟宮丸	
抑氣散	
五物煎	
牡丹皮散	
芎歸六君子湯	
逍遙飲	
成方切用	總目
如聖散	聖
人參荆芥散	
固下丸	
白芷散	
常歸煎丸	
婦寶丹	見理血門
胎產門	正方三十七 附方二十一
膠艾湯	
又方	又膠艾湯
當歸芍藥散	

桂枝茯苓丸	
乾薑人參半夏丸	
橘皮湯	
半夏茯苓湯	
釣藤湯	
當歸貝母苦參丸	
羚羊角散	
天仙藤散	
紫蘇飲	
白朮散	
成方切用	總目
鯉魚湯	罌
竹葉湯	
紫苑湯	
安榮散	
胎元飲	
固胎煎	
涼胎飲	
參朮飲	
表實六合湯	
表虛六合湯	風溼六合湯

升麻六合湯	柴胡六合湯
大黃六合湯	人參六合湯
朴實六合湯	梔子六合湯
石膏六合湯	茯苓六合湯
膠艾四物湯	附子六合湯
四物大黃湯	
當歸散	
達生散	
東胎丸	枳殼散
殿胞煎	
成方切用	總目
豬蹄湯	
當歸補血湯加葱白方	
參朮膏	
黑神散	
九蜜煎	古黑神散
清化飲	
失笑散	
通靈散	
清魂散	
當歸羊肉湯	

當歸生薑羊肉湯	
返魂丹	
免懷湯	
艾附暖宮丸	見理血門
佛手散	見理血門
歸芎湯	見理血門
嬰孩門	正方四十九 附方五
初生拭口法	
甘草下胎毒法	
豬乳法	
成方切用	總目
襁褓法	
乳哺法	
乳兒法	
哺兒法	
雞將護法	
柴歸飲	
升麻葛根湯	方見表散門
疏邪飲	
柴葛煎	
參蘇飲	方見表裏門



痧證初起方

癰瘍門 正方二十六 附方七

早筴丸

早蛤丸

桔梗杏仁煎

腸癰秘方

金銀花酒

回毒金銀花酒

長春藥酒

真人活命飲

成方切用

總目

癰

托裏散

芍藥痰藜煎

當歸痰藜煎

灸法

芙蓉外敷法

見本草從新木芙蓉條

百草煎

蠟礬丸

雄礬丸

托裏十補散

托裏散

托裏溫中散

托裏黃耆湯

蝶蛸散

槐花蕊

棉花瘡點藥

又武定侯方

當歸補血湯加防風連翹方

十全大補湯 方見治氣門

連翹金貝煎

連翹歸尾煎

成方切用

總目

平

降癰散

後方

止痛當歸湯

眼目門 正方一十九 附方六

人參益胃湯

雞子黃連膏

羊肝丸

濟生羊肝丸

圓明膏

兔矢湯

本事方

滋陰地黃丸	消風養血湯	金露散	補陽湯	益陰腎氣丸	駐景丸	加味駐景丸	定志丸	張子和定志丸	地芝丸	成方切用	眞人明目丸	防風飲子	神效明目丸	二百味草花膏	飛絲芒塵入目方	明目六事方	目疾者戒沐頭宜濯足	益氣聰明湯	救急門	六君子加天麻方
				方見補養門						總目			又法					見補養門	正方三十	附方二十三
										至										

四君子加薑汁竹瀝方	獨參湯	五磨飲	火醋熏鼻法	禮拜法	附子理中湯	生脈散加香薷方	脫陽脫陰	縊死	溺死	成方切用	中惡	蠱毒	鹽鹵毒	服鉛粉	蛇蟲犬咬傷	蛇傷三方	壁虎咬	瘋狗咬	湯泡傷
	方見治氣門				方見祛寒門					總目									
										至		礪毒	諸菌草毒及蟲蟻入腹			蜈蚣傷一方	蝎子螫	常犬咬	

又法	刀斧傷	骨哽	魚骨哽	諸骨哽	誤吞銅鐵金銀	吞髮繞喉不出	頰車開不能合	呃逆不止	舌脹滿口	成方切用	乳蛾喉痹	又法	霍亂攪腸痧	鼻衄不止	又方	蟲入耳中	跌打損傷	產婦血暈	產後子腸不收	勿藥元詮	正論二十六	附論四十八
			雞骨哽							總目		又喉閉			又三方							
										聖												

上古天真論	老子論	又老子論	又上古天真論	譚景昇論	又上古天真論	白樂天論	曹真人論	淮南子論	契祕圖論	成方切用	胎息經	張紫陽論	疏五過論	經脈篇	釋氏戒慾論	又上古天真論	又上古天真論	四氣調神論	真氏論	又四氣調神論
										總目										
廣成子論						方揚論	張虛靜論	金丹大要論	呂純陽論	胎息銘	李東垣省言箴	龍虎經	陰陽應象大論							
										聖										

除陽應象大論	吳氏論
又四氣調神論	
藏器法時論	又藏器法時論
又藏器法時論	又藏器法時論
老子論	
又四氣調神論	
扁鵲論齊侯疾	
刺法論	
悟真篇	古歌
晉道成長生養性論	蔣氏調氣篇
成方切用	總目
蘇氏養生訣	李氏十六字訣
彭祖論	
調息	
莊子南華經	王龍溪論
李東垣論	
調息之法	
勞心勞力人須調息以保元氣	
讀書家宜習養生法	醫家尤須愛養精力
小週天	
道經六字訣	

一秤金訣	
金丹祕訣	
按摩導引諸法	
羅先生論	
養生宜節飲食	
瘧疾尤宜節飲	
脾胃爲養生之本	
草頭藥汁不可服	
痰飲痞積等證宜灼艾	
素有溼熱飲食宜清勝	
成方切用	總目
蟲疳酒癰諸病初愈時不可驟服滋補藥	
臥病常存退步心	
眞空寺老僧論鄭子元心疾	
病中不可偏信師巫	
問疾來者勿得與之相接	
病加於小愈	
素不服藥不爲無見	



成方切用卷一目錄

寒痺方

季春痺方

目不暇方

猛疽方

萬氏方

千金三方

心鏡方

敗疵方

成方切用

鼓脹方

范汪方

何大英方

醫鑑方

脾癰方

血枯方

陽厥方

酒風方

尸厥方

五疫方

內經方 靈樞方五 附方六 素問方七 附方五

目錄

一 內經方 卷一

成方切用卷一

內經方

內者性命之道經者載道之書其書乃黃帝與岐伯見東區伯高少師少俞雷公六臣講求而成其方高簡奧妙不易測識今人罕能用之者然既為古聖之神方自不得不錄之以冠於卷首

用醇酒二十觔蜀椒一升乾薑一觔桂心一觔漬酒中浸以綿

絮布巾用生桑炭炙中以熨寒痺所刺之處 靈樞壽夭剛柔

篇 靈樞之體要足謂靈樞按漢藝文志曰黃帝內經十八卷蓋

靈樞九卷素問九卷內經也二經各載八十一篇皆合黃

鐘九九之數而天黃帝曰余聞刺有三變何謂三變 按史記黃

人之道盡乎是矣黃帝曰余聞刺有三變何謂三變 帝姓公孫

名軒轅有熊國君少典之子神農而有 伯高答曰有刺營者

天下都刺之邱以士德王故號黃帝 刺營者刺其陰刺衛者刺其陽

有刺衛者有刺寒痺之雷經者 刺寒痺者溫其經三刺不同故

成方切用 寒痺方

黃帝曰刺三變者奈何伯高答曰刺營者出血刺衛者出

氣刺寒痺者內熱 調經論亦曰取血於營取 黃帝曰營衛寒痺

之為病奈何伯高答曰營之生病也寒熱少氣血上下行 營主

氣也病在陰分則陽勝之故為寒熱往來陰病則陰虛則

無氣故為少氣邪在血故為上下妄行所以刺營者當刺其血

分 衛之生病也氣痛時來時去 佛音 戲音 責響風寒客於腸胃

之中 衛屬陽為水穀之悍氣病在陽分故為氣痛氣無定形故

之病風寒外襲而客於腸胃之間以六 寒痺之為病也雷而不

去時痛而痺不仁 寒痺久留不去則血脈不行或凝滯 黃帝曰

刺寒痺內熱奈何伯高答曰刺布衣者以火焯之刺大人者以

藥熨之 內熱謂溫其經也布衣血氣薄易焯當以火焯之黃

帝曰藥製奈何伯高答曰用淳酒二十觔蜀椒一升乾薑一觔桂心一觔凡四種皆咬咀漬酒中用綿絮一觔細白布四丈并納酒中置酒馬矢燭音中蓋封塗勿使泄五日五夜出布綿絮曝乾之乾復漬以盡其汁每漬必晡音其日乃出乾乾并用洋子與綿絮複音布為複巾長六七尺為六七巾則用之生桑炭炙中以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙中以熨之三十徧而止汗出以巾拭身亦三十徧而止咬咀者謂碎之如咀嚼之又吹去細末然後煎之取其清汁也漬浸也馬矢燭中者燃乾馬屎而燭之也此西北方所常用者塗鹽泥封固也周日也複布為複巾者重布為巾如今之夾袋所以盛出綿絮藥滓也洋相也桑布以生桑炭者桑能利腸節除風寒淫壞諸病也大人血氣清滑故當於未刺之先及刺之後但以藥製則經通汗出而寒痺可除矣

成方切用

寒痹方

二

內經方

風每刺必熨如此病已矣此所謂內熱也刺後起步於密室內中欲其氣血行而膜遇風寒也凡此者皆所謂內熱之法

治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤鉤之

治季春痺 靈樞經筋篇曰足陽明之筋病足中指支脛轉筋

脚跳堅本經之筋起於中指結於膝上邪外上行加於轉骨上結於膝外廉其直者上循肝結於膝也跳者跳動堅者

堅強 伏兔轉筋脾前腫瘰癧瘰癧其直者上循伏兔結於

也 引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開頰筋有

寒則急引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻僻歪斜也其筋自缺盆上

頰頰挾口上合於太陽太陽為目上綱陽明為目下綱故凡目

之不合不開口之急縱至僻者皆足陽明之筋病寒則急而熱則後

治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤

鉤之即以生桑炭置之坎中高下以坐等以膏熨急頰且飲美酒嗽音美炙肉不飲酒者自強也為之三拊音而已馬音馬筋僻乃風中血脈也手足陽明之筋絡於口會太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則通熱於右右中寒則通熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑癢營衛滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痹以通其血脈用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其營衛以通其經絡桑炭能治風痺通節竅以桑鉤鉤之者鉤正其口也復以生桑水炭置之也故以之中高下以坐等者欲其深淺適中便於坐而得其熱也然後以前膏熨其急頰且飲之也雖不善飲亦自強之三拊而已言再三拊其患處則病自已矣

治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰季春痺也足陽明正氣也

成方切用

季春痺方 目不瞑方

三

內經方

伯高曰夫邪氣之客人也或令人目不瞑不臥出者何氣使然

邪氣感人也令人寐無從生故云不臥出也 伯高曰五穀入於胃也其糟粕音津液宗

氣分為三隧音故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脈而行呼

吸焉陰道也精粕之道出於下焦津液之道出於中焦宗氣之

通宗氣而營氣者泌其津液注之於脈化以爲血以榮四末內

行呼吸 注五臟六腑以應刻數焉營氣出於中焦中焦受水穀之氣泌其津液變化以爲血脈外而四肢內

而臟腑無所不至故其運行之數與衛氣者出其悍氣之慄疾

而先行於四末分肉皮膚之間而不休者也晝行於陽夜行於

陰常從足少陰之分間行於五臟六腑衛氣慄疾滑利不能入於脈中故先行於四末

分肉皮膚之間而不休者也晝行於陽常從足太陽始夜行於陰常從足少陰始

今厥氣客於五臟六

眞滿淨冷定不時挑服一匙卽愈又肺後方治五種痼疾用猪脂一觔溫熱服日三當利乃愈千金方治小便不通猪脂一觔

更熱飲則腹鳴辰巳時行一二次皆黑水也次日覺足面漸有

竊又欲一次則漸趨至時上為愈矣。凡鼓脹由停積及淫熱有餘者宜用之。按虛者禁之。吳鶴皋曰：朝實暮急，病從陰化，可入營血。帝曰：其時有復發者何也？脹病多岐，伯曰：此飲食不節，故時有病也。故脹之病本因停滯，雖然其病且已時故，當病氣聚於腹也。言雖是飲食不節，時有病者又有病且已，之後其根未盡，故除病氣重聚於腹亦復焉。

治之以蘭除陳氣也。治脾瘕。素問奇病論帝曰：有病口甘者，病名謂何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾瘕。五氣五化也。瘕，夫五味入口，藏於胃，脾為之行，其精氣津液在脾，故令

人口甘也。津液在脾，脾屬土，其味甘，脾熱則口甘爾。此肥美之所發也。此人必數食甘美而多肥也。肥者，令人內熱，甘者令人成方切用。脾瘕方。六。內經方。

中滿故其氣上溢，轉為消渴。肥者，味厚助陽，故能生熱。甘者，性轉為消渴之病。治之以蘭除陳氣也。蘭草性味甘寒，能利水其氣清香，能生津止渴，潤肌膚，故可除陳積蓄熱之氣。按蘭草俗名省頭草，即澤蘭之一類。二種有以為即山蘭葉，李時珍辨正之詳載本。草從新澤蘭下。

以四烏鰂骨一蘆茹二物合并丸，以雀卵飲以鮑魚汁治血枯。素問腹中論帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩時時前後血病，名謂何？何以得之？支滿者，滿如支脈也。肺主氣，其臭腥，肝主血，其臭臊，肺間腥臊而吐清液也。口中唾血，血不歸經也。四支清，冷氣不升，故周也。頭目眩，運失血多而氣隨血去也。血氣既亂，故於前後陰血不時見而岐伯曰：病名血枯，此得之年少時有所大脫血，月信反無期矣。

若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。血枯者，月水斷絕，有二者：一則以少時有所大脫血，如胎產既多及崩淋吐衄之類，一則以醉後行房，血盛而熱，因熱而從，則金精盡，去則氣去，故中氣竭也。夫腎主閉藏，肝主疏泄，則金精盡而傷肝，及至其久，則三陰俱虧，所以有先見諸證，如上文所云而終必至於血枯，則月事衰少不來也。此雖以女子為言，若丈夫有犯前證，亦不免為精枯之病，則勞損之屬皆是也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸

中及傷肝也。烏鰂，即烏賊也。骨名海螵蛸，氣味鹹溫，而瀉主女。蘭茹，王冰言取其能散惡血，以通經脈，雀卵能令人有子，蘆茹即甘溫，能補益精血，主男子陰痿不起，故可使多精有子。及女子帶下，便溺不利，後飯者，先藥後飯也。鮑魚，即今之淡乾魚也。諸魚皆可為之。惟石首鮑魚者，為勝其氣味，辛溫無毒，魚本水中之物，故其性能入水，滋通血脈，益陰氣，味辛溫無毒，魚本水中女子血開也。以上四藥皆通血脈，血主於肝，故凡病傷肝者亦成方切用。血枯方。內經方。七。

皆可用之。蘇頌曰：本草諸藥，立不治血枯而經法用之，是攻其所生，所起爾時，珍曰：今人知雀卵能益男子陽虛，不知能治女子血枯，蓋雀卵益精血爾。按蘆茹，甲乙經及太素新校正李氏，均曰俱作蘭茹，獨張景岳以為即茜草也。以茜草一名茹，蘆能止血，治崩漏，又能活血通經，脈也。存之以備參考。

以生鐵洛為飲治陽厥。素問病能論帝曰：有病怒狂者，此病安生？怒狂者，多怒而狂也。岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，暴折而難決，故善怒也。病名曰陽厥。善怒而狂，三陽之氣厥逆，上行故名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者，常動，巨陽少陽不動，而動大疾，此其候也。陽明常動者，謂如下關地會大迎，人迎氣衝衝陽之類，皆有也。脈常動者，也。巨陽少陽不動者，謂巨陽惟委中，少陽惟聽會，懸鐘其脈雖微動，而不甚也。於其不甚動者，而帝曰：治動且大疾，則其常動者更甚矣。此則陽厥怒狂之候。

卽已五味入口而化於脾食入於陰也藏於胃以養五臟氣長氣於陽也食少則氣衰故節奪其食不使胃火復助陽邪

則陽厥怒狂者可已使之服以生鐵洛爲飲夫生鐵洛者下氣疾也生鐵洛者

卽爐冶間錘落之鐵屑用水研浸可以爲飲其屬金其氣寒而

中用鐵精鐵華粉鐵砂

以罌寫乳各十分麝釵五分合以三指最爲後版台酉風素

問病能論帝曰有兩身熱解竟干出叩谷惡風少氣此爲可兩

問病能言曰不病身矣解慳沽口如涸惡風少氣血爲何病  
皮角曰病名曰酒風此卽風論中所謂漏風也酒乃麴藥釀

順得熱而蒸故多汗多汗則氣壅泄而衛氣不固故

帝曰治之奈何

岐伯曰以澤瀉朮各十分麋衡五分合以三指撮爲後飢

成方切用  
卷一

微銜一名無心草南人呼爲吳風草卽鹿銜草蓋麋鹿一類也

指用三指撮合以約其數而爲前劑也飯後藥先故曰後飯

翳其左角之髮方一寸燔治飲以美酒治尸厥素問繆刺論

曰邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上

絡左角邪客於手少陰心經足少陰腎經手太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經此五絡皆會於耳中上絡於左耳之

五絡俱竭，令人身脈皆動，而形無知也。其狀若尸，故曰尸厥。

五絡俱竭陰陽離散也身脈皆動筋惕肉瞤刺其足大指內則

也上丁臨陽逆氣陽氣無知故名曰臨  
 下甲上去端即匪集足太陰之井後則足心足少陰之井後則

足中指爪土各一青足陽明之井厲兌穴也後列三大指四

足口指月一各一痛。有委偉二音刺癢也。後刺手力指內

側去竝女圭棄少商穴也 後刺手心也上文五絡未及手

心主而此刺之和胸中也少陰銳骨之端各一疔立已謂神門穴手少陰之脰也不已以竹管吹其兩耳以小竹管納對耳孔用力吹之勿令氣泄所以溫助五絡氣可復通也○新校正云按陶隱居謂吹其左耳極三度復吹其右耳三度也鬚其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者灌之立已鬚剃同左角之髮五絡之血餘也燔治燒製爲末也飲以美酒助藥力行血氣也補以其類故可使尸厥立已

目專易無問之、司代目以下地故發口訂訂排不用多、皆

相傳易無問大小病狀相似不施救療如何可得不相移易

不用移易者謂欲禁止其傳染也岐伯曰不相染者正氣內存

邪不可干避其毒氣天牝從來復得其往氣出於腦卽不邪干

天牝鼻也鼻受天之氣故曰天牝老子謂之玄牝是亦此義氣

成方切用  
五癭方  
九  
卷內經方

得其往也蓋以氣通於鼻鼻連於腦中流布諸經令人相染矣

氣出於腦爲噓或張鼻泄之氣出於腦卽先想心如日日爲太陽之氣

應人之心想心如日卽所以存吾  
之氣壯吾之神使邪不能犯也

肝而出左行於東化作林木心之所至氣必至焉故存心之則

化作林木之狀  
所以土氣見  
次想白氣自  
肺而出右行  
於西北作戊  
甲所以

次思赤氣自心而出南行於土北作燄月所以壯火思黑氣

也。三林。亦。翁。目。下。比。年。行。放。一。作。何。節。明。心。氣。也。三。林。黑。翁。自。賢。而。出。比。行。於。下。比。年。以。壯。心。思。黃。氣。目。卑。而。出。子。太。

自臂而出行於下作力腎氣也次想黃氣自臍而出存於

中央休作土脾氣也五氣護身之軍以想頭上如北斗之燐燐

然後可入於癰室染最速故當謹避之如此又一法於立春之

日日未出而吐之有言上焦受風去心以水煎之飲二盞吐之不瘳又一法於雨水日

後三浴以藥泄汗謂以祛邪滯之藥前湯三浴以泄其汗也又一法小金丹方辰砂二兩水磨雄黃一兩葉子雌黃一兩紫金半兩以金箔同研之可爲細末同人合中外固了地一尺築地實不用爐不須藥制用火二十觔煅之也七日終常令火不斷候冷七日取次日出合子埋藥地中七日取出順日研之三日煉白沙蜜爲丸如梧桐子大每日望東吸日華氣一口冰水下一丸和氣嚥之服十粒無疫干也合子即磁罐之屬順日研之謂左旋也。按此遺篇之言乃出後人增附法非由古未足深信。避疫之法必節慾節勞仍勿忍飢以近其氣自可無慮

成方切用

五疫方

十

內經方  
卷一

成方切用卷二目錄

治氣門 正方二十三 附方二十七

栝樓薤白白酒湯

栝樓薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

四獸飲

十味人參散

又六君子湯

七味白朮散

三白湯

六神散

八珍湯

成方切用

目錄

十全大補湯

大防風湯

溫經益元散

補中益氣湯

益胃升陽湯

升陽順氣湯

參朮益胃湯

調中益氣湯

調營養衛湯

順氣和中湯

補中益氣加黃蘗生地湯

代赭旋覆湯

升陽益胃湯

補脾胃瀉陰火升陽湯

治氣門  
卷二



不取消痰下氣而意實不同於治飲也故細分寸口凡通者約略言其脈之在陽者為微細及關上小緊數者約略言其脈之在陰者為弦當取太過不及者約略之辭也今以陰陽繁審關前關後使人認定上焦陽虛而胸痹一證與支飲痰飲等病因治法判然矣○彼支飲云飲逆倚息氣短不得臥其形如腫此胸痹云喘息欬唾胸背痛短氣彼邪重故不得臥此虛故前後胸背應痛是大別異

### 栝蒌薤白三白酒

此上焦膈中藥也膈中兩乳中間經曰膈中者臣使之官喜樂出焉喻嘉言曰胸中

陽氣如離照當空曠然無外設地氣一上則窒塞有加故知胸痹者陰氣上逆之候也仲景微則用薤白白酒以益其陽薤葉光滑露亦難貯故曰薤露其性滑泄能通氣滯故胸痹下重並用之甚則用附子乾薑以消其陰世醫不知胸痹為何病習用豆蔻木香訶子三稜神麝

### 成方切用

栝蒌薤白白酒湯

二 治氣門

麥芽等藥坐耗其胸中之陽亦相懸矣

加半夏名栝蒌薤白半夏湯金匱治胸痹不得臥心痛徹背

可曰胸痹而加以不得臥此支飲之兼證又心痛徹背支飲原不痛飲由胸痹而痛應背故即前方加半夏以去飲下逆○此條若無心痛除白酒加枳實厚朴桂枝名枳實薤白桂枝湯

治胸痹心中痞氣結在胸胸滿脇下逆搶心徐忠

胸痹而加以心中痞胸滿似病與結胸之象乃上焦陽微而容氣動膈也註云雷氣結在胸即客氣也更脇下逆搶心是不獨上焦虛而中焦亦虛陰邪得以據之為逆為搶故於薤

白栝蒌又加枳朴以開其結枝行陽以疏其肝又曰人參湯亦主之者病由中虛去其太甚即可補正以化邪也胸痹

之虛本陽氣微非營氣虛也陽無取乎補宣而通之即陽暢暢則陽盛矣故薤白方以行陽為主不取補也此日人參

湯等分而用

乾薑者爾

### 四君子湯

治一切陽虛氣弱脈來虛軟脾衰肺損飲食少思體瘦而黃或痰白皮聚毛落言語輕微四肢無力及脾胃不和洩痢虛飽

人參 白朮土炒 茯苓錢 甘草錢 加薑棗

人參甘溫大補元氣為君白朮苦溫燥脾補氣為臣茯苓甘淡滲溼瀉熱為佐甘草甘平和中益土為使氣足脾運飲食

倍進則餘臟受蔭而色澤身強矣

加陳皮以理氣散逆名異功散錢氏調理脾胃再加半夏以燥

溼除痰名六君子湯治脾胃氣虛飲食不進致成痰癖不時

### 成方切用

四君子湯

三 治氣門

欬唾或胃氣虛寒動成嘔惡凡虛癯及諸病後惟真陰虧損者大忌用此

培土之劑加香附砂仁名香砂六君子湯治虛寒胃痛或腹

痛泄瀉六君子加竹瀝麥冬治四肢不舉脾主四肢六君子加烏

梅草果等分薑棗煎名四獸飲三因和四臟以輔脾故名治五臟氣虛七

情兼併結聚痰飲與衛氣相搏發為瘧疾亦治瘡癰六君子

加柴胡葛根黃芩白芍名十味人參散治虛熱潮熱身體倦

怠加黃耆山藥亦名六君子湯為病後調理助脾進食之劑

加棗仁炒治振悸不得眠胡治加薑汁竹瀝治半身不遂在

右者屬氣虛亦治痰厥暴死加木香藿香乾葛名七味白朮

散錢氏治脾虛肌熱泄瀉虛熱作渴參朮乾葛皆能生津楊仁齋再加五



味柴胡治消渴不能食除人參加白芍名三白湯調理內傷

外感治虛煩或渴或泄加山藥藕豆薑棗煎名六神散

治小兒表熱去後又發熱者世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或謂不治此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再熱非熱證也宜此湯加梗米和其胃氣則收陽歸內而身涼矣挾寒者加肉桂兼陰虛加四君合四物名八珍湯治氣血兩虛及胃損飲食不為肌膚若傷之重者真陰內竭虛陽外鼓諸證蜂起則於四物四君之中又加黃耆以助陽固表加肉桂以引火歸元名十全大補湯

金匱曰虛者上補勿一瀉之此湯是也 十全大補加防風為君再加羌活附子杜仲牛膝名大防風湯治鶴膝風十全大補去川芎加陳皮名溫經益元散

治汗後頭眩心悸筋惕肉瞤或成方切用 四君子湯 補中益氣湯 四 治氣門 卷二

汗出不止或下後下利不止身體疼痛

太陽宜汗汗多則亡陰故有下利身痛之證

補中益氣湯 東垣

治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食脈洪大而虛氣短而渴或陽虛自汗

宜本湯加麻黃根浮小或氣虛不能舉

元致瘧痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足之證

諸體皆稟氣於脾胃饑飽勞傷其脾胃則眾體無以稟氣而皆病矣陽氣下陷則陰火上乘故熱而煩非真熱也頭者諸陽之會清陽不升則濁氣上逆故頭痛其痛或作或止非如外感常痛不休也陽虛不能衛外故惡寒自汗氣虛故懶言脾虛故惡食脾胃虛則火上干肺故短氣火冠金不能生水故渴脾虛不能升舉則降多而升少致清陽下陷則為瀉痢正虛邪陷則瘧不止李東垣內傷外感辨傷於飲食勞役七情六慾為內傷傷於風寒暑溼為外感內傷發熱時熱

昨止外感發熱熱甚不在內傷惡寒得暖便解外感惡寒雖厚衣烈火不除內傷惡寒不惡風反惡陰風外感惡風見風便惡內傷內傷痛年痛年止外感頭痛連痛無休待表邪傳裏方罷內傷有溼或心火乘肺亦作燥渴外感須二三日外表邪傳裏口力作渴內傷則熱傷氣燥渴外感無力倦怠嗜臥外感則風傷筋寒傷骨一身筋骨疼痛內傷則短氣不足以息外感則喘喘氣盛有餘內傷則手熱外感則手背熱天氣通於肺鼻者肺之外候外感傷寒則鼻塞傷風則流涕然能飲食口知味腹中和二便如常地氣通於脾胃者脾之外候內傷則懶言惡食口不知味小便黃赤大便或秘或泄內傷證不足宜溫宜補宜和和感證屬有餘宜汗宜吐宜下若內傷證作外感發其表重虛元氣禍如反掌故宜補中益氣湯主之又有內傷發熱急此湯唯上焦痰壅中焦濕熱傷食腦滿者不宜服陰虛發熱者宜養陰忌服此湯宜遵丹溪及養榮之法若陰虛兼外感者宜用補陰益氣煎等

黃耆 錢半 人參 甘草 炙 白朮 土 陳皮 醋 當歸 五 升 麻

成方切用

補中益氣湯

五

治氣門

柴胡 三 薑三片 棗二枚 東垣原方黃耆止有一錢其餘各歸一錢陳皮七分升柴五分如病甚者參耆錢半白朮當歸錢加用○東垣取輕清上升故數分少立齋每以濟危急故隨證加多○高鼓峰曰凡六經內傷感證及暑月勞倦發熱汗出不止者但用本方加白芍一錢病疾腹痛已除瀉瀉未止是脾氣下陷也加酒炒白芍三錢瘧疾發久形體羸瘦未中者瘧飲者加半夏一錢或內有火熱可加黃芩一錢凡婦女胎前氣虛以致胎動不安小產崩漏或產後血虛發熱但加酒炒白芍二錢此方凡婦中宮虛損病後失調無不相宜倪氏曰七情內傷脾胃先

如血不足加當歸精神短少加

人參五味肺熱欬嗽去人參乾噎加葛根 風藥多燥葛根獨升胃中清氣入 頭痛加蔓荊子痛甚加川芎腦痛加藁本細辛風溼相搏一身盡痛加羌活防風有痰加半夏生薑胃寒氣滯加青皮蔻仁木香益智腹脹加枳實厚朴木香砂仁腹

痛加白芍甘草熱痛加黃連能食而心下痞加黃連咽痛加  
桔梗有寒加肉桂溼勝加蒼朮陰火加黃蘗知母陰虛去升  
柴加熟地山茱山藥大便祕加酒煨大黃欬嗽春加旋覆款  
冬夏加麥冬五味秋加麻黃黃芩冬加麻黃不去根節天寒  
加乾薑泄瀉去當歸加茯苓蒼朮益智如冬月惡寒發熱無  
汗脈浮而緊加麻黃若脈浮而緩有汗加桂枝芍藥東垣此  
方原為  
感證中  
有內傷  
一種故  
立此方  
以補傷  
寒書之  
所未及  
非補  
虛方也  
今感證  
家多不  
敢用而  
以為調  
理補虛  
服食之  
藥則  
謬矣調  
理補虛  
乃通  
其意而  
轉用之  
者爾

肺者氣之本黃耆補肺固表為君脾者肺之母土能生金脾  
胃一虛肺氣  
絕人參甘草補脾益氣和中瀉火為臣東垣曰參耆甘草瀉  
火之聖藥蓋煩勞則  
虛而熱自退故亦謂之瀉

成方切用

補中益氣湯

六

治氣門

為佐補陽宜兼和陰  
不然則已亢升麻以升陽明清氣右升而復  
其本位柴胡以

升少陽清氣左旋而  
上行陽升則萬物生清升則濁陰降加陳皮

者以通利其氣陳皮同補藥則  
補獨用則瀉脾生薑辛溫大棗甘溫用以和

營衛開腠理致津液諸虛不足先建其中中者何脾胃是也

東垣曰脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其大  
肺氣受邪須多用黃耆而人參甘草次之脾胃一虛肺氣先  
絕故用黃耆以益皮毛而固腠理不令自汗上喘氣短故以  
人參補之中心火乘脾用炙甘草溫以瀉火熱而補脾元若脾  
胃急痛並大虛腹中急縮宜多用之中滿者減之白朮苦甘  
溫除胃中之熱利腰膝開胃中清氣在下必加升麻柴胡  
以升之引參耆甘草甘溫之氣味上升以補胃氣之散而實  
其表又緩帶脈之縮急氣亂於中清濁相干用去白陳皮以  
理之又助陽氣上升以散滯氣脾胃氣虛為陰火傷其生發  
之氣營血亦虧血減則心無所養致令心滿而煩病名曰悅

成方切用

補中益氣湯

七

治氣門

故用甘辛微溫之劑生陽氣若虛煩不寧者增人參補之陽  
旺則能生陰血或增當歸和之少加黃蘗以救腎水鴻陰中  
伏火如煩猶不止少加生地補腎水水旺則心火自降李士  
材曰虛人感冒不止少加散散者此方可以代之東垣曰肌熱者  
表熱也服此湯一二劑得微汗則已非正發汗乃陰陽氣和  
自然汗出也○凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒  
多用補中益氣湯氣虛者四君子加發散藥血虛者四物湯  
加發散藥東垣治風溼無汗者用神朮湯有汗者用白朮湯治  
木蒼朮海藏治風溼無汗者用神朮湯有汗者用白朮湯治  
剛瘧神朮湯加羌活黃芩治柔瘧白朮湯加蒼朮治心治中  
渴脈弦細者用黃耆湯此皆非仲景成法然對證則可  
用亦不可廢也明證雖著云發熱有數種治法各不同仲景論  
傷寒傷風此外感也故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義  
也感於寒令之月即時病發故用辛熱以勝寒如春溫之月  
則當變以辛涼之藥夏暑之月即當變以甘苦寒之藥又有  
冬溫此天時不正陽氣反泄用藥不可寒涼又有寒疫卻在  
溫熱之時此陰氣反逆用藥不可寒涼又有瘧疾沿門閭巷  
相似者此天地之厲氣當隨時令參氣運而治宜辛涼甘苦  
寒之藥以清熱解毒若夫飲食勞倦為內傷元氣則真陽下  
陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用甘溫之藥大補其

氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足也又有勞心好色  
內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而為虛熱是謂陰虛火旺  
勞瘵之證故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物加知母補  
其陰而火自降此用血藥以補血之不足也又有夏月傷暑  
之病雖屬外感卻類內傷東垣所謂清暑益氣是也又有因  
暑傷人因食涼而致之病治宜辛熱解表辛溫理中之藥御  
與傷寒治法相類者也外感之與內傷傷寒病之與熱病氣虛  
之與血虛如冰炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣  
讀東垣書而不讀丹溪書則陰虛不明而傷人多矣東垣脾  
胃論深明饑飽勞傷發熱等證俱是內傷悉類傷寒切戒汗  
下以為內傷多而外感少只須溫補不必發散如外感多內  
傷少溫補中少加發散以補中益氣為主如內傷兼寒者加  
麻黃兼風者加桂枝兼暑者加黃連兼溼者加羌活黃芩乃萬  
世無疆之利此東垣特發陽虛發熱之一門也然陰虛發熱  
者十之六七亦類傷寒今人一見發熱無不通用其散發散  
而斃則曰傷寒之法已窮子嘗於陰虛發熱者見其大熱面  
赤口渴煩躁與六味地黃湯一大劑即愈如下部惡寒足冷  
上部渴甚躁極或飲而反吐即加肉桂五味甚則加附子冷

飲以此活人多矣此丹溪發明陰虛發熱之外尚遺未盡之旨也張景岳曰補中益氣湯之用原以治勞倦內傷發熱等證雖曰為補氣也非發汗也然實有不散而散之意故於勞倦感寒或氣虛痰喘及脾氣下陷等證則最所宜也若全無表邪寒熱而但有中氣虧甚者則升柴之類大非所宜蓋以升柴味皆苦寒性專疏散雖曰能引清氣上升然邪有邪者固可因升而散之使或無邪能不因散而愈耗其中氣乎即曰此湯以補劑為主而唯藉升柴以引達清氣不知微虛者猶可出入大虛者必難假借當此之時即純用培補猶恐不及而再兼疏泄安望成功且凡屬補氣之劑無不能升正以陽主升也其升而不散者其散斯得補陽之大法又奚必升柴之是賴乎故於諸證之中凡其不宜用此者則有不可不察如表不固而汗不斂者不可用外無表邪而陰虛發熱者不可用陽氣無根而格陽發熱者不可用脾肺虛甚而氣促似喘者不可用命門火衰而虛寒泄瀉者不可用肺虛火亢而吐血衄血者不可用四肢厥逆而陽虛欲脫者不可用總之元氣虛極者不可用四散陰陽下竭者不可用升火虧敗者不可用清涼今人但知補中益氣湯可以補虛一槩倚之而不知病當緊急則此時幾微關係判於一舉指之間而纖微不可紊誤者正此類也

成方切用

補中益氣湯

八

治氣門

加炒芩神麴名益胃升陽湯治婦人經水不調或脫血後食

少水瀉東垣曰脫血益氣古聖之法也故先補胃以助生發之氣去白朮加草薢神麴半

夏黃蘗名升陽順氣湯治飲食勞倦所傷滿悶短氣不思食

不知味時惡寒東垣曰升麻柴胡味薄性陽引脾胃清氣行於實腠理使衛外為固凡補脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也又曰但言補之以辛甘溫熱之劑及味之薄者諸風藥是也此助春夏之升浮者也此便是溫秋收冬藏之藥也

在人之身乃肝心也但言瀉之以酸味寒涼之劑並淡味滲泄之藥此助秋冬之沉降者也此便是溫春生夏長之藥也

在人之身肺腎是也吳鶴皋曰升柴辛甘升其清升則陽氣順矣藥皮苦寒降其濁濁降則陰氣順矣參耆當歸甘草

補其虛虛補則正氣順矣半夏陳皮利其膈膈利則痰氣順矣豆蔻神麴消其食

食消則穀氣順矣加蒼朮倍分半夏黃芩益智各三分名

參朮益胃湯治內傷勞倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃除

參朮益胃湯治內傷勞倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃除

當歸白朮加木香蒼朮名調中益氣湯治脾胃不調胸滿肢

倦食少短氣東垣曰不知味及食入反出加白芍五味亦名調中

益氣湯以上俱治氣虛多汗餘治同前本方純用甘溫所謂

此加白芍五味之酸以收耗散之氣有發有收此東垣別開一路以廣補中之妙者乎

加羌活防風細辛川芎名調營養衛湯治勞力傷寒頭痛身熱惡寒微渴

汗出身痛脈浮無力加白芍細辛川芎蔓荊名順氣和中湯

實治清陽不升頭痛惡風脈弦微細加黃蘗生地名補中益

氣加黃蘗生地湯治陰火乘陽發熱晝甚自汗短氣口渴無

味

代赭旋覆湯 仲景

成方切用

補中益氣湯

代赭旋覆湯

九

治氣門

治傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣未除汗吐下後

痞氣弱而不和虛氣上逆故痞鞭噫氣即俗所謂噯氣也并善治反胃噎食氣逆不降

旋覆花 甘草 兩半 夏半 人參 兩二 代赭石 兩一 生薑 兩五 大棗 二十枚

喻嘉言曰此亦伏飲為逆但因胃氣虧損故用法以養正而

兼散餘邪大意在噯氣不除上既心下痞鞭更加噯氣不除

則胃氣上逆全不下行有升無降所謂弦絕者其聲嘶土敗

者其聲嘶也故用代赭領人參納氣歸元海以鎮安其逆微

加散邪滌飲而痞自開爾成氏曰噯則氣堅旋覆之類以輕

逆辛者散也生薑半夏以散其邪散其邪者散也人參大棗

甘草之甘以補胃弱約其汗以病解後痞鞭噯氣不下利者用

此湯下利者生薑瀉心湯活人云有旋覆代赭證或欬逆氣虛者先服四逆湯胃寒者先服理中湯後服此湯為良

升陽益胃湯 東垣

治脾胃虛弱怠惰嗜臥時值秋燥令行溼熱方退體重節痛口苦舌乾心不思食食不知味大便不調小便頻數兼見肺病瀝漸惡寒慘慘不樂乃陽氣不升也

黃耆二兩半 甘草 人參 白朮 羌活 獨活 防風

五錢以其秋旺陳皮四錢 白朮 茯苓 小便利不澤瀉勿用故以辛溫瀉之

柴胡三錢 黃連二錢 每三錢薑蜜煎 此方殊為不合

六君子助陽益胃補脾胃之上藥也加黃耆以補肺而固衛芍藥以斂陰而調營羌活獨活防風柴胡以除溼痛羌活除

芍藥以斂陰而調營羌活獨活防風柴胡以除溼痛羌活除

成方切用 升陽益胃湯 十 治氣門

而升清陽茯苓澤瀉以瀉溼熱而降濁陰少佐黃連以退

陰火補中有散發中有收使氣足陽生自正旺而邪服矣東

曰此治脾胃兼肺病也何故秋旺用參朮芍藥之類反補脾

為脾胃虛則肺病受病故因時而補易為力也又曰子病脾

胃久衰一日體重肢節痠痛大便泄下小便閉塞思內經

云在下者因而竭之是利小便也又治諸瀉小便不利者

先分利之治溼不利小便非其治也當用淡滲之劑又思聖

人之法雖布在方策其未盡者以意求之今寒溼客邪自外

入裏而甚暴若用淡滲以利之病雖即已降之又降復益

其陰而重竭其陽也治以升陽風藥是為宜爾羌活獨活

麻黃胡各一錢防風各五分一劑而愈大寒溼之

勝風以平之又曰下者舉之聖人之法舉一可知百矣東垣

又曰藥中但凡澤瀉茯苓木通通草淡味滲洩之類皆

從時令之旺氣以泄之而水通則金水之不足也或成小

便已數肝腎不受邪者而誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先

損其兩目也又云虛損者而誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先

化也胃中溼勝而成瀉瀉助中助脾助風勝以克之又是升陽助胃氣上行之法也

補脾胃瀉陰火升陽湯 東垣

治飲食傷胃勞倦傷脾火邪乘之而生大熱右關脈緩弱脾或弦木尅或浮數東垣曰溼熱相合陽氣日虛不能上升脾

惟瀉陰火升陽氣用味薄風藥升發則陰不病而陽氣升矣

黃耆 蒼朮 甘草 羌活 獨活 升麻 柴胡 黃連 酒炒

黃芩 人參 錢七 石膏 長夏用 每服三錢或五錢

柴胡升麻羌活助陽益胃以升清氣人參蒼朮黃耆甘草益

氣除溼以補脾胃黃芩黃連石膏涼心清熱以瀉陰火東垣

乃脾之剛脾乃胃之柔飲食不節則胃先病脾無所稟而後病勞倦則脾先病不能為胃行氣而後病胃為十二經之海

成方切用 補脾胃瀉陰火升陽湯 十 治氣門

脾胃既虛十二經之邪不一而出假令不能食而肌肉削此

本病也右關脈緩而弱本脈也或本脈中兼見弦脈證中或

見四肢滿悶淋瀝便難轉筋一二證此脾胃兼肝病也當加

風藥以瀉之脈中兼見洪大證中或見肌熱煩熱面赤肉消

一二證此脾胃兼心病也當加瀉心火之藥脈中兼見浮滑

證中或見短氣氣上喘欬痰盛皮澀一二證此脾胃兼肺病

也當加泄肺及補氣之藥脈中兼見沉細證中或見善欠善

恐一二證此脾胃兼腎病也當加瀉腎水之浮及瀉陰火之

藥蓋百病皆從脾胃生也處方者當從此法加時令藥

橘皮竹筴湯 金匱

治久病虛羸嘔逆不已 胃寒則嘔胃熱亦嘔有停痰有積飲

者 亦治吐利後胃虛嘔逆 皆作嘔此為久病虛火上逆而乾嘔

橘皮 竹筴 升二 甘草 兩 人參 一 生薑 半 大棗 三十

徐忠可曰此胃虛而沖逆為嘔然非真元衰弱之比故以參

甘培口中元氣而以橘皮竹筴一寒一溫下其上逆之氣以  
薑棗宣其上焦使胸中之陽漸暢而下達謂上焦固受氣於  
中焦而中焦亦稟承於上焦上焦既宣則中氣自調也加半  
夏麥冬赤茯苓枇杷葉亦名橘皮竹筴湯

丁香柿蒂湯 嚴氏

治久病呃逆因於寒者 呃在中焦穀氣不運其聲短小得食  
等長大不食亦然為胃呃久呃則胃腎俱寒者為多此病有  
因於阻滯者有因於虛者有因於火鬱者有因於胃實失下者  
此皆屬實有因於中氣大虛者有因於火鬱者有因於胃實失下者  
者此皆屬虛寒熱虛實治法不一古方以此湯治寒呃

丁香 柿蒂 人參 生薑 一方加陳皮半夏茯苓甘

草良薑

成方切用

丁香柿蒂湯

主

治氣門

丁香泄肺溫胃而暖腎生薑去痰開鬱而散寒柿蒂苦澀而  
降氣人參所以輔真氣使得展布也 朱丹溪曰人之陰氣因  
火直沖清道而上作呃逆古人以為胃寒用丁香柿蒂不能  
清痰利氣惟助火而已李時珍曰朱氏但執以寒治熱矯枉  
之過矣按古人治陰呃每用桂附乾薑吳茱萸丁香茴香諸辛  
熱藥多有收效者治陽呃用橘紅竹筴湯玉機微義曰呃逆  
本由陰氣已虛陽火暴甚直衝而上出於胃入於肺而作聲  
東垣用涼藥者所以瀉熱降火也若陰證呃逆以陰氣先消  
陽火亦竭浮於胸中亦欲散也故不用寒藥而反以溫  
藥養胃蓄其陽氣胃氣和則愈陽生則陰長之說也

除人參生薑加竹筴橘紅名丁香柿蒂竹筴湯又名橘紅竹  
筴湯治陽呃 或問治陽呃者何以不用知藥吳鶴皋曰此少  
之若知藥味厚則益壯其氣也故用柿蒂竹筴之味薄者土  
寒不益甚乎古人蓋深權之矣 除人參生薑亦名丁香柿  
蒂湯 嚴氏 寶鑑去人參加青皮陳皮三因去人參加良薑甘草

名丁香散

四磨湯 嚴氏

治七情氣逆上氣喘急妨悶不食 怒則氣上思則氣結憂愁  
輕則上氣喘 急滿悶妨食 不已氣多厥逆重則眩仆

檳榔 沉香 烏藥 人參 等分濃磨煎三四沸溫服

一方人參易枳殼一方去參加枳實木香白酒磨名五磨飲

治暴怒卒死 名曰 氣厥

氣上宜降之故用檳榔沉香 檳榔性如鐵石沉香入 氣逆宜

順之故用烏藥加入人參者降中有升瀉中帶補恐傷其氣也

舉元煎 景岳

成方切用

四磨湯

舉元煎

獨參湯

主

治氣門

治氣虛下陷血崩血脫亡陽垂危等證有不利於歸熟等劑  
而但宜補氣者以此主之

黃耆 人參 炙甘草 白朮 炒 甘草 炙 升麻 炒 五 如兼陽氣

虛寒者桂附乾薑隨宜佐用如兼滑脫者可加烏梅二箇或

文蛤七八分

獨參湯

諸虛氣弱脈微危急及大失血者此方主之 血脫者須益其  
不能速生無形之氣所有痰者加薑汁煩躁者加童便 虛而  
當急固陽生則陰長也 或竹瀝 煩躁者加童便 有火  
身寒者加附子  
人參得天地沖和之氣以成形故用之以補沖和之氣使其

一息尚存則可以次第而療諸疾是以病之危急而虛者良醫以氣爲首務也

卷之四

獨參湯

一可

治氣門

成方切用卷三目錄

理血門 正方二十一 附方三十四

四物湯

知藥四物湯

滋陰降火湯

坎離丸

二連四物湯

三黃四物湯

三黃補血湯

元戎四物湯

治風六合湯

補肝丸

治氣六合湯

神應養真丹

防風當歸散

四神湯

艾附暖宮丸

成方切用

目錄

婦寶丹

歸芎湯

生地黄連湯

玉燭散

抵當湯

抵當丸

代抵當丸

桃仁承氣湯

桃仁承氣對子

蒼朮地榆湯

芍藥地榆湯

芍藥湯

導滯湯

秦艽白朮丸

秦朮當歸湯

秦艽羌活湯

秦艽防風湯

秦艽蒼朮湯

麻黃人參芍藥湯

當歸補血湯

槐花散

加減四物湯

槐角丸

又槐花散

當歸和血散

欬血方

龍腦雞蘇丸

成方切用

三

上

卷三

犀角地黃湯

加味犀角地黄湯

歸脾湯

酸棗仁湯

人參養營湯

養心湯

還元水

迴輪酒

獨聖散

清咽太平丸

小薊飲子

復元羌活湯

補陰益氣煎

四生丸

當歸六黃湯

成方切用

目錄

—

門

成方切用卷三

理血門

人有陰陽即為血氣陽主氣故氣全則神旺陰主血精血  
 盛則形強人生所賴惟斯而已蓋其源而後生於心  
 七竅之靈為四肢之用為筋骨之液得此以通行二陰  
 至滋臟腑安神魂潤顏色充營衛津液得以通於此血  
 以條暢凡形質所在無非血之用也人有此形惟賴此血  
 故血衰則形萎血敗則形壞矣然血化於氣而氣於陰陽  
 虛則不能生血所以血宜溫而不宜寒氣則能傷陰  
 所以血宜靜而不宜動此血虛而用之藥皆能察其精義  
 而治得其宜又何血指之不足也然血虛者宜補血之  
 黃血虛者宜生血之藥如黃芩芍藥歸身地黃等藥  
 熱所宜補仁紅花蘇木丹皮血熱所宜清乳香沒藥五靈脂  
 漆香花白芷血瘀而痛所宜丹參益母草酒黃連所宜  
 川芎白芷血陷所宜棕灰髮灰白芨烏梅倍子血滑所宜  
 乳酪酥油柏子仁從蓉血燥所宜龜板血寒所宜人參白  
 朮黃耆甘草氣虛不能生血及不能攝血所宜荷能補類  
 成方切用 四物湯 而長之可以應 無窮之變矣

四物湯

治一切血虛及婦人經病 月經先期為熱後期為寒為虛為  
 必從陽故其色紅上應於月其行有常故名曰經為氣之配  
 因氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯行後作痛者  
 氣血俱虛也色淡亦虛也錯經妄行者氣之亂紫者氣之熱  
 黑則熱之甚也今人見紫黑作痛成塊率指為風冷乘之而  
 用溫熱之劑禍不旋踵矣經曰亢則害乘乃制熱極則乘水  
 化所以熱則紫甚則黑也若曰風冷必須外得設或有之十  
 不一二也玉機微義曰寒則凝而 不行既行而紫黑故知非寒也

當歸酒

錢三芍藥二錢 如涼血心加黃連肝條芩

肺枯芥大腸實芥膽黃連腎膀胱黃蘗脾生地胃大黃三焦  
 地骨心包絡丹皮小腸梔子木通如清氣心與包絡加麥冬

肺枳殼肝柴胡青皮脾白芍胃乾葛石膏大腸三焦連翹小

腸赤茯苓滑石琥珀血虛加龜板血燥加人乳血瘀加桃

仁紅花韭汁童便行之暴血加薄荷元參散之血不止加炒

蒲黃京墨久不止加升麻引血歸經婦人經血紫黑脈數為

熱加芩連血淡脈遲為寒加桂附人肥有痰加半夏南星橘

紅人瘦有火加黑梔知母黃蘗鬱者加木香砂仁蒼朮神麴

瘀滯加桃仁紅花延胡肉桂氣虛加參耆氣實加枳朴以上

時加用法 當歸辛苦甘溫入心脾生血為君生地甘寒入心腎滋血為

臣芍藥酸寒入肝脾斂陰為佐芩薤辛溫通上下而行血中

成方切用

四物湯

二 理血門

之氣為使也 川芎入厥陰心包肝經上行頭目下行血海玉  
 散能行血滯於氣也地黃血中之氣藥也通腎經性味甘寒能  
 補真陰之虛也當歸血中主藥也通肝經性味甘辛能  
 和血治血虛腹痛也此特血病而求血藥之屬者也若氣虛  
 血弱又當從長沙血虛以人參補之陽旺即能生陰血也丹  
 溪治陰虛發熱於血藥四物湯亦分陰陽血之動者為陽歸  
 芍不用血之靜者為陰地黃主之血之陰不足雖芍歸辛溫  
 亦不用血之陽不足雖地黃主之血之陽不足雖芍歸辛溫  
 陽調和而血自生若失血太多氣息微者以固欲絕之氣故  
 四物陰類非所以生血者也當重用參耆以固欲絕之氣故  
 日脫血者先益其氣否則川芎香薷反能耗氣氣血雙亡而  
 死矣故凡胃虛氣弱之人皆不宜服丹溪謂產後忌用芍藥  
 恐酸寒伐生生之氣然芍藥能治血虛氣痛新產正血虛氣  
 痛之時醇酒微炒用之何害又血塊凝滯作痛不可泥於產  
 後大補氣血散瘀用之何損積血而煩者多矣張景岳曰  
 血之劑古人多以四物湯為主然亦有不宜蓋補血行



血無如當歸但當歸之生動而潤凡因大動血者忌之因大動而散凡火散血者忌之血散而無如川芎然川芎之性生血涼血無如生地微血清血無如芍藥然二物皆涼陽虛者非宜也脈弱身涼多嘔便溏者皆非宜也故凡用四物以治血者不可不察其宜否之性

加黃蘗知母名知藥四物湯再加元參名滋陰降火湯治陰

虛有火知藥四物蜜丸名坎離丸治陰虛嗽血丹溪論癆瘵

自子至巳屬陽自午至亥屬陰陰虛則熱在午後子前屬陽陽虛則寒在子前午後屬陰陰虛則熱在午後子前屬陽陽虛則寒在子前午後屬陰陰虛則熱在午後子前屬陽陽虛則寒在子前午後屬陰陰虛則熱在午後子前屬陽陽虛則寒在子前午後屬陰

成方切用

四物湯

三

仁北味枇杷葉之類佐以生地汁藕汁人乳童便等如欲嗽則多用桑皮枇杷葉有痰增貝母有血增薏仁百合阿膠熟甚增地骨食少增薏仁至七八錢而麥冬常為之主以保肺金而滋化源無不輒效又曰虛勞之疾百脈空虛非黏滯之物填之不能實也精血枯涸非濡澤之物滋之不能潤也當用參耆地黃二冬枸杞五味之屬各煎膏另用青蒿以童便熬膏合前諸汁并藥角膠雲天膏化服大抵薏仁百合之屬治肺虛參耆地黃膏之類治腎虛蓋心肝屬陽肺腎屬陰補肺腎即是補陰非知藥四物之謂也

加黃連胡黃連名二連四物湯元治氣旺

血虛五心煩熱熱入血室夜分發熱血室衝脈也衝為血海

熱入加黃蘗黃芩甘草名三黃四物湯治陰虛潮熱用生熟

二地加黃耆丹皮升麻柴胡名三黃補血湯治亡血血虛六

脈俱大按之空虛二地補血丹皮涼血黃耆補氣

花名元戎四物湯治血結便秘撲損瘀血加羌活防風秦一用

名治風六合湯治風虛眩暈風秘便難蜜丸名補肝丸肝以

補加木香檳榔名治氣六合湯治血虛氣滯或血氣上衝加

羌活天麻蜜丸名神應養真丹治足厥陰經受風寒暑濕癱

瘓不遂語言蹇澀及血虛腳氣加桃仁紅花竹瀝薑汁治半

身不遂在左者屬瘀血瘀血不去則新血不生故用桃仁紅

分左去白芍加防風名防風當歸散治發汗過多而成瘕證

宜去風養血去地黃加乾薑名四神湯治婦人血虛心腹疴

痛疴音鴉又音加艾葉四製香附童便鹽水酒

暖宮丸治子宮虛冷再加阿膠名婦寶丹治虛寒月水不調

加丹皮地骨治婦人骨蒸除芍藥地黃名歸芍湯為末名佛

成方切用

四物湯

四

手散又名一奇散又名君臣散治產後血虛頭痛胎動下血

服此即安子死腹中服此即下催生神效四物各七錢加防

風一兩梔子黃芩黃連各三錢每服五錢如脈實加大黃名

生地黃連湯海治婦人血風證去血過多因而燥涸循衣摸

牀撮空閉目揚手擲足錯語失神脈弦浮而虛男子去血過

連湯○陶節菴曰大承氣湯氣藥也自外而之內者用之生此證

自氣之血而復之氣者大承氣湯下之自血之氣而復之

之血者生地黃連湯主之二者俱不大便是承氣湯對

危急只得以此降血中之伏火爾○綱目曰四物與桂枝麻

黃白虎柴胡理中四逆藥氣涼膈等皆可作各半湯此

歸用尾芍藥用赤名玉燭散子治經閉腹痛體瘦善饑

歸用尾芍藥用赤名玉燭散子治經閉腹痛體瘦善饑

時和氣謂之  
王燭之義也

抵當湯 仲景

治太陽病六七日表證仍在發熱惡寒脈微而沉反不結胸

其人發狂者以熱在下焦少腹當硬滿小便自利者必有畜

血令人善忘所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也

太陽為諸陽之長其氣上通於心下通於腎其氣在裏故也

為腑此太陽熱邪隨經入腑熱與血搏故為畜血脈沉為在裏

表證仍在則邪氣猶淺不結於胸中而發狂經曰熱結膀胱

其人如狂又曰血併於下亂而善忘小腹硬滿而小便不利者為溺澀難滿而小便利者為畜血準繩曰玩仍在二字

則邪氣為不傳裏非猶淺也膀胱為太陽本經曰熱結下焦

日少腹硬滿曰小便自利皆膀胱之證故總結曰隨經瘀熱

也在裏二字乃隨經膀胱之裏非三陰之裏也按太陽

在陽在表縱有沉緊沉滑之脈皆不得以裏陰名之

水蛭三十箇豬蠹蟲三十箇去桃仁二十枚去大黃四兩

脂熬黑 蠹蟲頭足翅 桃仁皮尖研 酒浸 成方切用 抵當湯

苦走血鹹滲血蠱蟲水蛭之苦鹹以除畜血甘緩急苦泄熱

桃仁大黃之甘苦以下結熱程郊倩曰表證仍在脈微而沉

可知非桂枝所能散桃仁所能攻綠熱結膀胱與瘀熱在裏邪有淺深故桃仁承氣與抵當湯攻有緩急

減水蛭十箇蠱蟲桃仁各減五箇分為四丸每水煮一丸名

抵當丸治本病無喜忘如狂之證者 附代抵當丸大黃四兩

生地歸尾桃仁穿山甲元明粉各一桂心三錢蜜丸桃仁歸尾

通之桂心熱以動之大黃元明粉苦寒鹹寒以推蕩之加穿山甲引之以達於瘀所也

桃仁承氣湯 仲景

治傷寒外證不解熱結膀胱小腹脹滿大便黑小便利燥渴

譴語畜血發熱如狂及血瘀胃痛腹痛脇痛瘧疾實熱夜發

痢疾畜血急痛熱邪自下不解傳入膀胱之府與血相搏

焦故小腹急脹皮見青紫筋大便秘結者瘀血也小便不利者

病而氣不病也小便利而少腹仍急故知為畜血心主血邪

熱上心君不寧故腹煩煩語而如狂瘀血聚於陽明則胃

病在太陰則腹滿在厥陰則脇痛瘧疾夜發者熱入血分也活

人云不當汗而汗之亡其津液陽證之極則陰證之少陽證

畜於胸中也李挺曰太陽證則如狂陽明證則善忘少陽證

則寒熱如瘧傷寒有用大承氣不解反便堅善食者瘀血也

凡胸中滿心下滿者皆氣也腹中滿者或燥矢或宿食少腹

滿者或溺或血停蓄而脹滿也清陽出上竅故上滿者為氣

多濁陰出下竅故下滿者為血多俱是熱病惟冷結膀胱少

腹滿一證為寒有手足厥冷為可辨之證滿亦有在上焦者

桃仁五十枚去大黃兩芒硝甘草 桂枝二兩

皮尖研 大黃兩芒硝 甘草 桂枝二兩

大黃芒硝蕩熱去實甘草和胃緩中此調胃承氣湯也熱甚

則搏血血聚則肝燥故加桃仁之甘苦以潤燥而緩肝加桂

枝之辛熱直達瘀所而行之也 櫻寧生曰血溢血泄諸畜妄

以當伊畢曰血既妄行迷失故道不去畜利瘀則以妄為常

仁以達血所加桂枝以解外邪亦猶大柴胡湯用柴胡解外

相似益見太陽隨經之邪非桂枝不解爾程郊倩曰五苓散

與桃仁承氣均為太陽犯府之藥一利前而主氣分一利後

而主血分 治各不同

節菴加青皮枳實當歸芍藥蘇木汁柴胡名桃仁承氣對子

加青皮枳實破血必行氣也加當歸芍藥去瘀而生新也

柴胡平肝升清而散表熱蘇木助桃仁桂心以逐瘀血

蒼朮地榆湯 潔古

治脾經受溼痢疾下血

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮燥溼強脾升陽而開鬱地榆清熱涼血酸收而斷下為

治血痢腸風之平劑初起者勿用加芍藥阿膠卷柏名芍藥

地榆湯治泄痢膿血乃至脫肛阿膠補血與液為肺大腸要藥能治熱痢

芍藥湯潔古

治下痢膿血稠黏腹痛後重下痢皆屬溼熱赤為傷血白為傷氣膿血自愈調氣則後重自除

芍藥歸尾黃芩黃連大黃三錢木香甘草各一錢檳榔

桂枝半錢每服五錢痢不減加大黃此為實熱者言也然

芍藥酸寒瀉肝火斂陰氣和營衛故以為君大黃歸尾破積

而行血木香檳榔通滯而行氣黃芩黃連燥溼而清熱痢由

成方切用芍藥湯 秦朮白朮丸 七 卷理血門

溼熱積於腸胃不得宣通故大便重急小便赤澀也辛以散

之苦以燥之寒以清之甘以調之加肉桂者假其辛熱以為

反佐也

除桂甘草加枳殼名導滯湯一作導氣湯治前證兼渴者此方今

用之禍不旋踵矣

秦朮白朮丸東垣

治痔瘡痔漏有膿血大便燥結痛不可忍手陽明大腸庚金

津液以從足陽明胃土之化旺則生化萬物入或醉飽入房

酒熱雷著忍精不泄流注募間前陰之氣歸於大腸木乘火

勢而侮燥金火就燥則大便閉而痔作矣受病者燥氣也為

病者胃溼也溼熱風燥四氣合邪法當瀉火潤燥疏風和血

止痛二除之文名錄

桃仁研歸尾酒洗秦朮白朮枳實炒早角子燒存澤瀉五錢

地榆三錢麝香麝香丸

秦朮歸尾桃仁潤燥和血秦朮為風藥中潤劑早角仁以除風燥地榆

以破血止血枳實苦寒以泄胃實澤瀉瀉濕使氣歸於前陰

以清溼邪也白朮之苦甘以瀉火而益元氣故曰甘寒瀉火

乃假枳實之寒也大便祕澀以大黃推蕩之其津液益不足

用當歸和血加油潤之劑自然輟利矣

除地榆加大黃紅花名秦朮當歸湯治痔漏大便燥結疼痛

用秦朮一味加羌活防風麻黃升麻柴胡黃耆黃耆炙

草紅花名秦朮羌活湯治痔漏成塊下垂不任其癢除早角

成方切用麻黃人參芍藥湯 入 卷理血門

枳實地榆加防風升麻柴胡陳皮大黃黃蘗紅花炙甘草名秦

朮防風湯治痔漏大便時疼痛東垣曰如無痛者非痔漏也除白朮枳實

地榆加蒼朮黃蘗大黃檳榔防風名秦朮蒼朮湯以上俱治

同東垣曰腸頭成塊者溼也作大痛者風也大便燥結者兼

受火熱也是溼熱風燥四氣合邪當去四者以破氣藥兼

之治法全矣麻黃人參芍藥湯東垣

治吐血外感寒邪內虛蘊熱

麻黃去外黃耆實表甘草炙白芍藥安太陰人參益元氣

麥冬保肺氣五味子益衛肺氣當歸和血桂枝各五分熱服

綱目曰觀此一方足以為萬世模範矣蓋取仲景麻黃湯與

補劑各半服之但凡人當服仲景方者宜以此為則東垣  
貢士病脾胃虛弱與補藥後居臥熱炕而吐血東  
垣謂此久虛弱冬居暖室衣單薄是重虛其陽表有大寒  
虛熱因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與之  
遂成衄血卻與麻黃湯立愈與  
此甚同因作此湯一服而愈

當歸補血湯 東垣

治傷於勞役肌熱面赤煩渴引飲脈大而虛血盛則身涼血  
機飽勞役傷其陰血虛陽勝故肌熱煩渴與陽明白虎證  
無異但白虎證得之外感實熱內盛故脈大而長按之有力  
此證得之內傷血虛發熱脈洪大而無力內  
經所謂脈虛血虛是也誤服白虎湯必斃

黃耆 當歸 酒洗 空心服

成方切用

當歸補血湯 槐花散

九 理血門

血湯乎蓋有形之血生於無形之氣又有當歸為引則從之  
而生血矣經曰陽生則陰長此其義爾

槐花散 本事

治腸風臟毒下血 血之在身有陰有陽陽者順氣而行循流  
居於絡脈順守臟腑滋養神氣濡潤筋骨若感內外之邪而  
受傷則或循經之陽血至其傷處為邪氣所阻滯泄經外或  
居絡之陰血因風名之邪風裂而出則皆滲入腸胃而泄矣  
世俗率以腸風名之不知風乃六淫之一爾若腸胃受火熱  
二淫與寒燥濕滯鬱其氣及飲食勞力傷其陰絡之血者亦  
可謂之腸風乎誠經曰陽絡傷則血外溢而吐陰絡傷則  
血內溢而便溺戴氏以陽感而見色鮮者為腸風積久而發  
色淡者為臟毒又云色鮮為熱自大腸氣分來色淡為寒自  
小腸血分來或曰腸風者風邪淫胃臟毒者淫邪注胃○臟  
毒腸風之血出於腸腸之開五痔之血出於肛門此孔處治  
同各不

槐花 炒 側柏葉 枳殼 枳實 等分為末每服三錢米  
飲下

側柏養陰燥溼最清血分槐花疏肝瀉熱能涼大腸荆芥散

瘀搜風 為風病血 枳殼寬腸利氣 此病多由溼熱風燥之邪

涼須兼溫補及升舉藥大法涼血用槐角地榆制柏條等妙

連梔子生地和血用阿膠當歸川芎白芍風溼用秦艽防風

制芥蒼朮茯苓血虛少加桃仁紅花蘇木寬腸用枳

殼升舉用升麻補氣生血加人參黃耆白朮甘草

加當歸生地川芎入烏梅生薑煎名加減四物湯 治同 補

血除柏葉荆芥加當歸黃芩防風地榆酒糊丸名槐角丸 局

治同 疏風除柏葉枳殼加青皮等分亦名槐花散 治血痢

腹不痛不裏急後重除柏葉枳殼加當歸川芎熟地白朮青

皮升麻亦名槐花散又名當歸和血散 東垣治腸澼下血溼毒

下血經驗方單用槐花荆芥炒黑為末酒服亦治下血

欬血方 丹溪

治欬嗽痰血 欬者有聲無物嗽者有物無聲欬嗽者有聲有

肺主氣氣逆為欬腎主水水泛為嗽腎脈上入肺循喉嚨其

支者從肺絡心屬胸中故病則俱病也涎唾中有少血散漫

者此腎從相火炎上之血也若血如紅縷從痰中欬出者此

肺絡受熱傷之血也若欬出白而淡紅者此肺經受熱傷之

血也凡唾中帶血咯出者或血或血絲屬腎經鼻衄出血故有

血屬肺經經吐血者或成碗或成盞屬胃經鼻衄出血故有

兩脇逆上吐血者屬肝經經渴血屬小腸膀胱經下血屬大腸

經牙宣出血屬胃經腎虛火舌血謂之舌衄汗孔出血謂之肌

衄心與肝也又驚而動血者屬心怒而動血者屬肝憂

而動血者屬肺思而動血者屬脾勞而動血者屬腎

青黛 水 枯槁仁 海石 山梔 訶子肉 等分為末蜜丸

肝火上逆能燔肺金故咳嗽痰血青黛瀉肝而理血散五臟

鬱火梔子涼心而清肺使邪熱下行一者所以治火枯樓潤

燥滑痰爲治嗽要藥  
俞潔山魚翅少  
蕩除鬱熱垢膩  
海石  
輒堅止嗽清水之

上源命脈所由一者降火而兼行痰加訶子者以

能斂肺而定痰喘也不用治血之藥者火退則血自止也

龍腦雞蘇丸 局方

治肺有鬱熱咳嗽吐血衄血下血

下血  
大腸  
則熱  
淋消  
渴  
肺熱  
則肺  
熱而  
多飲  
爲上  
消  
口臭  
有熱  
口

苦有熱清心明目

成方切用

雞蘇葉 一名龍腦荷 一兩六錢 生地 錢六 麥冬 錢四 蒲黃 阿膠 木通

銀柴胡二錢 甘草半錢 黃耆 人參一錢 先將木通柴胡浸二日

熬汁地黃浸汁熬膏再用蜜三兩煉過和丸梧子大每服一

十丸細嚼湯下一方有黃連

肺本清肅或受心之邪燄或受肝之亢害故見諸證雞蘇輕

揚升發瀉肺搜肝散熱理血故以爲君生地涼血炒蒲黃止

血以療諸血柴胡平肝解肌熱木通利水降心火麥冬阿膠

潤燥清肺參耆甘草瀉火和脾此亦爲熱而涉虛者設故少

佐參耆也

犀角地黄湯

治傷寒胃火熱盛吐血衄血  
衄血曰衄血行清道喉與咽二管不同也

經本肺經之血走而不守隨氣而行氣急追故隨經直抵清道上腦而出於鼻爲衄其從肺竅而出於咽者則爲咳血

爲火逼故嘔吐從咽而出也吐血之熱在腑衄血之熱在經

胃也在經肺也裏熱臟腑也表熱太陽也在肺嗽血便血心移

熱二證傷寒便血爲傳經熱邪畜血如狂漱水不欲嚥

血發躁而內不渴故雖漱水而不欲嘔海藏曰大凡血證皆

血傷寒當發汗而不發汗邪熱入裏逼血妄行故見諸證

及陽毒發我下早熱毒乘虛入胃則發斑下遲熱雷胃中亦

輕而斑重色紫黑者熱極而胃爛也多死凡斑疹慎不可汗

不可遽下恐斑毒內陷也

成方切用

生地半白之兩 犀角是也作器物者多被蒸煮不堪入藥

每朋五錢煮甚如狂者加黃芩一兩因怒致而

者加槌于柴胡  
焦之火柴胡平少陽厥陰之火

血屬附才南因言糸少通途不安其位而要行屈角力寒饑

胃禁而清心少左藥醕藥和附血而濕口少之母 丹房考

海藏曰血分三部藥有輕重犀角地黃湯治上血如吐衄

當湯丸治下血如畜血如狂之類又曰此證足太陰所主脾

不與血越而上行實者犀角地黃湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐血者咸用芍藥主之故知大陰藥也醫貫曰犀角地黃

湯刀血之方蓋水體也。以分水可以通于鼻。血之從任督而至顛頂入鼻中。惟犀角能下入腎水。引地黃滋

子 52—521

皆可借用成功若陽虛勞瘵及脾胃虛者皆不宜活人書言  
以升麻入裏吐衄血者犀角湯乃陽明聖藥如無犀角代  
陽明也朱二允曰升麻性升犀角性降用犀角止衄升麻  
下之氣清心肝之火使血下行歸經則衄誤用升麻血隨  
氣升不愈湧出不止乎。犀角通頂而下降。傷寒汗出  
不微能運動經血誤發其汗亦動經血二者不同陶尚文治  
一入傷寒四五日吐血不止醫以犀角地黃湯茅花湯治之  
反劇陶切其脈浮數而緊遂用麻黃湯汗出而愈此取脈不  
取證也可謂得仲景心法矣設脈不浮緊而數其可用乎經  
曰傷寒發熱身無汗因致衄者麻黃湯主之又曰太陽病  
脈浮發熱身無汗因致衄者麻黃湯主之若全未發汗致衄者仍須  
解鬱發熱散血散俗名紅汗故愈寒在經鬱而為熱不得汗  
用麻黃發之成無已曰傷寒衄者為邪氣不得發散甚於  
經迫迫於血也桂枝麻黃湯治衄者非治衄也即是發散經  
中邪氣爾血鬱於上而吐血者謂之薄厥雷於下而瘀者謂  
之畜血此由太陽隨經瘀熱在裏血為  
熱所搏結於下焦少腹當鞭小便自利  
節菴加當歸紅花桔梗陳皮甘草藕汁名加味犀角地黃湯

成方切用

當歸引血歸經藕汁涼血散瘀桔梗以利上焦陳皮以導中焦紅花以行下焦  
歸脾湯濟生

治思慮過度勞傷心脾怔忡健忘上氣不足下氣有餘陽驚

悸有觸而心動曰驚無驚盜汗汗為心液。心氣虛故善忘驚

見前發熱脾主體倦四肢食少健運不眠思而藏血脾傷故

諸證或脾虛不能攝血致血妄行及婦人經帶或心脾傷痛

嗜臥肢體作痛大便不調或癰癤流注不能消散潰斂

黃耆蜜酒洗龍眼肉二棗仁研白朮土炒人參扶神一

遠志去心木香沖甘草分五董肅煎

醫貫曰心生血脾統血肝藏血凡治血證須按三經用藥遠

志棗仁補肝以生心火扶神補心以生脾土參耆甘草補脾  
以固肺氣木香香先入脾總欲使血歸脾爾氣為火之血順  
血自歸經治虛火之血妄正為先氣壯則自能攝血。高  
峰曰心火衰甚不能生土以致土困金敗外兼咳嗽吐血  
熱往來盜汗急以此方去木香加白芍以治之凡見脾胃衰  
弱飲食不思大便泄瀉總屬君火不旺所致此補本也凡  
各種虛證補中益氣所不效者投以此方如肺腎受傷再  
加柴胡丹皮山梔如非二陽之病至怔忡則去木香加枸杞  
麥冬五味如肝腎受傷則芍藥更為有益如從佛鬱而起則  
加柴胡丹皮山梔如夢遺則加熟地五味白芍牡蠣之屬如怔  
忡而實挾包絡一經有餘之火兼痰者則加黃連生地貝母  
之類以清之夢遺而挾相火者加黃藥知母麥冬以清之陽  
虛盜汗脈四至以內奄奄不起遲遲不寐此方亦是對證要  
藥亦可變為養營加減。按歸脾湯乃有宋嚴用和所創以  
治二陽之病發心脾內遠志當歸乃薛新甫所加以治血虛  
又加丹皮山梔為加味以治血熱而陽生陰長之理乃備隨  
手變化通於各證無不神應曰歸脾而陽生陰長之理乃備隨  
率所生所藏而從所統所謂隔二之治蓋是血藥非氣藥脾

成方切用

後人見薛氏得力亦漫浪效之而不解其說妄為加減盡  
失其義即有稍知者亦止謂治血從脾難入溫中却陰之藥  
而嚴薛二家之旨益晦四明高鼓峰熟於趙氏之論而獨悟  
其微謂木香一味本以噓血歸經然以其香燥反動肝火而  
乾津液故其用每去木香而加芍藥以追已散之真陰且肺  
受火刑白朮燥烈恐助欬嗽得芍藥以爲佐則太陰爲養榮  
之用又配合黃耆建中龍性乃馴唯脾虛泄瀉者方當木香  
以醒脾脾虛挾寒者方加桂附以通真陰之陽而外此皆出  
入於心肝脾三經甘平清潤  
之藥濟生之法始無遺義矣

去白朮木香龍眼加茯苓陳皮入蓮肉董棗煎名酸棗仁湯

治虛煩不眠金匱酸棗仁湯亦

人參養營湯

治脾虛食少無味身倦肌瘦肺虛色枯氣短毛髮脫落小便

赤澀營血不足驚悸健忘寢汗發熱肺此地氣上升也肺主

治節通調水道下輸膀胱此天氣下降也脾肺虛則上下不交而為不常血無所藉以生諸種虛證亦治發汗過多身振脈搖筋惕肉瞤汗為心液汗即血也發汗過多則血液枯涸筋肉無以榮養而然也

人參 白朮 白芍 黃耆 當歸 茯苓 熟地 甘草

陳皮 桂心 遠志 五味 加薑棗煎

熟地歸芍養血之品參耆苓朮甘草陳皮補氣之品血不足

而補其氣此陽生則陰長之義也且參耆五味所以補肺

氣能甘陳扶朮所以健脾脾統血熟地所以滋腎腎藏精精生血

遠志能通腎氣上達於心桂心能導諸藥入營生血五臟交

養互益故能統治諸病而其要則歸於養營也薛立齋曰氣血兩虛而變

成方切用 人參養營湯 養心湯 幸 卷理血門

現諸證莫能名狀勿論其病勿論其脈但用此湯諸證悉退此十全大補對子也十全大補但分氣血此則五臟皆補無平不到虛寒甚者高氏常加附子以治之三陰虛更妙

養心湯

治心虛血少神氣不寧怔忡驚悸心主血而藏神經曰靜則神藏躁則消忘心血虛則

易動故怔忡驚悸不得安寧也

黃耆 茯苓 茯神 當歸 川芎 半夏 薊 甘草 柏子仁 油 棗仁 遠志 五味 人參 肉桂 每服

五錢

參耆以補心肺之氣肺為心之華蓋芎歸以養心肝之血肝木能生心火

茯遠志以泄心熱柏仁酸棗以寧心神五味收神氣之散越

半夏去擾心之痰涎甘草補土以培心子赤桂引藥以入心經潤以滋之溫以補之酸以收之香以舒之則心得其養矣

還元水 治欬血吐血及產後血運陰虛久嗽火蒸如燎血生於心統於脾藏於肝

宣布於肺靜則歸經熱則妄行火傷肺絡血隨欬出或帶痰中

童便 取十一二歲無病童子不茹葷辛清徹如水者去頭

尾熱飲冬則用湯溫之或加藕汁阿膠和服有痰稍加薑汁

童便鹹寒降火滋陰潤肺散瘀故治血證火嗽血運如神北齊

褚澄曰喉不容物毫髮必欬血既滲入愈滲愈欬愈滲飲淡粥百不一死服寒涼藥百不一生李時珍曰小便飲之

入胃隨脾之氣上歸於肺下通水道而入膀胱乃其舊路故能治肺病引火下行其味鹹而走血故治血病當熱飲則

成方切用 還元水 獨聖散 未 卷理血門

真氣尚存其行自速冷則唯有鹹寒之性而已李士材曰煉成秋石真元之氣漸失不及童便遠矣。飲自己溺名迴輪

獨聖散

治多年欬嗽肺痿咯血紅痰

白芨 為末每服二錢臨臥糯米湯下

人之五臟唯肺葉壞爛者可以復生白芨苦辛收瀉得秋金

之令能補肺止血故治肺損紅痰又能蝕敗疽死肌為去腐

生新之聖藥

清咽太平丸

治膈上有火早間咯血肺屬金肅清之藏也木火焚灼肺金受刑故咯血早間寅卯木旺生火之



時兩頰常赤肝肺之部咽喉不清二經脈唯足太陰在表不厭

而君相二火為尤甚諸火上逆故咽喉不清

薄荷兩川芎防風犀角枯霜甘草二桔梗三蜜

丸

薄荷辛香升浮消風散熱清風故疏肝散熱故防風血藥之

使瀉肺搜肝防風瀉肺火散肝火川芎血中氣藥升清散瘀

柿霜生津潤肺犀角涼心清肝甘草緩炎上之火勢桔梗載

諸藥而上浮又甘桔相合為清咽利膈之上劑也

小薊飲子

治下焦結熱而成血淋心主血小腸其腑也熱甚搏血流入

成方切用

清咽太平丸 小薊飲子 主理血門

為瀉血蓋心熱者小腸必熱經所謂胞移熱於膀胱則癰弱

小薊蒲黃黑炒藕節滑石木通生地梔子炒淡竹

葉當歸甘草梢各五分

小薊藕節退熱散瘀生地涼血蒲黃止血木通降心肺之火

下達小腸梔子散三焦鬱火由小便出淡竹葉草清心而利

小便心與小腸相為表裡滑石瀉熱而滑竅當歸能引血歸經草梢能

徑達莖中也

復元美活湯

湯名美活而方內無之疑缺誤

治從高墜下惡血留於脇下疼痛不可忍者不渴傷在何經

下以肝主血故也

柴胡五錢當歸一兩枳椇根穿山甲炮甘草紅花二桃仁五

去皮尖研大黃酒浸每服一兩加酒煎以利為度

原文曰肝膽之經行於脇下屬厥陰少陽故以柴胡引用為

君以當歸活血脈以甘草緩其急為臣以穿山甲花粉桃仁

紅花破血潤血為佐以大黃蕩滌敗血為使惡血去而痛自

除矣

補陰益氣煎景岳

治勞倦傷陰精不化氣或陰精內乏以致外感不解寒熱瘰

瘕陰虛便結不通等證

成方切用

復元美活湯 補陰益氣煎 太理血門

人參一錢熟地三五錢或當歸二錢山藥酒炒甘草炙陳皮一錢

柴胡一二錢如無升麻三五分火浮於上不用薑棗煎

此補中益氣湯之變方也凡氣虛感邪者宜補中益氣湯精

虛感邪者宜此張景岳曰補中益氣湯乃東垣獨得之心法

此是賴者在賴其發生之氣運而上行故由胃達脾由脾達

肺滋潤一身即如天地之土其氣皆然凡春夏之土能生能

長者以得陽氣而上升則向生也秋冬之土不生不長者

以得陰氣而下降則向死也今本方以升柴助升氣以參

耆歸助陽氣此東垣立方之意誠盡善矣第助升氣以參

本象地地天既交所以成泰然不知泰之前猶有臨之前

助臨復之氣庶乎得根本之道而足補東垣之未備也

四生丸

治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行此方



生荷葉 生艾葉 生地黃 生側柏葉 四仲爛搗丸如雞子大每服一丸滾湯化服

統而論之生之則寒則四生皆能去火析而論之則荷艾輕香去火於氣地柏質實瀉火於陰火去則血歸經而吐衄愈矣

當歸六黃湯

治陰虛有火盜汗發熱心之所藏在內者為血發於外為汗之以行其變化隨其陽氣所在之處而生津亦隨其火擾之處泄而為汗汗者心之陽衰者腎之陰陰虛睡熱陽必湊之故汗出也有火者謂有面赤口乾唇燥便赤舌重脈數諸證

當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃蘗 黃連等黃耆加倍

成方切用

四生丸 當歸六黃湯

本

理血門

加麻黃根

本湯加麻黃根治盜汗甚捷蓋其性能行周身肌表引諸藥至衛分而固腠理也

陰虛有火睡去則衛外之陽乘虛陷入陰中表液失其固衛

故澌澌然而汗出及覺則陽用事衛氣復出於表表實而汗

即止歸地所以養陰芩連所以去火生地黃蘗可以養陰亦

可以去火而倍用黃耆所以補衛固表也

當歸六黃湯加地骨皮陽虛陰必乘故發熱盜汗宜

中湯甚者加附子或黃附湯有淫熱合邪汗出不休以風藥勝其淫甘藥泄其熱羌活勝濕湯有痰證冷汗自出宜理氣降痰痰去則汗自止有汗證用固真藥汗愈不收止可理心

血汗乃心之液心失所養不能攝血故溢而為汗宜大補黃耆湯加棗仁有微熱者加石斛。土材曰六黃湯唯火實氣

成方切用卷四目錄

補養門 正方六十 附方二十七

八味地黃丸

十補丸

右歸丸

右歸飲

六味地黃丸

知樂八味丸

都氣丸

八仙長壽丸

成方切用

目錄

一

補養門

滋腎生肝丸

滋陰腎氣丸

人參補氣湯

加味地黃丸

抑陰腎氣丸

九味地黃丸

疏肝益腎湯

滋水清肝飲

左歸丸

左歸飲

一陰煎

加減一陰煎

二陰煎

三陰煎

四陰煎	五陰煎	七寶美髯丹	大補元煎	滋陰大補丸	打老兒丸	五福飲	七福飲	黑地黃丸	大營煎	成方切用	小營煎	虎潛丸	補益丸	參朮膏	兩儀膏	天真丸	貞元飲	三才封髓丹	三才湯	當歸地黃飲
										目錄			龍虎濟陰丹						鳳髓丹	
										二										
										補養門										
										卷四										

人參固本丸	地黃醴	參乳丸	頓乳取粉法	歸腎丸	天王補心丹	贊化血餘丹	孔聖枕中丹	養元粉	大補陰丸	成方切用	斑龍丸	又斑龍丸	元武豆	龜鹿二仙丹	二至丸	蟠桃果	扶桑丸	羊肉湯	益氣聰明湯	秦朮鱉甲散
										目錄										
										三										
										補養門										
										卷四										

黃耆鼈甲散

人參黃耆散

秦艽扶羸散

百合固金湯

補肺湯

補肺阿膠散

紫苑湯

王母桃

玉屏風散

黃耆湯

成方切用

妙香散

參苓白朮散

休癰飲

何人飲

四君子湯

歸脾湯 見理血門

人參養營湯

十全大補湯

八珍湯 見治氣門

生脈散 見消暑門

目錄

川芎湯

四 補養門

當歸補血湯 見理血門

成方切用

目錄

五 補養門

成方切用卷四

補養門

凡氣虛者宜補其土人參黃耆之屬精虛者宜補其下熟地枸杞之屬陽虛無火者宜補而兼暖桂附乾薑之屬陰虛有火者宜補而兼清門冬芍藥生地之屬此固陰陽之治法也其有氣因精而虛者自當補精以化氣精因氣而虛者自當補氣以生精又有陽失陰而離者不補陰何以收散亡之氣水失火而敗者不補火何以甦垂寂之陰此又陰陽相濟之妙用也故善補陽者必於陰中求陽則陽得陰助而生化無窮善補陰者必於陽中求陰則陰得陽升而泉源不竭是故以精氣分陰陽則陰陽不可離以寒熱分陰陽則陰陽不可混此又陰陽邪正之離合也大凡陽虛多寒者宜補而兼溫而清潤之品非所宜陰虛多熱者宜補以甘涼而辛燥之類不可用知宜知避則不惟用補而力制皆可

崔氏八味丸 金匱

成方切用

八味地黃丸

補養門

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思泄瀉腹脹或元陽虛憊陽痿精寒臍腹痛夜多漩溺膝痠腰輭目昏等證王冰所謂益火之原以消陰翳也尺脈弱者宜之 亦有

力者服之亦效○仲景云氣虛有痰宜腎氣丸補而逐之○吳茱山云八味丸治痰之本也

熟地黃 用懷生地水洗去砂土柳木甌砂鍋上蒸一山萸肉 日曬乾再蒸再曬九次為度臨用搗膏入兩

陳者 懷山藥 四茯苓 丹皮 澤瀉 三肉桂 皮 熟附子 酒潤 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩

蜜丸 洛謂蜜性甘緩易得 空心鹽湯下

吳鶴皋曰腎中水火俱虧者此方主之 李士材曰腎有兩枚之別仙經曰兩腎一般無二樣中間一點是陽精兩腎中間

穴名命門相火所居也一陽生於二陰之間所以成乎坎而位乎北也越養葵曰君子觀象於坎而知腎中具水火之道焉夫一陽居於二陰為坎此人生與天地相似也今人入

成方切用

八味地黃丸

補養門

房甚而陽事易舉者陰虛火動也陽事先痿者命門火衰也真水竭則陰冬不寒真火息則盛夏不熱是方也六味皆濡潤之品所以能壯水之主桂附辛潤之物能於水中補火所以能益火之原水火得其養則腎氣復其天矣○亦有火盛而宗筋弛緩者不可不知○喻嘉言曰金匱用八味丸治脚氣上入少腹不仁者脚氣即陰虛少腹不仁即攻心之漸故用之以驅逐陰邪也其虛勞腰痛少腹拘急小便不利則因過勞其腎陰氣逆於少腹俾過勝脫之氣化小陰類阻其胸中故用之自致短氣故用之引飲下出以安胸中也消渴病飲水之陽小便亦一斗此腎氣不能攝水小便出而消渴有立竭之勢故急用此以逆折其水也夫腎水下趨則消腎氣不上騰則渴非用此以逆折其水也夫腎水下趨則消腎氣不上騰則渴附即坎卦之一聖藥得其旨矣按不入味地黃丸主用之味為桂藥而辛熱純陽通行諸經走而不守桂為少陰之藥宜通血脈以爲之導而後能納之九淵而無震盪之虞今人不明此義直以桂附爲腎陰之定藥離法任意而雜用之酷烈中上燥烈三陰爲禍非少也或曰仲景治少陰傷寒用附者十之二

致津液通氣道據其窟宅而招之誘之同氣相求火必下降矣然則桂附者固治相火之正藥歟○八味丸用澤瀉芩宗爽謂其接引桂附歸就腎經李時珍曰非接引也伏苓澤瀉皆取其瀉勝於之邪氣也古人用補必兼瀉邪去則補藥得力一闢一闢此乃元妙後世不知此理專一於補必致偏勝之害矣洛按此亦為虛中挾邪滯者設爾若純虛之證而兼以滲利未免減去藥力

微弱陰陽俱虛

加五味鹿茸名十補丸治兩尺

右歸丸 景岳

治元陽不足或先天稟衰或勞傷過度以致命門火衰不能生土而為脾胃虛寒飲食少進或嘔惡膨脹或反胃噎膈或怯寒畏冷或臍腹疼痛或大便不實瀉痢頻作或小水自遺虛淋寒疝或寒侵谿谷而肢節痛痺或寒在下焦而水邪浮

成方切用

右歸丸

三 補養門 四

腫總之真陽不足者必神疲氣怯或心跳不寧或四肢不收或眼見邪祟或陽衰無子等證速宜益火之原以培右腎之元陽而神氣自強矣八味丸治之不愈者宜服此或用右歸飲凡八味右歸用桂附等方唯肺陰有飲者宜之否則助火燥金反生肺病

大懷熟兩山藥 山萸肉 枸杞 兔絲 杜仲 鹿角

膠四兩當歸三兩便附子 肉桂二兩 右丸法如前或丸如

彈子大每嚼服二三丸白湯下其效尤速 如陽衰氣虛必加人參以為之生或二三兩或五六兩隨入虛實以為增減蓋人參之功隨陽藥則入陽分隨陰藥則入陰分欲補命門之陽非加人參不能捷效 如陽虛精滑或帶濁便溲加補

骨脂酒炒三兩 如殭泄腎泄不止加五味子三兩肉豆蔻

三兩麩炒去油用 如飲食減少或不易化或嘔惡吞酸皆

脾胃虛寒之證加乾薑三四兩炒黃用 如腹痛不止加吳

茱萸二兩湯泡半日炒用 如腰膝痠痛加胡桃肉連皮四

兩 如陰虛陽痿加巴戟肉四兩肉蓯蓉三兩或加黃狗外

腎一二副以酒煮爛搗入之

右歸飲 景岳

此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝者宜此方加減主之如治陰盛格陽真寒假熱等證宜加澤瀉二錢煎成用涼水浸冷服之尤妙

成方切用

右歸飲

四 補養門 四

熟地三四錢或加 山藥 杜仲 薑 枸杞 炙甘草 肉桂

一二錢 製附子一二錢 黃肉 錢一 水二盞煎七分食遠服 如氣

虛血脫或厥或昏或汗或運或虛狂或短氣者必大加人參

白朮隨宜用之 如小腹多痛加吳茱萸六七分 如火衰

不能生土為嘔噦吞酸者加炮薑二三錢 如陽衰中寒泄

瀉腹痛加人參肉豆蔻隨宜用之 如淋帶不止加破故紙

一錢 如血少血滯腰膝痠痛者加當歸二三錢

六味地黃丸 仲陽

治肝腎不足真陰虧損精血枯竭憔悴羸弱腰痛足疲自汗

盜汗水泛為痰 丹溪曰久病陰火上升津液生痰不發熱欬生血宜補血以制相火其痰自除

嗽腎虛則移熱於肺而欬嗽按之至頭運目眩直指方云注不能歸元此氣虛頭運也吐衄崩漏耳鳴耳聾遺精便血消渴淋瀝失血失音舌燥喉痛虛火牙痛足跟作痛下部瘡瘍

等證諸證皆由腎水不足虛火上炎所致

熟地八山茱肉潤山藥四茯苓乳丹皮澤瀉三右九法

如前空心鹽湯下

腎中水虛不能制火者此方主之今人足心熱陰股熱腰脊

痛率是此證乃欬血之漸也熱地滋陰補腎生血生精山黃

溫肝逐風瀉精氣壯丹瀉君相之伏火涼血退蒸時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃藥治相火不知丹山藥皮之功更勝○丹皮能入腎瀉陰火退無汗之骨蒸

成方切用六味地黃丸五補養門

清虛熱於肺脾補脾固腎能清茯苓滲脾中溼熱而通腎交

心澤瀉瀉膀胱水邪而聰耳明目壯水之主以制陽光即此

方也六味地黃丸純陰重味潤下之方也純陰腎之氣重味

地一味為本藏之主然遇氣藥則運用於上遇血藥則流走

於經不能制其一錢入腎也故以五者佐之山藥陰金也坎

中之艮堅凝生金故入手太陰能潤皮膚水發高源導水必

自山山藥堅少腹之土真水之原也水土一氣鎮達臍下必

榮莫陰木也肝腎同位乎下借其酸澀以斂泛流火火升降

必由金木為道路故與山藥為左右降下之主以制其旁軼

二陰之藥能降心火達於膀胱水對居瀉南即益北而又不

有茯苓之淡泄以陽陽澤瀉之鹹泄以降陰疏瀉決排使無

不就下入海之水此制方之微旨也仲景原方以此六者駕

馭桂附以收固腎中之陽至宋錢仲陽治小兒行逆齒遲脚

軟類問陰虛發熱諸病皆屬腎虛神效明薛新甫因恒大方

為補陰之神方矣趙養葵得力於薛氏醫案而益闡其義觸處旁通外邪雜病無不貫攝而六味之用始盡矣○趙氏作

腎胃通外邪雜病無不貫攝而六味之用始盡矣○趙氏作

於胃腑消耗津液故渴恐胃汁乾急下之以存津液其於

但云欲飲水者不可不與不可多與別無治法縱有治者徒

知以茶連梔麥冬五味花粉甚則石膏知母此皆有形之

水以沃無形之火安能滋腎中之真陰乎若以六味地黃

大劑服之其渴立愈何至傳至少陰而成燥實堅之證乎

加黃藥知母各二兩名知藥八味丸治陰虛火動骨痿髓枯

因下焦尺脈旺者宜之朱丹溪曰君火者心火也人火也可

之相火者天火也龍雷之火也陰火也可以水淫折之屬

從其類而伏之唯黃藥之屬可以降之醫賈曰左尺脈虛細

數者是腎之真陰不足宜六味丸以補之醫賈曰左尺脈虛細

是命之相火不足宜八味丸以補之醫賈曰左尺脈虛細

俱虛宜十補丸此皆滋先天化源自世之補陰者率用知藥

反戕脾胃過度致不起不能無憾故特表而出之又曰王節齋

云凡酒色過度損傷肺腎真陰者不可過服參耆服多者死

蓋恐陽旺而陰消也自此說行而世之治陰虛者視參

成方切用六味地黃丸六補養門

者如鶴鶴以知藥為靈丹使患此證者百無一生良可悲也

蓋病起房勞真陰虧損虛火上故效當先以六味丸之類

補其真陰使水升火降隨用參耆救肺之品補腎之母使金

水相生則病易愈矣世之用寒涼者固不足齒聞有知用參

名七味地黃丸引無根之火降而歸元治肝經氣虛筋無所

養變為寒證以致筋骨疼痛腳軟懶行及傷寒服涼藥過多

木中無火手足牽引肝經血虛以致火燥筋變為結核瘰

癧等證經曰辛以潤之此方是也加五味名都氣丸治勞嗽

益肺之源以加肉桂一兩五味二兩名加減八味丸治腎水

不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛

或形體憔悴汗發熱五臟齊損加五味二兩麥冬三兩名

八仙長壽丸治虛損勞熱加杜仲炒牛膝酒洗各二兩治腰膝痠痛去澤瀉加益智仁三兩治小便頻數益智辛

腰膝痠痛去澤瀉加益智仁三兩炒酒治小便頻數益智辛

氣用熟地二兩山藥山萸丹皮歸尾五味柴胡各五錢茯苓澤瀉各二錢半蜜丸硃砂為衣名益陰腎氣丸即明日地治

腎虛目昏加柴胡者所以升陽於上也加柴胡五味白朮當歸甘草名滋

腎生肝飲治血虛氣滯或肩背絆痛或胃脘當心而痛或肝

火鬱於胃中以致倦怠嗜臥飲食不思口渴咽燥及婦人小

便自遺頻數無度凡傷寒後熱已退而見口渴者用之薛氏

用治婦女鬱怒傷肝脾以致小便淋瀝不利月經不調兩脇

脹悶小腹作痛寒熱往來胸乳作痛左關弦洪右關弦數此

成方切用 六味地黃丸

鬱怒傷肝脾血虛氣滯為患高鼓峰曰六味地黃丸一變而

兩而加柴胡五味白朮當歸甘草合逍遙而去白芍加五味

合都氣意也以生肝故去芍藥而留白朮甘草以補脾補肝

者生金以制木也以制去山萸而加柴胡歸尾生地五味辰

砂為衣名滋陰腎氣丸治目神水寬大漸散或如霧露中行

漸觀空中有黑花視物二體久則光不收及內障神水淡白

色高鼓峰曰又一變而為滋陰腎氣丸獨去山萸而加柴

者行於滯也柴胡疎木氣也去芍藥恐妨於行之疎之也名

滋陰者厥陰也皆用五味者雖合都氣然實防水之反尅瀉

丁之義也去山萸去澤瀉而用參耆歸朮陳皮甘草五味麥

冬名人參補氣湯治腎水不足虛火上炎咳嗽膿血發熱作

渴小便不調等證高鼓峰曰又一變而為人參補氣湯其義

愈變化無窮真有游龍戲海之妙夫白朮

之與六味其功相反焉得合之曰從合生脈來則有自然相

通之義借茯苓以合五味異功之妙用歸者以合養血之奇

其不用澤瀉者蓋為發熱作渴小便不調則無再竭之理理

無再竭便當急生生脈之所由來既當生脈異功之可以轉

入也且水生高原氣化能出肺氣將敗故作渴不調此所以

急去澤瀉而生金滋水復崇土以生金其苦心不可不知哉

加生地柴胡五味復等其分名加味地黃丸又名抑陰地黃

丸治肝腎陰虛耳內痒痛出水或眼昏痰喘或熱渴便澀等

證高鼓峰曰又一變而為加味地黃丸真愈出而愈奇矣柴

痛出水或眼昏痰喘或熱渴便澀而總為肝腎陰虛則知陰

虛半由火鬱而致也故用柴胡以疎之鬱火非生地不能涼

故用生地用五味仍瀉丁以補金補金以生水也曰抑陰為

鬱火太盛非疎之不可疎之所以抑之生地涼血便有瀉義

抑之也所以加五味生地當歸名抑陰腎氣丸治諸臟虧損胸

膈痞悶發熱潮熱晡熱或寒熱往來五心煩熱或口乾作渴

成方切用 六味地黃丸

月經不調或筋骨痠倦飲食少思或頭目不清痰氣上壅欬

嗽喘甚或小便赤數兩足熱痛或腰膝痠軟肢體作痛等證

高鼓峰曰又一變而為抑陰腎氣丸加五味仍合都氣生地

當歸二味則從四物湯來何也其列證有發熱潮熱晡熱肝

血虧矣焉可再以柴胡疎之哉最妙在胸膈痞悶一句緣此

證之問是肝膽燥火閉伏胃中非當歸生地合用何以消胸

矣一用柴胡一不用柴胡流瀉潤燥之義判若天淵微乎微

乎去澤瀉加川棟子當歸使君子川芎以赤茯苓換白茯苓

六味加減法須嚴其善用六味雖薛氏取其悟端而以上變  
化藥未透其根底故盡廢而不能用見其能合當歸柴胡而  
去芍藥則反用芍藥為疎肝益腎此則其聰明也乃謂白朮  
與六味水土相反人參脾藥不入腎其論亦高簡嚴密然細  
參薛氏畢竟趙氏拘泥薛氏諸變法似乎寬活然其實嚴密  
學者當善悟其妙而以意通之大旨以肝腎為主而旁救脾  
肺脾肺安頓則君相二火加當歸芍藥柴胡棗仁山梔名滋  
不必提起而自然帖伏矣

左歸丸

景岳

治真陰腎水不足不能滋養營衛漸至衰弱或虛熱往來自

汗盜汗或神不守舍血不歸原或遺淋不禁或口燥舌乾或

成方切用

左歸丸

補養門  
卷四

腰痠腿軟或昏運眼花耳聾凡精髓內虧津液枯竭等證俱

宜速壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣此方主之

大懷熟兩山藥 黃肉 枸杞 菟絲子 鹿角膠 珠四兩

牛膝 酒洗蒸熟三兩 龜膠 無火者不用 丸法如前每食

前滾清湯或淡鹽湯送下百餘丸 如純陰失守虛火上炎

者宜用純陰至靜之劑於本方去鹿膠枸杞加女貞子麥冬

三兩 如火燥肺金乾枯多嗽者加百合三兩 如氣虛者

加人參三四兩 如大便燥結去菟絲子加肉蓯蓉三兩如

血虛微滯加當歸四兩 如腰膝痠痛加杜仲三兩鹽水炒

用 如臟平無火而腎氣不充者加破故紙三兩蓮肉去心胡

桃肉各四兩龜膠不必用 右凡五液皆主於腎故凡屬陰  
分之藥無不皆走腎有謂必須導引者皆見之不明爾

左歸飲

景岳

治腎水乾枯虛火上蒸脾胃陰土受虧以致飲食不進大便秘  
燥結甚至三陽癰閉將成噎膈治之於早無不愈也嘗以此  
方加歸芍治傷寒舌黑唇焦大渴引飲此必服攻伐寒涼之  
藥過多也此方救之治瘧疾而兼燥證熱重寒輕者此方更  
宜

熟地三四錢或加 山藥 甘枸杞 錢二 茯苓 錢半 炙甘草 錢一 黃肉

一二錢畏酸 如肺熱而煩者加麥冬二錢 血滯者加丹

成方切用

左歸飲

補養門  
卷四

皮二錢 心熱而躁者加元參二錢 血熱妄動者加生地

三四錢 陰虛不寐者加女貞子二錢 上實下虛者加牛

膝二錢以導之 血虛而燥滯者加當歸二錢 脾熱易饑

者加芍藥二錢 腎虛骨蒸多汗者加地骨皮二錢 此壯

水之劑乃一陰煎四陰煎之主方也 按六味乃虛中挾濕熱

無取澤瀉之泄丹皮之涼也 宜以此甘純之劑平補之

一陰煎 景岳

此治水虧火勝之劑故曰一陰凡腎水真陰虛損而脈證多  
陽虛火發熱及陰虛動血等證或瘧疾傷寒屢散之後取汗  
既多脈虛氣弱而煩渴不止潮熱不退者此以汗多傷陰水



虧而然也皆宜用此加減主之

熟地錢三五 生地 白芍藥 麥冬 丹參錢二 杜仲錢半 甘草錢一

如火盛躁煩者入真龜膠二三錢化服 如氣虛者間用

人參一二錢 如心虛不眠多汗者加棗仁當歸各一二錢

如汗多煩躁者加北五味十粒或加山藥山茱萸 如見

微火者加女貞子一二錢 如虛火上浮或吐血或衄血不

止者加澤瀉一二錢茜根二錢或加川續斷一二錢以清之

亦妙 去杜仲丹參加知母地骨皮各一錢名加減一陰煎

治證如前而火之甚者

二陰煎

成方切用 二陰煎 三陰煎

補養門 卷四

此治心經有熱水不制火之病故曰二陰凡驚狂失志多言

多笑或癆疹煩熱失血等證此方主之

生地錢四 麥冬錢二 棗仁錢二 茯苓 木通錢半 黃連錢一

生甘草錢一 加燈心二十根或竹葉亦可 如痰勝熱甚

加九製膽星一錢或天花粉一錢五分

三陰煎

此治肝脾虛損精血不足及營虛失血等證故曰三陰凡中

風血不養筋及瘡疾汗多邪散而寒熱猶不能止是皆少陽

厥陰陰虛血少之病微有火者宜一陰煎無火者宜此方主

之

當歸錢二 熟地錢三五 芍藥錢二 棗仁錢二 人參錢一 炙甘草錢一 如

嘔惡者加煨薑三五片 汗多煩躁加五味子十四粒 汗

多氣虛者加黃耆一二錢 小腹隱痛加枸杞一二錢 如

有服悶加陳皮一二錢 如腰膝筋骨無力加杜仲牛膝

四陰煎

此保肺清金之劑故曰四陰治陰虛勞損相火熾盛津枯煩

渴咳嗽吐衄多熱等證

生地錢四 麥冬 芍藥 百合錢二 生甘草錢一 沙參錢二 茯苓錢半

如夜熱盜汗加地骨皮一二錢、如痰多氣盛加貝母二

三錢阿膠一二錢或天花粉亦可 如金水不能相滋而乾

成方切用 四陰煎 五陰煎

補養門 卷四

燥者加熟地三五錢、如多汗不眠神魂不寧加棗仁二錢

、如多汗兼渴加五味十四粒 如熱甚者加黃蘗一二錢

鹽水炒用或元參亦可但分上下用之 如血少經遲枯澀

不至者加牛膝二錢 如血熱吐衄加茜根二錢 如多火

便燥或肺乾咳咯者加天冬二錢或加重便亦可、如火載

血上行者去甘草加炒山梔一二錢

五陰煎

凡真陰虧損脾虛失血等證或見溇泄未甚者所重在脾故

曰五陰忌用潤滑宜此主之

熟地錢五 芍藥錢五 山藥錢二 糯豆錢二 茯苓錢半 甘草錢二 五

味二十人參隨宜白朮炒一錢加蓮肉去心二十粒

七寶美髯丹 邵應節

治精血不足羸弱周痺腎虛無子消渴淋瀝遺精崩帶癰瘡

痔腫等證 周痺周身痠痺也由氣血不足無子由腎冷精衰消渴淋瀝由水不制火遺精由心腎不交崩帶瘡

痔由營血不調

何首烏 大者赤白各一觔去皮切白茯苓 乳牛膝酒浸同首

蒸至第當歸 酒洗枸杞 酒浸菟絲子 酒浸蒸破故紙 黑芝蘇并

蜜丸鹽湯或酒下並忌鐵器

何首烏滋精固氣補肝腎為君茯苓交心腎而滲脾溼牛

膝強筋骨而益下焦當歸辛溫以養血枸杞甘潤而補水菟

成方切用

七寶美髯丹 大補元氣

主

補養門

絲子益三陰而強衛氣補骨脂助命火而暖丹田此皆固本

之藥使營衛調適水火相交則氣血太和而諸疾自已也 何

烏滋補雖久服者尚宜明察時方士邵應節進此方世宗服之連生皇子遂盛行於世

大補元煎 景岳

治男婦氣血大壞精神失守急劇等證此回天贊化救本培

原第一要方 本方與前右歸飲出入互用

人參 補氣補陽以此為上少則熟地則用三四錢多則用一

兩山藥 炒杜仲二錢多則用一二兩熟地則用三四錢多則用一

兩甘草 二錢如元陽不足多寒者加附子肉桂炮薑之

屬隨宜用之、如氣分偏虛者加黃耆白朮胸口多滯者不

必用 如血滯者加川芎去黃肉 如滑泄者加五味故紙

之類

滋陰大補丸 丹溪

溫補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰腳沈重肢

體倦怠血氣羸乏瘦弱食減發熱盜汗遺精白濁牙齒浮痛

等證

熟地 二兩牛膝 酒浸枸杞 酒浸山藥 兩茯苓 乳牛膝酒浸同首

遠志五味 巴戟天肉苁蓉 酒浸黃肉 一石菖蒲 五錢

加棗肉蜜丸鹽湯或酒下

兩腎中間有命火乃先天之真陽人之日用云為皆此火也

成方切用

滋陰大補丸 五福飲

主

補養門

此火衰微則無以薰蒸脾胃飲食減少而精氣日衰矣菟蓉

巴戟能入腎經血分茴香能入腎經氣分同補命門相火之

不足火旺則土強而脾能健運矣熟地枸杞補水之藥水足

則有以濟火而不亢不害矣杜仲牛膝補腰膝以助腎茯苓

山藥滲溼熱以助脾山藥五味生肺液而固精遠志菖蒲通

心氣以交腎 遺精白濁由大棗補氣益血潤肺強脾此陰陽

平補之劑而曰滋陰者腎為陰臟也 此即楊氏還少丹去橘

氏用之甚妙丹還少之別見加續斷茯苓換在神名打老兒丸

五福飲 景岳

凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參 熟地隨宜 當歸錢二三 白朮炒錢半 甘草錢一 加薑棗

凡氣血俱虛等證以此為主或宜溫者加薑附宜散者加柴  
麻升葛左右逢源無不可也宜涼者亦當隨宜加之 加棗  
仁二錢遠志三五分製用名七福飲治氣血俱虛而心脾為  
甚者

黑地黃丸

治脾腎不足房室虛損形瘦無力面色青黃此脾腎兩傷之證 亦治

血虛久痔氣不攝血則妄行淫熱下流則成痔潔古曰此治血虛久痔之聖藥

蒼朮油 熟地一 五味半 乾薑春冬一兩秋七錢夏五錢 棗肉丸米飲或  
酒下

成方切用

黑地黃丸 大營煎

圭 補養門 卷四

喻嘉言曰此方以蒼朮為君地黃為臣五味為佐乾薑為使  
治脾腎兩臟之虛而去脾淫除腎燥兩擅其長超超元著視  
後人之脾腎雙補藥味麗雅者相去不已遠耶

大營煎

治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼痛或血氣  
虛寒心腹疼痛等證

當歸二錢 熟地三錢 杜仲二錢 牛膝錢半 肉桂 炙甘  
草一錢 如帶濁腹痛者加故紙一錢炒用 如氣虛者加

白朮人參 中氣虛寒嘔惡者加炒焦乾薑一二錢

小營煎

治血少陰虛此性味和平之方也

當歸錢二 熟地錢三 芍藥酒炒 山藥 枸杞錢二 炙草錢一 如營虛

於上而為驚恐怔忡不眠多汗者加棗仁茯神各二錢 如  
營虛兼寒者去芍藥加煨薑 如氣滯有痛者加香附一二  
錢引而行之

虎潛丸

治精血不足筋骨痿弱足不任地及骨蒸勞熱肝主筋血不足則筋骨不

黃藥酒洗 知母炒 熟地酒 虎脰骨酥炙 龜板酥炙 瑣陽酒

當歸酒洗 牛膝酒 白芍酒 陳皮鹽水潤 羯羊肉酒煮爛

成方切用

小營煎 虎潛丸

圭 補養門 卷四

搗丸鹽湯下冬加乾薑一兩丹溪加乾薑白朮茯苓甘草五  
味堯絲紫河車名補益丸治痿一方加龍骨名龍虎濟陰丹  
治遺洩

知藥熟地所以壯腎水而滋陰歸芍牛膝所以補肝陰而養  
血牛膝又能引諸藥下行以壯筋骨蓋肝腎同一治也龜得

陰氣最厚故以補陰而為君虎得陰氣最強故以健骨而為  
佐用脰骨者虎雖死猶立不仆其氣力皆在前脰故用以入  
足從其類也瑣陽益精壯陽養筋潤燥然數者皆血藥故又  
加陳皮以利氣加乾薑以通陽羊肉甘熱屬火而大補亦以  
味補精以形補形之義使氣血交通陰陽相濟也名虎潛者

虎陰類潛藏也一名補陰丸蓋補陰所以稱陽也凡陽勝者只補其陰以配陽使水火均平自無偏勝之患矣

### 參朮膏

治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參 白朮 等分水煎稠湯化服之

### 兩儀膏

治精氣內虧諸藥不應或以尅伐太過耗損真陰者凡虛在

陽分而氣不化精者宜參朮膏若虛在陰分而精不化氣者

莫妙於此其有未至大病而素覺陰虛者用此調元尤稱神

### 成方切用

參朮膏 兩儀膏 天眞丸

七 補養門 卷四

妙

人參八兩或四兩 大熟地一兩 二味用好甜水或長流水十五碗

浸一宿以桑柴文武火煎取濃汁若味有未盡再用水數碗

煎渣取汁并熬稍濃乃入磁罐重湯熬成膏入上白蜜四兩

或半觔收之每以白湯點服若勞損咳嗽多痰加貝母四兩

亦可

### 天眞丸

治一切吐血過多形體羸瘦飲食不進腸胃滑泄津液枯竭

久服益氣生血暖胃駐顏

精羊肉七觔去筋膜脂皮 肉苁蓉 山藥淨者十兩 當歸十二兩

天冬去心 爲末安羊肉內縛定用無灰酒四瓶煮令酒乾

入水二斗煮爛再入後藥 黃耆五兩 人參三兩 白朮二兩 爲末糯

米飯作餅焙乾和丸溫酒下如雞丸用蒸餅杵丸

喻嘉言曰此方可謂長於補矣人參羊肉同功十劑曰補可去弱人參羊

肉之屬是也人參 而苁蓉山藥爲男子之佳珍合之當歸養

營黃耆益衛天冬保肺白朮健脾而其製法尤精允爲補方

之首

### 貞元飲

治氣短似喘呼吸促急提不能升嘔不能降氣道噎塞勢劇

垂危者常人但知爲氣急其病在上而不知元海無根肝腎

### 成方切用

貞元飲 三才封髓丹

大 補養門 卷四

虧損此子午不交氣脫證也常見婦人血海常虧者最多此

證宜以此飲濟之緩之散之神劑凡診此脈必微細無神若

微而兼緊尤爲可畏儼庸衆不知妄云痰逆氣滯用牛黃蘇

合及青陳枳殼破氣等劑則速其危

熟地七八錢或一兩 當歸二錢 炙甘草一二錢 如兼嘔惡或惡寒者

加煨薑三五片 如氣虛脈微至極者急加人參隨宜 如

肝腎陰虛手足厥逆加肉桂一錢

### 三才封髓丹

降心火益腎水滋陰養血潤而不燥

天冬 熟地 人參五錢 黃藥酒炒 砂仁兩 甘草炙七錢 麝香

丸用磁器五錢切片酒一大盞浸一宿次日服湯送下

天冬以補肺生水人參以補脾益氣熟地以補腎滋陰以藥有天地人之名而補亦在上中下之分使天地位育參贊居中故曰三才也喻嘉言曰加黃蘗以入腎滋陰砂仁以入脾行滯甘草以少變天冬黃蘗之苦俾合人參建立中氣以伸參兩之權殊非好為增益成方之比也 除後三味等分煎名三才湯治脾肺虛勞咳嗽 除前三味名鳳髓丹 治心火旺盛腎精不固易於施泄

當歸地黃飲

治腎虛腰脚疼痛等證

成方切用

當歸地黃飲 人參固本丸

丸

補養門 卷四

當歸二錢 熟地三錢 山藥 杜仲二錢 牛膝半錢 山萸一錢 炙甘草八分 如下部虛寒加肉桂一二錢甚者加附子 如多帶濁去牛膝加金櫻子二錢或補骨脂一錢 如氣虛者加人參一二錢枸杞子二三錢

人參固本丸

治肺勞虛極 肺主氣氣者人身之根本也肺氣既虛火又起之則成肺癆有咳嗽咯血肺痿諸證也

人參二錢 天冬 麥冬 生地 熟地四錢 蜜丸肺主氣而氣

根於丹田故肺腎為子母之臟必水能制火而後火不刑金也二冬清肺熱二地益腎水人參大補元氣氣者水之母也且人參之用無所不宜以氣藥引之則補陽以血藥引之亦

補陰也

地黃醴

治男婦精血不足營衛不充等證宜製此常用之

大熟地八兩 曬乾 枸杞四兩 用肥極者 沈香一錢或白檀

右約每藥一觔可用高燒酒十觔浸之不必煮但浸十日之外即可用矣凡服此者不可過飲服完又加酒六七觔浸半月再用

參乳丸

大補氣血

人參末 人乳粉 等分蜜丸頓乳取粉法取無病年少婦

成方切用

地黃醴 參乳丸 歸腎丸

丸

補養門 卷四

人乳用銀瓢或錫瓢傾乳少許浮滾水上頓再浮冷水上立乾刮取粉用如攤粉皮法 按人乳乃陰血所化服之潤燥降能滋脾滑腸膩膈久服亦有不和宜者唯製為粉則有益無損須用一婦人之乳為佳乳雖則其氣難又須旋用經久則

人參大補元氣人乳本血液化成用之以交補氣血實平淡之神奇也

歸腎丸

治腎肝真陰不足精衰血少腰痠脚軟形容憔悴遺泄痿弱等證 此左歸右歸二方之次者也

熟地八兩 菟絲子 杜仲 枸杞子 茯苓 黃肉 山藥四

當歸<sup>三</sup> 煉蜜同熟地搗為丸桐子大每服百餘丸饑時淡

鹽湯送下

天王補心丹 終南宣律師撰勞心夢天工授以此方故名

治思慮過度心血不足怔忡健忘心口多汗大便或或或

口舌生瘡等證 心者君主之官神明出焉思慮過度耗其心

心之液心煩熱故多汗心主血血不足故大便燥而閉或時

滑者心火燥肺金肺熱而心不主血血不足故大便燥而閉或時

炎故口舌生瘡怔忡者心惕惕然動不自安也丹溪曰怔忡

大傷血虛與痰經曰血并於下氣并於上亂而善忘又曰

盛怒傷志志傷善忘又曰靜則神藏躁則消忘人不耐於事

物之擾擾其血氣之陰者將竭故失其清明之體而善忘也

夫藥則有安心養血之功不若

寧心慮返觀內守為尤得也

生地<sup>四</sup> 柏子仁<sup>炒研</sup> 當歸<sup>酒洗</sup> 棗仁<sup>去心</sup> 天冬<sup>去心</sup> 麥冬<sup>去心</sup> 五味<sup>兩</sup>

成方切用 天王補心丹 主 補養門

人參<sup>元參</sup> 丹參<sup>丹參</sup> 桔梗<sup>一用</sup> 茯苓<sup>神遠志肉</sup> 蜜丸<sup>錢五</sup>

彈子大硃砂為衣臨臥燈心湯下一丸或噙含化一方有石

菖蒲四錢 菖蒲辛香 無五味子一方有甘草

生地入心腎滋陰而瀉火故以為君 養陰所以配陽 丹參當

歸所以生心血血生於氣人參茯苓所以益心氣人參合麥

冬五味又為生脈散蓋心主脈肺為心之華蓋而朝百脈 百脈

皆賴補肺生脈血也 所以使天氣下降也 天氣下降地氣上騰萬物乃生 天

冬元參苦寒而瀉火與麥冬同為滋水潤燥之劑遠志棗仁

柏仁所以養心神而棗仁五味酸以收之又以斂心氣之耗

散也桔梗清肺利膈取其載藥上浮而歸於心故以為使硃

砂色赤入心寒瀉熱而重寧神讀書之人有宜常服者今聲

有謂此方可廢不如以都氣統之亦屬臆見爾

贊化血餘丹

此藥大補氣血故能烏髮壯形體其於培元贊化之功有

不能盡述者

血餘<sup>熟地</sup> 何首烏<sup>小黑豆汁拌蒸七次如</sup> 胡桃肉<sup>肉</sup>

茯苓<sup>酒洗去</sup> 茯苓<sup>乳拌</sup> 小茴香<sup>略</sup> 巴戟肉<sup>酒浸剝</sup> 杜仲<sup>鹽水</sup>

菟絲<sup>製</sup> 鹿角膠<sup>炒當歸</sup> 枸杞<sup>兩</sup> 人參<sup>無亦可用</sup> 煉蜜丸每

服三五錢食前白湯下 精滑者加白朮山藥各三兩 便

溲者去菟蓉加補骨脂酒炒四兩 陽虛者加附子肉桂

成方切用 贊化血餘丹 孔聖枕中丹 主 補養門

孔聖枕中丹 千金 治讀書善忘久服令人聰明 讀書易忘者心血不足

敗龜板<sup>酥炙</sup> 龍骨<sup>研末入酒</sup> 遠志<sup>而痰與火亂其神明也</sup> 九節菖蒲<sup>等分</sup> 為末每

服酒調一錢日三

龜者介蟲之長陰物之至靈者也龍者鱗蟲之長陽物之至

靈者也假二物之陰陽以補吾身之陰陽假二物之靈氣以

助吾心之靈氣也又人之精與志皆藏於腎腎精不足則志

氣衰不能上通於心故迷惑善忘也遠志苦泄熱而辛散鬱

能通腎氣上達於心強志益智菖蒲辛散肝而香舒脾能開

心孔而利九竅去溼除痰 菖蒲為水草之精 又龜能補腎 元

英神仙之靈藥

武

龍能鎮肝 使痰火散而心肝寧則聰明

龍而記憶強矣

養元粉 景岳

大能實脾養胃氣

糯米一升水浸一宿 山藥 芡實 蓮肉 三川椒 去口及閉

汗取紅 共為末每日饑時以滾水一碗入白糖三匙化開

入藥一二兩調服之 或加使君子查肉各一兩亦可

大補陰丸 丹溪

治水虧火炎耳鳴耳聾效逆虛熱耳為腎竅耳鳴耳聾皆屬

虛熱腎脈洪大不能受峻補者

成方切用

黃藥 鹽酒 知母 鹽水炒 熟地 敗龜板 酥炙 豬脊髓和蜜

丸鹽湯下

四者皆滋陰補腎之藥補水所以降火所謂壯水之主以制

陽光也加脊髓者取其能通腎命以骨入骨以髓補髓也

於脊骨

斑龍丸

治虛損百病駐顏益壽

鹿角膠 鹿角霜 菟絲子 柏子仁 熟地黃 等分為

末酒化膠為丸一方加補骨脂一方加鹿茸肉蓯蓉陽起石

附子黃耆當歸棗仁辰砂亦名斑龍丸

鹿角膠菟絲熟地皆腎經血分藥也大補精髓柏子仁入

心而養心氣又能入腎而潤腎燥使心腎相交心志旺而神

魂安精髓充而筋骨壯去病益壽不亦宜乎

通腎脈是以多壽頭為六陽之會茸角鍾於鹿首豈尋常舍

血之屬所可擬哉成都道士常貨斑龍丸歌曰尾間不禁滄

海竭九轉靈丹都說說唯斑龍頂上珠能補玉堂閣下穴

元武豆

補腎之功甚大

羊腰子 五十 甘枸杞 二 補骨脂 一 大茴香 小茴香 六 肉蓯

蓉 十二兩大便 青鹽 八兩如無從蓉 大黑豆 圓淨者一 右

用甜水二斗以砂鍋煮前藥七味至半乾去藥渣入黑豆勻

成方切用

火煮乾為度如有餘汁俱宜拌滲於內取出用新布攤涼曬

乾磁瓶收貯日服之若陽虛者加附子一二兩更妙

龜鹿二仙膏

治瘦弱少氣夢遺泄精口視不明精極之證

故瘦弱少氣氣弱則不能生神故目眩不明精氣不固水不

能制火故遺洩

而精愈耗也

鹿角 十 龜板 五 人參 一 先將鹿角龜板鋸截刮淨

水浸桑火熬成膠再將人參枸杞熬膏和入每晨酒服三錢

龜為介蟲之長得陰氣最全 鹿角遇夏至即解稟純陽

之性 陰生 且兩月長至一二十筋骨之速生無過於此者

人唯骨難長故能峻補氣血兩者皆用氣血以補氣血所謂補之以其類也人參大補元氣枸杞滋陰助陽此氣血陰陽交補之劑氣足則精固不遺血足則視聽明了久服可以益壽豈特已疾而已哉李時珍曰龜鹿皆靈而壽龜首常藏向腹能通任脈故取其甲以補心補腎補血以養陰也鹿首常返向尾能通督脈故取其角以補命補精補氣以養陽也

### 二至丸

補腰膝壯筋骨強腎陰烏鬚髮價廉而功大

冬青子即女貞實冬至日採不拘多少陰乾蜜酒拌蒸過一夜粗袋擦去皮曬乾為末瓦瓶收貯或先熬早蓮膏旋配早蓮草夏至日採不拘多少荷汁熬膏和前藥為丸臨臥酒服一方加桑葚乾為丸或桑葚熬膏和入

### 成方切用

二至丸 蟠桃果 扶桑丸

重

補養門 卷四

女貞甘平少陰之精隆冬不凋其色青黑益肝補腎時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉早蓮甘寒汁黑入腎補精故能益下而榮上強陰而黑髮也

### 蟠桃果

治遺精虛弱補脾滋腎最佳

芡實 蓮肉去心 膠棗肉 胡桃肉去衣熟地 等分以豬腎六箇摻大茴香蒸極熟同前藥末搗成餅每日服一箇空心食前用滾白湯或好酒一二鍾送下此方凡人參附子俱可隨意加用

### 扶桑丸

胡僧

除風溼起羸疴駐容顏烏鬚髮卻病延年

嫩桑葉去帶洗淨暴乾一觔為末 巨勝子即黑芝蘇白蜜一 將脂麻搗碎熬濃汁和蜜煉至滴水成珠入桑葉末為丸一方桑葉為末脂麻蒸搗等分蜜丸早鹽湯晚酒下

桑乃箕星之精其木利關節養津液其葉甘寒入手足陽明涼血燥溼而除風巨勝甘平色黑益腎補肝潤臟腑填精髓陶隱居曰八穀之中唯此為真夫風溼去則筋骨強精髓充則容顏澤卻病烏髭不亦宜乎歌曰扶桑扶桑高入雲海東日出氣氣氤氳忽如奈綠葉英英翠可掬真人採補天地氣雷與紅霞共吐吞濯磨入鼎即靈藥芝朮區區未可羣餐松已有神仙去我今朝夕從此君葉今葉今願玉汝綠陰裏面有桃津

成方切用 羊肉湯 益氣聰明湯

羊肉湯 韓祗和

治傷寒汗下太多亡陽失血惡人踴臥時戰如瘧及產脫血

虛韓祗和曰若止救逆效必遲矣與羊肉湯為效甚速病人有陽則上焦陽氣下焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦降丹田知所歸宿矣

當歸 白芍 牡蠣一枚 龍骨一枚 附子一枚 生薑二兩 桂枝七錢

每服一兩羊肉四兩加葱白煮服

當歸芍藥以補其陰附子薑桂以復其陽龍骨牡蠣以收其脫羊肉大補以生其氣血

益氣聰明湯 東垣

治內障目昏耳鳴耳聾五臟皆稟氣於脾胃以達於九竅煥發傳中使沖和之氣不能上升故目



昏而耳聾也李東垣曰胃不理脾胃及  
養血安神治標不治本是不明理也

黃耆 人參 錢五 葛根 蔓荊子 錢三 白芍藥 黃蘗 二錢 如有  
月漸加夏倍之如脾 升麻 錢一 炙甘草 錢一 每四錢臨臥服五  
虛去之熱減少用

更再服

十二經脈清陽之氣皆上於頭面而走空竅因飲食勞役脾  
胃受傷心火太盛則百脈沸騰邪害空竅矣參耆甘溫以補  
脾胃甘草甘緩以和脾胃乾葛升麻蔓荊輕揚升發能入陽  
明鼓舞胃氣上行頭目中氣既足清陽上升則九竅通利耳  
聰而目明矣白芍斂陰和血黃蘗補腎生水蓋目為肝竅耳  
為腎竅故又用二者平肝補腎也

成方切用

秦艽 龜甲散

手

補養門  
卷四

秦艽 龜甲散

治風勞骨蒸午後壯熱欬嗽肌瘦煩赤盜汗脈來細數風陽  
在表則表熱在裏則裏熱則骨蒸午後甚者陰虛也風  
火相搏則欬嗽久血枯則肌瘦虛火上炎則煩赤睡而汗  
出曰盜汗陰虛也脈  
細為虛脈數為熱

龜甲 炙 柴胡 地骨皮 一兩 秦艽 知母 當歸 錢五 烏梅 一青  
蒿 葉 汗多重用黃耆

風生熱而熱生風非柴胡秦艽不能驅之使出陰類用甲  
者骨以及骨之義烏梅酸澀能引諸藥入骨而斂熱青蒿苦  
寒能從諸藥入肌而解蒸

秦艽 葛根 蔓荊子 白芍藥 黃蘗 二錢 如有  
月漸加夏倍之如脾 升麻 錢一 炙甘草 錢一 每四錢臨臥服五  
虛去之熱減少用

又去汗除蒸之上品也 地骨退有  
汁之骨蒸

黃耆 龜甲散 謙甫

治男女虛勞客熱五心煩熱四肢怠惰欬嗽咽乾自汗食少  
或日晡發熱五心煩熱手足心足心也脾主四肢五心煩熱是  
虛也欬嗽肺火也咽乾腎水不足相火上炎也  
自汗陽虛也食少脾胃弱也日西潮熱肺虛也  
黃耆 炙 龜甲 炙 錢五 柴胡 秦艽 地骨皮 茯苓 錢三  
白皮 紫苑 半夏 芍藥 生地黃 甘草 炙 知母 錢三  
人參 桔梗 肉桂 錢半 每一兩加薑煎衛生減桂芍地骨  
名人參黃耆散治同

龜甲天冬芍地知母滋腎水而瀉肺肝之火以養陰 地黃知  
母滋腎

成方切用

黃耆 龜甲散 小兒扶風湯

手

補養門  
卷四

水天冬瀉肺火 龜甲 黃耆 人參 桂枝 甘草 固衛氣而補脾肺之  
虛以助陽桑皮桔梗以瀉肺熱半夏紫苑以理痰嗽 紫苑潤  
肺止嗽  
半夏化痰利咽故全散治嗽喘  
痛皆用半夏蓋辛能散亦能潤也 秦艽地骨以散內熱而除  
蒸柴胡以解肌熱而升陽此表裏氣血交治之劑也

秦艽扶風湯 直指

治肺痿骨蒸或寒或熱成勞欬嗽聲啞不出體虛自汗四肢  
倦怠 肺痿有火熱傷肺而得之者有肺氣虛寒而得之者骨  
蒸骨裏蒸然熱也陰虛也欬嗽陰火乘肺也或寒或熱  
陰陽不和也聲啞火熱在肺也自  
汗倦怠心脾虛而氣不充也

柴胡 錢二 秦艽 人參 當歸 龜甲 炙 地骨皮 錢半 甘草 炙 紫  
苑 半 夏 錢一 加薑煎此方前加當歸去黃耆茯苓生  
地芍藥天冬知母桑皮及肉桂

柴胡秦艽散表邪兼清裏熱柴胡解肌退熱秦艽退骨蒸鼈甲地骨滋血而

退骨蒸地骨皮涼血參草補氣當歸和血紫苑理痰嗽潤肺除痰

半夏發聲音肺屬金聲之所從出也有物實之則金不鳴燥

肺已損表裏交治氣血兼調為扶羸良劑透肌解熱柴胡秦

也難治方中多用之寇宗奭曰柴胡本經本無一字治勞瘵故

大明並言補虛勞家執而用之貽害無窮時珍曰勞有五

若勞在肝膽心包有熱或少陽經寒熱則柴胡乃手足厥

陰必用之藥唯勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡為退熱升

通論○大抵柴胡能退熱升清宣暢氣血昔孫思邈治勞瘵而

胡有在皮膚在骨節在骨髓者非柴胡不除則柴

胡亦有退熱升清之功況有補之藥以輔之乎直指方又

云柴胡退熱不及黃芩不知黃芩乃寒能勝熱

折火之本也柴胡乃苦以發之散火之標也

百合同金湯趙叢庵

成方切用百合同金湯

治肺傷咽痛喘痰血肺金受傷則腎水之源絕腎脈挾咽

痰因火生虛火上炎故咽痛火上薰肺故喘痰

血因火逼

熟地錢三生地錢二麥冬錢一百合錢一芍藥炒生甘草當歸貝

母錢一元參桔梗分八

金不生水火炎水乾故以二地助腎滋水退熱為君肺腎為

臟故補肺者百合同金湯安神麥冬清熱潤燥元參利咽喉而

降火貝母散肺鬱而除痰歸芍養血兼以平肝肝火盛桔梗

清金功成上部戴諸華皆以甘寒培元清本不欲以苦寒傷

生發之氣也李士材曰葦庵此方殊有卓見熟地土為金母清

飲嗽吐血未必成痰也服西物知藥之類不能足也醫賈曰

滿腹脹飽不快未必成痰也服西物知藥之類不能足也醫賈曰

成矣而曰浮腫小便澀澀未必成水也服滲利之藥不止則

小成矣氣滯喘塞未必成噎也服青皮枳殼寬快之藥不止

成矣

補肺湯

治肺虛欬嗽有聲無痰曰欬蓋傷於肺氣也有痰無聲曰嗽

因痰因溼因食因虛之異此為肺虛不能生腎水虛火上炎

而欬嗽也○欬嗽脈浮為客邪宜發散脈實為內熱宜清利

脈濡散為肺虛宜溫補久嗽胃經解外以散

肺胃俱虛飲食不進宜溫中助胃兼治嗽藥

桑皮蜜熟地人參黃耆五味紫苑入蜜少許

和服

肺虛而用參耆者脾為肺母氣為水母也虛則補用熟地者

腎為肺子子虛必盜母氣以自養故用腎藥先滋其水且熟

地亦化痰之妙品也丹溪曰補水以制欬則氣傷五味酸溫

能斂肺氣欬由火盛桑皮甘寒能瀉肺火紫苑辛能潤肺溫

能補虛合之而名曰補肺蓋金旺水生欬嗽自止矣此治肺

若實火嗽者禁用劉宗厚曰因勞而嗽則非嗽為本也故此

湯與金匱腎氣丸為少陰例藥仁齋直指曰肺出氣也腎納

氣也肺為氣主腎為氣本凡欬嗽暴重自覺氣從臍下逆上

者此腎虛不能收氣歸元當用地黃丸安腎丸母徒從事於

肺此虛則補子之義也醫賈曰五行唯肺腎二臟母病而子

受邪何則肺主氣肺有熱氣得熱而上蒸不能下生於腎而

腎受傷矣腎傷則肺益病蓋母藏子官子隱母胎凡人肺金

之氣夜臥則歸藏於腎水之中因肺受心火之邪欲下通水

中而腎水乾枯有火無可容

之地由是復上而為病矣

補肺阿膠散錢乙

治肺虛有火嗽無津液而氣哽者火盛則津枯津枯則氣哽

阿膠蛤粉炒 馬兜鈴焙 甘草炙 牛蒡子炒香 杏仁去皮尖 糯米一兩

馬兜鈴清熱降火兜鈴象肺 牛蒡子利膈滑痰潤肺解熱 杏仁潤燥散風故入肺 阿膠清肺滋腎益血補陰氣順則不哕液補則

津生阿膠補 火退而嗽寧矣土為金母故加甘草糯米以益

脾胃時珍曰補肺阿膠散用馬兜鈴非取其補肺取其清 紫苑湯熱降氣而肺自安也其中阿膠糯米乃補肺之正藥

治肺傷氣極勞熱久嗽吐痰吐血氣極六極之一也肺主氣

嗽氣故成氣極火炎肺系故久 及肺痿癰癰元氣虛則陰火盛壯火食

紫苑洗淨 阿膠蛤粉炒 知母 貝母 錢 桔梗 人參 茯苓 成方切用紫苑湯 王母桃

甘草五粒 五味十二粒

勞而久嗽肺虛可知即有熱證皆虛火也海藏以保肺為君

故用紫苑阿膠二藥潤肺補 以清火為臣故用知母貝母二藥

燥消痰以參苓為佐者扶土所以生金以甘桔為使者載藥

上行脾肺桔梗載諸藥上行而能 五味滋腎家不足之水收

肺家耗散之金久嗽者所必收也

王母桃景岳

培補脾腎功力最勝

白朮味甘者佳苦者勿用 大懷熟蒸搗二 何首烏九 巴戟草 湯浸米泔浸一宿切片炒 剝炒三味 右為末煉蜜丸龍眼大每服三四丸饑時

嚼服滾湯送下或加人參其功尤大

玉屏風散

治自汗不止氣虛表弱易感風寒陽也者衛外而為固也陽

固而易洩且畏風也此與傷風自汗不同

彼責之邪實此責之表虛故補為各異

黃耆多 防風一兩 白朮炒二兩 為末每服三錢

黃耆補氣固肌表故以為君白朮益脾脾主肌肉故以為

臣防風去風為風藥卒徒而黃耆畏之故以為使以其益衛

固表故曰玉屏風李東垣曰黃耆得防風而功益大取其相

不因其氣不遇而病者故黃耆為必用之君藥防風為必用

之臣藥黃耆助真氣者也防風載黃耆助真氣以過於身者

也亦有治風之功焉黃耆治王太后 前藥等分煎名黃

中風口噤煎二藥煎之而愈況服之乎

成方切用玉屏風散 妙香散

者湯潔古用代桂枝湯治春夏發熱有汗脈微弱惡風寒者

惡風甚加桂枝又用川芎蒼朮羌活等分名川芎湯以代麻

黃湯治秋冬發熱無汗惡風寒者惡寒甚加麻黃

妙香散王荆公

治夢遺失精驚悸鬱結腎主藏精心主藏神邪火妄行心腎

擾故多驚悸憂思不交上實下虛則夢中遺失心虛神

氣滯則成鬱結

山藥薑汁炒 人參 黃耆 遠志炒 茯苓 茯神一兩 桔梗三錢 木香二錢 辰砂另研 甘草錢二 麝香錢一 為末每服二錢酒下

心君火也君火一動相火隨之相火寄於肝膽腎之陰虛則

精不固肝之陽強則氣不固陽即邪 故精脫而成夢矣華繩

之初起亦有不在于肝腎而在心肺脾胃之不足者然必由肝腎而精乃走也又曰心腎是水火之靈法天地施生化成之道故藏精神為五臟之宗主若由他臟而致腎之泄者必察四屬以求其治大抵精自心而泄者血脈空虛本經不收自肺而泄者皮槁毛焦喘急不利自脾而泄者色黃肉消四肢懈怠自肝而泄者筋痿色青自腎而泄者色黑髓空而骨墮即派亦可辨也丹溪曰上閉藏者腎也司疏泄者肝也二臟皆有相火而其系上屬於心心君火也為物所感則易於動心動則相火翕然隨之雖不交會而精亦暗流而山藥益滲漏矣所以聖賢只是教人收心養性其旨深矣

陰清熱兼能瀉精故以為君人參黃耆所以固其氣遠志二茯所以寧其神神寧氣固則精自守其位矣且二茯下行利水又以泄腎中之邪火也桔梗清肺散滯木香疎肝和脾氣故疎肝肝疎則水不赴土而脾和丹砂鎮心安魂麝香通竅解鬱二藥又能辟邪亦所以治其邪感也加甘草者用以交和乎中猶黃婆成方切用

參苓白朮散

卷四 補養門

之媒嬰姪也黃婆脾也嬰兒姪女心腎也是方不用固瀉之劑但安神正氣使精與神氣相依而自固矣以其安神利氣故亦治驚悸鬱結葉全善曰詳古治夢遺方屬鬱滯者居大半庸醫不知其鬱但用瀉劑固脫愈瀉愈鬱其病反甚矣

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉上為萬物之母脾土受傷則失其健運之職故飲食不消兼寒則嘔吐兼溼則濡泄也飲食既少眾藏無以稟氣則虛羸日甚諸病叢生矣

人參

白朮

炒土

茯苓

甘草

山藥

扁豆

薏仁

蓮肉

去心陳皮

砂仁

桔梗

為末每三錢

東湯或米飲調服

治脾胃者補其虛除其滯行其滯調其氣而已參朮苓草山藥薏仁扁豆蓮肉皆補脾之藥也然茯苓山藥薏仁理脾而

兼能滲溼砂仁陳皮調氣行滯之品也合參朮苓草暖胃而又能補中陳皮砂仁入補藥而宜滯桔梗苦甘入肺能載諸藥上浮又能通天氣于地道肺和則天氣下降使氣得升降而益和且以保肺防燥藥之僭上也

休癰飲

此止瀉最妙之方也若汗散既多元氣不復或以衰老或以弱質而癰有不能止者俱宜用此化暴善後之第一方也

人參

白朮

炒

當歸

各三錢

何首烏

製五錢

炙甘草

八分

水各一盞煎七分露一宿次早溫服如陽虛多寒宜溫中散寒者加乾薑肉桂之類甚者或加製附子如陰虛多熱

成方切用

休癰飲

卷四 補養門

煩渴喜冷宜滋陰清火者加麥冬生地芍藥甚者加知母或加黃芩如腎陰不足水不制火虛煩虛餒腰痠脚軟者加熟地山藥杜仲之類如邪有未盡而留連難愈者于此方加柴胡麻黃細辛紫蘇之屬自無不可如氣血多滯者或加酒水各一盞煎服藥後飲酒數杯亦可去白朮甘草加生薑陳皮名何人飲治同

成方切用卷五目錄

瀉固門 正方二十四 附方四

赤石脂禹餘糧湯

桃花湯

訶子散

河間訶子散

鞏隄丸

真人養臟湯

脫肛方

牡蠣散

成方切用

目錄

柏子仁丸

固真丸

金鎖固精丸

珍珠粉丸

豬苓丸

苓朮菟絲丸

治濁固本丸

秘元煎

固陰煎

茯苓丹

菟絲煎

一 瀉固門 卷五

水陸二仙丹

黏米固腸糕

惜紅煎

桑螵蛸散

人參樗皮散

玉關丸

四神丸 見祛寒門

二神丸 見祛寒門

如聖散 見經帶門

撲汗法

成方切用

目錄

工 瀉固門 卷五

成方切用卷五

瀉固門

十劑曰瀉可去脫壯氣龍骨之屬是也如久嗽為喘而氣  
泄於上者宜固其肺尤宜固其腎所謂上病下取也久  
瀉成淋而精脫於下者宜固其腎尤宜固其氣所謂下  
病上取也小便不禁者宜固其皮毛血泄不止者宜固其  
腸臟汗泄不止者宜固其氣溫補有火而滑者當佐以清涼總  
之在上在表者皆宜固氣氣主在肺也  
在下在裏者皆宜固精精主在腎也

赤石脂禹餘糧湯

治傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥

下之利不止治之誤醫以理中與之利益甚誤也理中者

理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當

成方切用

赤石脂禹餘糧湯

瀉固門

利其小便難經曰中焦主泌水穀下焦者常陽脫上  
穀者常并居於胃中成精而後下於大小腸而成下焦滲  
而俱下瀉泌別於下焦而後下於大小腸而成下焦滲  
勝賊不滲而下焦滑脫也餘糧甘平消痞硬而鎮臟腑石脂  
甘溫固陽虛而收滑脫乃利仍不止者勝賊不滲而水穀不  
分也利小便者導其水而分消  
之使膀胱各行其事也

赤石脂禹餘糧湯 水六升煮二升去渣分三服

瀉可去脫重可達下二物瀉以止脫重以固下甘以益氣

知云下焦有病人難  
會須用餘糧赤石脂

桃花湯

治少陰病二三日至四五日腹痛小使不利下利不止便膿

血者喻嘉言曰腹痛小使不利少陰熱邪也而下利不止便  
膿血則下焦滑脫矣不可用寒藥故取乾薑

脂之辛溫以溫經固脫而加梗米之甘以益中州蓋  
治下利必先中氣不下等則滑脫無源而自止也

赤石脂 一兩 乾薑 一兩 梗米 一升 水七升煮米熟去渣

內石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服

此少陰傳經熱邪也陰經循行於裏故腹痛下利仲景反用

石脂乾薑之溫澀何意蓋下利至於不止熱勢已大衰而虛

寒滋起矣故非固脫如石脂不可且石性最沉味澀易滯故

稍用乾薑之辛散佐之用梗米獨多者取其和中而養胃也

石脂用半全半末以全用則氣味不出純末又難於下咽所

以斟酌其當而為之者也傷寒便膿血皆是傳經熱邪成無

非之是也程郊倩以為大衰不能生土母乃迂乎汪詒菴  
未經臨證所見每隔一層其是成程而非王吳無足怪也

成方切用

桃花湯

瀉固門

訶子散

治虛寒泄瀉水穀不化腸鳴腹痛脫肛及便膿血日夜無度

御米穀 去蒂蜜 訶子 七分 乾薑 六分 橘紅 五分 右末空心

服

御米穀酸澁微寒固腎瀉腸訶子酸澀苦溫收脫住瀉炮薑

辛熱能逐冷補陽陳皮辛溫能升陽調氣共以固氣脫亦可

收形脫也泄瀉為氣脫  
脫肛為形脫

河間訶子散訶子 一兩半 木香 五錢 甘草 二錢 黃連 三錢 為末每服

三錢用白朮芍藥湯調下治瀉久腹痛漸已瀉下漸少以此

止之如不止加厚朴一兩竭其餘邪唯積滯未

鞏隄丸

治膀胱不藏水泉不止命門火衰小水不禁等證

熟地 菟絲酒製 白朮炒二兩 韭子炒 破故紙酒炒 益智仁酒炒 北五

味 熟附子 茯苓兩 爲末山藥糊丸桐子大每服百餘

丸空心滾湯或酒下 如氣虛加人參一二兩更妙

眞人養臟湯

治瀉痢日久赤白已盡虛寒脫肛肛門爲大腸之使大腸受者傳導之官腎者作強之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺

用以虛大腸氣無所主故脫肛小兒血氣未壯老人血氣已

衰皆易 亦治下痢赤白臍腹疼痛日夜無度

罌粟殼去蒂蜜炙 訶子麩裏煨 肉豆蔻麩裏煨 木香二兩

成方切用

肉桂八錢 人參 白朮炒 當歸六錢 白芍炒一兩 生甘草一兩

每服四錢臟寒加附子一方無當歸

脫肛由於虛寒故用參朮甘草以補其虛肉桂肉蔻以祇其

寒木香溫以調氣當歸潤以和血芍藥酸以收斂訶子罌殼

則瀉以止脫也 此虛寒脫肛故宜大補氣血或加川芎以調

挺出者宜用芩連槐藥或 四物加升柴芫防之類

丹溪脫肛方人參黃耆當歸川芎升麻此治氣血兩

牡蠣散

治陽虛自汗醒而汗出曰自汗

牡蠣煅 黃耆 麻黃根錢一 浮小麥百 煎服

陳來章曰汗爲心之液心煩熱則汗不止牡蠣浮小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽爲陰之衛陽氣虛則衛不固黃耆麻黃根之甘溫走肌表而固衛

柏子仁丸

治陰虛盜汗睡而汗出曰盜汗

柏子仁炒研去油三兩 人參 白朮 半夏 五味子 牡蠣麻

黃根兩 麥麩錢五 棗肉丸米飲下五十丸日三服

陳來章曰心血虛則睡而汗出柏子仁之甘辛平養心寧神

爲君牡蠣麥麩之鹹涼靜躁收脫爲臣五味酸斂收瀉半夏

和胃燥溼爲佐溼能作汗 麻黃根專走肌表引人參白朮以固衛

成方切用

氣爲使

固眞丸

治夢遺精滑

菟絲子一兩 淘洗淨用酒浸三日煮極熟 牡蠣煅 金櫻子

熟茯苓酒拌蒸 蜜丸空心好酒送下三錢或鹽湯亦可

金鎖固精丸

治精滑不禁精滑者火炎上而水

沙苑蒺藜 芡實蒸 蓮鬚二兩 龍骨酥炙 牡蠣鹽水煮一日 蓮

肉粉爲糊丸鹽湯下

茯苓補腎益精蓮子交通心腎牡蠣清熱補水芡實固精補

脾合之蓮鬚龍骨皆瀉精祕氣之品以止滑脫也法有遺精大  
神浮越者辰砂慈石龍骨之類之痰飲擾心者豬苓八之  
類導之思想傷陽者謙甫鹿茸從容菟絲等補陽陰陽俱虛者丹  
火思想傷陽者謙甫鹿茸從容菟絲等補陽陰陽俱虛者丹  
溪作心虛治用珍珠粉丸定志丸補之附本事豬苓丸豬苓  
末二兩先將一半炒半夏黃取半夏爲末糊丸更用豬苓  
末一半同炒微裂砂瓶養之中未間空心酒鹽湯任下釋曰  
半夏通利性豬苓導水蓋腎閉導  
氣使通之意也定志丸見眼目門

苓朮菟絲丸

治脾腎虛損不能收攝以致夢遺精滑困倦等證

菟絲子酒蒸或五六兩蓮肉去心白朮四兩茯苓杜仲三兩山藥酒炒

二五味酒蒸或七八兩炙甘草五錢石用山藥末以陳酒煮糊爲丸桐子

大空心白滾湯或酒下百餘丸如氣虛不能收攝者加人

成方切用

苓朮菟絲丸 治濁固本丸

五 瀉固門 卷五

參三四兩尤妙

治濁固本丸

治胃中溼熱滲入膀胱下濁不止淋病在溺竅屬肝膽部濁

由溼熱或由虛寒大抵熱者多而寒者少赤屬血白屬氣或

由敗精瘀血壅塞竅道痛澀異常非是熱淋不宜用淋藥治

甘草炙三兩豬苓兩黃連兩蓮鬚二兩黃蘗兩益智仁兩砂仁兩

半夏製茯苓兩

精濁多由溼熱與痰黃連瀉心火黃蘗瀉腎火所以清熱二

苓所以利溼半夏所以除痰溼熱多由於鬱滯砂仁益智辛

溫利氣又能固腎強脾既以散留滯之氣且稍濟連蘗之寒

甘草和中而補土唯蓮鬚之瀉則所以固其脫也

朱丹溪曰 果氏原病

候論曰白濁者田勞傷腎氣虛冷故也歷代宗其說不確  
白濁之理不明所治之法亦悞不思內經本無白濁之名惟  
言少陰在泉客勝便溺少陽在泉客勝則白濁又言思想  
無窮入房太甚發爲白濁與脾移熱於腎出白二者皆隨波  
而下夫非白濁之源乎原病與脾移熱於腎出白二者皆隨波  
皆屬於熱言天氣熱則水渾濁寒則清濁可謂發聖人之旨  
以正千載之誤矣予嘗問先生論赤白濁多由濕熱下流勝  
氣使成即靈樞所謂中氣不足溼便爲之變是也必先補中  
所傷固在瀉熱補虛設其氣虛甚或火熱充極者則不宜過  
用寒涼必以反佐治之要在權衡輕重而已葉氏曰遺精多  
作腎虛補之而後治之要在權衡輕重而已葉氏曰遺精多  
痰火之人多有此疾腎雖熱內鬱使其精木於脾胃飲食生化而  
輸於腎若脾胃受傷溼熱內鬱使其精木於脾胃飲食生化而  
溺氣邪火擾動水不得而安靜故令遺精也

祕元煎

治遺精帶濁等證此方專主心脾

成方切用

祕元煎 固陰煎

木 瀉固門 卷五

金櫻子去核棗仁炒茯苓實山藥炒白朮炒茯神錢人參二錢

炙甘草二錢遠志八分五味子十粒水煎食遠服

此治久遺無火不痛而滑者可用之如尙覺有火熱者加

苦參一二錢如氣大虛者加黃耆一二錢

固陰煎

治陰虛滑泄帶濁淋遺及經水因虛不固等證此方專主肝

腎

熟地三五錢菟絲子炒二錢山藥炒二錢黃肉一錢甘草炙一錢遠志七

分五味子十四粒人參隨宜水煎食遠服如虛滑遺甚者加

金櫻二三錢或醋炒文蛤一錢或烏梅一個如陰虛微熱



而經血不止者加川斷續二錢 如下焦陽氣不足而兼腹  
痛泄瀉者加補骨脂吳茱萸之類隨宜用之 如肝腎血虛  
而小腹痠痛血不歸經者加醋炒當歸二三錢 如脾虛多溼  
或兼嘔惡者加白朮一二錢 如氣陷不固者加炒升麻一  
錢 如兼心虛不眠或多汗者加棗仁二錢炒用

扶菟丹 局方

治遺精白濁及強中消渴 心腎為水火之臟法天施地生之  
水受傷腎主藏精所受五臟六腑輸至之精皆不得藏而時  
下矣及為遺精夢泄或氏曰遺精有因用心過度心不攝腎  
以致失精者有思色慾不遂致精失位輸泄而出者有慾  
太過滑泄不禁者亦有年壯氣盛久無色慾精滿而泄者亦  
濁屬血由心小腸屬火也白濁屬氣由肺大腸屬金也渴  
證下消者莖長與盛不交精出名強中腎水虧心火亢也

成方切用

扶菟丹 菟絲煎

七 清固門

菟絲子 十五味子 八山藥 六白茯苓 三石蓮肉 三將菟絲  
用酒浸浸過餘酒煮山藥糊丸漏精鹽湯下赤濁燈心湯下  
白濁茯苓湯下消渴米飲下

菟絲辛甘和平強陰益陽能治精寒淋渴五味滋腎生津石  
蓮清心止濁山藥健脾利溼皆溫精固氣之品也茯苓能通  
心氣於腎利小便而不走氣取其淡滲於補正中能泄腎邪  
也

菟絲煎

治心脾氣弱凡遇思慮勞倦即苦遺精者宜此主之

山藥 炒二錢 棗仁 炒茯苓 一錢 當歸 錢 人參 二錢 製菟絲子 四錢

炙甘草 一錢或五分 遠志 肉 製四分 鹿角霜 為末每用加 水煎  
加鹿角霜末食前調服或加白朮二三錢

水陸二仙丹

治遺精白濁 精與濁所出之竅不同便濁即是膏淋肝膽之  
火也精濁乃精氣滑出不便亦然此腎水不足  
精離其位也

金櫻膏 取半黃者熬膏一觔 芡實 一觔 蒸 和丸鹽酒下  
熟則全甘而失滋味

山故名水陸二仙丹

黏米固腸糕

治脾胃虛寒或因食滯氣滯腹痛泄瀉久不止者多服自效  
成方切用 水陸二仙丹 黏米固腸糕 桑螵蛸散 入 清固門

白糯米滾湯淘洗炒香熟為粉每粉一兩加乾薑炒熟者二  
分半白糖二錢拌勻於饑時用滾水調服一二兩如帶微滯  
者加陳皮末二分或砂仁一分 一法用陳老米粉亦妙

桑螵蛸散 寇氏

治小便數而欠 數便頻也欠便短也溺雖出於膀胱然泌別  
者小腸也小腸虛則便數小腸熱則便短  
能安神魂補心氣療健忘

人參 茯苓 一用 遠志 石菖蒲 鹽 桑螵蛸 鹽水 龍骨 煅  
板 酥炙一用 當歸 等分為末臨臥服二錢人參湯下

虛則便數故以螵蛸龍骨固之 並能補 腎經熱則便欠故以當歸  
龜板滋之人參補心氣當歸開心竅茯苓能通心氣於腎遠

志能通腎氣於心並能清心解熱心者小腸之合也心補則小腸不虛心清則小腸不熱矣

惜紅煎

治婦人經血不固崩漏不止及腸風下血等證

白朮 山藥 白芍 錢二 酒炒 錢五分 荆芥穗 炒 地榆 川續斷 炒

炙甘草 錢一 北五味 錢十四 烏梅 錢二 水煎食遠服 如火盛

者加黃芩黃連 如脾虛兼脾泄者加破故紙人參

人參梔皮散

治臟毒挾熱下血久痢膿血不止 挾熱者謂挾客熱及飲酒

止氣虛 附脫也

成方切用

惜紅煎 人參梔皮散 玉關丸

九 清固門 卷五

人參 梔根白皮 東引者去 粗皮醋炙 等分爲末米飲或酒調下

人參之甘以補其氣梔皮之苦以燥其溼寒以解其熱瀉以

收其脫使虛者補而陷者升亦劫劑也 初起 勿用

玉關丸

治腸風血脫崩漏不止帶濁不固諸藥難效者宜用此方兼

煎藥治之及瀉痢滑泄不能止者

白麩 炒熟 四兩 枯礬 文蛤 醋炒黑 二兩 北五味 一兩 訶子 二兩 共

爲末熟湯和丸桐子大以溫補脾腎等藥隨證加減煎湯送

下或人參湯亦可如血熱妄行者以涼藥送下

撲汗法

凡自汗不止者用龍骨牡蠣糯米等分爲末絹袋盛周身撲之即止

成方切用

撲汗法

十 清固門 卷五

成方切用卷六目錄

表散門 正方二十七 附方三十八

桂枝湯

疏邪實表湯

桂枝甘草湯

桂枝加附子湯

桂枝附子湯

桂枝新加湯

桂枝加芍藥湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝加厚朴杏仁湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝加黃耆湯

桂枝五物湯

栝樓桂枝湯

成方切用

目錄

一 表散門 卷六

桂枝加龍骨牡蠣湯

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃加朮湯

麻黃附子湯

甘草麻黃湯

三拗湯

大青龍湯

小青龍湯

小青龍加石膏湯

葛根湯

桂枝加葛根湯

葛根加半夏湯

葛根解肌湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

升麻葛根湯

柴葛解肌湯

柴胡升麻湯

九味羌活湯

十神湯

神朮散

白朮湯

太無神朮散

成方切用

目錄

二

表散門 卷六

局方神朮散

許學士神朮散

九製蒼朮散

葱豉湯

連鬚葱白湯

人參敗毒散

倉廩散

硝黃敗毒散

敗毒加黃芩湯

連翹敗毒散

荆防敗毒散

川芎茶調散

菊花茶調散

再造散

麻桂飲

大溫中飲

升陽散火湯

方見瀉火門

藿香正氣散

方見和解門

大羌活湯

歸葛飲

舉斑湯

犀角消毒湯

柴葛煎

方見嬰孩門

成方切用

目錄

火鬱湯

見瀉火門

升陽散火湯

見瀉火門

三

表散門

成方切用卷六

表散門

仲景太陽經風傷衛用桂枝為主藥寒傷營用麻黃為主藥陽明經用葛根為主藥少陽經用柴胡為主藥此散表之準繩也後世宗之而用之有效有不效者蓋不獨分經之未的并性味亦有未精悉也凡用散之法當知性力緩急及氣味寒溫之辨用得其宜無不妙也如麻黃峻散寒邪桂枝解肌緩散者也防風荆芥紫蘇平散者也蒼朮羌活走經走溼而散者也柴胡乾葛薄荷涼散者也蒼朮羌活走經走溼而散者也柴胡乾葛薄荷涼散者也蒼朮羌活走經走溼而散者也柴胡乾葛薄荷涼散者也

成方切用

桂枝湯

桂枝湯 仲景

一

表散門

治太陽中風陽浮而陰弱發熱頭痛自汗惡風惡寒鼻鳴乾

嘔關前為陽衛為陽陽以候衛關後為陰營亦陰陰以候營受之故頭痛經曰陽浮者熱自發陰弱者汗自出風併於衛營弱衛強故發熱自汗也衛虛則惡風營虛則惡寒自汗則皮腠疏故惡風復惡寒也惡寒雖屬表亦有虛實之分無汗惡寒為表實宜發汗汗出惡寒為表虛宜解肌解肌之方無汗惡風未有不惡寒者所以傷寒亦互云惡風後人謂傷寒惡風誤矣及陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗脈遲汗多屬陽明證以微惡寒尚兼太

桂枝 芍藥

生薑 甘草

三兩 二兩

大棗 十二枚

熱服須臾啜

稀熱粥以助藥力溫覆取微似汗不可令如水淋漓汗出病

差停後服一劑盡病證猶在者更作服喻嘉言曰妙用全藥力穀氣內充則邪不能入而熱吸以繼藥之後則邪不能留法中之法若此世傳方書無此四字駭失初意更有已透微似之汗蓋覆強逼致令大汗淋漓者總不知解肌為何義爾所以服桂枝時要使周身發熱然似汗有汗者無非欲其皮毛開竅暫開而邪散也然恐藥力易過又藉熱粥以助其暖如此一時之久肌氣不致速閉則外受之邪盡從外解其為合法矣不識此意汗時不失之太過即失之不及太過則邪未入而先擾其營甚則汗不止而亡陽不及則邪欲出而不除而生變矣

周揚俊曰風既傷衛則衛氣疎不能內護於營而汗自出矣汗者血之液也桂枝血分藥也苟非以血藥入透營分和營散邪芍藥護營固裏則不但外邪不出且必內入而為腑患然後知和營則外邪出則衛自密更不必用固表之藥

成方切用

桂枝湯

二 表散門

而汗自止矣仲景曰病當自汗出者營氣和衛氣不共營氣邪營反出汗之理所以中風病治法宜桂枝湯也此明衛受風問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又曰或無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能開汗也二義相通否乎曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營弱衛強陰虛陽必湊之故用桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多則桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能開汗孔也○亦唯有汗者宜之若傷寒無汗則當以發汗為主而不獨調其營衛矣故曰無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃以桂枝湯中有芍藥故也蓋斂汗在芍藥不在桂枝也李東垣曰仲景治表虛製此湯用桂枝為君桂枝辛熱發散體輕助陽芍藥甘草佐之若腹中急痛乃製小建中湯以芍藥為君芍藥酸寒主收諸中桂枝甘草佐之一治表虛一治裏虛又曰以桂枝易肉桂治感寒腹痛之神藥如中熱腹痛去桂

加白朮川芎羌活防風飴糖名疎邪實表湯節治同 陶氏製

尤為君以代桂枝湯喻嘉言曰至令外感內傷混同論治矣○節麻黃所著傷寒六書書景原方參合後賢治法以代桂枝於仲景以節麻黃為捷徑以仲景為畏途節麻黃之書行而仲景之功卑而在長沙實為損也去芍藥薑棗名桂枝甘草湯景仲治發汗過多叉手自心下悸欲得按者方中行曰而心虛動悸故叉手自心下悸欲得按者桂枝走陰斂液宅心能收陰補陽之為用也○不用附子者未見惡寒也不加人參者不見沉遲脈也去芍藥為散也去薑棗無取辛散也故止用桂枝二甘草一則固表和中兩加附子名桂枝加附子湯

仲治太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸方中行曰此亦太陽中風誤汗之變證夫固表斂汗無出桂枝右矣而欲復陽益氣所以有附子之加焉○惡風為陽虛小便難為膀胱傷拘急難以屈伸因無津液以養此本桂枝證也誤用麻黃勢必至大汗而亡陽人身津液有幾

成方切用

桂枝湯

三 表散門

桂枝湯中為固表回陽上兩去芍藥加附子名桂枝附子湯堪漏而無已耶故以附子入仲治傷寒八九日風溼相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴脈浮虛而濡八九日再經之時既不傳經復不入裏者固風也不嘔不渴無裏證也浮風也虛則汗後之不足濡溼也其脈正與相應然後知風溼之邪在肌肉而不在筋節故以桂枝表之而不發熱為陽氣素虛故以附子逐溼兩相結合自不能謂矣○此得之寒因此方即後條之甘草附子湯以薑棗易朮之變制也去朮者以寒本無汗不似風之自汗而溼多也用薑棗者以寒屬陰不如風陽之能食也然去彼取此雖少殊而其所以散風除溼則均○金匱之治風寒溼者多矣未嘗不用附子獨於傷寒風溼者三方均用附子其理安在蓋傷寒熱證也加以風溼寒氣虛勢必易熱乃至八九日之內久則易而身熱難知其人陽氣素虛矣陽虛者故仲景用桂枝解外復重附子以溫經使經絡肌肉無虛不測則無邪矣再加芍藥生薑各一兩人參三兩名桂枝新加湯仲治

傷寒汗後身痛脈來沉遲

傷寒汗後身痛脈來沉遲者乃陽氣虛弱不能蒸出所致

發汗新虛故於桂枝湯中加芍藥以桂枝能解肌表之邪

參反固肌表之邪然在誤汗後正氣虛微餘邪不解有不得

汗而陽虛邪濇恐陽孤無偶和以芍藥俾不至散亂也加芍

藥一倍名桂枝加芍藥湯

治太陽誤下腹滿時痛屬太陰

也喻嘉言曰太陽病之誤下其變皆在胸膈以上此而腹滿

法以升舉陽邪但倍芍藥以收太陰去桂加茯苓白朮名桂

枝去桂加茯苓白朮湯

治服桂枝湯或下之仍頭項強痛

翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利

喻嘉言曰服桂枝湯不解而證變設更下之則邪勢乘虛入裏益誤矣在表之風

寒未除而在裏之水飲上逆故變五苓散

成方切用

桂枝湯

茯苓白朮為主治去桂枝者以已誤不可復用也然桂枝雖

不可用其部下諸屬皆所以必需備併不用芍藥以收陰甘草

董素以益虛而和脾胃何以定誤汗誤下之變耶加厚朴杏

仁名桂枝加厚朴杏仁湯

治太陽病下之微喘表未解也

微喘邪猶在中上略為上逆故但疎利其氣而已均人桂枝

湯者以表均未解也○厚朴杏仁為下氣散結之聖藥蓋誤

下則引邪入裏既入不復外出利其下行散其熱結而喘自

止矣然即非誤下而喘亦宜用此湯故仲景原文復申言此

湯也

去芍藥生薑加茯苓名茯苓桂枝甘草大棗湯

治汗後臍下悸欲作奔豚

喻嘉言曰汗本心之液發汗後

微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更吐下也面色反有

熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢宜桂枝麻黃

各半湯

準繩云首節頗似小柴胡證故以不嘔清便自調證

司開闢原非溫經之謂後節面色反有熱色言表邪未盡故

各半湯

之次節雖微惡寒止宜小建中加黃耆以溫分肉

宜各半湯不可與面赤色比類而觀也方中行曰如瘧狀

謂有往來寒熱也發熱惡寒熱多寒少者風寒俱有而寒少

風多也不嘔渴清便邪之往來未微表亦未及裏也二三度

發乃邪居淺近易及而頻數故脈亦微緩而為欲愈也脈微

而惡寒已下重以不得解者言而出其治也陰言後陽言前

俱虛故禁攻也不可得汗已過表也不可得汗下未見有裏也熱

色陽浮外薄風寒持之不散所以小汗亦不能得出也而瘧

也桂枝麻黃各半湯

湯

治服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形

如瘧日再發者汗出必解

喻嘉言曰此亦風多寒少之證服

桂枝湯治風而遺其寒汗反大出

成方切用

桂枝湯

五

表散門

卷六



麻黃 去節 桂枝 兩 杏仁 七十枚 甘草 炙 先煮麻黃數沸

去沫內諸藥煎熱服蓋取微汗中病即止不必盡劑無汗

再服 凡用麻黃去節湯略泡曬乾備用煎時先出則愈活

人云凡發汗病證仍在者三日內可二三汗之令腰以下周

偏為脈浮緩下之脈沉急下之脈汗當急而下當緩三陰

汗當緩而下當急按汗有大汗解表微汗解肌之殊下有急

下少與微和 麻黃中空辛溫氣薄肺家額藥而走太陽能開腠散寒

所主寒從此 桂枝辛溫能引營分之邪達之肌表 桂入營血

衛和始 杏仁苦甘散寒而降氣甘草甘平發散而和中經曰

寒淫於內治以甘熱佐以苦辛是已 喻嘉言曰麻黃發汗其

成方切用 麻黃湯 卷六 表散門

甘草和之用杏仁潤下以止喘逆正如駁馬防其放逸爾李

時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝其有寒者精

微者津液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗汗發熱

而惡寒風傷衛氣外泄不能內護於營營氣虛弱津液不

固故有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入皮毛肺之合

也證雖屬太陽然而赤白帶喘咳嗽有痰喘而胸滿非肺病乎

蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分

之邪達之肌表佐以杏仁潤肺而利氣汗後無大熱而喘者

加石膏活人書夏至後加石膏知母是皆泄肺火之藥是麻

黃湯雖太陽發汗重劑實散肺金火鬱之藥膝理不密則津

液外泄而肺氣虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪

以救表內伐肝木以防脾在胃藥瀉木而固脾使以薑棗

行脾之津液而和營衛下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣

也活人書加黃芩為陽明湯以泄肺熱也是桂枝湯雖太陽

不味故一稱為傷寒其煩則施治不得相混仲景之書專  
為傷寒之傷寒證不難為之傷寒之證病之證也今人以傷  
寒治治傷寒則熱證居多三陰傷寒證十居七八若溫病  
但一法治熱病則熱證居多三陰傷寒證十居七八若溫病  
景岳立麻黃湯桂枝湯之有其所主有疑諸熱劑不敢用是未悟仲  
劑則羣疑冰釋矣又曰傷寒即發於冬寒之時非用溫病閉  
其腠理非辛溫不能散之此麻黃桂枝等劑所以必用也溫  
病熱病發於春夏之時不能散之此麻黃桂枝等劑所以必用也溫  
若寒者發之劑不能散之此麻黃桂枝等劑所以必用也溫  
後人所處冰解散大黃湯千金湯防風通聖等所以不可用也而  
者之所以可用也也傷寒之傷寒有惡風惡寒之證者風寒  
在表衣氣受邪也後發之傷寒有惡風惡寒之證者風寒  
之證故仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病溫病如  
此則知熱病亦如此而不渴惡寒者非溫熱病矣或有因  
新中風寒亦見惡風惡寒之證者蓋因表虛熱達於表而傷  
表氣所謂衛虛則惡風惡寒之證者蓋因表虛熱達於表而傷  
寒也溫病熱病亦有先見表證而後傳裏者蓋熱自內達  
外也每見世人治溫熱病誤攻其裏亦無大害誤發其裏變不  
也每見世人治溫熱病誤攻其裏亦無大害誤發其裏變不

成方切用 麻黃湯 卷六 表散門

可謂此足明其熱之內達外矣間有誤攻致害者乃春夏

暴寒所中之疫證邪純在表未入於裏不可與溫病熱病同

論夫秋分後傷寒真傷寒也春夏傷寒寒熱疫也與溫病熱病自

是兩途豈可同治况傷寒直中陰經與太陽病傷寒不同其熱

即傳陰經為寒證而當溫者又與溫病熱病不同其熱

治乎。不惡寒則病非外來溫者又與溫病熱病不同其熱

後至秋分前不傳手非陽明之也也草窗劉子指足經所屬

日傷寒傳足不傳手非陽明之也也草窗劉子指足經所屬

水土木水遇寒而潤冰土遇寒而凝裂木遇寒而凋枯故寒

喜傷之手足經所屬金與火金遇寒而愈堅火遇寒而愈燥

輾故寒氣不能傷味者奇之病人身營衛經絡上下截斷不能

聯絡失血氣周流息之病人身營衛經絡上下截斷不能

灼熱鼻息粗細喘促手足不溫手足不溫手足不溫手足不溫

有傷寒自皮毛入之語先師有桂枝湯之設雖太陽表之



汗卽已脈沉者宜麻黃附子湯浮者宜杏子湯

病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻或從目出是名下厥上竭難治脈動數者不可發汗脈沉遲爲在裏反



小青龍湯

仲景曰傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利

或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

發熱惡寒頭痛身痛

屬太陽表證仲景書中凡有裏證兼表證者則以表不解三字該之內有水飲則水寒相搏水滯胃中故乾嘔而噎水寒射肺故欬而喘水停則氣不化津不生故渴水漬腸間故下利水蓄下焦故小便不利而少腹滿又曰傷寒

心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解

也小青龍湯主之

喻嘉言曰風寒水飲上逆津液不下行解之微也乃用小青龍湯大

率以輕劑助其欲解之勢爾

麻黃去桂枝芍藥酒炒細辛甘草炙乾薑兩半夏五味

子升水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升

成方切用小青龍湯

去滓溫服一升若微利者去麻黃加薤花如雞子大熬令

赤色麻黃發汗利則不宜利水渴者去半夏加栝樓根三

兩半夏燥津液枯噎者去麻黃加附子一枚炮噎水寒塞

子利氣而小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩茯苓能通

散而利水道喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖喘水氣射肺而

杏仁潤肺以下氣也

周禹載曰素常有飲之人一感外邪傷皮毛蔽肺氣停於心

下而上下之氣不利焉喘滿欬嘔相因而見於是以五味收

金乾薑散陰半夏祛飲而尤妙在用細辛為少陰經表藥且

能走水人之水氣大抵發源於腎故少腹滿小便不利因而

作喘安知少陰不為遺害乃以細辛搜豁伏邪走而不留而

後已上主散之藥皆靈動也

金匱云病溢飲者當發其汗大

徐忠可註曰溢飲者水已流行歸四肢以不汗而致身體大

重蓋表為寒氣所侵而水已流行歸四肢以不汗而致身體大

相雜猶之風寒兩傷內有水氣故以大青龍小青龙主之然

大青龍合桂枝而去芍藥加石膏則水氣不甚而表熱者宜之

傷寒而加五味乾薑半夏細辛雖表散而實欲其寒飲之下

生薑而加五味乾薑半夏細辛雖表散而實欲其寒飲之下

出也○觀仲景論太陽中喝身熱表散而實欲其寒飲之下

傷冷而水行皮中所致一物瓜蒂湯主之然曰發其汗則中

喝且勝理稍固不若夏月之易汗乎彼在夏月勝理本疎又

中喝在先故主吐然則夏月之易汗乎彼在夏月勝理本疎又

宜二湯可知也金匱云先渴後嘔者水停心下小青龙湯主

之不治渴而嘔治主之徐忠可註曰此即支飲之證也

不得臥小青龙湯主之徐忠可註曰此即支飲之證也

然而不治渴而嘔治主之徐忠可註曰此即支飲之證也

成方切用

石膏名小青龙加石膏湯

治肺脹欬而上氣煩躁而喘

脈浮者心下有水

金匱曰欬而上氣此為肺脹其喘目如

同是欬喘上氣脈浮然則條目如脫婢加半夏湯主之此條

夫  
卷六

東  
枚  
璧

成氏曰輕可去實葛根麻黃之屬是也此以中風表實故加

仲景以有汗無汗定風傷寒傷之別有汗爲風傷用桂枝加葛根湯不用麻黃無汗

卷六

之寒水

葛根解肌湯 治發熱惡寒頭痛項強傷寒溫病

傷仲景

治傷寒少陰病始得之反發熱脈沉者少陰脈微細但欲寐是也太陽勝於陰

麻黃二兩附子一枚細辛兩兩附子一枚先煮麻黃去上沫內辛

附煮取去渣溫服日三

太陽證發熱脈當浮今反沉少陰證脈沉當無熱今發熱故

曰反也熱為邪在表當汗脈沉屬陰又當溫故以附子溫少

陰之經以麻黃散太陽之寒而發汗以細辛腎經表藥聯屬

其間是汗劑之重者趙嗣真曰仲景太陽篇云病發熱頭痛

少陰篇云少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯

內強逼邪外出而乾重附子亦能出汗而散假令裏不虛寒

成方切用

麻黃附子細辛湯

太表散門

而脈浮則正屬太陽麻黃證矣均是脈沉發熱以無頭痛故  
名少陰病陰病當無熱今反熱邪在表未全入裏但皮膚  
鬱閉為熱故用麻黃細辛以發表熱附子以溫少陰之經假  
使寒邪入裏外必無熱當見吐利厥逆等證而正屬少陰四  
逆湯證矣由此觀之表邪浮淺發熱之反猶輕正氣衰微脈  
沉之反為重此四逆湯不為不重於麻黃附子細辛湯矣又  
可見熱附配麻黃發中有補生附配麻黃補中有發仲景之  
旨甚微矣按傷寒傳入三陰尚有在經表證如太陰有桂枝  
加芍藥湯少陰有麻黃附子細辛湯厥陰有當歸四逆湯之  
類皆陰經表藥也又按少陰經之甚若身熱頭痛全者則屬  
陽證醫貴貫日有頭痛連腦者此係少陰傷寒宜用麻黃附子  
細辛湯不可不知經又云少陰病吐利手足不逆冷反發熱  
者不死脈不至者灸少陰七壯此以陽氣為中少陰陰利  
法當厥逆以無陽也發熱為陽氣猶存故不死方中陰吐利  
熱邪在表也脈沉少陰位北而居裏也以其居裏邪在表而  
發熱故曰反也以邪在表不在裏故用麻黃以發之以其本  
陰而標寒故用附子以溫之細辛辛溫通於少陰用之以佐  
主治者以其專經而向導也陰嘉言曰仲景太陽經但有桂  
枝加附子法並無麻黃加附子法太陽無脈微惡寒之證不

仲景曰少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二

成方切用 麻黃附子細辛湯

成方切用

麻黃附子細辛湯

太表散門

三日無裏證故微發汗也喻嘉言曰不吐利煩躁嘔渴為無  
以甘草易細辛而微發汗又溫散之緩法也周揚俊曰言無  
裏證則亦有反發熱之表在可知也二方皆治少陰表證少  
陰無發汗之法汗之必至亡陽惟此二證用之此方又名  
麻黃附子湯金匱用治水腫已見麻黃湯附方下此處因列  
不妨重出

升麻葛根湯 錢仲陽

治陽明傷寒中風頭疼身痛發熱惡寒無汗口渴目痛鼻乾

不得臥及陽明發斑欲出不出寒暄不時人多疾疫三陽皆

故頭痛屬表六經皆有身痛在陽經則煩痛拘急風寒在表  
故發熱惡寒寒外故無汗熱入裏故口渴陽明脈絡鼻候  
日故日痛鼻乾陽明屬胃胃受邪故不安臥此其受邪之初  
猶未及乎狂也陽邪入胃裏實表虛故發斑細如蚊點為疹  
大若錦紋為斑

升麻三錢 葛根 芍藥二錢 甘草一錢 加薑煎 頭痛加川芎

白芷川芎爲通陰陽血氣之使白芷專治陽明頭痛 身痛背強加羌活防風此兼太陽

故兼 熱不退春加柴胡黃芩防風少陽司令柴 夏加黃芩

石膏清降火熱 頭面腫加防風荆芥連翹白芷川芎牛蒡石膏

升散 咽痛加桔梗清肺利咽 斑出不透加紫草茸涼血潤腸用茸

者取其初得暢 脈弱加人參 胃虛食少加白朮 腹痛

倍芍藥和之

陽明多氣多血寒邪傷人則血氣爲之壅滯辛能達表輕可

去實故以升葛辛輕之品發散陽明表邪陽邪盛則陰氣虛

故用芍藥斂陰和血又用甘草調其衛氣也雲岐子曰葛根爲君升麻爲佐

成方切用 升麻葛根湯 甘草芍藥 升麻甘草升陽解毒故又治時疫感時疫者必先入胃故用陽明

胃傷寒未入陽明者勿服恐反引表邪入陽明也斑疹已出

者勿服恐重虛其表也麻痘已見紅點則不可服陽明爲表

出之際宜服此湯以透其毒不可便服寒劑以攻其熱又不

可發汗攻下虛其表裏之氣如內熱甚加黃連犀角青黛大

青知母石膏黃芩黃蘗人參之類若斑勢稍退潮熱

諸證不大便可用大柴胡加芒硝調胃承氣下之

柴葛解肌湯 節菴製此以代葛根湯

治太陽陽明合病頭目眼眶痛鼻乾不眠惡寒無汗脈微洪

太陽脈起目內眥上額交巔陽明脈上至額顙絡於目風寒

上干故頭痛目痛眶痛也惡寒無汗屬太陽鼻乾不眠屬陽

明脈洪將爲熱也節菴曰此陽明在經之邪若正腑病另有治法

柴胡 葛根 羌活 白芷 黃芩 芍藥 桔梗 甘草

加薑棗石膏一錢煎 無汗惡寒甚者去黃芩

寒邪在經故以羌柴芷葛散之寒將爲熱故以黃芩石膏桔

梗清之三藥並泄肺熱以芍藥甘草和之也

柴胡升麻湯 局方

治少陽陽明合病傷風壯熱惡風頭痛體痛鼻塞咽乾痰盛

欬嗽唾涕稠黏及陽氣鬱遏元氣下陷時行瘟疫劉宗厚曰仲景與傷寒同論雖有麻黃桂枝之分至於傳變之後亦未嘗悉分之也諸家皆與感冒四氣併中風條混治惟陳無擇

別立傷風一方在四淫之首且依傷寒以太陽爲始分註六

經可謂詳密但風本外邪諸方例用解表發表然受病之源

亦有不同若表虛受風專用發表之藥必致汗多亡陽之譏

若內挾痰熱而受風亦宜內外交治不可顯於解表也或曰

此云表虛與傷寒中風表虛同歟子曰不同也彼以太陽中

風而於有汗無汗分虛實實者加麻黃虛者加葛根俱解表

成方切用 柴葛解肌湯 柴胡升麻湯 三 表散門

也此云表虛者當固守衛氣而散風者也

柴胡 前胡 黃芩 升麻 葛根 桑皮 荆芥 赤芍

石膏 加薑三片豉廿粒

陽明而兼少陽則表裏俱不可攻祇宜和解在經柴胡平少

陽之熱升葛散陽明之邪升提清陽前胡消痰下氣而解風

寒桑皮瀉肺利溼而止痰嗽荆芥疏風熱而清頭目赤芍調

營血而散肝邪黃芩清火於中上二焦石膏瀉熱於肺胃之

部風壅爲熱故以石膏辛寒爲君加薑豉者取其辛散而升發也

九味羌活湯 即羌活湯和湯張元素

治傷寒傷風憎寒壯熱頭痛身痛項痛脊強嘔吐口渴太陽

無汗及感冒四時不正之氣疫癘諸病有物有聲曰嘔氣逆則嘔有物無聲曰吐胃寒則吐邪熱在表則不渴傳裏則渴四時不正之氣謂天地間微惡之氣及病氣死氣流行傳染也

羌活 防風 蒼朮錢 牛細辛錢 川芎 白芷 生地 黃芩

甘草錢 加生薑葱白 如風證自汗者去蒼朮加耆朮

發表而即實表也 胸滿去地黃加枳殼桔梗 喘加杏仁 歐寇者隨關門也

汗下兼行加大黃

此足太陽例藥以代桂枝麻黃青龍各半等湯也藥之辛者

屬金於人為義故能匡正黜邪羌防蒼細芎芷皆辛藥也羌

活入足太陽為撥亂反正之主藥除關節痛甚 營朮入足

太陰辟惡而去溼能除溼下氣及安太陽使 邪氣不致傳足太陰脾 白芷入足陽明

成方切用

九味羌活湯

表散門

治頭痛在額芎朮入足厥陰治頭痛在腦細辛入足少陰治

本經頭痛皆能驅風散寒行氣活血而又加黃芩入手太陰

以泄氣中之熱生地入手少陰以泄血中之熱黃芩苦寒生 地寒滯二味

苟用於發熱之後則當 若初發熱猶當減也 防風為風藥卒徒隨所引而無不至

治一身盡痛為使甘草甘平用以協和諸藥也藥備六經治

通四時用者當隨證加減不可執一張元素曰有汗不得用 麻黃無汗不得用桂枝

若未瘥則其變不可言故立此方使不犯 三陽禁忌但陰虛氣弱之人在所禁爾

十神湯

局方

治時氣瘟疫癘氣初感頭痛發熱惡寒無汗欬嗽鼻塞聲重

癘氣由口鼻而入直行中道流布三焦致沿門闔境傳染相 似謂之瘟疫頭痛發熱惡寒無汗邪在表也欬嗽鼻塞聲重

表實而氣不利也○凡患時疫 而欬嗽者邪欲外出而易愈也

麻黃 葛根 升麻 川芎 白芷 紫蘇 甘草 陳皮

香附 赤芍 加生薑葱白

治傷寒須分六經見證用藥此則雖有發熱惡寒頭痛鼻塞

等證然屬時氣瘟疫與傷寒不同故總以疏表辛香利氣之

藥主之而又加芍藥甘草以和之吳綬曰此湯用升麻葛根 正傷寒之藥治太陽傷寒發熱用之 則引邪入陽明傳變發斑矣慎之

神朮散海藏

治內傷冷飲外感寒邪而無汗者內傷冷飲則寒溼停於中 經曰其寒飲食入胃則肺

寒肺寒則外內合邪是 也寒能滯血故無汗 亦治剛痙汗傷風後傷溼及太陽過 汗溼家過汗產後血虛破

傷風皆發痙其證頭搖口噤手足搐搦項背反張無汗為剛

痙有汗為柔痙亦有剛柔不分者不可純作風治宜清熱化

痰疎風養血亦有用大氣者凡陽症不厥逆其厥

逆者皆陰痙也宜附子湯附子防風散桂心白朮湯

蒼朮 防風 甘草 加生薑葱白 如太陽證發熱

惡寒脈浮緊者加羌活 浮緊帶洪者是兼陽明加黃芩

浮緊帶弦數者是兼少陽加柴胡 婦人加當歸

防風辛溫升浮除風勝溼為太陽主藥蒼朮甘溫辛烈散寒

發汗辟惡升陽能升陽 中陽氣 加甘草者發中有緩也

除蒼朮加白朮二兩薑三片不用葱名白朮湯海藏 治前證有

汗者蒼朮發汗 白朮止汗 亦治柔痙風而兼溼故多汗○按神朮白朮 嘉言曰此海藏得意之方蓋不欲無識者輕以麻黃 桂枝之熱傷人也昌明仲景不得不表揚海藏之功

桂枝之熱傷人也昌明仲景不得不表揚海藏之功

桂枝之熱傷人也昌明仲景不得不表揚海藏之功

桂枝之熱傷人也昌明仲景不得不表揚海藏之功



太無神朮散蒼朮治厚朴陳皮甘草藿香石

葛蒲各錢治感山嵐瘴氣憎寒壯熱一身盡痛頭面腫大瘡

瘧時毒治熱時毒感於暑濕人陽明邪正交爭陰勝則增

除濕散大頭瘡瘡毒治陽明邪正交爭陰勝則增

土此即平胃散而重用陳皮為君者也蓋人之一身以胃氣

為主胃氣強盛則容邪不能入故治外邪必以強胃為先也

加藿香葛蒲取其辛香通竅亦能辟邪而益胃也吳鶴皋曰

太無此方但理脾胃而解瘴之妙自在其中不愧為丹溪之

局方神朮散茅朮二川芎白芷羌活藁本細辛炙甘草各一兩

每服四錢加薑葱煎治傷風頭痛無汗鼻塞聲重及風寒欬

嗽時行泄瀉是頭痛鼻塞欬嗽是傷風也傷風應有汗若無汗

成方切用神朮湯 葱豉湯表散門 卷六

兼溼也蒼朮辛羌活各走一經祛風發汗而勝溼

散三陽之邪而能升清者也加甘草者緩其中也

許學士神朮散蒼朮一脂麻五錢棗五十枚取肉搗丸治水

飲結成澀囊水飲結成澀囊非蒼朮辛烈雄壯不能破之加

九製蒼朮散茅山蒼朮九蒸九曬為末治痰飲腹痛

葱豉湯肘後

傷寒初覺頭痛身熱脈洪便當服此

葱白握一握煎服取汗出如無汗加葛根三兩崔氏

葱通陽葱中空為肺榮散豉升散均能發汗邪初在表宜先

服此以解散之免用麻黃湯者之多所願忌用代麻黃湯者

之多所紛更也

去淡豉加生薑名連翹葱白湯活人治同

人參敗毒散活人

治傷寒頭痛憎寒壯熱項強睛暗鼻塞聲重風痰欬及時

氣疫癘嵐瘴鬼瘧或聲如蛙鳴眼赤口瘡溼毒流注腳腫腮

腫喉痺毒痢諸瘡斑疹風寒在表則惡寒發熱頭痛項強風

症下流則足腫傷於陽明則腮腫結於少陰則喉痺瘰癧於

皮腐則瘡疹

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼 桔梗

茯苓 甘草五錢 每服一兩加薑三片薄荷少許煎口

乾舌燥加黃芩 腳氣加大黃蒼朮 膚痒加蟬蛻

成方切用人參敗毒散表散門 卷六

羌活入太陽而理遊風獨活入少陰而理伏風兼能去溼除

痛柴胡散熱升清協川芎和血平肝以治頭痛目昏前胡枳

殼降氣行痰協桔梗茯苓以泄肺熱而除溼消腫人參甘草

輔正以匡邪疏導經絡表散邪滯故曰敗毒喻嘉言曰暑溼

此方為第一三氣合邪豈易當哉其氣五傳則為疫矣方中

所用皆辛平更有人參大力者荷正以祛邪病者日服二三

劑使疫邪不復留滯不悞哉奈何俗醫滅去人參曾與他方

有別耶又曰傷寒宜用人參其辨不可不明蓋人受外感之

邪必先汗以驅之唯元氣虛者始乘藥勢以出若素弱之

之人藥雖外行氣從中微輕者半出不出重者反隨元氣縮

入發熱無休矣所以虛弱之體必用人參三五七分入表藥

中少助元氣以為驅邪之主使邪氣得藥一湧而出全非補

養衰弱之意也即和解藥中有人參之力者居間外邪遇

者謂傷寒無補法邪得補而微熾即瘧疾瘧疾以及中風中



生之機悉置不理矣古方表汗用五積散參蘇飲敗毒散和解用小柴胡白虎湯竹葉石膏湯等方皆用人參領內邪外和之熱亦不退大熱呻吟津液灼盡身如枯柴醫者技窮正謂元氣已瀕故藥不應手爾僅元氣未瀕先用人參三五七分領藥深入藥邪何至汗印不應邪東垣治內傷外感用補中益氣加表藥一二味熱服而散外邪有今日醫家單除不從仲景至今明賢方書無不用參何為今日醫家單除不蓋全失相傳宗旨使體虛之人百無一活會不悟其害之也蓋不當用參而殺人者是與者九歸桂附等藥同行溫補之誤不謂與羌獨柴前芎半枳桔等藥同行汗和之法所致也安得視等視鴉耶嘉靖己未江淮大疫用敗毒散倍人參已壬午大饑大疫道殣相望汗和藥中惟加入參者多活饑饉兵荒之餘飲食起居不節致患時氣者宜用此法

**加陳廩米名倉廩散治噤口痢** 乃熱毒冲心食入即吐單陳廩米煎湯治痢後大渴飲水

**止加大黃芒硝名硝黃敗毒散治熱毒壅積加黃芩名敗毒**

**成方切用** 川芎茶調散 表散門 卷六

**加黃芩湯治溫病不惡寒而渴加連翹金銀花名連翹敗毒**

**散治瘡毒如有風熱加荆芥防風名荆防敗毒散亦治腸風**

**下鮮血** 血鮮者為腸風隨感而見也 血瘀者為腸毒積久而發也

**川芎茶調散** 局方

**治諸風上攻正偏頭痛惡風有汗憎寒壯熱鼻塞痰盛頭運**

目眩正偏頭痛者風中於腦作止無時也中風故有汗惡風泄越氣併於鼻故鼻塞壯熱風寒傷於皮毛腠理密緻不得痰盛痰熱上攻故頭運目眩

**薄荷** 錢八 荊芥 錢四 甘草 炙 羌活 白芷 錢二 防風 錢半 細辛 錢一

**每三錢茶調服一方加菊花** 錢一 殭蠶 分三 名菊花茶調散

**治頭目風熱** 菊花清熱明目 殭蠶消風化痰

**羌活治太陽頭痛白芷治陽明頭痛川芎治少陽頭痛細辛**

**治少陰頭痛防風為風藥卒徒皆能解表散寒以風熱在上**

**宜於升散也頭痛必用風藥者以巔頂之上惟風可到也薄**

**荷荊芥並能消散風熱清利頭目故以為君** 辛香輕清能入風熱肝風散同諸藥上行以升清陽而散鬱火清陽不升則頭目清明

**加甘草者以緩中也用茶調者茶能上清頭目也** 凡頭痛皆以升散之也若服辛散藥反甚者則宜用酸溫收而降之

**再造散** 節菴

**治陽虛不能作汗** 陶節菴曰治頭痛項強發熱惡寒無汗服發汗藥一二劑汗不出者為陽虛不能作汗名曰無陽諸痛醫不識不論時令遂用麻黃重藥劫取其汗誤人多矣。此方必脈證中有虛寒之實據方可用也

**人參 黃耆 桂枝 甘草 附子 地 細辛 羌活 防風**

**川芎 煨薑 棗二枚加炒芍藥一撮煎**

**經曰陽之汗以天地之雨名之汗之無汗邪盛而真陽虛也**

**故以參耆甘草薑桂附子大補其陽而以羌防芎細發其表**

**邪加芍藥者散中有收且能滋調營衛為諸陽藥取汗之助**

也 節菴曰人第知參耆能止汗而不知其能發汗以在表藥中益氣加表藥即助表藥而解散也東垣丹溪治虛人感冒多用補藥即同此意

**麻桂飲** 景岳

**治傷寒瘟疫陰暑瘧疾凡陰寒氣勝而邪有不能散者非此**

不可無論諸經四季凡有是證即宜是藥勿謂夏月不可用  
也不必厚蓋但取津津微汗透出為度此實麻黃桂枝之變

方而其神效則大有同於二者者不可不為細察

官桂錢一二 當歸錢三四 炙甘草錢一 麻黃錢二三 陳皮隨宜用 水

一盞半加生薑五七片或十片煎八分去浮沫不拘時服

若陰氣不足者加熟地三五錢 若元氣大虛陰邪難解者

當以大溫中飲更迭為用

大溫中飲 景岳

凡患陽虛傷寒及一切四時勞倦寒疫陰暑之氣身雖熾熱

時猶畏寒即在夏月亦欲衣被蓋或喜熱湯或兼嘔惡泄瀉

成方切用

麻桂飲 大溫中飲

表散門

但六脈無力肩背怯寒邪氣不能外達等證此元陽大虛正

不勝邪之候若非峻補托散則寒邪日深必至不救溫中自

可散寒即此方也服後畏寒悉除覺有躁熱乃陽回作汗佳

兆不可疑之畏之此外凡以素稟薄弱之輩或感陰邪寒疫

發熱困倦雖未見如前陰證而熱邪未甚者但於初感時即

速用此飲連進二三服無不隨藥隨愈真神劑也此方宜與

理陰煎麻桂飲相參用

熟地錢三五 於白朮錢三五 當歸錢三五 如泄瀉者人參錢二三 錢

兩或甘草錢一 麻黃錢三 柴胡錢一 乾薑錢一 用煨薑三五片 水

二盞煎八分去浮沫溫服或略蓋取微汗 如氣虛加黃耆

二三錢 如寒甚陽虛者加附子一二錢 如肚腹泄瀉宜  
少減柴胡加防風細辛亦可

此方惟氣血兩虛而重感寒邪者宜之非正傷寒治法

大羌活湯 潔古

治兩感傷寒 內經曰傷寒一日巨陽受之太陽經脈循腰脊

主肉其脈使鼻絳於目故身熱目疼而鼻乾不得臥三日少

陽受之少陽主膽其脈循脇絡於耳故胸脅痛而耳鳴四日

太陰受之太陰主脾其脈循胃絡於舌故口燥舌乾而渴六日

陰受之少陰主腎其脈循於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日

陰受之厥陰脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮兩感者謂一

日則太陽與少陰俱病有身熱語而頭項強而口乾煩渴也二日

則陽明與太陰俱病有身熱語而腹滿不飲食也三日

則少陽與厥陰俱病有身熱語而囊縮不食也此陰陽

表裏俱病故汗之則有裏證欲下之則有表證故仲景不立

治法吳鶴皋曰易老製此方意謂傳經者皆為陽邪一於升

陽散熱滋養陰臟則感

之淺者尚或可平也

羌活 獨活 防風 細辛 防己 黃芩 黃連 蒼朮

甘草 白朮 知母 川芎 生地 每服五錢熱飲

此陰陽兩解之藥也氣薄則發泄故用羌獨蒼防芎細祛風

發表升散傳經之邪寒能勝熱故用芩連知母生地防己清

熱利溼滋培受傷之陰又用白朮甘草以固中州而和表裏

之氣升不至峻寒不至凝間能回九死於一生也

云兩感病俱作治有先後如表急當先救裏裏急當先  
救裏李挺曰表裏俱急者大羌活湯陽證體痛而不下痢者  
為表急先以葛根麻黃解表後以調胃承氣攻裏陰證身痛  
而下利不止者為裏急先用四逆救裏後以桂枝救表陰陽  
頭痛加羌活防風口渴加黃芩知母二日陽明太陰大柴胡

湯三日少陽厥陰危甚大承氣加川芎柴胡救之劉宗厚曰  
傷有兼風兼溼不同表裏俱實俱虛之異大抵俱虛為多脈  
從陰者可治  
歸葛飲 景岳

治陽明溫暑時證大煩大渴津液枯涸陰虛不能作汗等證

當歸 錢三五 乾葛 錢二三 水二盞煎一盞以冷水浸涼徐徐服

之得汗即解

舉斑湯

治瘟疫斑毒內陷 吳又可曰瘟疫邪留血分裏氣壅閉不下  
漸出更不可下設有下證宜少與承氣緩服僅大下則元氣  
不振斑毒內陷則危宜先與舉斑湯如下後斑毒隱伏反見  
循衣撮空脈微者本方加人

參三錢得補發出者不死

成方切用

歸葛飲 舉斑湯 犀角消毒湯 柴葛煎 手 表散門 卷六

白芍 當歸 錢一升 麻 錢五分 柴胡 白芷 錢七分 穿山甲 錢二 水煎

犀角消毒湯

治瘟疫毒氣發斑痛痒

牛蒡子 炒 防風 錢二 荆芥 錢一 甘草 錢八 犀角 錢一 每服三錢水煎

入犀角汁服

柴葛煎 景岳

治瘟疫痘疹表裏俱熱能散毒養陰

方見 嬰孩門疏邪飲附方

成方切用卷七目錄

涌吐門 正方八 附方二十六

瓜蒂散

獨聖散 三聖散

又三聖散

參蘆散

梔子豉湯

梔子甘草豉湯 梔子生薑豉湯

梔子乾薑湯 梔子厚朴湯

梔子大黃湯 枳實梔子豉湯

成方切用

目錄

涌吐門

豉蘆湯 犀角大青湯

吐法

又一法

稀涎散

常山散

乾霍亂吐方

燒鹽探吐法 又二法

搐鼻法

搐鼻如聖散

當歸湯

成方切用卷七

涌吐門

邪在表宜汗在上焦宜吐在中下宜下此汗吐下三法也  
今人惟知汗下有吐法絕不用使遇當吐之證而不行  
涌越則邪氣壅結而不散矣終日其高者因而越之又曰  
在上者涌之丹溪曰吐中就有發散之義張子和曰諸汗  
法古方多有之惟以此吐發汗者世罕  
知之故予嘗曰吐法兼汗其以此夫

瓜蒂散

治卒中痰迷涎潮壅盛顛狂煩亂人事昏沉五癇痰壅食填

太陰欲吐不出亦治諸黃急黃

卒然發黃心滿氣喘命在須臾曰急黃或服此散或搗鼻

或加仲景云病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞

硬氣上衝咽喉不得息此為胸中有寒也當吐之宜瓜蒂散

成方切用

瓜蒂散

涌吐門

諸亡血虛家不可與瓜蒂散

喻嘉言曰寒者痰也痰飲內動身必有汗加以發熱惡寒全似中風但頭不痛項不强此非外入之風乃內

蘊之痰室塞胸間宜用瓜蒂散以湧出之也又曰病人手足

厥冷脈乍緊者邪結在胸中心下滿而煩饑不能食者病在

胸中當須吐之宜瓜蒂散

手足厥冷與厥陰之熱深厥深相矣可見痰結在胸故滿煩而

不能食亦宜瓜蒂散為吐法也

甜瓜蒂炒赤小豆等分各別搗篩為散已合治之取一錢

七以香豉一合熱湯七合煮稀糜取汁和散溫頓服之快吐

乃止吐時須令閉目緊束肚皮吐不止者葱白湯解之良久

不出者含砂糖一塊即吐諸亡血虛家老人產婦挾虛脈微

者俱不可服

非尺脈絕者不宜便服此恐損胃氣若此劑中室塞悶亂以物探之得吐即止若探不出方以

此湯吐之

胸中痰食與虛煩者不同越以瓜蒂之苦涌以赤小豆之酸

吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣

十劑可去淫桑白皮赤小豆之屬是也赤豆瓜蒂並能行水淫痰

涎頭痛胸滿寒熱脈緊不大者宜此散吐之或問何謂木鬱

鬱曰厥陰少陽屬木於令為春乃人身生發之氣也食者陰

物也脾胃者坤土也飲食則土盛而反侮木生人氣不得上升而木鬱矣

時人土焦有形之物則木得條達而遂其升生之氣矣當用而胃弱者改用

參蘆

除赤豆名獨聖散 仲景曰太陽中暈身熱疼重而脈微弱

此以夏月傷冷水水行皮中所致也

劉宏璧曰仲景於此病逐其水則陽氣行而身重疼熱立解矣此則內因也由是推

之如水且變散為湯并無賴於赤小豆與漿水者蓋以一物驅

利小便而解上溼下流與下溼上甚為熱者可一汗而解也

除赤豆加防風黎蘆名三聖散

除赤豆加鬱金韭汁搗翎

探吐亦名三聖散治中風風癱痰厥頭痛除赤豆加全蠍五

分吐風痰加淡豉治傷寒煩悶

瓜蒂梔子散皆吐劑要知瓜蒂熱如未經汗下邪鬱胸膈而痞滿者謂之實宜瓜蒂散此重

劑也已經汗下邪乘虛客胸中而懊憹者宜梔子散此輕

劑也○丹溪用瓜蒂梔子散參藜蘆等藥吐許白雲不透後以附子尖和漿水與之始得大吐也

參蘆散

治虛弱人痰涎壅盛

人參蘆 為末水調一二錢或加竹瀝

探吐之

如不探亦未必吐也

病人虛羸故以參蘆代藜蘆瓜蒂宣猶帶補不致耗傷元氣也  
丹溪曰人參補陽中之陰蘆反瀉太陰之陽亦猶麻黃苗能發汗根能止汗也

梔子豉湯 仲景

治傷寒汗吐下後虛煩不眠劇者反覆頭倒心中懊憹及大

下後身熱不退心下結痛或痰在膈中 汗吐下後正氣不足故煩熱懊憹煩熱者熱而煩懊憹者懊憹煩悶也苦動爲陽夜臥主陰陽熱未散陰氣未復故不得眠身熱去而心結痛者熱散漫爲虛煩熱仍在表故當越之

梔子 十四 淡豉 四 服令微吐

煩爲熱勝梔子苦寒色赤入心故以爲君淡豉苦能泄熱腐能勝焦 腎氣爲腐心氣爲焦助梔子以吐虛煩故以爲臣酸

成方切用

梔子豉湯

三

卷七

苦涌泄爲陰也此吐無形之虛煩若膈有實邪當用瓜蒂散

海藏曰煩氣也躁血也煩出於肺躁出於腎故用梔子治肺煩香豉治腎躁亦用作吐藥以邪在上焦吐之則邪散經所謂在上者因而越之也或問煩躁皆心爲之何謂煩出於肺躁出於腎曰熱則煩燥則躁煩爲陽躁爲陰大抵皆心火爲病火旺則金燥而水虧惟火獨在故肺腎合而爲煩躁○仲景曰病人舊微瀉者不可與服論嘉言曰舊微瀉則大瀉易動服此方不能上湧反爲下泄矣錄內經有先泄而後生他病者治其本必先調之後乃治其他病故此示戒又曰諸梔豉一法證顯實煩虛煩之不同要皆可用以湧其餘熱乃因汗吐下後胸中陽氣不足故虛之處便是容邪之處正宜因其高而越之爾若謂津液內竭正氣暴虛餘邪不盡則宜仲景原有之甘草湯一法寧敢妄湧以犯虛虛之戒耶  
加甘草名梔子甘草豉湯 仲景治前證少氣者則加甘草以少氣中人皆知之然既少氣謂是後中虛雖邪氣未退故用梔豉以湧吐之乎乃知此證之少氣緣外邪內陷洵是熱傷元氣而不與但內弱者同此 加生薑名梔子生薑豉湯 仲景治前

證兼嘔者 辛以除淡豉加乾薑名梔子乾薑湯仲景治傷寒醫

以丸藥大下之身熱不去微煩者 喻嘉言曰丸藥大下傷其

梔子合乾薑用之亦 溫中散邪之法也 除淡豉加厚朴枳實名梔子厚朴湯 景

治傷寒下後心煩腹滿臥起不安者 喻嘉言曰滿而不煩即

不滿即表證未罷之虛煩合而有之且臥起不安用是邪索

胸表腹裏之間無可奈何之象故取梔子以快湧其邪而洽

滿亦表裏兩解之法也 加枳實大黃名梔子大黃湯 仲景治酒

疸發黃心中懊憹或熱痛亦治傷寒食復 輕則導下加枳實

名枳實梔子豉湯 景仲治傷寒勞復 餘熱爲勞復傷食者爲食

復加薤白名豉薤湯 張文治傷寒下利如爛肉汁赤滯下伏

氣腹痛諸熱證 梔豉苦寒能升能散薤白辛溫能開胸痺及大腸氣滯 加犀角大青名

成方切用 吐法 稀涎散

犀角大青湯治斑毒熱甚頭痛

吐法

此方可代瓜蒂三聖之屬凡邪實上焦或痰或食或氣逆不

通等證皆可以此代之

蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取淡湯徐徐飲之少頃即當吐即

有吐不出者亦從下行矣

一法以蘿蔔子爲末溫水調服一匙良久吐涎沫愈

稀涎散

治中風暴仆痰涎壅盛氣閉不通先通其關令微吐稀涎續

進他藥 不可令大吐後不可大投 亦治喉痺不能進食

阜角四挺去白礬一為末溫水調下五分或加藜蘆此吐

風痰善通  
頂令人嚏

吳鶴皇曰清陽在上濁陰在下天冠地履無暴仆也若濁邪  
逆上則清陽失位而倒置矣故令人暴仆所以痰涎壅塞者  
風盛氣湧使然也經曰病發於不足標而本之先治其標後  
治其本故不與疎風補血而先吐其痰涎白礬酸苦能涌泄  
鹹能蠱頑痰故以為君阜角辛能通竅鹹能去垢專制風木  
故以為使固奪門之兵也師曰凡吐中風之痰使咽喉疎通  
能進湯藥便止若盡攻其痰則無液以養筋令人攣急偏枯  
此其禁也丹溪曰胃氣亦賴痰以養不  
可盡攻攻盡則虛而愈劇

戊方切用

乾霍亂吐方

五涌吐門

張子和加藜蘆常山甘草名常山散吐瘧疾甘草台常  
山必吐

乾霍亂吐方三因

治乾霍亂欲吐不得吐欲瀉不得瀉腹中大痛者霍亂攪霍  
有所感內有所傷陰陽乖隔邪正交爭故上吐下瀉而中絞  
痛也邪在上焦則吐在下焦則瀉在中焦則吐瀉交作此淫  
霍亂證輕易治若不能吐瀉邪不得出壅遏正氣關格陰  
陽其死甚速俗名攪腸沙切勿與穀食即米飲下咽亦死

燒鹽 熱童便 三飲而三吐之

吐瀉不得邪結中焦鹹能軟堅可破頑痰宿食炒之則苦故  
能涌吐童便本人身下降之氣引火下行乃其舊路味又鹹  
寒故降火甚速此由脾上鬱極而不得發以  
致火熱內擾陰陽不交而然鹽涌於上溺泄  
於下則中通矣方極簡易而有回生之功不可忽視準德曰  
鹽涌童

便非獨用以降陰之不通也陰既  
不通血亦不行兼用行血藥也

單用燒鹽熟水調飲以指探吐名燒鹽探吐法治傷食痛連  
胸膈痞悶不通手足逆冷尺脈全無食積太陰抑遏膽肝之  
故痛連胸膈陽氣不舒故手足逆冷下焦隔絕故尺脈不至  
則胃下而脾堅能破積聚又龍宜涌使不化之食從上而出  
則胃通矣亦未嘗達之也經曰上部有脈下部無脈其人  
當吐不吐者死或曰食填太陰胸中痞亂兩寸脈當用事今  
反尺脈不見其理安在曰獨陽不生獨陰不長天之用在於  
地則萬物生長地之用在於天則萬物收藏此乃天在  
五臟主有形之物物者陰也陰者水也食塞於上絕五臟  
之源源絕則水不下流千金用此法三飲三吐通治霍亂盡  
兩尺之絕此其理也

毒宿食腹痛冷氣鬼氣且曰此法大勝用藥凡有此疾者宜  
先用之○又有中食證忽然厥逆口  
不能言肢不能舉者名曰食厥若作中風中氣治  
之死可立待宜先以鹽吐之再用消食導氣之藥

戊方切用

搐鼻法

六

涌吐門

一法用鹽少許於熱鍋中炒紅色乃入清水煮至將滾未滾  
之際攪勻試其滋味稍淡乃可飲之每用半碗漸次增飲自  
然發吐以去病為度而止

又法凡諸藥皆可取吐但隨證作湯劑探而吐之無不可也

搐鼻法

溼家鼻塞頭疼或頭額兩太陽痛宜行此法

苦瓜蒂不拘多少為末令病人嚙水一口將此藥一字吹入

鼻中出黃水愈凡云一字者二分半  
也取一文四字之義

溼家頭疼是濁邪干清陽之分也鼻者氣竅上通於腦下屬  
於肺濁邪干之故清竅不利瓜蒂苦而善湧瀉鼻竅受之則

能出濁邪而瀉溼熱經曰客者除之此之謂也

搐鼻如聖散

治纏喉急痺牙關緊閉

皐角

去皮炙

白礬

雄黃

藜蘆

爲末搐鼻

當歸湯

吐虛痰

體弱痰乾而吐不出者此方神効雖吐而絕不傷氣血也

當歸

錢五

甘草頭

錢

參蘆 逆流水煎

成方切用

搐鼻如聖散

當歸湯

七

涌吐門  
卷七

成方切用卷八目錄

攻下門 正方二十四 附方一十八

大承氣湯

三一承氣湯

六一順氣湯

黃龍湯

麻仁丸

小承氣湯

三化湯

厚朴大黃湯

調胃承氣湯

當歸承氣湯

大黃甘草湯

破棺丹

成方切用

目錄

一

攻下門  
卷八

大陷胸湯

白散

小陷胸湯

大陷胸丸

十棗湯

三化神佑丸

小胃丹

赤金豆

三物備急丸

備急散

太平丸

硝砂丸

敬阜丸

木香瀝榔丸

木香導氣丸

百順丸

枳實導滯丸

倒倉法

霞天膏

蜜煎導法

豬膽導法

成方切用

鹽合草烏導法

大螺着小腹法

罌傷寒結胸法

附子瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

抵當湯

桃仁承氣湯

威應丸

久痛丸

天台烏藥散

目錄

二

攻下門  
卷八

醬薑導法

竹葉薰法

蘿蔔菜薰法

成方切用

目錄

三

攻下門  
卷八



攻下門

凡之氣者攻其聚聚可散也攻血者攻其瘀瘀可通也攻積者攻其堅在臟者可破可行在經者可鍼可灸也攻癰者攻其急堅實者暫宜解標多虛者只宜求本也但諸病之實有微甚用攻之法分輕重大實者攻之未及但諸病可攻陰病在胸者不可攻賊若其者病必乘虛內陷所謂引賊入門也病在陰者勿攻其陽病在裏者勿攻其表若此者病必因誤而甚所謂自撤藩籬也大都治宜用攻必其病邪之甚者若實邪既甚自與攻藥相宜不必難之補劑蓋實不嫌攻若但略加甘滯使相牽制虛不嫌補若但略加消耗便覺相妨所以純虛者最不可喜清熱實者最不喜暖然實而誤補不過增病病增者不可喜虛而誤攻必先脫元元脫者無治矣是皆攻法之要也其或虛中有實實中有虛此又當酌其權宜不在急宜攻急宜補之例雖然凡用攻之法所以除凶翦暴也亦猶後世之兵必不可無然必不得已乃可用之若或有疑再加詳慎蓋攻雖去

成方切用

邪無弗傷氣傷血實自古仁人所  
深忌者正恐其成之難敗之易爾

大承氣湯

治傷寒陽明腑證陽邪入裏胃實不大便發熱譫語自汗出

不惡寒痞滿燥實堅全見雜病三焦大熱脈沉實者陽明外證身熱  
汗出不惡寒反惡熱是也此爲在經仍當汗散若熱邪已入  
胃腑痞滿燥熱堅全見者是爲當下實則當自汗出亡液虛  
則鄭聲一語頻言也陽明多血多氣法當自汗過汗亡液虛  
水以制火腸胃有燥蘖結而不下故妄見妄言也經曰何緣  
得陽明病曰太陽病若汗若下若利小便此亡津液胃中乾  
燥因轉屬陽明胃實大便難也又曰太陽初病發其汗汗先  
出不微因轉屬陽明胃實大便難也又曰太陽初病發其汗汗先  
能食爲中寒寒陰邪不能消穀以此爲辨○胸悶不食爲痞  
胸腹膨脹爲滿大便結少爲燥腹  
滿痛不大便爲實按之石硬爲堅  
證腹滿口噤臥不著席手足斷齒而無汗謂之剛瘕宜下之  
者以陽明主潤宗筋風寒淫熱傷陽明胃津液不行筋失所

養故以此湯下。溼熱行津液。喻嘉言曰。傷寒腹滿。可下。胸滿不可下。謂熱邪尚在表也。此證入裏之熱極深。極重。陽熱既極。陰血立至。消亡小小下之。尚不能勝。必大下之。以承領其一線之陰。陰氣不盡。爲野馬。劫因而得生者多矣。既有下多亡陰之大戒。復有急下救陰之活法。學者深造端在斯矣。○經曰。陽明居中土也。萬物所歸。無所復傳。以胃爲水穀之海。四旁有病。皆傳入胃。已入

大黃四兩酒洗王海藏曰邪氣居高非酒不到若用生者則遺高分之邪熱病愈後變生目赤喉痹頭腫膈上熱疾也

芒硝三合厚朴半枳實五枚先煎朴實將熟內大黃煮二三

沸傾碗內和芒硝服得利則止

黃不熱發表用麻黃無葱白不發吐痰用瓜蒂無淡豉不  
湧竹瀝無葶汁不能行經絡蜜導無皂莢不能通秘結

熱淫於內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故

用芒硝之鹹寒以潤燥，鞣堅大黃之苦寒以瀉熱，去瘀下燥。

成方切用

大承氣湯

三

攻下門

結泄胃強枳實厚朴之苦降瀉痞滿實滿經所謂土鬱奪之

也陽明屬上。大黃治大實。芒硝治大燥。大堅二味治有形。然血藥也。厚朴治大滿。枳實治痞。二味治無形氣藥也。

非大實大滿不可輕投恐有寒中結胸痞氣之變

由作也。○承順也。十劑曰通可去滯泄可去閉使塞者利而閉者通正氣得舒故曰承氣。仲景曰欲行大承氣先與小承

氣若腹中轉矢氣者有燥屎也可以大承氣攻之若不轉矢氣者此但初鞭後唐不可攻之攻之必脹滿不能食也又用

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯  
陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯比新其人易

明之路仍從外解則不內攻也又曰陽明病應發汗按反下

實爲正則皆下證也陽明之邪其來路則由太陽凡陽明證見八九而太陽證有一二未罷乃從太陽而不從陽明下

而不可下也其去路則趨少陽凡陽明證雖見八九而少陽證略見一二則從少陽而不從陽明下而不可用也

寒之邪已離太陽未接少陽恰在陽明界內亟爲攻下則不

已盡方敢議下不知太陽有十餘日不解者若不辨經而但計日其誤下仍在太陽至陽明二三日即顯下證反以計日當面錯過及陽明已入少陽又以計日妄行攻下輕者重而重者死矣仲景法日數雖多但有表證而脈浮者猶宜發汗日數雖少若有裏證而脈沉者即宜下之○古人有治惡寒戰慄用大承氣下燥屎而愈者此陽邪入裏熱結於裏表虛無陽故惡寒戰慄此陽盛陰陷乃熱病非寒證誤投熱藥則死矣

### 加甘草等分名三一承氣湯 治大承氣證腹滿實痛調胃

證諸語下利小承氣證內熱不便一切傷寒雜病畜熱內甚

燥實堅脹 謂小承氣則邪不服若小承氣證反用大承氣則

過傷元氣而腹滿不能食仲景所以分而治之也後人以三方

合而為一方云通治三方之證及傷寒雜病內外一切所傷與

仲景之方甚相遠辰失軒岐緩急加柴胡黃芩甘草入鐵繡

之旨使病人暗受其害將誰咎哉 水三匙墜熱開結名六一順氣湯 節菴謂合三承氣三一承

成方切用 大承氣湯 氣大柴胡大陷胸六方而

為一治潮熱自汗發渴譫語狂妄斑黃腹滿便實正陽明腑

病加人參甘草當歸桔梗薑棗名黃龍湯治邪熱傳裏胃有

燥屎心下硬痛身熱口渴下利純清水 有燥屎何以又下清

寒而利乃日飲湯藥而下滲也名熱結利庸醫妄謂漏去芒

硝加麻仁杏仁芍藥蜜丸名麻仁丸 景治跌陽脈浮而濇浮

則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾為約跌陽

也經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺

通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾主為胃行其

津液者也今胃火乘脾約束津液但輪膀胱致小便數而大

便難故名脾約與此九潤燥通液但輪膀胱致小便數而大

仲景曰太陽陽明脾約是也按成氏釋此證謂脾弱胃強然

本云但云脾約未嘗云脾弱也蓋嘉言曰脾弱即當補矣何

為反用大黃朴實乎此脾上過燥使腸胃津液枯槁致中消

證中凡宜攻下者惟恐邪未入胃大便勿鞭又恐初鞭後濇未可妄攻故先與小承氣試其轉矢氣方可攻之皆是慮夫脾氣之弱也若脾約證在太陽即當下矣何待陽明耶朱丹溪曰此由久病大下之後陰血枯槁內火熾灼熱傷元氣又傷於脾而脾虛土欲不傷其可乎肺失傳送脾熱液虧故大便硬而小便利也理宜滋養陰血使火不熾而金化行木有制而脾上運津液乃能入胃腸潤而通矣此方施之熱盛而氣實者則安若熱盛而血虛者勿膠柱而鼓瑟也

當下諸證 發汗不解腹滿痛者急下之利三部脈皆平按

之脈經曰滑為食病仲景曰滑則穀氣實又曰寸脈浮大按

之反濇尺中亦微而濇知有宿食宜下之傷寒六七日目中

不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下

之內經曰諸脈皆屬於目錢經曰熱病目不明熱不已者此

腎水將絕不能照物也陽明病發熱汗多者急下之汗多則

亡津液而內燥宜急下以存津液少陰病得之二三日口燥

咽乾者急下之邪入未深便作口燥此腎水將乾宜急下以

救欲絕之少陰證六七日腹脹不大便者急下之此少陰

成方切用 當下諸證 忌下諸證 四 攻下門

邪熱入胃腑也上勝則水乾宜急下以救腎水少陰病自利

清水色純青心中必痛口中燥者急下之青為肝色肝邪乘

腎故下利陽邪上攻故口燥此亦少陰傳入陽明腑證也厥

陰證舌捲囊縮宜急下之此證仲景無治法按舌捲囊縮有

寒極而縮者宜附子四逆加吳茱萸湯并灸關元氣海為熱

所攻勿藥而急引舌與吳茱萸湯并灸關元氣海為熱

以救陰以上皆大承氣證也張兼善曰胃為水穀之海四旁

有病皆能傳入胃上燥則腎水乾故陽明與少陰皆有急下

之條證雖不同其入腑之理則一故皆用大承氣有病循衣

摸床兩手撮空者此胃熱也錢仲陽小兒直訣云此肝熱也

黃湯肺氣清則胃邪自散不可下少陰病陽虛尺脈弱清者不可下脈數不可下數為血虛下之則熱邪入裏血愈虛而亡陰惡水者不可下下之則冷不嗜食完穀出頭痛目黃者不可下諸逆厥者不可下陽微不可下下之病轉諸虛不可下諸動氣者不可下

小承氣湯 仲景一名三物厚朴湯

治傷寒陽明證譫語便鞭潮熱而喘及雜病上焦痞滿不通

大黃四兩厚朴二兩枳實三枚水四升煮一升二合去渣分

溫二服初服當更衣不爾者盡飲之若更衣勿服

邪在上焦則滿在中焦則脹胃實則潮熱潮熱有時陽明燥金旺

於中西故日晡潮熱傷寒邪乘心則狂胃熱干肺則喘

故以枳朴去上焦之痞滿以大黃蕩胃中之實熱此痞滿燥

成方切用 小承氣湯

五 攻下門

實堅未全者故除芒硝欲其無傷下焦真陰也陽明證有正

陽陽明有少陽陽明自陽明經傳入胃腑不惡寒腹滿便鞭

者宜大承氣下之若汗多發熱惡寒者為外未解其熱不

潮未可與承氣若腹大滿不通者可與小承氣微和胃氣勿

令人泄下謂陽明有在經者未全入腑宜審慎陽明少自

病多由太陽傳入或成無已日自太陽少陽傳入者衆所共知

之微旨與經曰傷寒脈浮緩手足濡者繫在太陽當發黃若

小便利者不能發黃至七八日大便鞭者陽明病也程郊倩

曰此證謂之太陰陽明陽明為病本之胃實不特三陽受邪

能轉屬陽明三陰亦能轉屬陽明推之少陰三大承氣厥陰

屬陽明之病哉

金匱用治支飲胸滿更名厚朴大黃湯徐忠可曰言支飲則

脇下亦不言脇支滿而只胸滿雖是偏而不甚偏故可直驅

之而用小承氣順則自下也此即小承氣治腹滿之痛

而閉者即日三物湯蓋此重散結氣故以加羌活名三化湯

厚朴為主彼乃與七物湯對照言之也

要治中風邪氣作實二便不通三化者使三焦獲利復其氣風也然中風多虛氣上逆無用承化之常也加羌活者病本於氣之理非堅實之體不可輕投

調胃承氣湯 仲景

治傷寒陽明病不惡寒反惡熱口渴便閉譫語腹滿中焦燥

實及傷寒吐後腹脹滿者邪有表則身熱汗出而惡寒邪已

出而反惡熱也汗多亡津然又入裏則表證罷故不惡寒身熱汗

大內有燥屎故妄見妄言而譫語吐後不解腹脹滿者熱入

胃也然滿而不痛不宜陽明病不吐不下而心煩者為內煩

急下故少與調胃和之

下後煩者胃有乾熱也亦治渴證中消善食而瘦

下心煩者胃有乾熱也亦治渴證中消善食而瘦

大黃芒硝兩甘草炙五錢少少溫服

大黃苦寒除熱蕩實芒硝鹹寒潤燥輕堅二物下行甚速故

成方切用 調胃承氣湯

用甘草甘平以緩之不致傷胃故曰調胃承氣去枳朴者不

欲其犯上焦氣分也準繩曰陽明一證分為太陽正陽少陽

入陽明經浸久於洗故能引於至高之分仲景以調胃承氣

收入太陽門而大黃芒硝酒浸後日少少溫服以調胃承氣

氣又本湯治不吐不下心煩者及發汗不解蒸熱者吐

後腹脹滿者是太陽陽明去表未遠其病在上不當攻下故

宜緩劑調和之也至正陽陽明則日急下之而大承氣湯大

黃註曰酒洗洗輕於浸是微升其走下之性以治其氣也至

少陽陽明則去正陽而通大陰其分爲下故小承氣湯大黃

不用酒製少陽不宜下故去芒硝又日少與微瀉之勿令大

泄下此仲景之妙法也○大承氣統治三焦

焦小承氣不犯下焦胃承氣不犯上焦

加當歸薑棗煎名當歸承氣湯問治裏熱火鬱或皮膚枯燥

或咽燥鼻乾或便溺秘結或瘀血發狂加當歸入血分以潤

氣同意加薑除芒硝名大黃甘草湯金匱治食已即吐徐忠可

棗引入胃也

即吐非復嘔病矣亦非胃弱不能消乃胃不容穀食已即吐者也明是有物傷胃氣閉而不納故以大黃通營分已閉之穀氣而兼以甘草調其胃爾外臺用治吐水大黃亦用大能開脾氣之閉而使散精於肺通調水道下輸膀胱也

黃二兩半芒硝甘草各二兩又名破棺丹治多汗大渴便閉

證語陽結之證及諸瘡腫熱  
使胃中津液為實熱之邪燥灼枯槁而死皆先賢至精至妙之旨也但後世陽明證起卒至不救粗工殺人往往因此致誤投一下之後變證蜂起卒至不救粗工殺人往往因此所以後賢師古人之意變古人之法凡審其人病係實邪而質非強壯脈不牢固者藥用滋陰補水之劑如甘露飲四物湯或六味飲貞元飲或左歸飲去茯苓加花粉濃煎頻進令胃中津液充足實邪自解陰氣外溢則得汗陰血下潤則便通矣故雖運實稱穩當此乃仲景功臣不可不知也又曰治感證大法總以始終照顧胃中津液為第一奧旨蓋邪之所感皮毛閉塞氣不外達鬱而成熱熱積皮毛不解漸而肌肉熱矣此必然之勢也又兄遇來稟賦漸薄且喜御酒肉厚味胃調胃承氣湯 大陷胸湯 七 攻下門

成方切用

中素有淫熱者多一旦客熱交併區區陰津幾何能當此烈焰燎原乎凡感證之死皆由胃汁乾枯故也是以古人立法及其邪之在表血氣未傷之時當汗之欲熱從汗解則清寧安固而氣血全保不傷矣當其邪之在裏血氣漸虧之際可下下之欲熱隨便通則焦灼頓除而氣血可除使其來復矣其有氣血素虧之人三日後不論表證解與未解裏證急與不急一見口乾唇焦舌胎黑燥全用滋養清涼虛甚者并涼藥不用純陰重劑加人參升發運用但救得胃中津液不竭其人必不即死及其津液漸充汗自能來宿物自下至所謂胃中之津液非他即周身氣血所化乃後天之本也凡人所下之強弱及遇外感賊邪之難治易治可治不可治強半憑此粗工不知無論新久虛實但見身熱風濕表一覺滿悶攻中破氣雜投不効大黃枳朴繼進必求一便以畢其技能盡慮得風而益熾陰被劫而速亡何其與先賢之意相反乎

大陷胸湯 仲景

治傷寒下早表邪內陷胸內拒痛心下因鞭或結胸證或重

汗而復下之不大便五六日舌上燥渴日晡時小有潮熱從心上至小腹鞭滿而痛不可近者 按之鞭痛者為結胸鞭而熱乘虛入結於心胸之間故鞭而痛又有鞭痛而無熱證者為寒實結胸白散主之結胸固當下然脈浮大者下之則死以其病在表而重虛結而沉故死嘉言曰太陽誤下之脈主病皆在陽在表即有沉緊沉滑之殊皆不得以裏陰名之。六書云胸膈滿者胸間氣塞滿悶也非心下滿膈滿者脇肋脹滿也非腹中滿蓋表邪傳裏必先胸以至心腹入胃是以胸滿多帶表證宜微汗解滿多帶半表半裏宜和解胸中痰實者宜瀉之如結實燥渴便秘宜以此湯下之。附白散巴豆一分去心皮炒黑研貝母各三分治寒實結胸巴豆辛熱以散寒結貝母苦辛以散痰熱結在胸故以桔梗上必吐病在膈下必利也

大黃二兩芒硝一分甘遂一分 先煮大黃去渣內芒硝煮一二沸內甘遂末溫服

成方切用

大陷胸湯

攻下門

表邪入裏結於高位以致三焦俱實手不可近證為危急非常藥所能平故以甘遂苦寒行水直達為君芒硝鹹寒輭堅為臣大黃苦寒蕩滌為使三藥至峻而有起死之功 中處至高之分宜若可吐然邪氣與胸中陽氣相結不能分解壅於心下為鞭為痛非虛煩實者所可同故須攻下也低者舉之高者陷之以平為期故曰陷胸也經又曰太陽病脈浮而動數汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲陷心下因鞭則為結胸客氣動胸短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷而攻裏可謂虛矣又曰太陽病脈浮而動數今得誤下動數變遲矣又曰胃中不和心下痞硬而動數今得誤下陽氣內陷心下因鞭而可攻之乎豈陷胸之力反緩於承氣一下再下寧不其虛乎前文曰結胸脈浮大者下之死又曰結胸證悉具煩躁者死今日脈浮又曰煩躁大陷胸湯去胸中之邪胸膈節菴曰結胸乃下早而成未曾經下者非結

胸也乃表邪傳至胸中證雖滿悶尚為在表正屬少陽部分  
半表半裏之間只須小柴胡加枳桔以治未效則以小柴胡  
對小陷胸一服然若因下早而成者方用陷胸湯九分淺  
深從緩治之不宜太峻上焦乃清道至高之分過下則傷元  
氣也崔行功曰傷寒結胸欲經心膈高起不可近用大陷  
胸湯不達者此下後虛逆氣效如神活人云誤下未成結胸  
中丸先理其氣次調諸疾其效如神活人云誤下未成結胸  
中者急須與理中湯自然解了蓋理中治中焦故也胃中雖  
和傷寒未退宜依日數足卻以承氣再下之蓋前來之下未  
是也其水結胸者用小半更加茯苓湯小柴胡去薑加牡蠣  
主之又有血結胸證手不可近漱水不欲嚥  
喜忘如狂大便黑小便利宜犀角地黃湯

小陷胸湯

仲景

治傷寒誤下小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者及痰熱

塞胸前證上下俱硬此則正在心下前證痛不可近此則按

與此湯以除隔上結熱

成方切用

小陷胸湯 大陷胸丸

九 卷下門八

黃連兩半 夏半 枳椇一枚

黃連之苦寒以泄熱枳椇之寒潤以滌垢半夏之辛溫以散

結結胸多由痰熱結聚故用三物以除痰去熱也劉心山曰

痰飲凝結心胸故陷胸瀉心用日蓮半夏結胸多由

大陷胸丸

仲景

治傷寒結胸項強如柔痙狀有汗為柔痙胸膈實滿故項

大黃兩 杏仁去皮 葶藶炒 芒硝各半 合研取如彈丸一枚

別搗甘遂末一錢白蜜丸合煮服大黃之苦寒以泄熱芒硝

之鹹寒以軟堅杏仁之苦甘以降氣葶藶甘遂取其行水而

直達白蜜取其潤滑而甘緩

十棗湯 仲景

治太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出頭

痛心下痞鞭引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒表解而裏未

和邪熱內蓄有伏飲者下利嘔逆裏受邪也汗出不惡寒表

氣邪熱內蓄而有伏飲也此為水氣上逆嘔逆短氣與表證

頭痛稍別周揚後曰此證與結胸頗同故湯亦與陷胸相微

表解後攻與結胸之戒不殊也

芫花黑 甘遂 大戟等分 大棗十枚 先煮棗去滓內前藥末強

人服一錢虛人五分或棗肉為丸病不除者再服得快下後

糜粥自養

成方切用

十棗湯

十 卷下門八

處以攻決為用三藥過峻故用大棗之甘以緩之益土所以

勝水使邪從二便而出也十棗湯小青龙湯主水氣乾嘔桂

少陰下利乾嘔吳茱萸湯主厥陰吐涎沫乾嘔王海藏曰表

有水用小青龙能裏有水用十棗李時珍曰仲景治傷寒太陽

證表未解心下有水氣而飲乾嘔發熱或喘或利小青龙湯

主之表已解有時頭痛惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或

喘或欬十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂

開鬼門也十棗湯逐裏邪使水從二便出內經所謂潔淨腑去

陳寒法也或問十棗湯汁枝去生加茯苓白朮湯皆屬飲家

俱有頭痛項強之證何也張兼善曰太陽經多血少氣病人

表熱微渴念飲水漿為水多氣弱不能施化本經血氣困而

凝滯致有頭痛項強之患不難表但宜逐飲飲盡則自安

杜壬曰裏未和者蓋痰與燥氣乘於中焦故頭痛乾嘔汗出

短氣是痰膈也非十棗不能除但此湯不宜輕用恐損人於

風痰鬱熱支體麻痺走注疼痛渾熱腫滿氣血壅滯不得宣  
通及積痰翻胃服二九後轉加痛悶此痰涎壅塞頓攻不開  
再加二九快利則止加牽牛大黃大瀉氣血之滯加輕粉無  
竅不入以去痰積虛人尤不可輕用  
各五錢加黃蘗三兩酒炒大黃兩半粥丸名小胃丹治胸膈腸  
胃熱痰渾痰

赤金豆 亦名八仙丹

治諸積不行凡血凝氣滯疼痛腫脹蟲積結聚癥堅宜此主  
之此丸去病極速較之硝黃發我之類過傷臟氣者大為勝

巴霜去皮膜略去生附子切略炒皂角微炒焦丁香 木香  
成方切用 赤金豆 三物備急丸 丁香 木香

天竺黃錢各二輕粉錢一硃砂錢二為末醋浸蒸餅為丸蘿

蔔子大硃砂為衣欲漸去每服五七丸欲驟行者每服一二  
十丸用滾水或煎藥或薑醋茶蜜荷香使君子煎湯為引送  
下若利多不止可飲冷水一二口即止蓋此藥得熱則行得  
冷即止也如治氣滯食滯鼓腫先用紅棗煮熟取肉一錢許  
隨用七八丸甚者一二十丸同棗肉研爛以熱燒酒加白糖  
少許送下如治蟲痛亦用棗肉和服止用清湯送下

三物備急丸 千金

治食停腸胃冷熱不調腹脹氣急痛滿欲死及中惡客忤卒  
暴諸病食滯腸胃上焦下行下脫下通  
故痛脹欲死內實者法當下之

巴豆霜 大黃 乾薑 等分蜜丸小豆大每服二三丸中  
惡口噤者折齒灌之崔氏乾薑易桂枝名備急散

大黃苦寒以下熱結巴豆辛熱以下寒結加乾薑辛散以宣  
通之乾薑辛溫開五臟  
六腑通四肢關節三藥峻厲非急莫施故曰備急

太平丸

治胸腹疼痛脹滿及食積氣積氣痛血痛邪實祕滯等證此  
借些微巴豆以行羣藥之力去滯  
最妙如欲其峻須用巴豆二錢

陳皮 厚朴 木香 烏藥 白芥子 草豆蔻 三稜

蓬蘽乾薑牙皂炒澤瀉各三錢已上十一味共為細

末另將巴豆用滾湯泡去皮心并膜稱足一錢用水一碗微  
成方切用 太平丸 齒痛丸 主 攻下門

火煮半碗將巴豆撈起用乳鉢研極細仍將煎湯攪入研勻  
然後量藥多少入蒸餅浸爛搗丸前藥如紫豆大每用三分  
或五分甚者一錢隨證用湯引送下 凡傷食停滯即以本  
物湯下 婦人血氣痛或紅花湯下或當歸湯下 氣痛陳  
皮湯下 疝氣茴香湯下 寒氣薑湯下 欲瀉者用熱湯  
送下一錢未利再服 利多不止用冷水一二口即止  
硃砂丸 木事

治一切積聚痰飲心脇引痛

硃砂 巴豆去油三稜 乾薑 白芷錢五木香 青皮 胡椒  
半 乾姜 炒 大黃 兩 檳榔 肉豆蔻 筒 為末醋醋二升煮

巴豆五七沸再下三稜大黃末同煎五七沸入礪砂熬成膏和諸藥杵丸藜豆大每服五九薑湯下

此治肉積氣積血積通劑也礪砂化肉食礪砂性大熱能爛化人心為血故治腐乾黍散瘀血木香青皮行滯氣三稜破

血而行氣肉慙暖胃而和中白芷散風而除溼乾薑胡椒除

沉寒錮冷大黃巴豆能斬關奪門方內多辛熱有毒之品用

之以破冷攻堅惟大黃苦寒假之以蕩熱去實蓋積聚既深

攻治不得不峻用醋者酸以收之也玉機微義曰方中因白

痰飲也○潔古曰壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱氣

血兩衰四時有感冒能成積若速以磨堅破結之藥治之疾

似去而人已衰矣乾姜藜砂三稜大黃牽牛之類得藥則暫

快藥過則依然氣愈消疾愈大竟何益哉故善治者當先

成方切用敦阜丸攻下門

虛使氣血旺積自消如滿坐皆君子則小人自無

容地也不問何臟先調其中使能飲食是其本也

敦阜丸

治堅頑食積停滯腸胃痛劇不行等證

木香 山查 麥芽 皂角 丁香 烏藥 青皮 陳皮

澤瀉各五錢 巴霜一錢 右共為末用生蒜頭一兩研爛加熟

水取汁浸蒸餅搗爛丸藜豆大每服二三十九丸隨便用湯引

送下如未愈徐徐加之

木香檳榔丸子和

治胸腹積滯痞滿結痛二便不通或瀉泄下痢裏急後重食

有因火熱者火燥物而性急也有因氣滯者大腸氣壅不得

宣通也有因積滯者腸胃有物結聚也有氣虛者中氣陷下

不能升也也有血虛者津枯腸燥虛坐努責是也當分證

論治脈洪大而實為裏實宜下若脈浮大慎不可下

我蔬醋三稜黃連吳黃黃蘗枳殼陳皮白青皮檳

榔木香五錢大黃酒浸香附黑牽牛芒硝水九量入

虛實服一方加當歸洗張子和儒門事親無三稜枳殼只十

味紺珠無三稜陳皮名木香導氣丸

溼熱在三焦氣分木香香附行氣之藥能通三焦解六鬱陳

皮理上焦肺氣青皮平下焦肝氣瀉痢多由脾枳殼寬腸而

利氣而黑丑檳榔又下氣之最速者也氣行則無痞滿後重

之患矣瘧痢由於溼熱鬱積氣血不和黃蘗黃連燥溼清熱

成方切用木香檳榔丸百順丸

之藥三稜破血中氣滯莠莠破氣中血滯大黃芒硝血分之

藥能除血中伏熱通行積滯並為摧堅化痞之峻品溼熱積

滯去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不除清陽終不得升

故必假此以推蕩之亦通因通用之意然非實積不可輕投

滑伯仁曰腸胃陽明燥金也下焦少陽相火也後重之用木

香檳榔行燥金之鬱也癰閉之用知母黃蘗散相火之鬱也

百順丸

治一切陽邪積滯凡氣積血積蟲積食積傷寒實熱祕結等



亦可

枳實導滯丸 東垣

治傷溼熱之物不得施化痞悶不安腹內硬痛積滯泄瀉

大黃兩一枳實錢五黃芩錢五黃連錢五神麴錢五白朮錢五茯苓錢五澤瀉錢五

錢二 蒸餅為丸量多寡服

飲食傷滯作痛成積非有以推蕩之則不行積滯不盡病終

不除故以大黃枳實攻而下之而痛瀉反止經所謂通因通

用也傷由溼熱黃芩黃連佐之以清熱茯苓澤瀉佐之以利

溼積由酒食神麴蒸餅之物化食解酒因其同類溫而消之

芩連大黃苦寒太甚恐其傷胃故又以白朮之甘溫補土而

成方切用

枳實導滯丸 倒倉法

圭

攻下門 卷八

固中也

倒倉法 丹溪

黃牡牛肉 肥嫩者二 三十觔

切碎洗淨用長流水桑柴火煮糜爛

濾去滓取淨汁再入鍋中文武火熬至琥珀色則成矣擇一

靜室明快不通風者令病人先一夜不食坐其中每飲一鍾

少時又飲積數十鍾病在上者必吐病在下者必利病在中

者吐而且利視所出物可盡病根乃止 連進之急則逆上而

多視病之上吐利後必渴不得與湯其小便必長取以飲之

名輪迴酒非惟止渴兼滌餘垢行後倦臥覺饑先與米飲次

與稀粥三日後方與厚粥軟飯菜羹調養半月一月精神煥

發沉痾悉痊矣須戒色慾半年一年戒牛肉五年 霞天臺

即照前法每肉十二觔可熬膏一觔磁罐盛之夏月水浸可

留三日寒天久留生微用重湯煮入煎劑調服入丸劑每三

分加麴一分煮糊或同蜜煉

朱丹溪曰牛坤土也黃土之色也以順為德而法健為功者

壯之用也肉胃之藥也液無形之物也積聚久則形質成依

附腸胃迴薄曲折之處以為巢曰豈銖兩之丸散所能窺其

藩牖乎肉液充滿流行無處不到如洪水泛漲浮莖陳朽皆

順流而下不能停畱凡屬滯礙一洗而空澤枯潤槁補虛益

損寧無精神煥發之樂乎其方傳於西域異人中年後行一

成方切用

蜜煎導法

圭

攻下門 卷八

二次亦卻病養壽之一助也 王綸曰牛肉補中非吐下藥借

蜜煎導法 仲景

治陽明證自汗小便利大便祕者 胃實自汗小便利此為

下葉則液愈耗矣雖大便祕不可攻津液內竭非熱結也若與

之宜俟其欲大便然後用外導之法

蜜七合銅器中微火煎頻攪勿令焦候凝如飴捻作挺子令

頭銳大如指長寸許揅臍角末少許乘熱納穀道中用手抱

住大便出時乃去之 加鹽少許亦可

蜜能潤腸熱能行氣早能通竅津液內竭饑不可攻須俟其

欲便乃導而通之不欲以苦寒傷胃也 徐忠可曰此為大便秘

設也結胸痞滿腸結胃有燥屎皆有見證今但自汗且小便利是津耗熱結而乾燥也



豬膽導法 仲景

治證同前

豬膽一枚取汁入醋少許用竹管長三四寸以一半納穀道將膽汁灌入頃當大便

便秘者屬燥屬熱自汗者為亡津液當小便不利今反利是

熱猶未實故不可攻豬膽汁寒勝熱滑潤燥苦能降醋酸善

人故能引人大腸而通之也 海藏法用蜜煎鹽相合或草烏

草烏能化寒消結可隨證陰陽所宜而用之○準繩曰凡多

汗傷津及屢經汗下不解或尺中脈遲弱元氣素虛人便欲

下而不潤利者宜導法但須分津液枯者用蜜導邪熱其

者用鹽導濕熱痰飲固結善汁麻油浸枯棧導下傍流

水者導之無益非大承氣峻攻不效以實結在內而不在下

也至於陰結便閉者宜於蜜導中加薑汁生附子末或別陳

成方切用 豬膽導法 大螺着小腹法 七 攻下門

醫道導之此補 長沙之未備也

大螺着小腹法

宋季饒醫熊彥誠年五十五歲病前後便溺不通五日腹脹

如鼓同輩環視皆不能措力與西湖妙果僧慧月相善遣信

邀至訣別月驚馳而往於釣橋逢一異客揖之曰方外高人

何子子走趨若是月曰一善友久患秘結病危急欲往問客

曰易事爾待奉施一藥即脫離人水探一大螺而出曰事濟

矣抵家以鹽半匙和殼生搗置病者臍下一寸三分用寬帛

緊繫之仍辦溺器以須其通月未以為然姑異謝之至熊家

彥誠昏不知人妻子聚泣諸醫知無他策慢使試之曾未安

席而暴下諸醫愧歎而散月歸訪異人不見矣熊後十六年

乃終此因熱秘而便溺不通大螺性寒而善分清故濁水之

中一着大螺便能澄澈劑之以鹽取其善潤而已

瘧傷寒結胸法

凡傷寒結胸其有中氣虛弱不堪攻擊內消須以此法外

之則滯行邪散其效如神

葱白頭 兩生薑 兩生薑 此味加倍如 右三味共搗一處

炒熱用手巾或白布包作大餅罨胸前脹痛處此藥須分二

包冷則輪換罨之無不即時開通汗出而愈但不宜大熱恐

炮烙難受也

成方切用 瘧傷寒結胸法 竹葉蘆法 又蘿蔔菜蘆法 太 攻下門

又法以大蒜頭二十箇搗爛攤厚紙或薄絹上貼於脹處

少頃即散用治一切腹脹無不神效

竹葉蘆法

凡大便不通實結在肛門而不得下將烈火煮竹葉一鍋乘

滾熱傾淨桶內上撒綠絲末一握坐上薰之

又蘿蔔菜蘆法

用蘿蔔菜如上法亦妙如無蘿蔔菜即青菜亦可

成方切用卷九目錄

消導門 正方一十九 附方三十三

枳朮丸

枳朮湯

半夏枳朮丸

橘半枳朮丸

橘皮枳朮丸

木香枳朮丸

香砂枳朮丸

木香乾薑枳朮丸

木香人參乾薑枳朮丸

消飲丸

三黃枳朮丸

麴蘖枳朮丸

平胃散

成方切用

目錄

一 消導門  
卷九

除溼湯

和解散

藿香平胃散

人參養胃湯

加味平胃散

厚朴溫中湯

對金飲子

和胃飲

保和丸

小保和丸

大安丸

芍藥枳實丸

痞氣丸

伏梁丸

肥氣丸

息賁丸

賁豚丸

十香丸

枳實消痞丸

廓清飲

健脾丸

益氣健脾丸

養榮健脾丸

理氣健脾丸

舒鬱健脾丸

化痰健脾丸

清火健脾丸

和中健脾丸

妙應丸

寬中進食丸

成方切用

目錄

二 消導門  
卷九

解肝煎

排氣飲

葛花解醒湯

大和中飲

小和中飲

鼈甲飲

小分清飲

方見燥溼門

資生丸

神香散

佐關煎

見祛寒門

抑扶煎 見補寒門

成方切用

目錄

三

消導門  
卷九

成方切用卷九

消導門

消者散其積也導者行其氣也脾虛不運則氣不流行氣不流行則停滯而為積其作爲痼疾或成癰瘕以致飲食減少五臟無所資榮氣血日以虛衰因致危困者多矣故必消而導之假劑已見攻下門茲集緩攻平治之劑

枳朮丸 潔古

消痞除痰健脾進食

白朮 兩 枳實 一兩 為末荷葉包陳米飯煨乾為丸痞悶

加陳皮氣滯加木香傷食加麥芽神麴

東垣曰白朮甘溫補脾胃之元氣其味苦除胃中溼熱利腰臍間血過於枳實剋化之藥一倍枳實苦寒泄胃中痞悶化

成方切用

枳朮丸

消導門  
卷九

胃中所傷是先補其虛而後化其傷則不峻矣荷葉中空色青形仰象震在人為少陽膽胃氣元氣穀氣甲膽上升之氣

皆生氣也食藥感此氣化胃氣何憂不上升乎燒飯與白朮

協力滋養穀氣補令胃厚不致再傷其利廣矣 王安道曰勞

為內傷誠不足矣飲食傷又當於不足之中分其有餘夫饑餓不飲食者胃氣空虛此為不足而傷也飲食自倍腸胃乃傷者此不足之中兼有餘而傷也惟其不足故補益惟其有餘故消導亦有物滯氣傷宜消補兼行者亦有物滯氣不傷

但須消導者亦有不須消導但須補益者枳朮丸之類雖曰消導固有補益之意焉若所滯之物非枳朮丸之力所能去者備急丸煮黃丸瓜蒂散等潔古東垣亦未嘗委之而勿用也景范曰枳朮丸以白朮為君脾胃得其燥所以能健然佐以枳實其味苦峻有推牆倒壁之功此實寓攻於守之劑惟脾

氣不清而滯勝者正當用之若脾氣已虛非所宜也今人不察相傳為補脾之藥而朝吞暮餌或以小兒瘦弱

製令常服則適足以傷其氣助其瘦爾用宜酌也

金匱用枳實七枚白朮二兩作湯名枳朮湯治水飲心下堅

大如盤邊如旋盃心下上焦陽分也屬氣分之水加半夏一兩名半夏枳朮

丸治脾溼停痰及傷冷食淋者加澤瀉一兩加陳皮半夏名

橘半枳朮丸健脾消痞化痰加橘皮一兩名橘皮枳朮丸治

飲食不消氣滯痞悶加木香一兩名木香枳朮丸治氣滯痞

滿木香平肝行氣使木不尅土再加砂仁名香砂枳朮丸破滯氣消飲食

強脾胃再加乾薑五錢名木香乾薑枳朮丸兼治氣寒再加

人參陳皮名木香人參乾薑枳朮丸開胃進食加茯苓五錢

乾薑七錢名消飲丸治停飲胸滿嘔逆加酒炒黃連黃芩大

黃炒神麴橘紅各一兩名三黃枳朮丸治傷肉食溼麴辛熱

成方切用 平胃散 二 卷九 消導門

味厚之物填塞悶亂不快加神麴麥芽各一兩名麴蘖枳朮

丸治內傷飲食或泄瀉

平胃散 局方

治脾有停溼痰飲痞宿食不消滿悶嘔瀉上溼太過木邪乘不勝而侮之

脾虛不能健運故有痰食雷滯中焦致生痞滿諸證胃寒則嘔溼盛則瀉及山嵐瘴霧不服水土

由胃虛故易感也

蒼朮二錢厚朴二錢陳皮去白甘草錢一加薑棗煎傷食加神

麴麥芽或枳實溼勝加五苓痰多加半夏脾倦不思食加參

耆痞悶加枳殼木香大便秘加大黃芒硝小便赤澀加苓澤

傷寒頭痛加葱豉取微汗

蒼朮辛烈燥溼而強脾厚朴苦溫除溼而散滿苦降能瀉實

滿陳皮辛溫利氣而行痰甘草中州主藥能補能和為使泄

中有補務令溼上底於和平也景岳曰平胃者欲平治其不

其性味從辛從燥從苦而能消能散惟此為胃強邪實者設故

之今見方家每以此為常服健脾之劑動輒用之而不察其

誤甚矣

合二陳加藿香名除溼湯治傷溼腹痛身重足輭大便溏瀉

加藁本枳殼桔梗名和解散局方治四時傷寒頭痛煩躁自汗

欬嗽吐利加藿香半夏名藿香平胃散又名不換金正氣散

局治胃寒腹痛嘔吐及瘧疫溼瘧再加人參茯苓草菓生薑

烏梅名人參養胃湯治外感風寒內傷生冷食停痰嵐瘴

成方切用 和胃飲 三 卷九 消導門

瘟疫或飲食傷脾發為痄瘧老瘧也加麥芽炒麴名加味平胃

散治宿食不消吞酸噯臭除蒼朮加木香草蔻乾薑茯苓名

厚朴溫中湯治脾胃虛寒心腹脹滿及秋冬客寒犯胃時作

疼痛散以辛熱佐以苦甘滲以甘淡氣溫胃和痛自止矣本方一兩加桑白皮一兩名

對金飲子治脾胃受溼腹脹身重飲食不進肢痠膚腫

和胃飲

治寒溼傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清嘔惡脹滿等

證

陳皮 厚朴各一錢乾薑炮一錢炙甘草錢一

此即平胃散之變方也凡嘔吐等證多有胃氣虛寒一聞蒼

尤之氣亦能動嘔故以乾薑代之凡馨香木香丁香茯苓等  
夏菹豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胸腹有滯而兼  
時氣寒熱加柴胡以清利之

保和丸

治食積飲停腹痛泄瀉痞滿吐酸積滯惡食食瘧下利傷於  
脾不運化滯於腸胃故有泄痢食瘧等證傷而未甚不欲食  
以腐劑惟以和平之品消而化之故曰保和東垣曰傷飲者  
無形之氣也宜發汗利小便以導其滯傷食者有形之物也  
輕則消化或損其穀重則方可吐下脈經云大腸有宿食寒  
則消導重則下之

山查

三兩 神麴 炒 茯苓 半夏 陳皮 萊菔子 炒 連翹 錢

麴和丸麥芽湯下或加麥芽入藥亦可

成方切用

保和丸

四

治胃門

山查酸溫收縮之性能消油膩腥羶之食收縮故 陳麴辛溫  
蒸罽之物能消酒食陳腐之積脹子辛甘下氣而制麴麥芽  
鹹溫消穀而輭堅 堅積 傷食必兼乎溼茯苓補脾而滲溼積  
久必鬱為熱連翹散結而清熱半夏能潤能燥和胃而健脾  
陳皮能降能升調中而理氣此傷於飲食而氣未病者故但  
當消導也

加白朮白芍去半夏腹子連翹蒸餅糊丸名小保和丸助脾  
進食加白朮二兩名大安丸或加人參治飲食不消氣虛邪  
微加白朮香附黃芩黃連厚朴枳實治積聚痞塊合越鞠丸  
扶脾開鬱

芍藥枳實丸

治食積痞滿及小兒腹大脹滿時常疼痛脾胃不和等證此  
方較枳朮丸其效更神

白朮

炒 赤芍藥 二兩 枳實 炒 陳皮 兩 荷葉湯煮老黃米糊

為丸桐子大米飲或滾白湯任下百餘丸 如臟寒加炒黃

乾薑一二兩 如脾胃虛加人參一二兩

痞氣丸 東垣

治脾積在於胃脘大如盤久不愈令人四肢不收或發黃疸  
飲食不為肌膚者名聚為癥病按痞病由陰伏陽蓄氣血不  
運而成虛心下位中央填塞痞滿皆土病也與脹滿有輕重  
之分痞推內覺滿悶脹滿則外有脹急之形也有中氣虛衰

成方切用

芍藥枳實丸 痞氣丸 五

不能運化精微而成痞者有飲食積滯不能施化而成痞者  
有溼熱太甚上乘心下而成痞者古方用黃連黃芩枳實之  
苦以泄之厚朴半夏生薑之辛以散之參以散之參以散之  
以補之茯苓澤瀉之淡以滲之惟宜上下分消其氣果有內  
實之證庶可略施疎導世人苦於痞塞喜用利藥  
暫時通快藥過滋其害由不察中氣不運所致  
黃連 厚朴 吳茱萸 白朮 黃芩 茵陳 乾薑 砂  
仁 人參 茯苓 澤瀉 川烏 川椒 分 桂 巴豆霜

四 蜜丸燈草湯下黃連瀉熱燥溼治痞君藥 仲景治痞滿  
之用厚朴砂仁行氣而散滿茵陳蒼瀉利水以實脾黃芩清肺  
而養陰椒黃燥脾而逐冷薑桂川烏補命火以生脾土而薑  
桂又能去瘀生新 心下不痞 巴豆能消有形滯積為斬關奪  
門之將藉之以為先驅加參朮者以補脾元正氣正旺然後

可以祛邪也潔古曰養正積自除

除吳茱白朮茯苓澤瀉茵陳川椒砂仁加菖蒲茯神丹參紅

豆名伏梁丸治心積起膈上至心下大如臂令人煩心除吳

茱砂仁桂朮黃芩澤瀉加柴胡莢逆阜角昆布甘草名肥氣

丸治肝積在左脇下有頭足令人發欬痰瘧不已除吳茱白

朮砂仁黃芩茵陳澤瀉加紫苑桔梗天冬白薤青皮陳皮三

稜名息賁丸淡薑湯下治肺積在右脇下令人灑淅寒熱喘

欬發肺癰秋冬黃連減半除吳茱白朮砂仁人參乾薑川椒

黃芩茵陳加菖蒲丁香附子苦楝延胡獨活全蠍名賁豚丸

淡鹽湯下治腎積發於小腹上至心下若豚狀上下無時令

成方切用痞氣丸 十香丸 枳實消痞丸 六消導門

人喘欬骨痿及男子七疝女子瘕聚帶下此東垣五積方也雖有破滯削堅之藥多藉人參之力贊助成功經曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

十香丸

治氣滯寒滯諸病

木香 沉香 澤瀉 烏藥 陳皮 丁香 小茴香 香

附酒荔枝核煨焦各等分 阜角微火燒煙盡減半 爲末酒糊丸彈子大

者磨化服丸桐子大者湯引下癰疽之屬溫酒下

枳實消痞丸東垣

治心下虛痞惡食懶倦右關脈弦脾虛不運故痞滿惡食脾主四肢虛故懶倦右關屬脾脈弦者脾虛而木來侮之也○經曰太陰所至爲積飲痞隔皆陰勝陽也受病之臟心與脾也因兩鬱氣痞痞者火與

同

也蓋心陽火也主血脾陰土也主運凡傷其陽則火拂而血凝傷其陰則土壅塞而滯聚陰陽之分施治之法不可

枳實炒黃連五錢厚朴四錢半夏麴麥芽炒人參白

朮炒茯苓三錢甘草炙乾薑錢蒸餅糊丸

枳實苦酸行氣破血黃連苦寒瀉熱開鬱並消痞之君藥厚

朴苦降散溼滿而化食麥芽鹹溫破結氣而軟堅半夏燥痰

溼而和胃乾薑去惡血而通陽通四肢關節皆所以散而瀉

之也參朮苓草甘溫補脾使氣足脾運而痞自化既以助散

瀉之力又以固本使不傷真氣也王機微義曰此半夏瀉心湯加減法也內有枳朮四

君平胃等藥利溼消痞補虛之劑也

成方切用枳實消痞丸 廊清飲 健脾丸 七消導門

廊清飲

治三焦壅滯胸膈脹滿氣道不清小水不利年力未衰通身

腫脹或肚腹單脹氣實非水等證

枳殼二厚朴一錢大腹皮一錢白芥子七分或一二錢陳皮二錢茯苓

連皮用蘿蔔子生搗一錢如中不用澤瀉錢水煎食遠服

內熱多火小水熱數者加梔子木通各一二錢 身黃小

水不利者加茵陳二錢 小腹脹滿大便堅實不通者加生

大黃三五錢 肝滯脇痛者加青皮 氣滯胸腹疼痛者加

烏藥香附 食滯者加山楂麥芽 健脾丸

治脾虛氣弱飲食不消

白朮<sup>土</sup>人參<sup>二</sup>麥芽<sup>一</sup> 陳皮<sup>二</sup>山查<sup>二</sup>枳實<sup>三</sup> 神麴糊

丸米飲下

脾胃者倉廩之官胃虛則不能容受故不嗜食脾虛則不能運化故有積滯所以然者由氣虛也參朮補氣陳皮利氣氣運則脾健而胃強矣山查消肉食麥芽消穀食戊己不足<sup>胃</sup>為己土故以二藥助之使化枳實力猛能消積化痞佐以參朮則為功更捷而又不致傷氣也夫脾胃受傷則須補益飲食難化則宜消導合斯二者所以健脾也

成方切用

健脾丸

八

消導門

山查麥芽陳皮加當歸芍藥芩藜麥冬柏子仁名義營健脾丸治脾陰不足飲食不為肌膚<sup>脈充然</sup>去人參枳實麥芽加香附木香半夏茯苓神麴黃連當歸芍藥<sup>方無</sup>荷葉燒飯丸名理氣健脾丸治脾胃虛弱久瀉久痢去人參山查麥芽加神麴川芎香附麴糊丸名舒鬱健脾丸治脾氣鬱滯飲食不消去山查麥芽加半夏膽星蛤粉茯苓神麴糊丸名化痰健脾丸治內傷挾痰去人參山查麥芽加半夏梔黃連水丸名清火健脾丸治脾虛有火去人參山查麥芽加木香檳榔厚朴半夏甘草名和中健脾丸治胃虛饑不欲食仍用人參名抄應丸治胃虛不能食臟腑或結或泄去山查加半夏

青皮木香砂仁草薤乾薑炙甘草茯苓豬苓澤瀉蒸餅丸名寬中進食丸<sup>東</sup>補脾胃進飲食

解肝煎

治暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等證如兼肝火者宜化肝煎<sup>方</sup>門<sup>火</sup>

陳皮 半夏 厚朴 茯苓<sup>一錢</sup> 蘇葉<sup>五分</sup> 芍藥<sup>一錢</sup> 砂仁<sup>七分</sup> 加煨薑三五片 如脇肋脹痛加白芥子一錢 胸膈氣滯加枳殼香附藿香之屬

排氣飲

治氣逆食滯等證

成方切用

解肝煎

排氣飲

葛花解醒湯

九

消導門

陳皮 枳殼 藿香<sup>一錢</sup> 香附<sup>五分</sup> 澤瀉 烏藥<sup>二錢</sup> 厚朴<sup>一錢</sup> 木香<sup>一錢</sup> 水煎熱服 如食滯者加山查麥芽各二錢 寒滯者加焦乾薑肉桂之屬 氣逆之甚者加白芥子沉香 青皮檳榔之屬 嘔而兼痛者加半夏丁香之屬 痛在小腹者加小茴香 兼疝者加荔枝核煨熟搗碎用二三錢 葛花解醒湯 專治酒積或嘔吐或泄瀉痞塞頭痛小便不利<sup>酒熱而兼溼</sup>諸證<sup>胃故見</sup> 葛花 豆蔻 砂仁 木香<sup>分</sup> 青皮 陳皮 人參 白朮 炒 茯苓<sup>分</sup> 神麴<sup>炒</sup> 乾薑 豬苓 澤瀉<sup>分</sup>

過飲無度溼熱之毒積於腸胃葛花獨入陽明令溼熱從肌

肉而解豆蔻砂仁皆辛散解酒故以為君神麴解酒而化食

木香乾薑調氣而溫中青皮陳皮除痰而疏滯二苓澤瀉能

驅溼熱從小便出乃內外分消之劑飲多則中氣傷故又加

參朮以補其氣也人參補氣最能解酒東垣曰酒大熱有毒

下分消其溼氣今人或用酒療大熱之藥下之或用大黃

牽牛下之是無形元氣受傷反有大熱之藥下之或用大黃

大旺元氣消亡而虛損之病成矣葛花解酒而發散不

枳椇根一名雞距一名木蜜經霜黃赤而味甘其葉入酒

酒化為水門外植此木者屋內釀酒多不佳

大和中飲

治飲食積滯聚等證

成方切用 大和中飲 小和中飲

陳皮 枳實 厚朴 澤瀉 山查 麥芽 砂仁 水

煎溫服 脹甚者加白芥子 胃寒無火或惡心者加炮乾

薑一二錢 疼痛者加木香烏藥香附之類 痰多者加半

夏

小和中飲

治胸膈脹悶或婦人胎氣滯滿等證

藟豆 山查 陳皮 茯苓 厚朴 甘草 加煨薑三

五片 嘔者加半夏一二錢 脹滿而氣不順者加砂仁七

八分 火鬱於上者加炒梔子一二錢 婦人氣逆血滯者

加蘇梗香附之屬 寒滯不行者加乾薑肉桂之屬

龍甲飲

治瘧久不愈腹中結塊名曰瘧母瘧久不愈為瘧母多成癥

肝之積也瘧屬少陽膽經膽與肝相表裏久瘧屬在血分

血亦肝所主也當以龍甲為君隨證虛實而施佐使之藥

龍甲 白朮 黃耆 白芍 檳榔 草菓 厚朴 陳皮

甘草 等分薑三片棗二枚烏梅少許煎

久瘧必由脾虛白朮補脾氣黃耆補肺氣使氣足脾運方能

磨積也川芎補肝而行血中氣滯芍藥助脾而散肝經火邪

二藥並和厥陰營氣營血調則陰陽和矣陰陽不和而爭積

榔下氣而攻積草菓煖胃而祛寒厚朴破血而散滿陳皮理

氣而消痰甘草和中而補土龍甲鹹平屬陰色青入肝專能

成方切用 龍甲飲 小分清飲 資生丸

益陰補虛清熱散結故為瘧瘧之君藥也

小分清飲

治小水不利溼滯脹腫不能受補等證如兼火者宜大分清

飲方見燥

方見燥溼門

資生丸

健脾開胃消食止瀉調和臟腑滋養營衛張三錫曰余初識

出彈丸咀嚼問之曰此得之秘傳饑者服之即飽飽食之即

饑因飲其方已於醉飽後服之經投枕臥夙興了無停

滯始信此方又善治胎前惡阻

白朮 熟地 黃耆 白芍 人參 肉桂 茯苓 甘草 神麴



查肉 蒸橘紅二兩 芡實 麥芽麵 雲苓 去人乳拌 懷藥一兩

五錢 蓮肉 去心 桔梗 米炒 眞薑香 甘草 蜜炙 川連

薑汁 白豆蔻仁 微炒 澤瀉 二錢 末之蜜丸 每丸二錢重 每服

一丸 醉飽後二丸 細嚼淡薑湯下

按此方九補九消即枳朮丸之意而推廣之立方較為穩妥

名曰資生重脾胃也

神香散

治胸膈胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿痰飲隔噎諸藥不效

者惟此最妙

丁香 白豆蔻仁 或砂仁 亦可

等分爲末清湯調下七分甚者

成方切用

小分清飲 神香散

主

消導門 卷九

一錢日數服不拘若寒氣作痛者薑湯送下

成方切用卷十目錄

和解門 正方二十九 附方二十二

小柴胡湯

柴胡去半夏加枳椇根湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡合桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

柴胡飲子

柴胡枳椇湯

柴平湯

清鎮丸

柴胡四物湯

調經湯

小前胡湯

柴胡雙解散

成方切用

目錄

十

和解門 卷十

芍藥甘草湯

白朮芍藥湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃芩芍藥湯

外臺黃芩湯

黃連湯

溫膽湯

十味溫膽湯

越鞠丸

逍遙散

八味逍遙散

黑逍遙散

藿香正氣散

藿薤湯

六和湯

三解湯

清脾飲

薑茶飲

梅蜜飲

痛瀉方

甘草黑豆湯

成方切用

正柴胡飲

柴陳煎

柴芩煎

一柴胡飲

二柴胡飲

三柴胡飲

四柴胡飲

五柴胡飲

歸柴飲

盧根湯

目錄

和解門  
卷十

陰陽水

栝樓薤白白酒湯 見治氣門

半夏瀉心湯 見瀉火門

甘草瀉心湯 見瀉火門

生薑瀉心湯 見瀉火門

成方切用

目錄

三  
和解門  
卷十



陽邪入陰而熱熾非三黃不能除熱其人復真陽內微而陰盛非附子不能回陽然必各煎後乃得以各行其事而復煎以共行其事之

義不亦彰彰乎 嘔逆加生薑以散逆陳皮以理氣 煩而不嘔去半夏人參加栝蓢以蕩鬱熱 渴者去半夏加花粉以生津 若不渴外有微熱去參加桂枝以解肌覆取微汗

欬嗽去參棗生薑加五味以斂肺乾薑以散寒 欬為氣逆禮曰少陽有嗽無喘有喘非少陽也 齒燥無津 陽明有喘無嗽有嗽非正陽明也 齒燥無津 陽明有喘無嗽有嗽非正陽明也 齒燥無津 陽明有喘無嗽有嗽非正陽明也

膏以清胃止渴 虛煩加竹葉以涼心糯米以和胃 痰熱加瓜蒌貝母 腹痛去黃芩 以其加芍藥 合甘草 脇下痞

鞭去大棗 人滿加牡蠣 鹹能 脇下痛加青皮芍藥 膽為肝痛屬肝火 心下悸 經曰太陽證飲水多心 小便不利 水畜二藥平肝 心下悸 經曰太陽證飲水多心 小便不利 水畜

成方切用

去黃芩 苦反 加茯苓 淡能 本經頭痛加川芎 入肝活血 散鬱除風 發黃加茵陳以利溼

膽為清淨之腑無出入其經在半表半裏不可汗吐下法宜和解 仲景曰少陽中風耳聾目赤胸滿而煩不可吐下吐

氣虛者悸以下除滿下則亡血血虛者驚又曰傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽不可汗汗之則譫語釋曰汗之亡津液少陽之邪因邪入本經乃由表而將至裏當微熱發表迎

而奪之勿令傳太陰柴胡味苦微寒少陽主藥以升陽達表為君黃芩苦寒以降陰退熱為臣 陽乘於陰則發熱用柴胡不熱陰乘於陽則發寒用黃芩降陰氣使不上入陽中則不寒又曰柴胡黃芩之苦寒以退熱半夏生薑之辛溫以退寒人參大棗甘草之甘溫以助正氣 半夏辛溫能健脾和胃以散逆氣而止嘔

人參甘草以輔正氣而和中使邪不得復傳入裏為佐邪在半表半裏則營衛爭 表屬衛 故用薑棗之辛甘以和營衛為使也 陶節菴曰本經證心下飽悶未經下者非結胸也乃表

不效就以此方對小陷胸加枳桔一服豁然其效如神李時珍曰少陽證雖在半表半裏而胸膈痞滿實兼心膈上焦之邪心煩喜嘔雖不欲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以

治手足少陽相火黃芩亦少陽藥也喻嘉言曰傷寒分表裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和之於人參甘草半夏生薑大棗助脾之升但帶柴胡一味透表黃芩一味透裏飲入

胃中聽胃氣之升者帶柴胡一味透表黃芩一味透裏飲入胃中聽胃氣之升者帶柴胡一味透表黃芩一味透裏飲入胃中聽胃氣之升者帶柴胡一味透表黃芩一味透裏飲入

可曰小柴胡湯為邪傳少陽治在半表半裏和解之主方又少陽傳經而散以柴甘生薑為定藥餘則加減隨證爾吳

成方切用

也李士材曰今人治傷寒不分陰陽表裏藥用此方去參投之以為平穩殺人多矣不獨峻劑也喻嘉言曰虛勞發熱者乃衛虛則惡寒營虛則發熱爾緩調營衛伸不亢戰寒熱

自止若誤用小柴胡俾汗多而衛傷於外便溲而營傷於內虛益甚矣

去半夏加花粉名柴胡去半夏加栝蓢根湯 治往來寒熱而渴及勞瘵 喻嘉言曰此仲景治少陽病全體大用之一方

小柴胡湯乃傷寒少陽經天然不易之法湯者去半夏加栝蓢實亦天然不易之法而施之於少陽邪傳陽明傷耗津液

津竭者全無少陽之邪益益渴雖陽明津竭者取之少陽非以其木火之熱切奪胃津而然耶故經曰邪退於少陽即以此方進退而施其巧柴胡黃芩對治木火人參甘草扶助胃土枯養生津潤燥黃芩發越營衛若勞瘵之病其木火盛去半夏營衛衰津液竭所不待言故并可施此方以治之也 去半夏人參薑棗加桂枝乾薑花粉牡蠣名柴胡桂枝乾薑湯 景仲治

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而

不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也

陽所以誤下而胸脇微結也太陽中篇結胸條內頭汗出而

用大陷胸湯以其結在裏故從下奪之法也此頭汗出而

胸微結用柴胡桂枝乾薑湯以裏證未具故從和解之法也

小柴胡方中減半夏人參而加枳實以行太陽加乾薑以散

滿結一皆從本例也亦治瘧發寒多微有熱或但寒不

熱服一劑如神喻嘉言曰此瘧之寒多熱少或但寒不熱非

止附一方且云服一劑如神其邪之輕而淺從可識矣蓋

以衛氣在外營血在內胸中之陽氣散行於分肉之間今以

邪氣痺之則外營血在內胸中之陽氣散行於分肉之間今以

瘧結而不散遇衛氣行陽二十五度而病發其邪之入營者

既無外出之勢而營之素痺者亦不出而與陽爭所以多寒

少熱或但有寒無熱也小柴胡湯本陰陽兩停之方可隨進

邪之進退以為進退者加桂枝乾薑則進而從陽瘧着之邪

可以開矣更加牡蠣以乘其堅壁則陰陽豁然貫通而大汗

成方切用小柴胡湯五和

解矣所以服一劑如神也其加合桂枝湯名柴胡桂枝湯

治傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證

未去者喻嘉言曰心下支結者邪結於心下之偏旁不中正

宜經傳已過乃發熱微惡寒肢節煩疼微嘔其邪尚在太陽

之界未入於裏雖心下支結而外證未除則不可用大陷胸

湯以大陷胸湯主裏而不主表也亦不可用小陷胸湯以

陷胸湯主飲而不主表也夫支結之邪其在外者方盛其陷

入者原少故但合用柴胡桂枝和解二除黃芩甘草加桂枝

法以治其表邪去而支結自開矣

茯苓龍骨牡蠣鉛丹大黃名柴胡加龍骨牡蠣湯治傷寒

八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側

喻嘉言曰此伏飲素積為變之最鉅者蓋積飲之人津液素

結原不足以充灌週身及遇外感一切汗吐下定法漫難輕

試其誤下之變更有進於結胸者以此一證八九日過經乃

下之可謂慎矣孰知外邪未盡乘虛而陷積飲挾之填滿胸

中胸中既滿則腹中之氣不能因布而使道絕則若

主孤危所以心驚而神亂也煩與譫語本屬胃此則兼心小

便不利本屬津液內竭此則兼小腸火燭一身盡重不可轉

側者又神明內亂治節不行百骸無主之明徵也夫邪方在

表裏其患已及神明於此而補天浴日寧復尋常表裏所辦

故用人參茯苓之補以益心虛鉛丹之重以鎮心驚龍骨牡

蠣之澀以爲載神之舟楫一方而抵邪導邪全收安內攘外

之功後人不察謂是總三陽而和之之法豈其然哉○按傷

寒雖云傳足不傳手其實原無界限此證于少陰心主爲邪

所逼神明內亂因致譫語無倫較他證證于少陰心主爲邪

去懸絕若復以治足經之法治之必無幸矣方中藥止九味

用入心藥五種不以爲復且用重瀉藥三種不以爲猛蓋都

城震動勢必悉力入援非孤注可圖僥倖也至於痰飲搏膈

最爲難治者但用半夏一味表邪內襲首發難端者但從太

少之例用桂枝柴胡二味陽邪入陰最宜急驅者但用大黃

一味是則治傷寒與緊之虞咸落第二義止從治心諸藥之

後一案共結其局此等去柴胡黃芩加厚朴名厚朴生薑半

夏甘草人參湯治發汗後腹脹滿者喻嘉言曰吐後腹脹

胃氣乘虛入裏爲實也若發汗後外已解而復脹滿知非

裏實之證由脾胃氣虛虛津液搏結陰氣內動壅而爲滿也故

以益胃和脾降除半夏加當歸白芍大黃名柴胡飲子治

肌熱蒸熱積熱汗後餘熱脈洪實弦數表爲肌熱裏爲積熱亦治

瘧疾喻嘉言曰於和法中肯綮加桔梗名柴胡桔梗湯治春嗽合

平胃散名柴平湯治溼瘧身痛身重加青黛薑汁和丸名青

鎮丸治嘔吐脈弦頭痛及熱嗽本方一分加四物二分名

柴胡四物湯治婦人日久虛勞微有寒熱本方與四物各半

名調經湯以前胡易柴胡名小前胡湯而除餘治同加陳皮

芍藥名柴胡雙解散

芍藥甘草湯

治腹中不和而痛此陰陽氣血不和肝木乘脾而然○腹痛有蟲寒痛者病無增減或兼吐利熱痛者時痛時止腹滿

血有蟲寒痛者病無增減或兼吐利熱痛者時痛時止腹滿堅結實痛者痛甚脹滿手不可按虛痛者按之即止食痛者痛甚則利後痛減死血痛者痛有常處淫痰痛者脈滑痰氣阻礙不得升降蟲痛者時作時止面唇紅大抵胃脘下大腹痛者多屬食積外邪繞臍痛者屬仲景用治誤表發厥痰火積熱臍下少腹痛者屬寒或瘀血

腳攣吐逆與甘草乾薑湯以復其陽厥愈足溫者更作此湯

以和其陰其腳即伸酸甘相合用補陰血

白芍藥 甘草各四兩 脈緩傷水加桂枝生薑脈洪傷金加

黃耆大棗脈瀉傷血加當歸脈弦傷氣再加芍藥脈遲傷火

加乾薑

氣血不和故腹痛白芍酸收而苦泄能行營氣炙草溫散而

成方切用

芍藥甘草湯 黃芩湯

七 和解門

甘緩能和逆氣又痛為木盛尅土諸痛皆屬肝木 白芍能瀉肝甘草

能緩肝而和脾也王海藏曰稼穡作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已化土此仲景妙方也

加白朮名白朮芍藥湯機要治脾溼水瀉身重困弱保命集曰或暴下者皆太陰受病故不可離芍藥人不受溼則不利故須白朮

黃芩湯

仲景

治太陽少陽合病自下利者合病者謂有太陽證之身熱頭痛嘔而口苦寒熱往來也自利者不因攻下而泄瀉也

黃芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩 大棗十二枚

太陽陽明合病下利為在表與葛根湯以汗之少陽陽明合

病下利為陽邪入裏與承氣湯以下之此太陽少陽合病下

利為在半表半裏與黃芩湯以和解之仲景之書一字不苟方亦單治下痢機要用之治熱痢腹痛更名黃芩芍藥湯潔古因之加木香檳榔大黃黃連歸尾官桂更名芍藥湯治下痢仲景此方遂為

治瀉痢之祖方矣

加半夏升半 生薑二兩 名黃芩加半夏生薑湯仲景治前證兼嘔者

嘔胃氣逆也加半夏生薑以散逆氣千金曰生薑嘔家聖藥是散其逆氣也金匱云嘔家用半夏以治其水水去則嘔止是下其

痰飲也 亦治膽腑發欬嘔苦水如膽汁膽氣逆則嘔苦除大

棗名黃芩芍藥湯機要治熱痢腹痛後重身熱膿血稠黏及火

升鼻衄不止脈洪數

外臺黃芩湯黃芩人參乾薑各三兩 桂枝一大棗 半夏半

治乾嘔下利

成方切用

黃芩湯 黃連湯

八 和解門

黃連湯

仲景

治傷寒胸中有熱而欲嘔胃中有寒而腹痛成氏曰淫家下以丹田有熱胸中有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃中有邪氣使陰不得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不得降而獨治於上為胸中熱欲嘔吐宜與此湯以升降陰陽

黃連炒 乾薑炒 桂枝三兩 人參二兩 半夏半 大棗十二枚

黃連苦寒泄熱以降陽薑桂辛溫除寒以升陰人參助正祛

邪半夏和胃止嘔甘草大棗調中止痛上中二焦寒熱交戰

故以此和解之喻嘉言曰淫家下之舌上如胎者丹田有熱表裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和之故有小柴胡之

和法至於丹田胸中之邪在上下不在表裏即變柴胡為黃

連湯以桂枝代柴胡以黃連代黃芩以乾薑代生薑飲入胃

中聽胃氣之上下敷布故不問下寒上熱上寒下熱皆可治

之也夫表裏之邪則用柴芩用生薑之辛以散之上下之邪則用桂連用乾薑之辣以開之仲景聖法灼然矣

溫膽湯集驗

治膽虛痰熱不眠虛煩驚悸口苦嘔涎膽熱則口苦膽虛氣鬱致脾生痰涎而煩

嘔傷寒病後多有此證

半夏製茯苓或用陳皮去枳實炒竹筍加薑煎或

加棗局方無茯苓如心虛加人參棗仁心內煩熱加黃連麥冬口燥舌乾去半夏以其行水耗津加麥冬五味花粉表熱未清加

柴胡內虛大便自利去枳實加白朮內實心煩加黑梔子

橘半生薑之辛溫以之導痰止嘔即以此之溫膽戴氏云痰在膽經神不守舍亦令

人不寐枳實破滯茯苓滲淫甘草和中竹筍開胃土之鬱清

成方切用

溫膽湯 越鞠丸

九 卷和十

肺金之燥涼肺金即所以平甲木也膽為甲木金能平木如是則不寒

不燥而膽常溫矣經又云胃不和則臥不安又曰陽氣滿不

得入於陰陰氣虛故目不得瞑半夏能和胃而通陰陽故內

經用治不眠二陳非特溫膽亦以和胃也三因云心虛膽怯搏變生諸證觸事易驚或夢寐不祥或短氣悸乏或自汗並

溫膽湯主之嘔則以人參代竹筍經曰諸水病者故不得臥

則效甚

加人參棗仁遠志熟地各十味溫膽湯治夢遺驚惕

越鞠丸丹溪

統治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不消六鬱者氣鬱血鬱痰鬱火鬱濕鬱食鬱也六者之中以氣為主氣行則鬱散矣吞酸嘔吐由於痰火飲食不消由氣不通行丹溪曰氣升則鬱自降滑伯仁曰

鬱也六者之中以氣為主氣行則鬱散矣吞酸嘔吐由於痰火飲食不消由氣不通行丹溪曰氣升則鬱自降滑伯仁曰

鬱者結聚而不得發越當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化所以傳化失常而病見矣氣鬱者胸膈痛滯鬱者周身痛或關節痛遇陰寒即發痰鬱者動則氣喘脈沉滑熱鬱者昏昏便赤脈沉數血鬱者四肢無力能食食鬱者不能食

香附醋炒蒼朮酒浸撫芎神麴梔子炒等分麴糊丸如

溼鬱加茯苓白芷火鬱加青黛痰鬱加南星半夏枯蘗海石

血鬱加桃仁紅花氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山查砂仁

痰寒少加吳茱萸

吳鶴皋曰越鞠者發越鞠鬱之謂也香附開氣鬱蒼朮燥溼

鬱撫芎調血鬱梔子解火鬱神麴消食鬱陳來章曰皆理氣

也氣暢而鬱舒矣脾胃為水穀之海五臟六腑之主四臟一有不平則中氣不得其和而先鬱矣此方

成方切用

越鞠丸 逍遙散

十 卷和十

藥兼升降者將欲升之必先降之將欲降之必先升之蒼朮辛烈雄壯固胃強脾能徑入諸經疏泄陽明之溼通行數滯香附陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平撫芎足厥陰藥直達三焦上行頭目下行血海為通陰陽氣血之使不但開中焦而已胃主行氣於三陽脾主行氣於三陰脾胃既布水穀之氣得行則陰陽臟腑皆由胃氣而得通利矣

逍遙散局方

治血虛肝燥骨蒸勞熱潮熱欬嗽有乾欬嗽者丹溪曰極為難治此係火鬱之證乃痰鬱其火邪在中用逍遙散以

凡肝膽兩經鬱火以致脇痛頭眩或胃脘當心而痛或肩髀

絆痛或時眼赤痛連及太陽婦人鬱怒傷肝致血妄行赤白

淫閉沙淋崩漏等證俱宜此方加減治之易曰風以散之是

也

當歸酒 白芍 柴胡 茯苓 甘草 加煨

薑薄荷煎

肝虛則血病當歸芍藥養血而斂陰木盛則土衰甘草白朮

和中而補土 補土生金 柴胡升陽散熱合芍藥以平肝而使

木得條達 為補取疏通之義 茯苓清熱利溼助甘朮以益土

而令心氣安寧 茯苓能煨薑煖胃祛痰調中解鬱薄荷搜肝

瀉肺理血消風疏逆和中諸證自已所以有逍遙之名 醫貫

鬱曰東方先生木者生生之氣即火氣也火附木中木鬱

則火亦鬱矣火鬱則土自鬱土鬱則金鬱金鬱則水鬱五行

相因自然之理也余以一方治木鬱而諸鬱皆愈逍遙散是

也方中柴胡薄荷二味最妙蓋難乃甲木少陽之氣其氣柔

嫩象草穿地而未伸此時若被寒風一鬱即輒萎遏抑不能

上伸不上伸則下尅脾土而金水併病矣惟得溫風一吹鬱

成方切用 逍遙散 土和 卷十

氣始得暢達也蓋木喜風搖寒則摧萎溫則發生柴胡薄荷

辛能發散溫能入少陽古人立方之妙如此其甚者方中加

吳茱炒連即左金丸黃連清心火吳茱氣燥肝氣亦燥同氣

相求以平肝木平則不生心火不刑金而金能制木木不

直伐木而左金以制木此左金所以得名也此法之巧者然

猶未也繼用六味地黃加柴胡芍藥以滋腎水俾能生木迨

遙散風以散之也地黃飲雨以潤之也木有不潤其天者乎

此法一立木火之鬱既舒木不下尅土土亦得滋潤無燥熯

之患金水自能相生子謂一法可通五法者如此推而廣之

凡寒熱往來惡寒惡熱嘔吐吞酸噎膈胸膈痛小腹痛脹

黃桂枝也必小柴胡木鬱達之也此理甚簡易劉守真謂用  
氏謂九味羌活散可代三和六神通解加石膏於黃芩湯  
三方也火為寒鬱煎腎水至木旺時無生發滋潤之本故  
滋其水以柴胡舒其木活人多矣  
加丹皮山梔名八味逍遙散 薛 治怒氣傷肝血少目暗 肝火  
經曰目得血而能視肝傷血少則目昏丹皮能瀉血中伏火  
梔子能瀉三焦鬱火故薛氏加之以抑肝氣兼以調經也醫  
貫曰古方逍遙散柴胡薄荷當歸芍藥陳皮甘草白朮茯苓  
其加味者則丹皮梔子余以山梔屈曲下行泄水改用吳茱  
黃妙黃連○按以加味逍遙散六味丸治鬱自薛長洲始也  
然長洲之法實得之丹溪越鞠之芍藥即逍遙之歸芍也越  
鞠之蒼朮即逍遙之白朮也越鞠之神麴即逍遙之陳皮也  
越鞠之香附即逍遙之柴胡也越鞠之梔子即逍遙之加味  
也但越鞠峻而逍遙和矣越鞠燥而逍遙潤矣此則青  
出於藍後來居上亦從古作述之大凡如東垣之補中益氣  
謂枳朮之謬而禁不用哉 加熟地名黑逍遙散  
成方切用 藿香正氣散 土和 卷十  
治外感風寒內傷飲食憎寒壯熱頭痛嘔逆胸膈滿悶欬嗽  
氣喘及傷冷傷溼瘧疾中暑霍亂吐瀉凡感嵐瘴不正之氣  
者並宜增減用之 元氣虛弱 人慎用  
藿香 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 白朮 陳皮 半  
夏 厚朴 薑 桔梗 甘草 兩 每服五錢加薑棗煎一方  
加木瓜 氣脫能收 傷食重者加消食藥  
藿香辛溫理氣和中辟惡止嘔兼治表裏為君蘇芷桔梗散  
寒利膈佐之以發表邪厚朴大腹行水消滿橘皮半夏散逆  
除痰佐之以疏裏滯苓朮甘草益脾去溼以輔正氣為臣使



也正氣通暢則邪逆自除矣吳綬曰若太陽傷寒頭痛發熱用之雖汗出亦不解變成壞證者多矣凡傷寒發熱脈沉元氣虛人并夾陰傷寒發熱者皆不可用戴元禮曰肥人多中氣盛於外而軟於內也肺為氣出入之道人肥者必氣急氣急必肺邪盛肺金剋肝木膽為肝之腑故痰涎壅盛治之必先理氣中後氣未盡順痰未盡降調理之劑當以藿香正氣散和星香散服此藥非特治中風之證中氣中惡霍亂尤宜合三味香薷飲名藿薷湯治伏暑吐瀉轉筋

六和湯局方

治夏月飲食不調內傷生冷外傷暑氣寒熱交作霍亂吐瀉及伏暑煩悶倦怠嗜臥口渴便赤中酒等證

砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 藟豆 木瓜 人參

白朮 赤茯苓 甘草 加薑棗煎傷暑加香薷傷冷加

成方切用 六和湯 三解湯

三和 卷十

紫蘇一方無白朮一方有蒼朮

藿香砂仁杏仁厚朴香能舒脾辛能行氣而砂仁厚朴兼能

化食木瓜酸能平肝舒筋助肺金以平肝邪故治霍亂轉筋

藟豆赤茯苓能滲溼清熱而藟豆又能散暑和脾半夏辛溫

散逆而止嘔參朮甘溫補正以匡邪甘草補中協和諸藥薑

棗發散而調營衛皆所以和之也吳鶴皋曰六和者和六腑也脾胃為六腑之總司先

調脾胃則水精四布五經並行百骸九竅皆太和矣

三解湯

治時行瘧之通劑喻嘉言曰瘧發必有寒有熱蓋外邪伏於

陰勝則寒入與陰爭陽勝則熱即純熱無寒為瘧瘧溫瘧純寒無熱為瘧瘧要皆自少陽而造其極偏補偏救弊亦必還

返少陽之界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼他經則有一字實貫之謂他經而不涉少陽則不成其為瘧矣脈縱瀾瀾而弦之微之也

柴胡 麻黃去澤瀉各三錢

瘧邪藏於分肉之間邪正分爭併於表則在表併於裏則在裏未有所併則在半表半裏麻黃之辛能散表邪由汗而泄

澤瀉之鹹能引裏邪由溺而泄柴胡升陽退熱居表裏之間

而和解之此但可以治實瘧虛者當辨其氣血晝發屬氣而夜發屬血

加補劑

清脾飲厥用和

治瘧瘧脈弦數但熱不寒或熱多寒少脘滿不食口苦舌乾

成方切用 清脾飲

煩渴小便赤澀大便不利

青皮 厚朴醋炒 柴胡 黃芩炒 半夏薑製 茯苓 白朮土炒 甘草

炙草果 薑引一方加檳榔大渴加麥冬知母瘧不止加酒

炒常山一烏梅二箇常山極痰截瘧烏梅斂陰清熱

瘧為肝膽之邪然多因脾胃受傷而起脾屬溼土重感於暑

溼故見前證也脾既受病木又尅之故用青皮柴胡以破滯

而伐肝半夏厚朴以行痰而平胃古云無痰不作瘧 茯苓用以滲溼

黃芩用以清熱草果辛熱能散太陰之積寒除痰而截瘧清

膏粱蓋先去其害脾者而以白朮甘草調而補之也此即小

加減從溫脾諸方而一變也張子和曰世醫以瘧為脾寒甚

者歸之崇怪良可笑也劉宗厚曰盛暑陽極伏陰作內人或

納涼深浴寒客肌肉之間或饑飽勞役內傷而病作肌肉屬脾發則惡寒戰慄乃謂之脾寒兩實由風寒淫喝邪鬱厥理夏時毛竅疏通而不為病至秋收斂之際表邪不能發越故進退不已往來寒熱勢如凌虛之狀所以名瘧不能發者兼理內傷取效由脾胃和精氣通陰陽和解諸邪悉散實非脾病也世用發表解肌溫經散寒等法亦未嘗執於燥脾却劑也吳鶴皋曰清脾非清涼之謂乃攻去其邪而脾部為之一清也劉宗厚因草果之辛熱而議焉是未達嚴氏之清矣高鼓峯曰治瘧多方俱不得要惟此方為中正子每用此加減無不愈者蓋瘧發寒熱原屬少陽半表半裏故必以小柴胡為君青皮以解脈之弦數厚朴以寬胃中之積滯草果以化痰消壅蒼朮以實脾土此二味乃補正之義緣瘧固由外感然必內傷而後外感起焉此東垣之微旨也嚴氏立方最為的當但竟由飲食起者子每以蒼朮易白朮加陳皮以合平胃之意熱多寒少者稍加黃連滑石寒多熱少者稍加前胡以發其鬱熱無不應手而驗能審此而消息之何至遷延久病困苦天下人哉若誤服藥病久者不可執此為不易之法是在學者神而明之爾如服藥而致胃傷者須以人參養胃湯養之服藥多者仍以小柴胡湯多加黃連丹草生地以解之久而虛者補中益氣以救之發於夜者益母草飲

成方切用

薑茶飲 痛瀉要方

五和解門

以濟之用法雖殊然小柴胡之旨不可脫也○益母草飲一名香紅飲

薑茶飲

治赤白痢及寒熱瘧

生薑 陳細茶 每味三錢濃煎

茶助陰薑助陽使寒熱平調並能消暑解酒食毒此方用之屢效勿以平淺而忽之也

除生薑加陳白梅蜜水煎名梅蜜飲治熱痢除茶加木香肉

蔻治冷痢 蜜最能治痢

痛瀉要方

劉草愈

治痛瀉不止 脾虛故瀉肝實故痛吳鶴皋曰此與傷食不同傷食腹瀉痛得瀉便減今瀉而痛不止故責之土

敗木賊也○戴氏曰水瀉而腹不痛者溼也痛甚而瀉瀉而痛減者食積也瀉水腹痛腸鳴痛一陣瀉一陣火也或瀉或不瀉或多或少或虛者痰也

完穀不化者氣虛也

白朮 三兩 白芍 二兩 陳皮 半兩 防風 兩 或煎或丸久瀉加升麻

白朮苦燥溼甘補脾溫和中芍藥寒瀉肝火酸斂逆氣緩中

止痛防風辛能散肝香能舒脾風能勝溼為理脾引經要藥

東垣曰若補脾胃 陳皮辛能利氣炒香尤能燥溼醒脾使氣

行則痛止皆以瀉木而益土也

甘草黑豆湯

解百藥毒兼治筋疝 莖中掣痛挺脹不堪由用春方邪

成方切用

甘草 二兩 黑豆 升半 正柴胡飲

大和解門

蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試之不然又加甘草其驗乃奇

若治筋疝當用甘草梢以梢能徑達莖中也

加大黃名大黃甘草湯治上中下三焦消渴

正柴胡飲 景岳

凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛痠瘧初起等證氣血和平宜從平散者

柴胡 三錢 防風 錢一 陳皮 錢半 芍藥 錢二 甘草 錢一 生薑 三五片 如熱

而兼渴者加乾葛一二錢 如嘔惡者加半夏錢半 如溼

勝者加蒼朮一錢 如胸腹有微滿者加厚朴一錢 如寒

氣勝而邪不易解者加麻黃一二三錢去浮沫或蘇葉亦可  
柴陳煎景岳

治傷風兼寒欬嗽發熱痞滿多痰

柴胡一二錢 陳皮錢五分 半夏錢二分 甘草錢一分 生薑三五片 如寒勝者

加細辛七八分 如風勝氣滯者加蘇葉錢半 如冬月寒

甚者加麻黃錢半 氣逆多嗽者加杏仁一錢 痞滿氣滯

加白芥子五七分

柴苓煎

治傷寒表邪未解內外俱熱瀉痢煩渴喜冷氣壯脈滑數者

宜此主之及瘧痢並行內熱去血兼表邪發黃等證

成方切用

柴陳煎 柴苓煎 一柴胡飲 七和解門

柴胡 黃芩 梔子 澤瀉 木通 枳殼 如瘧痢並行

鮮血純血者加芍藥二錢甘草一錢 如溼勝氣陷者加防

風一錢

一柴胡飲景岳

一為水數從寒散也 凡感四時不正之氣或為發熱或為

寒熱或因勞因怒或婦人熱入血室或產後經後因冒風寒

以致寒熱如瘧等證但外有邪而內兼火者須從涼散宜此

主之

柴胡一二錢 黃芩錢半 芍藥錢二分 生地 陳皮錢半 甘草八分 如內熱

盛者加連翹一二錢 如外邪盛者加防風一錢 如邪結

在胸而痞滿者去生地加枳實一二錢 如熱在陽明而兼

渴者加花粉或葛根一二錢甚者加知母石膏亦可

二柴胡飲

二為火數從溫散也 凡遇四時外感或其人元氣充實臟

氣素平無火或時逢寒勝之令本無內熱等證者皆不宜妄

用涼藥以致寒邪不散則為害匪淺宜此主之

陳皮錢半 半夏 細辛 厚朴錢二分 甘草錢一分 柴胡錢半 或

三五 如邪盛者可加羌活防風白芷紫蘇之屬擇而用之

如頭痛不止者加川芎一二錢 如多溼者加蒼朮 如

陰寒氣勝必加麻黃一二錢或兼桂枝不必疑也

成方切用

二柴胡飲 三柴胡飲 四柴胡飲 六和解門

三柴胡飲景岳

三為木數從肝經血分也 凡素稟陰分不足肝經血少而

偶遇風寒或感邪不深可兼補而散者或病後或產後感冒

有不得不從解散而陰氣虛弱不能外達者宜此

柴胡二錢 芍藥錢半 甘草錢一分 陳皮錢一分 當歸二錢 熟地錢半 生薑三五片 如微寒欬嘔者加半夏

四柴胡飲景岳

四為金數從氣分也 凡元氣不足或忍饑勞倦而外感風

寒或六脈緊數微細正不勝邪等證必須培助元氣兼之解

散庶可保全宜此主之若但知散邪不顧根本未有不元氣

先敗者察之慎之

柴胡一二錢隨宜炙甘草一錢當歸二三錢湯者少用生薑三五片如

胸膈滯悶者加陳皮二錢

五柴胡飲景岳

五為土數從脾胃也 脾土為五臟之本凡中氣不足而外

邪有不散者非此不可此與四柴胡飲相表裏但四柴胡飲

止調氣分此則兼培血氣以逐外邪尤切於時用者也神效

不可盡述凡傷寒瘧疾痘瘡皆所宜用

芍藥炒白朮當歸二三錢柴胡一二錢熟地三五錢炙甘草一錢陳

皮酌用或不必用寒勝無火者減芍藥加生薑三五七片或炮薑

成方切用五柴胡飲 歸柴飲 蘆根湯 尤和解門

一二錢或加桂枝二錢則更妙 脾滯者減白朮 氣虛者

加人參隨宜勞倦傷脾下陷者加升麻一錢

歸柴飲景岳

治營虛不能作汗凡真陰不足外感寒邪難解者此神方也

當歸一錢柴胡五錢炙甘草八分或加生薑三五七片或加陳皮

一錢或加人參大便多溏者以冬朮代當歸亦佳

蘆根湯千金

治傷寒病後嘔噦不下食

蘆根升竹筴升生薑二兩粳米二合

蘆根甘寒降伏火利小水竹筴甘寒除胃熱清燥金生薑辛

溫祛寒飲散逆氣三者皆能和胃胃和則嘔止加粳米者亦

藉以調中州也

陰陽水又名生熟水

治霍亂吐瀉有神功藥中治霍亂者最多然有寒熱二證萬

切勿輕投偏熱偏寒之劑惟飲陰陽水為最穩○張子和曰

霍亂吐瀉乃風淫腸三氣合邪也淫土為風木所剋則生

熱心火上炎故吐也吐者腸也脾淫下注故瀉也瀉者淫也風急

甚則轉筋轉筋者風也又邪在上焦則吐在下焦則瀉在中

焦則吐瀉交作

百沸湯新汲井水各半和服

陰陽不分而擾亂故上吐下瀉而霍亂飲此輒定者分理其

陰陽使和平也

成方切用陰陽水 尤和解門

成方切用卷十一目錄

表裏門 正方一十四 附方六

大柴胡湯

大前胡湯

柴胡加芒硝湯

葛根黃連黃芩湯

桂枝加大黃湯

防風通聖散

雙解散

祛風至寶丹

五積散

成方切用

目錄

一 表裏門 卷十一

五積交加散

參蘇飲

茯苓補心湯

芎蘇飲

香蘇飲

三黃石膏湯

麻黃白朮湯

冰解散

茵陳丸

柴苓飲

四逆散

成方切用卷十一

表裏門

病在表者宜汗宜散病在裏者宜攻宜清至於表裏未除兼治之後人師其意則有防風通聖參蘇五積諸劑姑探數方以爲準則學者其引而伸之比例而善用之則得矣

大柴胡湯

仲景

治傷寒發熱汗出不解陽邪入裏熱結在裏

少陽陽明三陰亦有轉入陽明者如太陰有桂枝加大黃湯少陰有三大承氣厥陰一小承氣皆兼陽明證也

痞鞭嘔而下利

張兼善曰裏虛者雖便難而勿攻裏熱者雖利而不可下

故下之則愈又曰傷寒下之早因作痞者裏虛協熱而利也

則表裏不解故用桂枝人參湯解表而裏若傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利或往來寒熱煩渴譫妄腹滿便者此爲實故以大柴胡下之

成方切用

大柴胡湯

祕表證未除裏證又急脈洪陽明或沉實弦數者

爲邪在少陽

柴胡

八兩

半夏

半升

黃芩

芍藥

兩三

生薑

兩五

黃二兩

酒浸

表證未除故用柴胡以解表裏證又急故用大黃枳實以攻裏芍藥安脾斂陰

嘔薑辛散而棗甘緩以調營衛而行津液此表裏交治下劑之緩者也

陶節菴曰傷寒邪熱傳裏須石熱氣淺深用藥三焦則有燥實堅三證宜調胃承氣湯加甘草和中去枳朴者

恐傷上焦氣虛之氣也邪在上焦則痞而實宜小承氣湯去芒硝者恐傷下焦氣陰也若表證未除裏證又急不得不下者則用大柴胡湯通表裏而緩治之大承氣最緊小承氣次

之謂胃承氣又次之大柴胡又次之蓋恐有微邪不  
用周揚俊曰仲景於太陽人膀胱證則有五苓散少陽  
陽明證則有大柴胡  
湯皆表裏兩解之法也

以前胡易柴胡名大前胡湯崔氏取其清降而治風痰

柴胡加芒硝湯仲景

治傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡潮熱已而微利此本

柴胡證知醫以圓藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴

胡湯以解外後以加芒硝湯主之傷寒十三日為再經已盡也胸滿而日晡潮熱陽明也邪氣猶在表裏之間

小柴胡湯見和加芒硝六兩

表證誤下邪熱乘虛入胃以致下痢而滿嘔潮熱之證猶在

成方切用

柴胡加芒硝湯

葛根黃連黃芩湯

表裏門卷十一

故仍先與小柴胡湯以解外隨後以加芒硝湯以瀉胃熱亦

與大柴胡兩解同意

葛根黃連黃芩湯仲景

治太陽病桂枝證發熱頭痛

惡風自汗

醫反下之利遂不止

邪在表而反下之虛

其腸胃表邪乘虛入裏

脈促者表未解也

脈數而止曰促促為陽盛雖下利而

脈促知表未解

喘而汗出者

汗出而喘為邪氣外盛所致喘而汗出為裏實氣逆所致與此

清裏熱邪此湯主之

葛根

半斤

甘草

黃芩

黃連

二兩

先煮葛根內諸藥煎或加

薑棗

表證尚在醫反誤下邪入陽明之腑其汗外越氣上奔則喘

下陷則利故舍桂枝而用葛根顯主陽明之表葛根能升陽

治瀉加芒連以清裏熱甘草以調胃氣不治利而利自止不

治喘而喘自止乃太陽陽明表裏兩解之變法也

桂枝加大黃湯仲景

治太陽誤下轉屬太陰腹滿大實痛者

桂枝湯見表加大黃一兩芍藥三兩

誤下而成結胸則邪在上仍屬太陽今腹滿而大實痛則邪

已入太陰經曰諸痛為實痛隨利減故用桂枝以解未盡之

表邪加大黃以下內陷之邪熱王海藏曰腹痛桂枝加大黃何為只用芍藥大黃而於桂枝內加之要知從太陽來以太陽為本也趙嗣真曰太陰腹痛有三有次第傳經之邪有直入本

成方切用

桂枝加大黃湯

防風通聖散

表裏門卷十一

經之邪有下後內陷之邪此腹滿時痛為下後內陷之邪宜

桂枝加芍藥湯大實痛者桂枝加大黃湯設遇本經直入陰

邪腹痛實痛脈沉細者宜急用四物理中等以和之矣○經

又曰太陰病脈弱其人續自便利設當用大黃芍藥者宜減

之以口氣弱易動故也以太陰為

寒藏其病多宜溫而不宜下也

防風通聖散河間

治一切風寒溼暑饑飽勞役內外諸邪所傷氣血怫鬱表裏

三焦俱實憎寒壯熱邪在表頭目昏運目赤睛痛風熱上攻耳鳴鼻

塞口苦舌乾咽喉不利唾涕稠黏咳嗽上氣大便秘結熱結大腑

小便赤澀熱畜膀胱瘡瘍腫毒氣血拂鬱折跌損傷瘀血便血腸風痔

漏手足癰癰驚狂譫妄肝風火丹斑癰疹風熱在

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎 當歸 白芍

炒白朮 山梔炒 大黃酒 芒硝五 黃芩 石膏 桔梗兩 甘草兩 滑石三 加生薑葱白煎自利去硝黃自汗去麻黃加桂枝涎嗽加薑製半夏

防風荆芥薄荷麻黃輕浮解表使風寒從汗出而散之於上大黃芒硝破結通幽梔子滑石降火利水使風熱從便出而泄之於下風淫於內肺胃受邪桔梗石膏清肺瀉胃風之爲患肝木受之川芎歸芍和血補肝黃芩清中生之火連翹散氣聚血凝甘草緩峻而和中重用甘草滑石亦猶六一利水瀉火之意而燥溼上下分消表裏交治而於散瀉之中猶寓溫養之意所以汗不傷表下不傷裏也

成方切用

五積散

四

表裏門

除大黃芒硝名雙解散麻黃防風荆芥薄荷川芎以解表黃芩梔子連翹石膏消石以解裏復有當歸白芍以和血桔梗甘草再加人參補氣熟地益血黃蘗黃連除熱羌活獨活天麻細辛全蠍祛風蜜丸彈子大每服一丸茶酒任下名祛風至寶丹喻嘉言曰此中風門不易之方也

五積散

局方

治少陰傷寒及外感風寒內傷生冷身熱無汗頭痛身痛項背拘急胸滿惡食嘔吐腹痛寒熱往來腳氣腫痛冷秘寒疝寒瘕惡寒無汗婦人經水不調上證皆寒淫爲病

白芷 陳皮 厚朴分六 當歸 川芎 芍藥 茯苓 桔梗 蒼朮 枳殼分七 半夏 麻黃分四 乾薑 肉桂重表者用桂枝 甘草

分三 加薑葱煎又法除桂芷枳殼陳皮餘藥慢火炒攤冷入桂芷同煎名熟料五積散用妙者助其溫散也有汗去蒼朮麻黃氣虛去枳桔加人參白朮腹痛挾氣加吳茱萸胃寒加炮薑陰證傷寒肢冷虛汗加附子婦人調經加醋艾

麻黃桂枝所以解表散寒甘草芍藥所以和裏止痛蒼朮厚朴平胃土而散滿陳皮半夏行逆氣而除痰芎歸薑芷入血分而祛寒溼枳殼桔梗利胸膈而清寒熱茯苓瀉熱利水寧心益脾所以爲解表溫中除溼之劑去痰消痞調經之方也王海藏曰桂枝麻黃芍藥甘草即各半湯也蒼朮陳草即平胃散也枳桔陳茯苓即枳桔半夏等湯也加芍歸治血又加乾薑爲厚朴散此數藥相合爲解表溫中之劑消痞調經之方雖爲內寒外感表裏之分所製實非仲景表裏桂枝麻黃

成方切用

參蘇飲

五

表裏門

蓋附之的方也惟在活法變而通之陶節菴曰夫病不身熱頭痛初起治寒腹痛嘔吐泄瀉臥沉熱不渴脈沉遲無力人皆知爲陰證矣至於發熱面赤煩躁渴去衣被脈大人皆不識認作陽證誤投寒藥死者多矣不知陰證不分熱與不熱不論脈之浮沉大小但指下無力重按全無便是伏陰急與五積散一服通解表裏之寒若內有沉寒必須薑附溫之不取證也按傷寒有舍證取脈者又有舍脈取證者○本方能散寒積食積氣積血積痰積故名五積

參蘇飲

元戎

治外感風寒內傷飲食發熱頭痛嘔逆欬痰塞中焦眩暈嘔煩傷風泄瀉及傷寒已汗發熱不止已汗而熱不止猶有表裏則邪自散○溢飲身重注痛者亦宜此方清利之

人參 紫蘇 乾薑 前胡 半夏蘇汁 茯苓七錢 陳皮去

甘草 枳殼炒 桔梗 木香錢二 每五錢加薑棗煎外感多

者去棗加葱白肺中有火去人參加杏仁桑白皮瀉肺泄瀉加

白朮 糯豆蓮肉炒燥淫

元戎云此方有風藥解表氣藥和中外感風寒內積痰飲皆

可用也合四物名茯苓補心湯尤能治虛熱及吐衄便血乃

虛實表裏兼治之劑然不可過劉宗厚曰此出少陽柴胡例

本方云前胡葛根自能解肌枳殼橘紅輩自能寬中

快膈毋以性涼為疑思觀藥性非涼亦是辛平之劑

去人參加川芎前胡易柴胡薑棗煎名芍蘇飲治傷風寒

外有發熱頭痛惡寒內有欬嗽吐痰氣湧此因肺有實熱且

成方切用 三黃石膏湯 參而加川芎以除頭痛以柴胡易

前胡者取其升散不取其清降也

三黃石膏湯 治傷寒溫毒表裏俱熱狂叫欲走煩躁大渴面赤鼻乾兩目

如火身形拘急而不得汗或已經汗下過經不解三焦大熱

譫狂鼻衄身目俱黃六脈洪數及陽毒發斑陶節菴曰此因

經絡津液榮衛

生石膏兩 黃芩 黃連 黃芩錢五 梔子三十箇 麻黃去

兩 每服一兩薑三片棗二枚細茶一撮煎熱服

表裏之邪熱俱盛故以黃芩瀉上焦之火黃連瀉中焦之火

黃芩瀉下焦之火梔子通瀉三焦之火而以麻黃淡豉發散

表邪石膏體重瀉火氣輕解肌亦表裏分消之藥也

麻黃白朮湯東垣

治大便不通小便赤澀身面俱腫色黃麻木身重如山喘促

無力吐痰唾沫發熱時躁躁已振寒項額如冰目中酒火鼻

不聞香膈有動氣少腹急痛東垣曰此宿有溼熱伏於營血

氣喘促為陰火傷氣門被痰弱為腎水不足冬時寒水

得令乘其肝木尅火傷氣門被痰弱為腎水不足冬時寒水

青皮 陳皮 黃連 黃芩 蒼朮 白朮 厚朴 豬苓 三澤瀉 吳

黃 茯苓 白朮 蒼朮 炒麴 分麻黃 六分 杏仁 研 分

二服

成方切用 麻黃白朮湯 香蘇飲 七 表裏門

前證蓋因表裏俱傷陽氣抑不得升故風火溼熱鬱而為病

也桂枝麻黃解表祛風升麻柴胡升陽散火黃連黃芩燥溼

清熱而黃芩又能補腎滋陰蔻朴青陳利氣散滿而青柴又

能平肝蔻朴又能溫胃杏仁利肺下氣神麴化滯調中吳黃

煖腎溫肝參耆甘草蒼白二朮補脾益氣二苓澤瀉通利小

便使溼去而熱亦行方內未嘗有通大便之藥蓋清陽升則

濁陰自降矣此方蓋合四君五苓平胃散黃芩黃連解毒而為

藥俱備但皆氣藥而無血藥與五積不同

香蘇飲 治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶噯氣惡食內經



下之地春氣常在故東南卑澤之區風氣柔弱易感風寒俗稱感冒受邪膚淺之名也山鼻而入在於上部客於皮膚故無六經形證唯發熱頭痛而已胸滿噯氣惡食則兼內傷也。輕爲感冒重者爲傷又重者爲中

香附 炒紫蘇 陳皮 錢白甘草 分加薑葱煎傷食加消導

藥欬嗽加杏仁桑皮有痰加半夏頭痛加川芎白芷傷風鼻

塞頭昏加羌活荆芥心中卒痛加延胡索酒一杯

紫蘇疏表氣而散外寒香附行裏氣而消內壅橘紅能兼行

表裏以佐之橘紅利氣能散表散寒益甘草和中亦能解

表爲使也

水解散 肘後

治天行一二日頭痛壯熱

成方切用 水解散 茵陳丸

麻黃 兩桂心 甘草 炙白芍 兩大黃 黃芩 三兩

麻黃能開腠發汗桂心能引血化汗黃芩以清上中之熱大

黃以瀉中下之熱甘草白芍能調胃而和中蓋天行瘟疫鬱

熱自內達外與傷寒由表傳裏者不同故雖一二日之淺可

以汗下兼行治法絕不同於傷寒也 易大黃宜減用

茵陳丸

治時氣瘴氣黃病疹瘡赤白痢等證

茵陳 梔子 鼈甲 炙芒硝 兩大黃 兩常山 杏仁 炒三巴

豆 心皮炒 鼓 合蜜丸 梔子大每服一丸或吐或利或汗如

不應更服一丸不應則以熱湯投之老幼以意加減

梔子淡豉梔豉湯也合常山可以涌吐合杏仁可以解肌大

黃芒硝承氣湯也可以蕩熱去實合茵陳可以利溼退黃三

名茵陳湯加巴豆大熱以去臟腑積寒加鼈甲滋陰以退血

分寒熱此方備汗吐下三法故能統治諸病

柴芩飲 景岳

治風溼發黃發熱身痛脈緊表裏俱病小水不利中寒泄瀉

等證

柴胡 錢二 茯苓 豬苓 澤瀉 錢一 白朮 錢二 肉桂 錢一 水

一盞半煎服 如寒邪盛者加生薑三五片 如汗出熱不

退者加芍藥一二錢

成方切用 柴芩飲 四逆散

四逆散 仲景

治傷寒少陰證陽邪入裏四逆不溫 熱結或欬或悸或

或小便不利或腹中痛或泄利下重 皆因熱結於裏○傷寒

至太陰則手足溫至少陰則熱邪漸深四肢逆而下溫至厥

陰則手足逆冷經曰熱深厥亦深熱微厥亦微與此湯以散

傳經之熱

柴胡 芍藥 枳實 甘草 等分爲末水調飲欬加五味

子散逆 乾薑 散肺 併主下利 欬下利治法頗同 悸加桂枝

導引 陽氣小便不利加茯苓 泄瀉腹痛加附子 補虛泄利下重加

薤白 通大腸 泄氣滿 經曰諸四逆者不可下故用枳實泄結熱甘草調逆氣柴胡

散陽邪芍藥收元陰以辛苦甘酸之品合表裏而交治之則陽氣敷布於四末矣

成方切用

四逆散

十

表裏門  
卷十一

成方切用卷十二目錄

祛風門 正方七十一 附方一十二

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散方

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

朮附湯

成方切用

目錄

十

祛風門  
卷十二

越婢加朮湯

小續命湯

麻黃續命湯

白虎續命湯

附子續命湯

羌活連翹續命湯

千金大續命湯

大秦北湯

地黃飲子

天麻丸

桂枝續命湯

葛根續命湯

杜附續命湯

錄驗續命湯

稀莪丸

活絡丹

三生飲

牽正散

改容膏

獨活湯

胃風湯

東垣胃風湯

解風散

愈風丹

成方切用

目錄

清風膏

消風散

轉舌膏

正舌散

二丹丸

排風湯

涼膈散

清心散

滌痰湯

方見除痰門

稀涎散

二 祛風門  
卷十二

竹瀝湯

貝母瓜蒌散

青州白丸子

星附散

治風六合湯

方見理血門

三聖散

加味六君子湯

薏苡仁湯

人參補氣湯

烏頭粥

成方切用

目錄

桂枝五物湯

方見表散門

十味判散

通痹散

史國公藥酒方

三因白散子

獨活湯

防風通聖散

方見表裏門

祛風至寶丹

方見表裏門

獨活寄生湯

羌活續斷湯

三 祛風門  
卷十一

資壽解語湯

不換金丹

搜風順氣丸

順風勻氣散

攝生飲調蘇合丸

烏藥順氣散

八味順氣散

通頂散

瀉青丸

舒筋保安散

成方切用

加味羚羊角散

如聖飲

上中下通用痛風方

三化湯

方見攻下門

血痺湯

三痹湯

千金地黃湯

烏梅擦牙關方

許盾宗方

王克明方

目錄

四

祛風門  
卷十二

清震湯

成方切用

目錄

五

祛風門  
卷十二

成方切用卷十二

祛風門

六氣風淫為首故風病最多其淺而止在皮毛則為傷風其久而漸於關節則為痠痹其最重而入於骨髓則為中風內經風痠痠厥四者各有專論獨風論中泛及雜風至論中風准曰風中五臟六腑之俞亦為風肺之風各人其門戶所中則為偏風不遇兩逆其名而已後論五臟并胃肺之風亦但各述其狀而已賴仲景金匱書表章先聖語諸金針大有端緒之可求矣仲景以後英賢輩出方書充棟何反漫無取哉坐令中風一證鮮書一之法治之百無一效如劉河間則主火為謂是火召風入火為本而風為標矣李東垣則主痰為謂是痰召風入痰為本而風為標矣張景岳則以為此證多屬氣脫本非風證竟以非風二字易中風二字其見雖超然豈無外邪乘虛而入以致卒倒者乎喻嘉言曰此證陽虛邪害空竅為本而風從外入者必扶身中素有之邪或氣或痰或火而為標也蓋風為陽邪人身衛外之陽不固陽邪乘隙尤為易入即如偏枯不

成方切用

侯氏黑散

卷十二

仁要皆陽氣虛餒不能充灌所致中風卒倒其陽虛更審設非陽虛其人必輕矯便捷何得卒倒耶要知風性善走空竅陽虛則風居空竅漸入臟腑此惟離照當空羣邪始得畢散若胸中之陽不治風必不出矣中風門中大小續命湯及六經加減法雖治風非治風依然後人之法也金匱取古今錄驗續命湯治風非治風依然後人之法也金匱取義也空竅一實則風出而不復入其病瘳矣古方中有侯氏黑散深得此意仲景取為主方隨製數方輔其未備乃遵內經久寒其空之意也後人以無師之智煥亂成法中風之初治其表裏風邪非不外出而重門洞開出而復入適至莫禦者多矣諸家所論俱太偏執因致客反勝主幾置中風一證於烏有矣

侯氏黑散

金匱

治大風四肢煩重心中惡寒不足者外臺用

菊花四十 白朮 防風 分桔梗 分黃芩 分人參 茯苓

歸 川芎 乾薑 桂枝 細辛 牡蠣 礬石 分 十四

味杵為散用溫酒調方寸七日三服二十日再冷食服四十

日禁一切魚肉大蒜共六十日止即藥積腹中不下熱食即

下矣冷食自能助藥力

此為中風家挾寒而未變熱者治法之準則也謂風從外入

挾寒作熱此為大風證見四肢煩重豈非四肢為諸陽之本

為邪所痺而陽氣不運乎然但見於四肢不猶愈體重不勝

乎證又見心中惡寒不足豈非漸欲陵心乎然燥熱猶未乘

心不猶愈於不識人乎故用參苓歸芎補其氣血為君菊花

白朮牡蠣養肝脾腎為臣而加防風桂枝以行痹着之氣細

成方切用

侯氏黑散

卷十二

辛乾薑以驅內伏之邪兼桔梗黃芩以開提肺熱為佐礬石

所至卻淫解毒收澀心氣酒力運行周身為使且必為散酒

服至六十日止又常冷食使藥積腹中不下填塞胸中之空

竅而邪可不復入內經所謂塞其空竅是為良工之理也菊

入肝養陰病因風必傷肝故獨多又恐風邪乘虛併入心臟

故也○嘉言曰仲景制方皆匠心獨創乃於中風證首引此

散豈非深服其長乎夫立方而但驅風補虛誰不能之至於

驅之補之之中行其諸載之法則非思議可到方中取用礬

石以固諸諸藥使之蓄積不散以漸填其空竅服之日久風

自以漸而熄所以初服二十日不得不用溫酒調下以開其

痹着以後則禁諸熱食惟宜冷食如此再四十日則藥積腹

中不下而空竅漸空矣空竅填則舊風盡出新風不受矣蓋若

性得冷即止得熱即行故囑云熱食即下

風引湯

金匱

治大人風引癱瘓小兒驚癇瘰癧日數十發巢氏用

大黃 乾薑 龍骨四兩 牡蠣 甘草二兩 桂枝三兩 寒水石 滑

石 赤石脂 白石脂 紫石英 石膏六兩 十二味杵粗

篩以葦囊盛之取三指撮并花水三升煮三沸溫服一升

風邪內并則火熱內生五臟亢盛逆歸於心故以桂甘龍牡

通陽氣安心腎為君然厥陰風木與少陽相火同居火發必

風生風生必挾木勢侮其脾土故脾氣不行聚液成痰流注

四末因成癱瘓故用大黃以蕩滌風火淫熱之邪為臣隨用

乾薑之止而不行者以補之為反佐又取滑石石膏清金以

伐其木赤白石脂厚土以除其淫寒水石以助腎水之陰紫

成方切用 風引湯 三 祛風門 卷十二

石英以補心神之虛為使故大人小兒風引驚癇皆主之巢

氏用治腳氣以石性下達可勝淫熱不使攻心也嘉言曰風

陰內屬肝木上緣手經下緣足經中見少陽相火所以風自

內發者由火熱而生也風生必害中土土主四肢土病則四

末不用聚液成痰癱瘓者以風火挾痰注於四肢故也觀金

匱此方可見非退火則風不熄非填竅則風復生風火一熾

則五神無主故其用藥如是之周到也又曰侯氏黑散顧主

補虛以熄其風此方兼主清熱去淫以除其風明此以治風

之入臟者游刃有餘何後世以為石藥過多舍之不用而用

腦麝以散其真氣花蛇以增其惡毒智耶愚耶吾不解矣忠

可曰河間謂風病多因熱甚良由將息失宜而心火暴甚腎

水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣熾鬱心神昏冒筋骨

不用而卒倒無知多因喜怒悲憂恐五志過極此最確之論

謂風強則然而以漸入內者也下則出風引湯方而方名全  
主於風以風為陽邪故熱也則知從亡血來是熱能生風而  
外邪又助之也從中風來是風能生熱以滯津液而於熱滯  
屬也是虛問主熱之論仲景早引其端緒但不專主於熱謂  
實有陽虛而外邪入之為卒倒為偏枯為筋急癱瘓者也若  
諸痿全起於肺熱因之傳入五臟為昏惑癱瘓者問暴瘖皆  
屬於火為四肢不收舌本強足痿不收痰涎有聲皆屬於土  
悉是淫熱之病與中風之虛多風多寒多皆為中風之理全  
不相涉矣○觀風引藥味全是和臟腑通經絡便是治風不  
專治風也○按黑散風引二湯喻氏以為仲景聖方而程雲  
來金匱直解又曰侯氏黑散風引湯防已地黃湯頭風摩散  
磐石湯所主皆非中風歷節之證是宋人較正附入唐人  
方遂盡刪之又云仲景方書之祖復取  
侯氏方為法耶亦不過臆度之見爾

防已地黃湯 金匱

治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈浮

桂枝 防風三分 甘草一分 以酒一杯漬之一宿絞取

成方切用 防已地黃湯 頭風摩散方 四 祛風門 卷十二

汁生地黃二觔咬咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞

地黃汁和分再服

此亦風之進入於心者也風升必氣湧氣湧必滯涎涎滯則

流淫淫留壅火邪聚於心故以二防桂甘去其邪而以生地

最多清心火涼血熱謂如狂妄行獨語不休皆心火熾盛之

證也况無寒熱則知病不在表不在表而脈浮其為火盛血

虛無疑爾後人地黃飲子犀角地黃湯等實祖於此

頭風摩散方 金匱

大附子炮 鹽 等分為散沐了以方寸匕以摩疾上令藥力

行

頭風乃偏着之病故以附子劫之鹽漬其邪

桂枝芍藥知母湯 金匱

治諸肢節疼痛身體羸瘦如脫頭眩短氣溫溫欲吐

生薑 五兩 桂枝 白朮 知母 防風 四兩 芍藥 三兩 附子 炮麻黃

甘草 二兩 九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

此項歷節病由風溼外邪而兼脾腎俱虛之方也謂諸肢節疼痛溼留關節也因而身體為邪所痹則羸瘦從下受亦或自上注之總是溼喜歸下故腳腫如脫腎虛挾風故頭眩

衛氣起於下焦腎元既虧三焦無主致太陽與陽明相牽制

為病故胃氣欲下行而太陽挈其氣在上太陽欲上行而胃

成方切用 桂枝芍藥知母湯 烏頭湯 五 祛風門 卷十二

溼相搏不利故短氣溫溫欲吐用桂枝湯去棗加麻黃以助

其通陽加白朮防風以伸脾氣加知母附子以調其陰陽謂

欲制其寒則上之鬱熱已甚欲治其熱則下之腎陽已痹故

並加之爾

烏頭湯 金匱

治病歷節不可屈伸疼痛亦治腳氣疼痛不可屈伸

烏頭 五枚 咬咀以蜜二升 煎取一升即出烏頭 甘草 炙 黃耆 芍藥 麻黃 三兩

將後四味咬咀以水三升煮取一升去滓內蜜煎中更煎之

服七合不知盡服之

歷節病即行痹之屬也乃溼從下受挾風流注故或足腫而

必發熱且更不可屈伸而疼痛故以甘芍和陰麻黃黃耆通  
肌肉之陽氣而藉川烏之迅發以行其痹著

礬石湯 金匱

治腳氣衝心 此亦因風而自下而上也故方列中風門

礬石 二兩 以漿水一斗五升煎三五沸浸腳良礬石收溼解

毒故以之為外治然至衝心亦能治之蓋腳氣而至衝心皆  
由腎水挾腳氣以陵心得礬石之卻水而勢自不能相陵所  
以有護心之功也

朮附湯 近効

治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣

成方切用 礬石湯 朮附湯 越婢加朮湯 六 祛風門 卷十二

附子 一枚半 炮去皮 甘草 炙 白朮 一兩 三味剉每五錢煨薑五片棗

一枚水盞半煎七分去滓溫服

腎氣空虛風邪乘之漫無出路風挾腎中濁陰之氣厥逆上

攻故頭重眩苦至極兼以胃氣亦虛不知食味此非輕揚風

劑可愈故用附子暖其水臟白朮甘草暖其土臟水土一暖

猶之冬月井中水土既暖陽和之氣可以立復而濁陰之氣

不驅自下矣

越婢加朮湯 千金

治內熱極則身體津脫腠理開汗大泄厲風氣下焦腳弱

石膏 半斤 麻黃 六兩 白朮 四兩 甘草 生薑 二兩 大棗 十五枚 六味以

水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

風加附子一枚

此治風極變熱之方也謂風勝則熱勝以致內熱極而汗多將必津脫津脫而表愈虛則腠理不能復固汗泄不已將必大泄風入營為厲內經曰厲者有營氣熱附今風入營為熱即是厲風氣矣蓋風勝氣浮下焦本虛至厥陽獨行而濁陰不降無以養陰而陰愈虛則下焦腳弱故以麻黃通痹氣石膏清氣分之熱薑棗以和營衛甘草白朮以理脾家之正氣汗多而用麻黃賴白朮之扶正石膏之養陰以制之故曰越脾加朮湯所謂用人之勇去其暴也汗大泄而加惡風即須成方切用

防其亡陽故加附子方內麻黃用根

小續命湯 千金

治中風不省人事神氣憤亂半身不遂丹溪曰左半身不遂物湯加桃仁紅花薑汁竹瀝右半身不遂屬氣虛與痰以四君子湯加竹瀝薑汁○分氣血屬左右亦太拘着不甚驗也筋急拘攣口眼斜語言蹇澀風溼腰痛痰火併多六經中風及剛柔二瘕瘕者項背強直手足反張也傷風有汗為柔瘕血也亦有血虛筋脈無所榮養而成瘕者凡中風口開為心絕手撒為脾絕眼合為肝絕遺尿為腎絕鼻鼾為肺絕吐沫直視髮直頭搖面赤如狂汗綴如珠皆不治或只見一二證尚有得生者○金匱中風篇曰寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛虛寒相搏邪在皮膚虛者氣虛邪者邪氣不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎釋曰中絡者邪方入衛尚在經絡

之外故但肌膚不仁中經則入營脈之中骨肉皆失所養故身體重着至中腑中臟則離外而內邪入深矣中腑必歸於胃者胃為六腑之總司也中臟必歸於心者心為神明之主也風入胃中胃熱必盛蒸其津液結為痰涎胃之大絡入心痰涎壅盛堵其出入之竅故中腑則不識人也諸臟受邪進入於心則神明無主故中臟者舌縱難言廉泉開而流涎沫也廉泉穴在舌下竅通於腎津液之所出也

防風一錢 桂枝 麻黃 杏仁 去皮尖 芍藥酒 白芍酒 人參

甘草 炙 黃芩 炒 防已 八分 附子 四分 每服三錢加薑棗煎

筋急語遲脈弦者倍人參加薏仁當歸去芍藥以避中寒煩躁不大便去桂附倍芍藥加竹瀝日久不大便胸中不快加大黃枳殼破下痢去防已黃芩倍附子加白朮嘔逆加半夏語言蹇澀手足戰掉加石菖蒲竹瀝身痛發搐加羌活口

成方切用 小續命湯

渴加麥冬花粉煩渴多驚加犀角羚羊角汗多去麻黃杏仁

加白朮口燥去桂附加石膏此六經中風之通劑也鶴臯曰麻黃杏仁麻黃湯也治太陽傷寒桂枝芍藥桂枝湯也治太陽中風此中風寒有表證者所必用也人參甘草補氣川芎芍藥補血此中風寒氣血虛者所必用也風淫故主以防風挾溼佐以防已挾寒佐以附子挾熱佐以黃芩病來雜擾故藥亦兼該也嘉言曰中風之寒則浮緊兼風則浮緩兼熱則浮數兼痰則浮滑兼氣則浮瀉兼火則盛大兼陽虛則脈微兼陰虛則脈數或細如絲虛滑為頭痛緩遲為營衛衰然虛浮遲數正氣不足尚不可補救急大數疾邪不受制必死無疑然數大未至急疾尚有可不死者又曰世傳中風之人每遇外風一發宜進續命湯以禦之殊為不然風勢熾定更用續命湯重引風入是添蛇足也惟



用甘寒藥類煩熱服內不召風外無從入之路且甘寒一可息風二可補虛三可久服何樂不用耶○保命集曰厥陰瀉痢不止脈沉遲手足厥逆膿血稠黏此為難治宜麻黃湯小續命湯汗之謂有表邪縮於內當散表邪則臟腑自安矣又曰厥陰風瀉以風治風小續命消風散主之

易老六經加減法倍麻黃杏仁防風名麻黃續命湯治太陽中風無汗惡寒倍桂枝芍藥杏仁名桂枝續命湯治太陽中風有汗惡風去附子加石膏知母名白虎續命湯治陽明中風無汗身熱不惡寒加葛根倍桂枝黃芩名葛根續命湯治陽明中風身熱有汗不惡風倍附子加乾薑甘草名附子續命湯治太陽中風無汗身涼倍桂附甘草名桂附續命湯治少陰中風有汗無熱加羌活連翹名羌活連翹續命湯治中

成方切用

小續命湯

九

祛風門

風六經混淆繫少陽厥陰或肢節攣急或麻木不仁王機微義曰此方無分經絡不辨寒熱虛實雖多亦奚以爲易老治分六經庶乎台法去防風防已附子白芍加當歸石膏即古今錄驗續命湯治中風痺身軀不能自收持或拘急不得轉側內之營衛痺而口不能言冒昧不知痛處嘉言曰痺即痺之別名也風入而痺其營衛即身軀不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側也然營衛有虛有實虛者自內傷得之實者自外感得之此方則治外感之痺其營衛者故以得小汗爲貴然已變越婢之制而加芍歸養血人參益氣矣其內傷而致營衛之痺錄驗方去者於補氣血藥中略加散風藥爲制更可知矣錄驗方去人參加乾薑黃芩竹瀝即千金大續命湯通治五臟偏枯賊風

大秦羌湯

機要

治中風手足不能運掉舌強不能言語風邪散見不拘一經者

秦艽 石膏兩三當歸酒洗白芍酒炒川芎 生地酒洗熟地 白朮土茯苓甘草炙黃芩酒炒防風 羌活 獨活 白芷細辛 每服一兩 兩酒加生薑春夏加知母心下痞加枳殼

成方切用

大秦羌湯

十

祛風門

此亦六經中風之通劑也中風虛邪也雷而不去其病則實故用驅風養血之劑兼而治之以秦艽爲君者以其主宰一身之風石膏所以去胃中總司之火羌活去太陽百節之風疾防風爲諸風藥中之軍卒三陽數變之風邪責之細辛三陰內淫之風溼責之蒼朮去厥陰經之風則有川芎去陽明經之風則有白芷風熱干乎氣清以黃芩風熱干乎血涼以生地獨活療風溼在足少陰甘草緩風邪上干於肺用當歸熟地芍藥者所以養血於疏風之內以濟風藥之燥也嘉言曰此方既云養血而筋自柔何得多用風燥藥既云靜以養血何復用風藥以動之是言與方持矣偶論三化湯愈風湯大秦羌湯皆似是而非者又曰四肢不舉皆屬脾土膏粱太過積熱內壅者爲脾土痰實宜瀉以開其壅食少體羸息情嗜臥者爲脾土虛衰宜補以健其運

地黃飲子

河間

治中風舌瘡不能言足廢不能行此少陰氣厥不至名曰風痺急當溫之○風痺如癱瘓是也

熟地 巴戟去心 黃肉 茯苓酒洗 附子炮 官桂 石斛 茯苓

石菖蒲 遠志 麥冬 五味 等分每服五錢入薄荷

少許薑棗煎

熟地以滋根本之陰巴戟從蓉官桂附子以返真元之火石

斛安脾而祕氣山黃溫肝而固精菖蒲遠志茯苓補心而通

腎臟麥冬五味保肺以滋水源使水火相交精氣漸旺而風

火自息矣醫貫曰治中風當以真陰虛為本但陰虛有二有

黃飲子為主水虛者當以六味地黃丸為主果是水虛辛熱

之藥與參耆之品俱不可加或曰風注所勝治以辛涼何故

反用桂附使火盛制金不能平木而風注所勝治以辛涼何故

虛真陰失守孤陽飛越若非桂附何以追復其散失之元陽

其痰涎上湧者水不歸元也面赤煩渴者火不歸元也惟桂

附能引火歸元水火既歸其元則水能生木木不生風而風

成方切用地黃飲子 天麻丸 卷十二 風門

自息矣。按腎氣厥不至舌下乃臟真之氣不上榮於舌本

爾至其濁陰之氣必橫格於喉舌之間吞咯維艱昏迷特甚

又非如不言之證可以緩調方中所用桂附巴從原

為驅逐濁陰而設用方者不可執已見而輕去之也

天麻丸 易老

養血祛風壯筋骨

天麻祛風 牛膝強筋 二味用酒同 革薺祛風 玄參各六兩壯

杜仲七兩使筋 常歸和血 生地一兩益 羌活十兩去 附子炮

兩行 蜜丸一方有酒活

此方大意主治腎熱生風其以天麻入牛膝同製取其下達

倍用當歸地黃生其陰血革薺玄參清下焦之溼熱附子補

下焦之真陽蓋唯腎中陽虛故風得以久據其地也羌活

之獨本者即真獨活不必更加也吁嗟多慾之人兩腎空虛

有如烏風洞慘慘黯黯漫無止期環視風門諸藥有一能勝

其病者乎此方雜在羣方內未易測識特表而出之劉宗厚

湯愈風湯雖皆有補血之藥而行經散風之劑居其大半

將何以養血而益筋骨也天麻丸養血壯筋骨庶幾近理

稀莖丸 張詠

治中風高僻語言蹇澀風中 肢緩骨痛風而 及風痺走痛

內經所謂行痺癱瘓也或十指麻木氣血不足或肝腎

風氣風溼諸瘡

稀莖草 以五月五日七月七日九月九日採者佳不拘多

少揀去粗筋留枝葉花實蒸曬九次蜜丸稀莖草苦寒其

成方切用 稀莖丸 卷十二 風門

次加以酒蜜則苦寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不

至九次則藥性不能透骨而御病也。嘉言曰稀莖草

也其治風溼乃風木所生之始取用其葉以治風凡腎臟生

風之證服此其效最著其妙處全在氣味之劣與腎中之

脾臟同氣相求故能入腎而助其驅逐陰風之力也因治

腎風之方百不得一特錄此丸合前天麻丸發其義也

稀莖能驅風散溼行大腸之氣然風藥終燥若風痺由於脾

腎兩虛陰血不足不由風溼而得者亦忌服之唐或謂有進

詠進稀莖表云其草金銀線素葉莖葉節葉相附頗類

耳巨槩百服眼目清明至十服髮長烏黑筋力轉健效驗

活絡丹

治中風手足不仁日久不愈經絡中有溼痰死血腿臂間忽

有一二點痛

川烏炮去 草烏炮去 膽星六地龍 乳香油 沒藥另研  
錢三 酒丸酒下

膽星辛烈所以燥溼痰二烏辛熱所以散寒溼蚯蚓溼土所  
生欲其引烏星直達溼痰所結之處大易所謂同氣相求也  
風邪注於肢節久則血脈凝聚不行故用乳香沒藥以消痰  
血乳香活血能去風神效沒藥散瘀生新血二藥並能消腫止痛故每相須而行

三生飲

治中風卒然昏愈不省人事痰涎壅盛語言蹇澀等證東垣  
風非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四旬氣衰之際或  
憂喜忿怒傷其氣者多有此證壯歲之時無有也若肥盛者  
則間有之亦是形盛氣衰而如此爾

成方切用

活絡丹

三生飲

圭

祛風門  
卷十二

生南星一兩 生川烏去皮 生附子去皮 木香二錢 每服一兩加入

參一兩煎

南星辛熱散風除痰附子重峻溫脾逐寒烏頭輕疏溫脾逐

風二藥通行經絡無所不至皆用生者取其力峻而行速也

重加人參所以扶其正氣少佐木香所以行其逆氣也醫賈

東垣之論當以氣虛為主經有風邪亦是乘虛而襲經曰觀  
之所湊其氣必虛是也當此之時尋常藥餌能通達於上  
下哉急以三生飲一兩加入參一兩煎服即能通達於上  
痰之剽悍關隘王之將必用人參兩許以助其邪而助其  
氣否則不惟無益適以取敗觀先哲參者參附其義可見若  
遺尿手撒口開鼻鼾為不治然服前藥多有生者○驗嘉言  
日隱為陰可勝純陽之藥前為陽必加陰藥一二味  
制其僭熱經絡之淺又常加和營衛升宣導之藥

牽正散

直指方

治中風口眼喎斜無他證者足陽明之脈挾口環唇足太陽  
熱大陽外中於風故牽急而喎斜也○又未及則在筋  
筋寒之未為全牽則土寡於畏故口眼喎斜口目常動故風  
生焉耳鼻常  
動故風息焉

白附子 蠲蠶 全蠍 等分為末每二錢酒調

吳鶴臯曰先防之屬可以驅外風而內生之風非其治也  
熱則自生風與星夏之屬足以治溼痰而風虛之痰非其治  
也三藥療內生之風治虛熱之痰得酒引之能入經而正口  
眼又曰白附辛可驅風而遊風蠲蠶鹹能軟痰浮能上走頭  
而驅風散痰全蠍直辛中有熱者必熱可使從風蠲蠶有毒  
走厥陰為治風要藥幸中有熱者必熱可使從風蠲蠶有毒  
可使破結藥有用熱以攻熱用毒以攻毒者大易所謂同氣

成方切用

牽正散 蠲痺湯

古

祛風門  
卷十二

相求內經所謂衰之以其屬也

附改容膏蓖麻子一兩 冰片三錢 共搗為膏寒月加乾薑附子各

錢 左貼貼右右貼貼左即正或用鱈魚血或用蜚蠊搗敷亦

良蓋三物皆追風拔毒之品也

蠲痺湯

嚴氏

治中風身體煩痛項背拘急手足冷痺腰膝沉重舉動艱難  
諸證皆因營衛虛而風淫下之也經曰營虛則不仁衛虛則  
不用不仁皮膚不痛痛者不仁手足不能運動也岐伯  
曰中風大法有因風而治者身不遂二日風痺也身無痛  
痛則肢不收也三日風也身不遂二日風痺也身無痛  
風痺也蓋言曰難相拘急身不遂二日風痺也身無痛  
受之兩致痺之因曰風也身不遂二日風痺也身無痛  
風氣勝者為行痺風性善行故也其寒氣勝者為痺風  
寒主收急故也以淫氣勝者為痺風性善行故也其寒氣勝者為痺風

黃耆蜜當歸洗赤芍羌活 防風 甘草 片子薑黃炒酒

加薑棗煎

辛能散寒風能勝溼防風羌活除溼而疏風氣通則血活血

活則風散黃耆炙草補氣而實衛黃耆畏防風合用而其功益大當歸赤芍

活血而和營薑黃理血中之氣能入手足而祛寒溼也凡風痺偏枯未有不因真氣不周而病者也治之不用黃耆為

昔人參歸芍為臣防風桂枝鉤藤刺瀝竹瀝薑汁韭汁葛汁漿汁乳汁之屬為佐而徒雜香手烏附羌

獨以酒營而耗衛如此死者醫殺之也

胃風湯易老

治風冷乘虛客於腸胃食泄注下完穀不化及腸風下血又

治風虛能食牙關緊閉手足癱瘓肉瞤面腫名曰胃風

成方切用

胃風湯

祛風門卷十二

人參 白朮土炒茯苓 當歸酒洗芍藥 芍藥酒炒桂 等分加

粟米百餘粒煎此即十全湯去黃耆地黃甘草

胃風者胃虛而風邪乘之也風屬肝木能剋脾土故用參朮

茯苓以固脾氣而益衛當歸川芎以養肝血而調營芍藥瀉

肝而能和脾肉桂散風而能平木木得桂而枯削桂針木根其木即死又辛能散風

故能住泄瀉而療風溼也王機微義曰此方名治風而實非治風乃補血和血益胃之藥血痢

而挾溼者實可倚仗

東垣胃風湯白芷升麻一錢麻黃二錢葛根一錢柴胡羌活藥

本蒼朮蔓荊草薏黃藥當歸炙草各五分加薑棗煎亦治胃風

證喻嘉言曰風入胃中何以反能食蓋風能生熱即內經痺成爲消中之理也是方但去其風不去其熱殊不合內經

之旨必加麥門冬竹瀝花粉石膏歲莖生地梨汁甘寒之藥入升麻葛根甘草為劑始為克當

解風散

治風成寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上膈壅滯

人參兩麻黃二兩川芎 獨活 細辛 甘草一兩 為細末每

五錢水盞半生薑五片薄荷葉少許煎八分不拘時服

按風成爲寒熱乃風入胃中而釀營衛之偏勝前胃風湯正

驅胃風使從外解之藥此因風入既久胃氣致虛故以人參

為君臣以麻黃川芎佐以獨活細辛使以甘草而和其營衛

乃可收其外解之功也若夫久風成爲食泄則風已入於裏

又當用人參為君桂枝白朮為臣茯苓甘草為佐使而驅其

成方切用

解風散 愈風丹

祛風門卷十二

風於內此表裏之權衡內經之旨要也本方雖用風成寒熱

四字漫無着落今併及之

愈風丹

治諸風證偏正頭痛

防風通聖散四物湯黃連解毒湯各一料加 羌活 細辛

甘菊花 天麻 獨活 薄荷 何首烏兩 蜜丸如彈

子大每服一丸細嚼茶清下不拘時服

按外風與身中之火熱相合以陽從陽必上攻於頭然風火

盛營血必虧故其藥如是也

清空膏 東垣

治正偏頭痛年深不愈及風溼熱上壅頭目及腦苦痛不止  
頭痛者少陽相火也其源目有痰者多左屬風火多血  
右屬痰濕熱多氣虛神疲目昏者多分頭痛頭痛風火二  
然一病也淺而近者名頭痛深而遠  
者為頭風當驗其邪所從來而治之

黃芩酒炒黃連酒炒羌活防風柴胡七錢川芎五錢甘草炙兩半

為末每服三錢茶調如膏白湯送下如少陰頭痛加細辛太

陰頭痛脈緩有痰去羌活防風川芎甘草加半夏如偏頭痛

服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍散少陽相火如自

汗發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加白芷東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足寒而氣逆也太陰少陰二經雖

不上頭然痰與氣壅於腦中頭上氣不得通而為痛也

頭為六陽之會其象為天乃清空之位也風寒溼熱干之則

成方切用清空膏 七祛風門 卷十二

濁陰上壅而作實矣羌防入太陽柴胡入少陽皆辛輕上升

祛風勝溼之藥川芎入厥陰為通陰陽氣血之使甘草入太

陰散寒而緩痛辛甘發散為陽也芩連苦寒以羌防之屬升

之則能去溼熱於高巔之上矣芩連用酒炒非獨制其寒欲

般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治魚尾眼角

也又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂顛頂痛

也○頭痛用羌活防風柴胡川芎升麻細辛蓋本之異者分

各經也用黃芩黃連黃蘗石膏知母生地之異者分各臟萬

火也用茯苓澤瀉者導溼也用參耆者補氣也用芎歸者養

血也王海藏曰熱在至高之分當以輕劑抑之從緩治也若

急服之上熱未除中寒生矣

治風熱上攻頭目昏痛項背拘急鼻嚏聲重及皮膚頑癩癰

疹癢癢婦人血風婦人衝任二經為風

厚朴薑汁炒陳皮去白甘草炙荆芥五錢防風錢蟬蛻羌活蒼

香殭蠶洗川芎茯苓人參二兩為末每服三錢茶湯

下瘡癰酒下

羌防荆芎之辛浮以治頭目項背之風殭蠶蟬蛻之清揚以

去皮膚之風蒼香厚朴以去惡散滿參苓甘橘以輔正調中

使風邪無留壅也

轉舌膏

治中風癱瘓舌蹇不語

涼膈散加菖蒲遠志各等分蜜丸彈子大硃砂為衣薄荷湯

成方切用治風散 轉舌膏 正舌散 二丹丸 六祛風門 卷十二

化下臨臥服

此乃治心經蘊熱之方也

正舌散

治中風舌本強難轉語不正

蠟梢二七茯苓兩末之每服一錢溫酒調又擦牙更效

此乃治風涎壅塞之方也

二丹丸

治風邪健忘養神定志和血內安心神外華腠理得睡

丹參熟地天冬去心硃砂兩半人參五錢菖蒲遠志錢五

神麥冬甘草兩煉蜜九桐子大每服五十九至一百

九空心食前服

按中風證心神一虛百骸無主風邪擾亂莫由驅之使出此

方安神益虛養血清熱息風服之安睡功見一斑矣相傳用愈風湯

吞下殊失用方之意

排風湯

治風虛冷溼邪氣入臟狂言妄語精神錯亂及五臟風發等

證

麻黃 茯苓 獨活一錢半 甘草炙 防風 白朮 當歸 芍

藥 肉桂 杏仁 川芎 白蘚皮五分 加薑三片

按虛風冷溼雖已入臟其治法必先宣之使從外散故用藥

成方切用

排風湯

涼膈散

清心散

五 祛風門 卷十一

如是也

涼膈散

治心火上盛膈熱有餘目赤頭眩口瘡唇裂吐衄涎嗽稠黏

二便淋閉胃熱發斑瘡疹黑陷諸風癰瘡手足掣搦筋攣疼

痛

連翹 梔子仁 薄荷 大黃 芒硝 黃芩 甘草 加

棗二枚葱一根

清心散

即涼膈散加黃連竹葉煎成去渣入蜜少許溫服 如頭痛

加防風川芎石膏

按中風證大率風木合君相二火主病多顯膈熱之證古方

用涼膈散最多不但二方已也如轉舌脊用涼膈散加黃蒲

遠志活命金丹用涼膈散加青黛藍根蓋風火之勢上炎胸

膈正燎原之地所以清心寧神轉舌活命涼膈之功居多要

不可以宣通腸胃之法輕嘗之也

滌痰湯

治中風痰迷心竅舌強口不能言

方見除痰門

稀涎散

治風涎不下喉中作聲如牽鋸或中溼腫滿

成方切用

滌痰湯

稀涎散

手

祛風門 卷十一

半夏大者十枚 豬牙皂角一箇 咀作一服水二盞煎一盞入

生薑自然汁少許服不能嚥者徐徐灌

此以半夏治痰涎牙皂治風比而成方蓋因其無形之風挾

有形之涎膠結不解用此二物俾涎散而風出也其有涎多

難散可於涌吐門諸吐法參治之或用蘿蔔子合牙皂等分

為末煎湯吐之其風多涎少人事不昏則用蝦半觔入醬葱

薑等水煮先喫蝦次喫汁後以鵝翎探引吐之活法在心無

施不當也

竹瀝湯

治四肢不收心神恍惚不知人事口不能言

竹瀝 生葛汁二升 生薑汁二合 和勻分溫三服

按人身之積痰積熱常招致外風結為一家令人心神恍惚如邪所憑實非邪也消風清熱開痰其神自安此方可煩服也

貝母栝樓散

治肥人中風口眼喎斜手足麻木左右俱作痰治

貝母 栝樓 南星炮 荊芥 防風 羌活 黃蘗 黃芩

黃連 白朮 陳皮 半夏湯泡七次 薄荷 甘草炙 威靈仙

天花粉 加薑煎

按中風證多挾熱痰而肥人復素有熱痰不論左右俱作痰

成方切用

竹瀝湯 貝母栝樓散 青州白丸子

主 祛風門 卷十二

治誠為當矣但肥人多虛風瘦人多實火虛風宜用甘寒一

派如竹瀝人參麥冬生地生葛汁生梨汁鮮淡竹葉汁石膏

栝樓葳蕤胡麻仁等藥此方三黃並用治瘦人實火或可治

肥人虛風甚不宜也至泛論治熱痰之藥諸方中又唯此足

擅其長存之以備實火生風生熱之選

青州白丸子

治風痰壅盛嘔吐涎沫口眼喎斜手足癱瘓及痰盛泄瀉肥人

滑泄多屬之痰腸滑不食不饑多責之痰

白附子 南星二半 夏水浸去衣七兩 川烏去皮臍五錢 四味俱生用

為末生絹袋盛於井花水內擺出粉未出者以手揉令出渣

再搗再擺以盡為度用磁盆日曝夜露每日一換新水攪而後澄春五夏三秋七冬十日去水曬乾如玉片以糯米粉作稀糊丸如菉豆大每服二十九生薑湯下無時如癱瘓酒下此治風痰之上藥也然藥味雖經浸曝毒氣已殺溫性猶存熱痰迷竅非所宜施

星附散

治中風能言口不至而手足癱曳者

南星 半夏各 茯苓 礬蠶炒 川烏去皮臍 人參 黑附子

白附子八分 煎成熱服得汗愈凡用附子藥多取冷服謂熱因寒用也此用烏頭附子人

參一派溫補絕無發散之藥向非加以熱服亦何由而得汗耶

成方切用

星附散 治風六合湯 三聖散

主 祛風門 卷十二

此治虛風寒痰之主藥也風虛則熾痰寒則壅阻遏脾中陽

氣不得周行故手足為之癱曳用此方熱服以助脾中之陽

俾虛風寒痰不相互結乃至得汗則風從外出痰從下出分

解而病愈矣

治風六合湯

治風虛眩運

方見理血門四物湯附方內

三聖散

治中風手足拘攣口眼喎斜腳氣行步不正

當歸酒洗 玄胡索微炒 肉桂去粗皮 為末每服二錢空心

溫酒調下

按此方治血虛風入之顛癇也故取以治口眼喎斜之左急右緩者然血藥中而加地黃白芍秦艽杜仲牛膝風藥中而加大麻防風羌活白芷細辛或加獨活以去腎間風加草解以除下焦熱又當隨證酌量也

加味六君子湯

治四肢不舉屬於脾土虛衰者須用此顛治其本不可加入

風藥

六君子每味一錢加竹瀝半小麥冬三錢加薑三片棗二枚

口渴去半夏加葶藶石膏 虛甚不熱者加附子

成方切用

加味六君子湯

薏苡仁湯

三

風門 卷十二

按中風門中從不錄用此方所謂治末而忘其本也夫風淫末疾四肢不舉乃風淫於內虛者多實者少審其果虛則以六君子加甘寒藥如竹瀝麥冬之屬允為治虛風之儀式也

薏苡仁湯

治痺在手足溼流關節并治手足流注疼痛麻木不仁難以

屈伸

薏苡仁 當歸 芍藥 桂心 麻黃 甘草 蒼朮米泔浸炒

加薑煎

此治風溼相搏關節不利之證故以薏苡仁為君舒筋除溼其力和緩當倍之又倍加之至於麻黃雖能通陽氣然在溼

勝方中即無汗不可多用減之又減可也

人參補氣湯

治手指麻木

人參 黃耆二錢升麻 柴胡 芍藥 生甘草 炙甘草

五味子五分

按諸陽起於指手指麻木風已見端宜亟補其氣以禦外入之風故用此為綱繆計也

烏頭粥

治痺在手足風淫末疾并治風寒溼麻木不仁此粥大治手足不隨及腫

服此預防之

成方切用

人參補氣湯

烏頭粥

桂枝五物湯

三

風門 卷十二

烏頭生研 每用香熟白晚米二合入藥末四錢以砂礮煮作稀粥不可太稠下生薑汁一匙白蜜三是攪勻空心溫啜之為佳如中溼多更加苡仁末三錢

按四肢為諸陽之本木根之地陽氣先已不用現周身經絡之末乎故用烏頭合穀味先從營衛所生之地注力俾四末之陽以漸而充

桂枝五物湯

治在上之痺

方見表散門桂枝湯附方內

此乃金匱治血痺之方也血痺而用桂枝湯加黃耆以其風



邪獨勝風性上行故其痺在上也其脈微濇寸口關上小緊  
緊處乃邪着之驗也然又曰寸口關上微尺中小緊外證身  
體不仁如風痺狀此方主之又可見風性善行隨其或上或  
下又皆主以此方矣桂枝湯為中風一證羣方之祖不但中  
絡即中經中腑中臟藥中皆當加入本  
方以風從外入者究竟必驅從外出故也後人競用續命湯  
為加減此方置之不錄未免得流忘源矣又况源流俱失者  
哉

十味劉散

治在臂之痺又治中風血弱臂痛連及筋骨動難支

附子炮黃耆 當歸 白芍 川芎 防風 白朮分茯苓

肉桂分五錢 熟地酒洗焙乾二錢 薑三片棗二枚臨臥服

成方切用 十味劉散 通痺散 祛風門 卷十二

按臂痛乃筋脈不舒體盛者可去其筋脈中之風然既已血  
痺所受風燥之累不淺故取此方養血之中加附子之力通  
其陽氣而用防風反佐黃耆出其分肉腠理之風也

通痺散

治腰以下至足風寒溼三氣合而成痺兩足至臍冷如冰不  
能自舉或因酒熱立冷水中久成此疾

天麻 獨活 當歸 川芎 白朮 薑本等 末之每服  
二錢熱酒調下

此方因風寒溼三氣混合入於陰股其邪已過於營衛故變  
桂枝五物之制而用此散緩緩分出其邪也

史國公藥酒方

治中風語言蹇澀風中 手足拘攣風燥其筋而 半身不遂邪

虛痿痺不仁風而兼溼頑

晚蠶砂炒 鼈甲醋炙 虎脰骨酥炙 松節 枰 防風 杜仲薑汁炒 川

草薢 川牛膝酒浸 當歸洗 白朮炒 羌活二兩 蒼耳子炒 秦艽

兩兩 枸杞五兩 茄根蒸熟 為粗末絹袋盛浸無灰酒三十觔煮

熟退火毒服每日數次常令醺醺不斷

防風羌活蒼耳秦艽松節茄根蠶砂草薢酥以祛風兼以燥

溼松節能除骨節間之風茄根散 血消腫能療凍瘡亦散寒之品當歸枸杞杜仲牛膝補陰

潤燥養血榮筋白朮補氣而健脾脾主四肢 虎脰驅風而壯骨風從

成方切用 史國公藥酒方 三因白散子 祛風門 卷十二

虎故虎骨治風虎雖死猶立不仆其氣力皆在 鼈甲亦厥陰

前經且腰骨能入手足若腰骨痛又當用脊骨 治痺藥酒方亦不為少此方平中之奇功效頗著後有

增入白花蛇一條者此又以腸胃浸試其毒所不取也

三因白散子

治肝腎中風涎潮壅塞不語嘔吐痰沫頭痛眩運兼治陰證  
傷寒六脈沉伏及霍亂吐瀉小便淋瀝不通

大附子去皮滑石五錢 半夏製七錢半 為末每用二錢薑七  
片蜜半匙煎空心冷服

按此方甚超但不明言其所以然且引兼治陰證傷寒霍亂  
吐瀉等證為言轉覺泛而不精矣蓋此即濁陰上逆之證緣

肝腎之氣厥逆而上是以涎潮壅塞舌瘖不語痰沫吐咯難出頭目重眩故非附子不能驅其濁陰然濁陰走下竅者也濁陰既上逆其下竅必不通故用滑石之重引濁陰仍順走前陰之竅亦因附子雄入之勢而利導之也更慮濁陰遇胸中之淫痰兩相畱戀再加半夏以開其痰庶涎沫與濁陰俱下矣

獨活湯 丹溪

治風虛癱瘓昏憤不覺或為寒熱筋急而縮為癱緩而縱為瘓是也木曰曲直之象也肝虛而風乘之入於血脈則癱瘓若在皮膚則為寒熱若移邪於所生則昏憤不覺也所生心也木能生火

成方切用

獨活湯 防風通聖散

祛風門 卷十二

獨活 羌活 防風 細辛 桂心 白微 當歸 芍藥

半夏 人參 茯神 遠志 菖蒲 甘草 錢半 每服

一兩加薑棗煎

肝屬風木而主筋故癱瘓為肝邪肝欲散急食辛以散之二活防風祛風細辛桂心溫經半夏除痰芎歸辛散風而溫和血活則風散辛以散之即辛以補之也木喜條達故以散為補心為肝子肝移熱於心則昏憤故以人參補心氣菖蒲開心竅茯神遠志安心神白微鹹寒退熱而治厥使風靜火息血活神寧而癱瘓自已矣

防風通聖散

治諸風潮搐手足癱瘓大便結邪熱暴甚肌肉蠕動一切風證

方見表裏門

祛風至寶丹

治諸風熱

方見表裏門防風通聖散附方內

獨活寄生湯 千金

治肝腎虛熱風溼內攻腰膝作痛冷痺無力弓伸不便肝主筋骨靈樞曰能屈而不能伸者病在筋能伸而不能屈者病在骨

獨活 桑寄生 續斷 秦艽 防風 細辛 當歸 洗

成方切用

祛風至寶丹 獨活寄生湯

祛風門 卷十二

芍藥 川芎 熟地黃 杜仲 牛膝 人參 茯苓

甘草 桂心 等分每服四錢

獨活細辛入少陰通血脈借秦艽防風疏經升陽以祛風桑寄生益氣血祛風溼借杜仲牛膝健骨強筋而固下芎歸芍地所以活血而補陰參桂苓草所以益氣而補陽辛溫以散之甘溫以補之使氣血足而風溼除則肝腎強而痺痛愈矣丹溪曰久腰痛必用官桂以開之方止腹痛亦然

資壽解語湯

治中風脾緩舌強不語半身不遂

防風 附子 天麻 棗仁 羚羊角 官桂 羌活 甘

草 加竹瀝 二匙 薑汁 二滴

喻嘉言曰此方乃治風入脾臟舌強不語之證至於少陰脈  
繫舌本腎虛風入舌不能言喫緊之候古今從無一方及之  
子每用此方去羌防加熟地何首烏枸杞子甘菊花胡麻仁  
天門冬治之獲效今特識於此方之下聽臨病之工酌用焉  
不換金丹

退風散熱治中風口喎 此方祛風之力頗大勢風 或塗口

處亦可

荊芥穗 甘草 防風 天麻 僵蠶 薄荷葉 羌活

成方切用

養氣補虛 不換金丹 搜風順氣丸

無 卷十二

川芎 白附子 烏頭 蠅梢 藿香葉 煉蜜丸彈子

大每服一丸細嚼茶酒任下

搜風順氣丸

治風燥便祕因致氣閉不行暫時用之以疏風潤燥順氣殊  
不可少 本方條下過於誇大謂久服百病皆除者還少豈  
肚肺萎補之則其藥有 偏峻不可久服明矣

車前子 白檳榔 火麻子 微炒 牛膝 酒 郁李仁 湯泡去

菴絲子 乾山藥 枳殼 防風 獨活 大黃 生牛膝

煉蜜丸桐子大每服二十九酒茶米飲任下空心臨臥各一

服去腸中宿滯并腸風下血

順風勻氣散

治中風中氣半身不遂口眼喎斜半身不遂偏枯也經曰胃  
小堅急皆屬偏枯男子發左女子發右不病者轉可治蓋心  
是神機開發之本胃是木穀充大之標標不相得則中氣  
相失宗氣虛耗分布不周於經脈則偏枯不周於五臟則瘖  
口眼喎斜者足陽明之脈缺口環唇寒則筋急熱則筋弛左  
寒右熱則左急而右弛右寒左熱則右急而左弛陽明燥金  
主緊縮風病而筋縮木極似金反乘勝已之化燥之甚也  
治宜辛涼不可用桂附元戎曰酒淫之病亦能作瘖證口  
眼尚斜半身不遂舌強不運正運中風當瀉毒及風氣腰  
不可作風病治而汗之也衍義易簡言與此同

白朮 錢 烏藥 人參 天麻 沉香 甘草 青皮 木瓜

蘇葉 白芷 加薑煎

成方切用

順風勻氣散 攝生飲調蘇合丸

手 卷十二

按勻氣之說甚長身內之氣有通無壅外風自不能久居而  
易於解散故知勻氣即調氣之旨也若取其方以治口眼喎  
斜之右急左緩者當倍用生熟甘草加苡仁以緩其急加麥  
冬竹瀝以熄其風得效去白芷蘇葉可多服也 蘇復龍曰治  
之即當順氣及其久也即當活血若不順氣連用 風之法初得  
烏附若不活血連用羌防天麻輩未見其能治也

攝生飲調蘇合丸

治一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣及痰厥飲厥之  
類初起或可用此先以皂角去皮弦細辛生南星半夏為末  
吹入鼻中俟其噴嚏即進前藥牙禁者中指點南星半夏細  
辛末并烏梅肉類搽自開

半夏百沸湯泡少頃一錢半 南星圓白者澤紙裏烘 南木香 蒼朮 細辛

生甘草 石菖蒲錢一 右件剉散分二服加生薑七厚片煎

取其半乘熱調蘇合丸半丸灌下痰盛者加全蠍二枚炙

按此方治卒中氣閉痰迷不得不用之劑但正氣素虛之人

不能當腦腐及辛香摧枯拉朽之勢裁節而用十之二三可

也諸香立散真氣虛風證大非所宜○牛黃清心丸與蘇合丸異治熱阻關竅可用牛黃丸開之寒阻關竅可用蘇合丸開之其口開手撒遺尿等死證急用人參附子峻補間有得生者若牛黃蘇合之藥入口即斃此無異于釣餌一絲也

烏藥順氣散

治風氣攻注四肢骨節疼痛偏身頑麻及癱瘓語言蹇澀腳

氣步履多艱手足不遂先宜服此藥以疏氣逆然後隨證投

成方切用

烏藥順氣散

至

風門卷十二

以風藥凡中風證多挾中氣不但急中為然

麻黃去節 陳皮去白 烏藥二兩 白殭蠶炒去 川芎 白芷 甘草炙

枳殼炒 桔梗兩 乾薑錢五 為末每服三錢水一盞薑三片煎

二枚煎如憎寒壯熱頭痛身體倦怠加葱白三寸煎併服

出汗 或身體不能屈伸溫酒調服

八味順氣散

治中風正氣虛痰涎壅盛

白朮炮 白茯苓 青皮去穢 白芷 陳皮去白 白烏藥 人參

錢一 甘草五

經曰邪之所湊其氣必虛故用四君子以補氣治痰之法利

氣為先故用青皮白芷烏藥陳皮以順氣氣順則痰行而無

壅塞之患矣此標本兼施之治也嚴用和云人之元氣強壯

焉能為害或因七情飲食勞役致真氣先虛營衛不固邪

乘虛而入故致此疾若內因七情而得者法當調氣不啻治

風外因六淫而得者亦當先調氣後以所感六氣治之此良

法也宜八味順氣散嚴氏此說於理甚當其方較局方烏藥

順氣散不用麻黃枳殼蠶絲等風藥正先治氣後治風之妙

旨後人反惜其說有未備且謂方中不當雜入白芷吹毛責

備詎知白芷香而不燥正和營衛之善藥也和劑合兩方取

用人參乾薑川芎陳皮枳梗厚朴白芷甘草白朮麻黃更加

成方切用

八味順氣散

通頂散

至

風門卷十二

字吹入鼻中有嚏者肺氣未絕可治

中風不省人事病已急矣非平藥可以開其壅塞故用藜蘆

與人參細辛取其相反而相用也藜蘆苦寒有毒入口即吐

細辛相反細辛散肺苦氣上逆加石膏之重以墜之氣即火

風通竅溫經破痰火湧故用石膏 甘草之平以緩之芍藥之用取其清氣利竅

辛寒入肺降火辛寒入肺降火 甘草之平以緩之芍藥之用取其清氣利竅

而已芍藥升清陽而開諸鬱為通陰陽氣血之使○凡諸辛

荆芥及用阜角半夏皆當發表還魂湯用麻黃桂枝清魂湯用

開發三焦使表邪流通也中暑忌用冷水開表亦同此意

故也 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安臥此是風熱躁煩之

通頂散

治初中風不知人事風鼓火盛 口噤不開風冷之氣客於胸

藜蘆 甘草生 細辛 人參 川芎 錢一 石膏 錢五 為末用一

成方切用

八味順氣散

通頂散

至

風門卷十二

字吹入鼻中有嚏者肺氣未絕可治

中風不省人事病已急矣非平藥可以開其壅塞故用藜蘆

與人參細辛取其相反而相用也藜蘆苦寒有毒入口即吐

細辛相反細辛散肺苦氣上逆加石膏之重以墜之氣即火

風通竅溫經破痰火湧故用石膏 甘草之平以緩之芍藥之用取其清氣利竅

辛寒入肺降火辛寒入肺降火 甘草之平以緩之芍藥之用取其清氣利竅

而已芍藥升清陽而開諸鬱為通陰陽氣血之使○凡諸辛

荆芥及用阜角半夏皆當發表還魂湯用麻黃桂枝清魂湯用

開發三焦使表邪流通也中暑忌用冷水開表亦同此意

故也 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安臥此是風熱躁煩之

當歸 川芎 梔子 羌活 大黃 防風 龍膽草等

蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

按此方以瀉青爲名者乃瀉東方甲乙之義也風入厥陰風木之臟同氣相求其勢必盛所慮者虛而眩運熱而躁煩虛也熱也其可以爲壯實而輕瀉之乎審果壯實乃可施此審屬虛熱必以四物湯全方加人參竹瀝秦艽羌活八味爲劑始合法度也

舒筋保安散

治左癱右瘓筋脈拘攣身體不遂腳腿少力乾淫腳氣及淫滯經絡久不能去宜用此以宣導諸氣

成方切用

瀉青丸

舒筋保安散

卷十二

祛風門

虎骨

酒炙

草薢

五靈脂

牛膝

酒浸

續斷

白殭蠶

炒

松節

白芍藥

烏藥

天麻

威靈仙

黃耆

當歸

防風

兩

木瓜

五

用無灰酒一斗浸上藥二七日緊封紮日足取藥

焙乾搗爲細末每服二錢用浸藥酒調下酒盡用米湯調下此治風溼搏結於筋脈之間凝滯不散阻遏正氣不得通行故用藥如是也

加味羚羊角散

治筋痹肢節束痛

羚羊角

當歸

白芍

川芎

附子

薄荷

獨活

防

風

加薑三片

此方治筋痹之義甚善蓋筋痹必以舒筋爲主宜倍用羚羊角爲君筋痹必因血不榮養宜以白芍川芎更加當歸爲臣

然恐羚羊性寒但能舒筋不能開痹必少用附子之辛熱爲反佐更少用薄荷獨活防風入風寒溼隊中而爲之使也

如聖飲

節菴

治剛柔二瘕面赤項強頭搖口噤角弓反張與癰瘕同法瘕太陽中風重感寒溼而爲病也風則燥而動寒則引而緊溼則着而拘故頭搖口噤項強而反張也風挾寒則筋澀無汗液出有汗爲柔瘕

羌藥

當歸

烏藥

加薑煎入薑汁竹瀝服柔瘕加白

羌藥

當歸

烏藥

加薑煎入薑汁竹瀝服柔瘕加白

羌藥

當歸

烏藥

加薑煎入薑汁竹瀝服柔瘕加白

羌藥

當歸

烏藥

加薑煎入薑汁竹瀝服柔瘕加白

成方切用

加味羚羊角散

如聖飲

卷十二

祛風門

羌桂枝剛瘕加蒼朮麻黃口噤齧牙大便實加大黃

羌防芎芷柴胡甘草辛甘以發散風邪用烏藥者治風須實氣也用歸芍者治風先活血也用半夏薑汁竹瀝者風必挾痰也用黃芩者風必生熱也柔瘕加白朮桂枝有汗欲其無汗剛瘕加蒼朮麻黃無汗欲其有汗口齒屬陽明陽明實則口噤齧牙而便秘故加大黃以泄胃熱也

上中下通用痛風方

丹溪

黃藥

炒蒼朮

洗南星

製神糊中

川芎

上下

桃仁

去皮

草

行防已

下白芷

兩羌活

上威靈仙

酒拌下

桂枝

三錢紅

花二錢

奶糊丸

痛風有寒有溼有熱有痰有血之不同此方能通治之黃藥  
清熱蒼朮燥溼治此三風能膽湯火防已行水四者所以  
治溼與熱也南星燥痰散風桃仁紅花活血去瘀川芎為血  
中氣藥四者所以治痰與血也羌活祛百節之風白芷祛頭  
面之風桂枝威靈仙祛臂脛之風四者所以治風而又兼治  
寒也加神麴者所以消中州陳積之氣也疎風而兼祛寒以  
宜於上瀉熱利溼以泄於下活血燥痰消滯以調其中所以  
能兼治而通用也證不兼者以意消息可矣丹溪曰大法痛  
川芎當歸白芷酒客在上者加羌活桂枝威靈仙在下者加  
牛膝防已木通黃芩薄荷能獨行手背項向星蒼朮諸藥至  
處痛

成方切用

土中下通用痛風方

三化湯

聖

疏風門  
卷十二

三化湯

治中風二便數日不行邪氣內實者以此方微利之嘉言曰  
絡只宜宜之使散誤下則風邪乘虛入腑入腑則患無窮若  
夫中風之候多有平素積虛真不守者下之立亡不可不  
慎唯在胃腑一證內實便澀者間有可下然不過解其煩熱  
非大下也所謂一氣之微汗一句之微利亦因可用始用之  
至於下和以下立法檢要中候者宜下為言則指下為定  
法胡可訓耶然中候有緩急二候中候日久熱勢深極傳人  
臟者此為可下而必使風與熱去其空發則不不再  
生若問其重輕必反增風熱何以下為哉其辛虛身中急證  
下藥入口其人即不覺矣可通其與後世以中腑之便認指  
為中臟見其誤下不致害人益信于和緩要之法為可用設  
遇真中臟證下不  
中病難可復追矣

方見攻下門附方內

大黃厚朴枳實小承氣湯也上焦滿治以厚朴中焦滿破以

枳實下焦實奪以大黃用羌活者不忘乎風也服後二便微  
行則三焦之氣無所阻塞而復其傳化之職矣故曰三化  
攻更之峻劑非堅實之體不可輕服蓋傷寒證胃熱腸枯不  
得不大承氣以開其結然且先之以小承氣湯調胃承氣  
恐誤用不當即傷人也在中風證多有虛氣上逆關隘阻閉  
之候斷無用大承氣之理古方取藥積腹中不下以漸順其  
其風豈知窺空而風愈熾長此安窮也哉

血痺湯

治血痺多驚筋脈掣急

人參 黃耆 肉桂 當歸 川芎 代赭石 羌活

厥陰肝臟所主者血也所藏者魂也血痺不行其魂自亂今  
不通其血而但治其驚此不得之數也故用人參以開血為

成方切用

血痺湯

美

疏風門  
卷十二

君黃耆肉桂當歸川芎為臣以代赭石之顛通肝血者佐參  
耆之不逮少加羌活為使蓋氣者血之天也氣壯則血行然  
必以肉桂當歸大溫其血預解其凝泣之勢乃以代赭之重  
墜直入厥陰血分者開通其瘀壅而用羌活引入風痺之所  
緣厥陰主風風去則寒溼自不存爾

三痹湯

治氣血凝滯手足拘攣風寒溼三痹

人參 黃耆 茯苓 甘草 當歸 川芎 白芍 生地

黃 杜仲 薑汁炒 牛膝 桂心 細辛 秦艽 川獨活

防風 等分加薑棗煎

喻嘉言曰此方用參香四物一派補藥內加防風秦艽以勝風溼桂心以勝寒細辛獨活以通腎氣凡治三氣襲虛而成痺患者宜準諸此

### 千金地黃湯

治熱風心煩及脾胃熱壅食不下

生地黃汁

枸杞子汁

荆瀝

竹瀝

升真酥

生薑汁

人參

天門冬

白茯苓

大黃

梔子

以後五味為

度

細末先煎地黃等汁內末藥調服方寸匙再漸加服以利為

按此方補虛清熱潤燥除風開通瘀壅美善具備誠足

### 成方切用

千金地黃湯 烏梅擦牙關方

圭

風門 卷十二

貴也因養血豁痰難於兩用姑舉此方為例以聽臨證酌量

又四肢不舉俱屬脾土而虛實分途異治苟其虛實不甚相

遠此方更在所必用法無窮盡人存政舉未易言爾

### 烏梅擦牙關方

治中風口噤不開 胃陽明之脈循頰車入齒縫風寒中之輕

開不噤者筋

先絕也不治

烏梅 指擦牙齦涎出即開

酸先入筋本能尅土

酸屬木陽

明門屬土使牙關酸軟則開矣若以鐵

器攪之恐傷其齒也

許盾宗治唐柳太后病風脈沉而噤盾宗曰口不下藥宜以湯

氣蒸之令藥入腠理周時可藥遂造黃耆防風湯數十斛置於牀下氣如煙霧次日便得語蓋鼻氣通於天無形之氣由鼻而入呼吸傳變無處不到黃耆甘而善補得防風而功益速驅風補虛兩得之矣

王克明治廬州王守道風噤不能語以熾炭燒地熱灑以湯藥

置病者於上須臾小蘇

若此二者以病至垂危藥不能及亦治風之權變也

### 清震湯

治雷頭風頭面疔瘡腫痛憎寒壯熱狀如傷寒

也東垣曰病在三陽不可通用寒藥重則誤伐無過清震

湯治之。三陽之氣皆會於頭從額至巔絡腦後者屬太陽從額至鼻下面者屬陽明從頰下耳中耳之前後者屬少陽

### 成方切用

清震湯

表

風門 卷十二

升麻 蒼朮 五錢 荷葉 一

升麻性陽味甘氣升能解百毒蒼朮辛烈燥溼強脾能辟

癘局方升麻湯也荷葉色青氣香形仰象震

震仰孟為雷取類象形以治之

能助胃中清陽上行用甘溫辛散之藥以升發之使邪從上

越且固胃氣使邪不傳裏也

成方切用卷十三目錄

祛寒門 正方五十三 附方四十

理中湯

附子理中湯

桂枝人參湯

枳實理中丸

理中安蚘丸

溫胃湯

黃耆湯

溫中湯

補中湯

連理湯

理陰煎

六味回陽飲

成方切用

目錄

四逆湯

四逆加人參湯

茯苓四逆湯

芍藥甘草附子湯

甘草乾薑湯

白通湯

茱萸四逆湯

當歸四逆湯

茵陳四逆湯

回陽返本湯

漿水散

當歸四逆湯

四逆加吳茱萸生薑湯

溫胃湯

附子湯

吳茱萸湯

吳茱萸加附子湯

大建中湯

小建中湯

黃耆建中湯

十四味建中湯

八味大建中湯

樂令建中湯

養中煎

白通加人尿豬膽汁湯

附薑湯

成方切用

目錄

薑附白通湯

附薑歸桂湯

附薑歸桂參甘湯

辛溫平補湯

甘寒補氣湯

益元湯

回陽救急湯

栝樓瞿麥丸

中滿分消湯

溫胃飲



四神丸

二神丸

澹寮四神丸

烏頭赤石脂丸

五君子煎

感應丸

九痛丸

黃芽丸

導氣湯

附子粳米湯

成方切用

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

天台烏藥散

薏苡仁附子散

四維散

疝氣方

梔附湯

鎮陰煎

橘核丸

五味子散

目錄

三

祛寒門  
卷十三

歸氣飲

暖肝煎

補火丸

金液丹

半硫丸

二氣丹

破陰丹

黑鉛丹

黑錫丹

五德丸

成方切用

七德丸

唐鄭相國方

青娥丸

復陽丹

三氣飲

壽脾煎

一炷丹

九炷丹

聖元煎

目錄

四

祛寒門  
卷十三

喝起丸

成方切用卷十三

祛寒門

寒之為病有陰邪犯於表者有生冷傷於內者有陰寒中於臟者此皆外來之寒人所易知者也至於本來之寒初起無所感其外來之寒人之病此者最多世之知此者少其有或因稟賦之弱或因失調之失以致陽氣不足者多見於中其有或因感寒之病無所不致第其來者漸形見者微當其未覺也孰為之意及其既甚也始知難治則庸醫多有不識每以假熱為真火因復發於無形無形又不知其幾也故惟高明見道之士常以陽衰根本為憂凡祛寒之法如乾薑附子中亦能散表之寒無汗者宜之內桂能行血善達四肢血滯多痛者宜之吳茱萸善暖下焦腹痛泄瀉者極妙肉豆蔻可溫脾胃強壯利者最奇胡椒溫胃和中其類近於草撥丁香止瀉行氣其暖過於豆仁補骨脂性降而善開故能氣定而瀉止帶濁泄瀉製附子性行如酒故無處不到能救急回陽凡此之類皆性味溫熱之當辨者然用法尚有具要以散兼溫者散寒邪也以行兼溫者行

成方切用

理中湯

卷十三

理中湯

仲景

治傷寒太陰病自利不渴王海藏曰上吐下瀉不止當渴而利者為寒利三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身冷其大較也下利雖有表證不可發寒多而嘔腹痛糞汙以下利為邪氣內攻走津液而胃虛也寒多而嘔腹痛糞太陰脾經也腹滿而吐食不下自利腹瀉為太陰病自利而腹痛者其病不渴喜嘔腹瀉便溏皆虛寒所致○外邪傳裏利大腹屬太陰少腹屬少陰屬厥陰亦有挾食積與痰

火脈沉無力或厥逆拘急寒束於外或結胸吐衄寒凝於中及感寒霍亂陰陽不和而揮霍擾亂或吐或瀉亦凡中宮虛寒氣不能理諸證俱宜用此分理陰陽安和胃氣

白朮陳壁土乾薑炮甘草炙人參兩自利腹痛者加木香

不痛利多者倍白朮渴者倍白朮益氣燥淫故能生津踞臥沉重利不止加附子此兼少陰證腹滿去甘草甘令嘔吐去白朮加半夏

汁白朮甘薑散逆臍下動氣去朮加桂白朮補氣悸加茯苓則悸

茯苓利發黃加茵陳寒實結胸加枳實本方等分蜜丸名理中丸仲景曰大病瘥後喜唾久不了了胃中有寒宜理中丸

中丸溫之○宋徽宗食水太過病脾疾國醫不效召楊介進

大理中丸上此藥是治受病之源也果愈

臣請以冰煎此藥是治受病之源也果愈

成方切用

理中湯

卷十三

人參補氣益脾故以為君白朮健脾燥溼故以為臣甘草和

中補土故以為佐乾薑溫胃散寒故以為使以脾土居中故

曰理中人身上脘清氣居多下脘濁氣居多而其

本方加附子一枚名附子理中湯亦可作丸即四逆湯加參朮治中寒腹

痛身痛四肢拘急漸傷曰傷卒中曰中中有中臟中腑中經絡

換金正氣散加附子皮肉筋脈之殊治之當分微甚微則用附

子理中湯薑附湯入肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加於白

朮入心加桂枝倍甘草名桂枝人參湯仲景治太陽表證不

上夜神除而數下之協熱而利心下痞鞭表裏不解者欲解表裏之

為敷布故用理中以和裏而加桂枝以解表不名理中而名桂枝者到底先表之意也大抵陽熱為邪則腹滿而嘔乾陰

寒為邪則腹加枳實茯苓蜜丸名枳實理中丸崔行治寒實

結胸欲絕胸膈高起手不可近用大陷胸不瘥者

此是下後

虛逆氣已不理而毒復上攻氣毒相搏結於胸者用此丸先

理其氣次療諸疾其效如神渴者加花粉自汗者加牡蠣粉

去甘草加茯苓川椒烏梅名理中安蚘丸陶仲文治胃寒吐就

就得甘則動故去甘草得酸則止得辛則伏故加椒梅加當歸白芍陳皮厚朴川椒入

薑煎名溫胃湯治憂思鬱結脾氣凝脹滿上衝飲食不下

加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯海藏亦出理中例法加青皮陳皮名

治中湯治前證腹滿痞悶兼食積者加陳皮茯苓名補中湯

治泄瀉瀉不已加附子惡食食不化加砂仁加黃連茯苓名

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

成方切用

理陰煎

主 祛寒門

卷十三

等證

熟地

三五七錢或一二兩當歸二二三錢或五七錢

乾薑炒黃色一

甘草炙一或二錢

加肉桂一二錢 加附子名附子理陰煎 若風寒外感邪

未深入但見發熱脈數不洪凡內無火證素稟不足者但用

此湯加柴胡一錢半或二錢連進一二服其效如神若寒凝

陰盛而邪有難解者必加麻黃一二錢放心用之或不用柴

胡亦可恐其清利也 若陰勝之時外感寒邪脈細惡寒或

背惡寒者乃太陽少陰證也加細辛一二錢甚者再加附子

一二錢 若陰虛火盛其有內熱不宜用溫而氣血俱虛邪

不能解者宜去薑桂單以三味與之加減或止加人參亦可

若脾胃兩虛水泛為痰或嘔或脹者加茯苓一錢五分或

加白芥子五分以行之 若泄瀉不止及腎瀉者宜少用當

歸或并去之加山藥藕豆吳茱萸破故紙肉豆蔻附子 若

腰腹有痛加杜仲牛膝 若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂

仁

成方切用

六味回陽飲

四 祛寒門

卷十三

見無力者悉是假熱之證若用寒涼攻之必死宜速用此加

減以溫補陰分托散表邪連進數服使陰氣漸充則汗從陰

達而寒邪不攻自散此最切於時用者也

六味回陽飲

治命門火衰陰中無陽陰陽將脫等證

人參一二兩或數錢製附子二三錢炮乾薑二三錢炙甘草一熟地五錢

兩當歸三錢如泄瀉者或動如肉振汗多者加炙黃耆

四五錢或一兩或冬白朮三五錢 如泄瀉者加烏梅二枚

或北五味二十粒 如虛陽上浮加茯苓二錢 如肝經鬱

滯加肉桂二三錢

滯加肉桂二三錢

滯加肉桂二三錢

滯加肉桂二三錢

滯加肉桂二三錢

滯加肉桂二三錢

滯加肉桂二三錢

四逆湯 仲景

治三陰傷寒 四逆湯為少陰主藥然三陰通身痛腹痛下利

清穀自利居名惡寒不渴四肢厥冷 治四肢厥逆故名四逆

則血脈凝滯陽氣不能敷布 或反不惡寒面赤煩躁 陽盛格

故一身盡痛而手足厥冷也 裏寒外熱或乾嘔 虛火上升脈沉微細欲絕 少陰脈

裏寒外熱或乾嘔 虛火上升脈沉微細欲絕 少陰脈

緊有數而仲景統以微細言之蓋沉必重按始得緊數亦在

沉細中見不似陽證浮大而緊數也薛慎齋曰人知數為熱

不知沉細中見數為寒其真陰寒證脈當

有七八至者但按之無力爾宜深察之

附子 生用乾薑 甘草 冷服 面赤者格陽於上也

加葱九莖以通陽 驗嘉言曰陽虛之人雖有表證其汗仍出

藥外邪不致散故用 腹痛真陰不足也加芍藥二兩以斂陰咽

前湯加葱為治 成方切用 四逆湯

痛陰氣上結也加桔梗一兩以利咽利止脈不出加人參二

兩以助陽補氣血嘔吐加生薑二兩以散逆氣

寒淫於內治以甘熱故以薑附大熱之劑伸發陽氣表散寒

邪 附子生用 甘草亦補中散寒之品又以緩薑附之僭上也

甘草為君乾薑必冷服者寒盛於中熱飲則格拒不納經所

為臣附子為使 謂熱因寒用又曰治寒以熱涼而行之是也 此制奇之大劑

大劑不能達仲景云傷寒醫下之續得下利清穀腹滿身痛

者急當救裏宜四逆湯清便自調身痛者急當救表宜桂枝

接便為厥手足逆冷是也。三陰三陽之脈俱相接於手足

陰主寒陽主熱陽氣內陷不與陰氣相順接則手足逆冷

加人參一兩名四逆加人參湯治惡寒脈微復利止亡血

利止而津液 再加茯苓六兩名茯苓四逆湯治汗下後病

不解而煩躁去乾薑加芍藥三兩名芍藥甘草附子湯治傷

寒發汗不解反惡寒者虛故也 百問曰汗後惡寒人必

子用甘草四兩乾薑二兩名甘草乾薑湯治傷寒脈浮自汗

小便數微惡寒腳掣急用桂枝湯誤攻其表得之使厥咽中

乾煩躁吐逆與此湯以復其陽 脈浮自汗便數惡寒陽不足

故與甘草益 侯厥愈足溫重與芍藥甘草湯 各四 以和陰

氣乾證助陽 侯厥愈足溫重與芍藥甘草湯 各四 以和陰

液證雖鄰於少陰而不敢用四逆 其腳即伸除甘草加葱白

成方切用 當歸四逆湯

四莖名白通湯 復脈加吳茱萸名茱萸四逆湯治少陰厥陰

腹痛加當歸木通名當歸四逆湯治感寒手足厥冷脈細欲

絕及寒疝臍下冷引腰膝痛 寒傷營血故加當歸木通能通

加茵陳名茵陳四逆湯治陰黃加生脈散陳皮名回陽返本

湯治陰盛格陽加官桂良薑半夏名漿水散 治虛寒水瀉

冷汗脈微甚者嘔吐此為急病

當歸四逆湯 仲景

治厥陰傷寒手足厥寒脈細欲絕

當歸 桂枝 芍藥 細辛 甘草 通草 大棗 五 仲景又曰其人素有久寒者加吳茱萸 升 生薑 酒 六

升和煮名四逆加吳茱萸生薑湯

四逆之名多矣而有因寒因熱之不同此則因風寒中血脈

而逆故以常歸辛溫血中之氣藥為君通脈散逆必先去血

中之邪故以桂枝散太陽血分之風細辛散少陰血分之寒

為輔未有營衛不和而脈能通者故以芍藥甘草大棗調和

營衛通草利九竅通血脈關節諸藥藉之以破阻滯而厥寒

散矣

真武湯 仲景

治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為

有水氣或欬或嘔或小便不利傷寒脈沉細欲吐不吐心煩但

成方切用

真武湯

卷十三

陰證凡人寤則氣行於陽寐則氣行於陰然必自少陰始故  
少陰證但欲寐陰氣勝也一有陽擾則反是矣周揚俊曰但  
欲寐非能寐昏昏如夢爾少陰屬腎腎病不能制水水飲停  
為水氣腹痛者寒淫內甚也四肢沉重疼痛寒淫外甚也小  
便不利自下利者淫勝而水穀及太陽病發汗汗出不解仍  
不別也或欬或嘔皆停飲也

發熱心悸頭眩筋惕肉瞤振振欲擗地氣虛惡寒汗出過多

為心液汗去心虛如魚失水則離也水停心下亦心悸心屬

火火畏水故悸也虛陽內動故頭眩汗多則液少不能榮養

筋肉故筋惕肉瞤而跳肉瞤謂動也振振欲擗地者亡陽無

奈欲擗地而入也程郊倩曰汗多亡陽夫人知之然有衛外

之陽為周身營衛之主此陽虛遂有汗漏不止惡寒身痛及

奔豚之證有腎中之陽為上焦心肺之主此陽虛遂有發熱

眩悸頭眩振振之證有胃中之陽為中焦水穀生土之主此

陽虛遂有腹脹滿胃不和而心下痞之證按諸者須觀脈

證知犯何逆以法治之胃之真陽盛則水皆內附而與腎

氣同其收藏矣腎之陽虛不能制水則汎溢為病故上凌心

喻嘉言曰汗雖出而熱不退則邪未盡而正已大傷况裏虛  
為悸上虛為眩經虛為瞤身振振搖無往而非亡陽之象所  
以行真武把關  
坐鎮之法也

附子一枚 白朮二兩 茯苓 白芍 生薑三兩

水寒相搏欬者加五味子細辛乾薑五味散肺氣細小便利

去茯苓以其下利去芍藥加乾薑芍藥散水寒

薑一倍 附子散上

茯苓白朮補土利水能伐腎邪而療心悸生薑附子回陽益

衛能壯真火而逐虛寒芍藥酸收能斂陰和營而止腹痛

必兼和陰不欲偏勝經曰寒淫所勝治以辛熱淫所勝佐以酸平 真武北方之神一龜一蛇

司水火者也腎命象之此方濟火而利水故以名焉 程郊倩

成方切用

真武湯

卷十三

唯太陽與少陰有之以二經同司水也然太陽從表得之  
膚腠不宣水氣為元府所過故以小青龍發之少陰由下焦  
有寒不能制水水客邪得深入而動其本氣緣胃陽衰而  
隄防不及也故用真武湯溫中鎮水收攝其陰氣按青龍上  
太陽表水十棗主太陽裏水真武主少陰裏水喻嘉言曰陽  
明少陽絕無用附子法唯太陽陰盛勢必傳出於腑以故經見脈微  
眈為腎之腑腎中陽虛陰盛勢必傳出於腑以故經見脈微  
惡寒漏汗惡風心悸頭眩筋惕肉瞤等證縱是傳經熱  
邪不得不不用薑附以消陰而回陽也

去生薑加人參二兩名附子湯 治少陰病身體痛手足寒

骨節痛脈沉者 腎主骨寒注則痛此一身骨節盡痛乃陽虛

痛治之則殺人矣故用參附助陽而及少陰病得之一二日

勝腎寒加芍藥斂陰以為陽之附也 及少陰病得之一二日

口中和背惡寒者 背為胸中之陽諸陽受氣於胸中轉行於

背為之惡寒若風寒在表而惡寒則一身盡寒矣又有陰氣

不足陽氣乘虛內陷陰中表陽新虛背微惡寒者經所謂傷

氣不足陽氣乘虛內陷陰中表陽新虛背微惡寒者經所謂傷

寒無大熱口渴心煩背微惡寒者是也白虎加人參湯主之  
一為陰寒內盛一為陽氣內陷何以別之蓋陰寒為病內無  
燥熱則口中和陽氣內陷則清稀津液口燥舌乾而  
渴也欲辨陰陽寒熱之不同當以口中燥潤詳之  
吳茱萸湯 仲景

治陽明證食穀欲嘔若得湯反劇者則屬上焦少陰證吐利  
手足厥冷煩躁欲死厥陰證乾嘔吐涎頭痛厥陰之脈挾胃  
內格也厥陰之脈上竅頭痛寒氣上逆也○按三陽皆有頭  
痛太陰少陰二經之脈不上循頭故無頭痛唯厥陰與督脈  
會於巔亦有頭痛然風溫在少陰溫在太陰而頭痛反痛是  
又不可拘拘者李東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足  
寒而氣逆也蓋太陰少陰二經雖不上循頭然  
痰與氣逆壅於膈中頭上氣不得暢而為痛也  
吳茱萸一升 人參三兩 大棗十二枚 生薑六兩

喻嘉言曰此明嘔有太陽亦有陽明若食穀而嘔則屬胃寒  
成方切用 吳茱萸湯 九 社寒門 卷十三

與太陽之惡寒嘔逆原為熱證者不同火熱上衝恐誤以寒藥  
治寒嘔也若服吳茱萸湯反劇者則仍屬太陽熱邪而非胃  
寒明矣 宜葛根加半夏湯小柴 若少陰證吐利厥逆至於煩  
躁欲死腎中之陰氣上逆將成危候 腎中陰盛上格 故用吳  
茱萸散寒下逆人參薑棗助陽補土使陰寒不得上千溫經而  
兼溫中也 吳茱萸為厥陰本藥故又 治肝氣上逆嘔涎頭痛  
加附子名吳茱萸加附子湯治寒疝腰痛牽引睪丸尺脈沉  
遲

大建中湯 金匱  
治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝皮起出見有

頭足上下痛而不可觸近者 陽受氣於胸中陽虛則陰邪得  
格於中焦故見高起而不可觸近之為心為胃寒為陰  
寒乘於心冷熱相激故痛寒乘於脾胃冷弱不消水穀故痛  
而飲食不 能飲食也

蜀椒 合乾薑 兩人參 煎去滓內飴糖一升微煎溫服  
蜀椒辛熱入肺散寒入脾暖胃入腎命補火乾薑辛熱通心  
助陽逐冷散逆人參甘溫大補脾肺之氣飴糖甘能補土緩  
可和中蓋人以中氣為主用辛辣甘熱之藥大建其中臟之  
陽以祛其逆上之濁陰也

小建中湯 仲景

治傷寒陽脈濇陰脈弦腹中急痛邪氣入裏與正相搏則腹  
成方切用 大建中湯 小建中湯 十 社寒門 卷十三

建中湯也太陽在表無腹痛少陽在牛表半裏有胸脇痛而無  
腹痛陽明腹滿急痛者裏實也宜下之大柴胡湯小承氣湯  
三陰下利而腹痛者裏虛也宜溫之四逆湯附子理中湯傷  
腸鳴泄瀉而痛者裏虛有寒也宜小建中湯溫中散寒傷  
寒二三日心悸而煩悸者陽氣虛也煩者陰血虛也氣血內  
陰陰收則陽歸附也加飴糖者 通治虛勞悸衄裏急腹痛夢  
遺失精四肢痠痛手足煩熱咽燥口乾虛勞黃疸 黃疸小便  
者是無熱也不可除熱當作虛寒治之喻嘉言曰虛勞病至  
於亡血失精精枯槁難為力矣急宜建其中臟使飲食增  
而陰血旺故但用飴糖作甘之味生其精  
血而酸辛酸苦在所不用舍是無良法也  
桂枝 生薑 芍藥 甘草 一兩 大棗 十二枚 入飴糖一升  
微火解服 嘔家不可用建中以其甜故也○此即桂枝加芍藥  
枝芍藥而名建中今人局建中絕不用飴糖為君故不名桂  
吳鶴皋曰桂枝當是桂枝湯故用桂枝湯以解表桂枝湯故用

以建裏

準繩曰脾居四臟之中生有營衛通行津液一有不調則失

所育所行矣必以此湯溫健中臟故名建中脾欲緩急食甘

以緩之故以飴糖為君甘草為臣桂枝辛熱辛散也潤也營

衛不足潤而散之芍藥酸寒酸收也泄也津液不通收而行

之故以桂芍為佐生薑辛溫大棗甘溫胃者衛之源脾者營

之本鍼經曰營出中焦衛出上焦是已衛為陽益之必以辛

營為陰補之必以甘辛甘相合脾胃健而營衛通故以薑棗

為使李東垣曰傷寒論云陽脈瀦陰脈瀦法當腹中急痛以

臣水挾木勢亦來侮土肉桂大辛熱佐芍藥以退寒水蓋藥

辛甘而溫發散陽氣行於經脈皮毛為使或謂桂枝湯解表

成方切用小建中湯

而芍藥少建中湯溫裏而芍藥多何也皮膚為近則制小其

服心腹為遠則制大其服所以不同也按此即表欲其散裏

欲其收之義也小建中治腹痛者以木來侮土取芍藥為君

土中瀉木也理中湯治腹痛者以水來侮土取乾薑為君

中瀉水也平胃散治腹痛自利者取蒼朮為君瀉土除濕也

雲岐子曰建中為補能補中焦之虛而不能補上焦下焦之

虛調胃為瀉能瀉中焦之實

而黃耆兩半名黃耆建中湯金匱治虛勞諸不足準繩曰血不

足而用黃耆

黃耆味甘加甘草大能生血此仲景之妙法蓋家精作甘

甘能補胃胃為氣血之海氣血所從生也經曰無陽則陰無

表而出之按補血湯黃耆五倍於當歸而云補血即此義亦

補虛使中氣建立則能生有營衛通行津液

十四味建中湯

治氣血不足虛損勞瘵短氣嗜臥欲成勞瘵及陰證發斑

或

成陰證後中氣虛乏或因惡事損傷腎氣或因過服涼藥

其色淡紅隱隱見於肌表與陽證發斑色紫赤者不同此胃

氣極虛若服寒涼立見危候與陽證發斑色紫赤者不同此胃

之變者也醫不寒甚脈微

黃耆 人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 夏 當歸 白芍

熟地 川芎 麥冬 肉蓯蓉 附子 肉桂 加薑棗

煎黃耆益衛壯氣補中首藥四君益氣四物養血陰陽調和則

成方切用十四味建中湯

血氣各安其位矣半夏和胃健脾麥冬清心潤肺蓯蓉補命

門相火之不足桂附引失守之火而歸元於十全大補之中

而有加味要以強中而戢外也

除茯苓白朮麥冬川芎熟地蓯蓉名八味大建中湯治同除

川芎熟地白朮附子蓯蓉加柴胡細辛陳皮名樂令建中湯

治臟腑虛損身體羸瘦潮熱自汗將成勞瘵大能退虛熱生

氣血陰虛之熱則不可退十四味建中湯用桂附蓯蓉意在退熱而陰

陽而陰虛之陽未必不可退又在用方者之善為黃耆附子

脾腎故引伸建中之法

乃使人超出之方也

養中煎

治中氣虛寒為嘔為泄者

人參二錢 山藥二錢 白朮二錢 炙甘草一錢 乾薑二錢

如噤腐氣滯者加陳皮一錢或砂仁四分 如胃中空虛覺餒加熟地三五錢

白通加人尿豬膽汁湯 仲景

治少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔而

煩服此湯後脈暴出者死微續者生 腎者胃之關也前陰利水後陰利穀寒邪客之則不能禁固故下利也與白通湯復陽散寒服後利不止厥後脈暴出者正氣因發泄而脫也故生

葱白四兩 乾薑一兩 附子一枚 人尿五合 豬膽汁一合 加減法同四

成方切用

黃帝經 白通加人尿豬膽汁湯

圭

社稷門 卷十三

逆湯

葱白之辛以通陽氣薑附之熱以散陰寒此白通湯也服而

不應者乃陰盛格拒乎陽藥不能達少陰故加人尿豬膽汁

為引取其與陰同類下咽之後冷體既消熱性便發情且不

違而致大益經曰逆而從之從而逆之正者正治反者反治

此之謂也 以熱治寒以寒治熱為正治以熱治熱以寒治寒為反治亦曰從治謂從其性而伏之也按厥有陰陽二證陰厥者身涼不渴脈遲細而微陽厥者身熱極而反厥雖厥而煩渴身復時溫而脈數也若陽厥極深至於身冷脈微欲絕為熱極而將死矣急以大承氣下之則厥愈所謂寒藥反能生脈而令身暖也若以熱藥助其陽則陰氣暴絕而死矣陰厥用白通四

逆湯亦須急投緩則無及

薑附白通湯

治暴卒中寒厥逆嘔吐瀉利色清氣冷肌膚凜慄無汗盛陰沒陽之證

附子炮去皮臍乾薑錢五 葱白五草豬膽汁大者 用水二大盞煎

附薑二味至一盞入葱汁并豬膽汁和勻服再用葱一大握

以帶輕束切去兩頭留二寸許以一面熨熱安臍上用熨斗

盛炭火熨葱白上面取其熱氣從臍入腹甚者連熨二三餅

又甚者再用艾炷灸關元氣海各二三十壯 臍下一寸五分名氣海二寸名

丹田三寸 內外協攻務在一時之內令得陰散陽回身溫不

冷次用附薑歸桂湯

喻嘉言曰寒中少陰行其嚴令埋沒微陽肌膚凍裂無汗而

成方切用

薑附白通湯 附薑湯

圭

社稷門 卷十三

喪神守急用附子乾薑加葱白以散寒加豬膽汁引入陰分

然恐藥力不勝熨葱灼艾外內協攻乃足破其堅凝少緩須

臾必無及矣又曰用薑附以勝陰復陽者取飛騎突入重圍

舉旗樹幟使既散之陽望幟爭趨頃之復合爾不知此義者

加增藥味和合成湯反牽制其雄入之勢必至藥緩無功矣

附薑湯

治卒暴中寒其人腠理素虛自汗淋漓身冷手足厥逆或外

顯似熱躁擾乃陰盛於內逼其陽亡於外即前方不用葱白

也

附子炮去皮臍乾薑錢五 水二大盞煎至一盞加豬膽汁一蛤



穀和溫冷服不用葱熨及艾灼

喻嘉言曰若其人真陽素擾腠理素疎陰盛於內必逼其陽亡於外魄汗淋漓食項強硬用附子乾薑豬膽汁卽不可加葱及熨灼恐助其散而陽無由內附也宜撲止其汁陡進前藥隨加固護腠理不爾恐其陽復越也

附子歸桂湯

治暴病用附薑湯後第二服隨用此繼之因附薑專主回陽而其所中寒邪先傷營血故加歸桂驅營分之寒纔得病相當也

附子炮去乾薑炮當歸肉桂二錢五分水二大盞煎至一盞成方切用

入蜜一蛤殼溫服

喻嘉言曰其次前藥中卽須首加當歸肉桂兼理其營以寒邪中入先傷營血故也不爾藥偏於衛弗及於營與病卽不相當邪不盡服必非勝算也

附子歸桂參甘湯

治陽氣將回陰寒少殺略有端緒第三服卽用此方

附子炮去乾薑炮當歸肉桂一錢五分人參甘草二錢水二大盞煨薑三片白不用大棗二枚煎至一盞入蜜三蛤殼溫服喻嘉言曰其次前藥中卽須加入人參甘草調元轉餉收功韓幄不爾雖附之猛直將犯上無等矣

辛溫平補湯

治暴中寒證服前三方後其陽已回身溫色活手足不冷吐利漸除第四方卽用此平調臟腑營衛俾不致有藥偏之害附子炮去乾薑炮肉桂五分當歸人參甘草炙黃耆蜜白北土芍酒炒五味子十二粒水二大盞煨薑三片大棗二枚煎至一盞入蜜五蛤殼溫服

喻嘉言曰用前藥二三劑後覺其陽明在躬運動頗輕神情頗悅更加黃耆白朮五味白芍大隊陰陽平補不可歇手蓋重陰見睨浪子初歸斯時搖搖靡定怠緩不爲善後必墮前功也又曰用羣陰之藥以培陰護陽其人卽素有熱痰陽出成方切用

辛溫平補湯 甘寒補氣湯

未 社寒門 卷十三

早已從陰而變寒至此無形之陰寒雖散而有形之寒痰阻塞竅隧者無由遽轉爲熱薑附固可弗施其牛黃竹瀝一切寒涼斷不可用若因其素有熱痰妄投寒劑則陰復用事陽卽躁擾必墮前功也

甘寒補氣湯

治中寒服藥後諸證盡除但經絡間微有窒塞辛溫藥服之不能通快者第五方用甘平助氣藥緩緩調之

人參 麥冬 白芍酒炒黃耆蜜炙生地黃二錢甘草炙牡丹皮八分淡竹葉鮮者取汁少許水二大盞煎至一盞入梨汁少許熱服無梨汁用竹瀝可代

喻嘉言曰前用平補後已示銷兵放馬偃武崇文之意茲後復有頑痰留積經絡但宜甘寒助氣開通不宜辛熱助熱藥塞蓋辛辣始先不得已而用其毒陽既安堵即宜休養其陰何得喜功生事徒令病去藥存轉生他患漫無寧字也

益元湯 活人

治面赤身熱不煩而躁飲水不入口名戴陽證成氏曰煩躁也躁煩者先躁而逆遲復煩也從煩至躁為先躁後煩明矣按內熱曰煩謂心中煩煩為有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱曰躁謂身體手足動擾欲裸衣入非為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不治大抵煩不煩者多屬熱惟悸者屬虛獨躁不煩者多屬寒而火邪者間或有之

成方切用

益元湯 回陽救急湯

七

社寒門 卷十三

附子 炮

乾薑 艾葉

黃連 知母

人參 麥冬

五味

子 甘草

加薑棗葱白煎入童便一匙冷服

附子乾薑艾葉回陽之藥協以人參甘草補其陽虛退其陰火所謂甘溫能除大熱也黃連以折泛上之火知母以滋在下之陰以靜其躁蓋陽無陰則孤陽無所附麗故扶陽亦兼和陰也麥冬五味補肺清心合人參以生其脈加童便而冷服者熱因寒用也

回陽救急湯 節菴自註云即四逆湯

治三陰中寒初病身不熱頭不痛惡寒戰慄四肢厥冷引衣自蓋跪臥沉重腹痛吐瀉口中不渴或指甲唇青口吐涎沫

或無脈或脈沉遲無力初病無身熱頭痛是無表邪邪不在表於四肢也引衣自蓋是寒中少陰也腹中痛是寒中太陰也不渴是寒中太陰也脈沉遲是寒中少陰也腹中痛是寒中太陰也氣內爭而正不勝故心寒足冷是陽微陰勝邪而勝故身為振搖遂大汗以解也

附子 炮

乾薑

肉桂

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮

甘草

五味子

加薑煎入麝三釐調服無脈加豬膽

汁苦入心泄瀉加升麻黃耆嘔吐加薑汁吐涎沫加鹽炒吳茱萸

寒中三陰陰盛則陽微故以附子薑桂辛熱之藥祛其陰寒而以六君溫補之藥助其陽氣五味合人參可以生脈加麝

成方切用

栝樓瞿麥丸

七

社寒門 卷十三

香者通其竅也

栝樓瞿麥丸

金匱

治小便不利有水氣其人渴

栝樓根

茯苓

薯蕷

附子

一枚

瞿麥

兩

煉蜜丸服以

小便利腹中溫為知

金匱治小便不利而淋且渴者用之以其胃中有熱腹中有寒故變八味丸之制為此丸見其人跌陽脈數即胃中有熱

胃熱必消穀引食大便必堅小便必數是其淋而且渴為胃熱中消明矣故用栝樓以清胃熱茯苓瞿麥以利小便然腎中寒水之氣上入於腹則腹中必冷故用附子以勝其寒方

下云以小便利腹中溫爲知制方之義可繹思也

中滿分清湯 東垣

治中滿寒脹寒疝二便不通四肢厥逆食入反出腹中寒心  
下痞下虛陰躁奔豚不收 或多食寒涼及脾胃久虛之人胃中寒則腹滿或臟寒生滿病此湯

川烏 乾薑 畢澄茄 生薑 黃連 人參 當歸 澤

瀉 青皮 麻黃 柴胡 草薢仁 厚朴 黃耆 黃蘗

分益智仁 吳茱萸 木香 半夏 茯苓 升麻 熱

服

川烏二薑吳茱萸澄茄益智草薢除溼開鬱暖胃溫腎以祛其

成方切用

中滿分清湯 溫胃飲

九 祛寒門 卷十三

寒青皮厚朴以散其滿升麻柴胡以升其清茯苓澤瀉以降

其濁人參黃耆以補其中木香以調其氣當歸以和其血麻

黃以泄其汗半夏以燥其痰黃蘗黃連以去溼中之熱又熱

因寒用也 李東垣曰中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者

脾胃有病令上下分清其淨下焦如瀉氣血自然分化

溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臟寒嘔惡胎氣不

安等證

白朮 炒 當歸 錢 人參 錢 白扁豆 炒 甘草 錢 乾薑 錢

炒黃 錢 陳皮 炒 錢 如下寒帶濁者加故紙一錢 如氣滯

或兼胸腹痛者加藿香丁香白豆仁砂仁白芥子之屬 如

兼外邪及肝腎之病者加桂枝肉桂甚者加柴胡 如脾氣

陷而身熱者加升麻五七分 如水泛爲痰而胸膈痞滿者

加茯苓一二錢 如脾胃虛極大嘔大吐不能止者宜倍用

參朮仍加柴胡胡椒二三分煎熟徐徐服 如泄瀉者去當

歸無滯去陳皮

四神丸

治腎瀉脾瀉 腎瀉者五更時瀉也經曰腎者胃之關也前陰

能鍵閉故將交陽分則瀉也脾瀉者脾之清陽下陷不能運

化關門元氣不足不能分別水穀不瀉而瀉也兩證皆由腎

命火衰不能上生脾土故也 分別水穀 楊仁齋曰腎命之氣交通水穀自然變化

成方切用 四神丸

破故紙 四兩酒浸 炒 五味子 三兩 炒 肉豆蔻 二兩 炒 吳茱萸 一兩 炒

泡 用大棗百枚生薑八兩切片同煮棗爛去薑取棗肉搗

丸每服二錢臨臥鹽湯下 若平旦服之至夜藥力已盡不能敵一夜之陰寒也

破故紙辛苦大溫能補相火以通君火火旺乃能生土故以

爲君肉蔻辛溫能行氣消食暖胃固腸五味鹹能補腎酸能

瀉精吳茱辛熱除溼燥脾能入少陰厥陰氣分而補火蓋久

瀉皆由腎命火衰不可專責脾胃故大補下焦元陽使火旺

土強泄瀉自止矣

單用破故紙肉豆蔻名二神丸治同 詩學士曰有全不進食

授二神丸頓能進食此病不可全作脾治蓋腎氣怯弱真單

用五味子吳茱萸名五味子散治同除五味吳茱萸加茴香

木香錢五薑煮棗丸亦名四神丸治同茴香亦散胃之藥

湯用以疎肝和脾不使木鬱土也薛氏醫案云脾胃虛寒下者補中益氣湯加木香肉果補腎脾氣虛寒不

者六君子湯加炮薑肉桂命門火衰脾土虛寒者宜入味丸

脾腎氣虛俱虛者十全大補湯送四神丸大便滑利小便秘

治心痛微背背痛微心

赤石脂煅蜀椒兩烏頭炮附子炮乾薑兩蜜丸日三服

不知稍加

此乃陰寒之氣厥逆而上干橫格於胸背經脈之間牽連痛

成方切用烏頭赤石脂丸 五君子煎 手 祿寒門 卷十

楚亂其氣血攪其疆界此而用氣分諸藥則轉益其病勢必

危殆仲景用蜀椒烏頭一派辛辣以溫散其陰邪然恐胸背

既亂之氣難安而即於溫藥隊中取用乾薑之泥赤石脂之

瀉以填塞厥氣所橫衝之新隧俾胸之氣自行於胸背之氣

自行於背各不相犯其患乃除此煉石補天之精義也今人

知有溫氣補氣行散氣諸法矣亦知有堵塞邪氣攻衝之實

令胸背陰陽二氣並行不悖者哉

五君子煎

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼溼者

人參錢三乾薑錢三炒黃錢三白朮錢三茯苓錢三甘草錢一加陳皮

一錢名六味異功煎證治同前而兼微滯者

按此即四君子湯五味異功散之變方也

感應丸

治新舊冷積瀉痢等證

木香 肉豆蔻 丁香兩乾薑炮百草霜一杏仁一百四十

巴豆七十粒去心巴豆杏仁另研同前藥末和勻用好黃

蠟六兩溶化重絹濾去渣好酒一升於砂鍋內煮數沸候酒

冷蠟浮用清油一兩銚內熬熱取蠟四兩同化成汁就銚內

和前藥末乘熱拌勻丸如豆大每服三十丸空心薑湯下

肉蔻逐冷消食下氣和中丁香暖胃助陽宜壅除癖木香升

成方切用感應丸 久痛丸 手 祿寒門 卷十

降諸氣和脾疎肝杏仁降氣散寒潤燥消積炮薑能逐鋼冷

而散痞通關巴豆善破沉寒而奪門宜滯寒積深鋼非此莫

攻百草霜和中溫散亦能消積治痢為佐也醫貫曰此方神

巴豆不令人瀉其積自然消化李時珍曰一婦年六十餘瀉

瀉五載犯生冷油膩肉食即作痛服升溫藥瀉反甚服沉而

滑此乃脾胃久傷積冷凝滯法當以熱下之用蠟置巴豆

丸五十粒服二日遂愈自此每用治瀉痢愈者近百人

久痛丸金匱

治久寒心痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷

流注心胸痛并冷腫上氣落馬墜車血疾等

附子三生狼牙炙巴豆去皮心人參 乾薑 吳茱萸兩  
煉蜜丸桐子大酒下強人初服三丸日三服弱者二丸

仲景於胸痹證後附久痛丸治久寒心痛以其久着之邪不  
同暴病故藥則加峻而湯改爲丸取緩攻不取急蕩也久寒  
心痛乃久客之劇證即腎水乘心腳氣攻心之別名也痛久  
血瘀陰邪團結溫散藥中加生狼牙巴豆吳茱萸驅之使從  
陰竅而出以其邪據胸中結成堅壘非搗其巢邪終不去爾  
黃芽丸

治脾胃虛寒或飲食不化或時多脹滿泄瀉吞酸嘔吐等證  
人參二兩焦乾薑二錢蜜丸芡實大常嚼服甚妙加甘草二錢

爲散名參薑散治脾肺虛寒嘔吐欬嗽氣短小兒吐乳等證  
二方或陳皮或華撥或茯苓皆可酌用

成方切用 黃芽丸 導氣湯 圭 卷十三

治寒疝疼痛 陰氣積於內復爲寒邪所襲營衛不調則成疝  
七種寒疝水疝筋疝血疝氣疝狐疝癰疝也證雖見於腎病  
實本於肝以厥陰肝脈絡於陰器故也女子小腹有積前陰  
突出及陰菌亦同此類但女子不名疝而名瘕

川練子 錢四 木香 錢三 茴香 錢二 吳茱萸 錢一 湯泡 長流水煎

此治疝之通劑也川練苦寒能入肝舒筋使無鬱急之苦又  
能導小腸膀胱之熱從小水下行爲治疝之主藥木香升降  
諸氣通利三焦疏肝而和脾胃茴香能入腎與膀胱暖丹田而  
祛冷氣吳茱萸入肝腎氣分燥溼而除寒三者皆辛溫之品  
用以宣通其氣使小便下利蓋疝病多因寒溼所致寒去則

溼自除也

附子粳米湯 金匱

治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

附子一兩 炮 半夏半升 甘草一兩 大棗十枚 粳米半升 以水八升煮米  
熟湯成去滓溫服一升日三服

腹中陰寒奔迫上攻胸脇以及於胃而增嘔逆頃之胃氣空  
虛邪無所隔徹入陽位則殆矣是其除患之機所重全在胃  
氣乘其邪初犯胃尙自能食而用附子粳米湯以溫飽其胃  
胃氣溫飽則土厚而邪難上越胸脇逆滿之濁陰得溫無敢  
畱戀必還從下竅而出曠然無餘此持危扶顛之手眼也

成方切用 附子粳米湯 胃關煎 圭 卷十三

胃關煎

治脾腎虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢等證

熟地三五錢 或一兩 山藥 炒 藟豆 炒 白朮 炒 焦乾薑 三錢 甘草 一錢 吳茱萸 製 五分 瀉甚者加肉豆蔻一二錢 炒 或補骨脂亦

可 氣虛甚者加人參隨宜用 陽虛下脫不固者加製附  
子一二三錢 腹痛甚者加木香七八分或厚朴八分 滯  
痛不通者加當歸二三錢 滑脫不禁者加烏梅二箇或五  
味子二十粒 肝邪侮脾者加肉桂一錢

佐關煎

治生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用此湯以去寒溼安

脾胃此胃關之佐者也

厚朴炒 陳皮炒 山藥炒 藟豆炒 豬苓 澤瀉錢 甘草錢 乾薑炒 肉桂錢 甘草錢 如腹痛甚者加木香三五分吳茱萸亦可

抑扶煎

治氣令陰寒或暴傷生冷致成瀉痢凡初起氣血未衰脾胃未敗或脹滿或嘔惡皆可用此湯此胃關煎表裏藥也宜察虛實用之其有寒溼傷臟霍亂邪實者最宜用此

厚朴 陳皮 烏藥錢 豬苓 澤瀉錢 甘草錢 乾薑炮 吳茱萸製五分 如氣滯痛甚者加木香五七分或砂仁亦可

成方切用 佐關煎 抑扶煎 天台烏藥散 卷十三 祛寒門

血虛多痛者加當歸二錢 寒溼勝者加蒼朮錢半

天台烏藥散

治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

疝陰肝脈絡於陰器上入少腹

疼痛小腸經絡並於厥陰

疝病乃肝邪也肝主筋故上而不下痛入臍腹甚則上衝心膈故俗亦名小腸氣古人治法往往相類

巴豆粒 川練子十箇 烏藥 木香 茴香鹽炒 良薑炒 青皮錢 五

檳榔二箇 先將巴豆微打破同川棟炒黑去殼及巴豆同

餘藥為末酒下一錢烏藥散膀胱冷氣能消腫止痛川棟等

小腸邪熱從小便下行木香青皮行氣而平肝良薑茴香散

寒而暖腎檳榔性如鐵石能下水潰堅巴豆斬關奪門破血

瘕寒積皆行氣祛溼散寒之品也

薏苡仁附子散 金匱

治胸痺緩急之證

薏苡仁二兩 大附子一枚 杵為散服方寸七日三服

胸中與太空相似天日照臨之所而膈中之宗氣又賴以包

舉一身之氣者也今胸中之陽痹而不舒其經脈所過非緩即急失其常度總由陽氣不運故致然也用薏苡仁以舒其經脈用附子以復其陽則宗氣大轉陰濁不畱胸際曠若太空所謂化日舒長曾何緩急之有哉

四維散

成方切用 薏苡附子散 四維散 疝氣方 卷十三 祛寒門

治脾胃虛寒滑脫之甚或瀉痢不能止或氣血下陷二陰血

脫不禁者無出此方之右

人參兩 乾薑炒 製附子錢 甘草錢 烏梅五分 或一錢酌其

或不用此即四 為末和勻用水拌溼蒸一飯頃取起烘乾

味回陽飲也 再為末每服一二錢溫酒調下

疝氣方 丹溪

治疝氣疼痛

吳茱 枳殼 梔子 棠球子即山查之小者俱妙用 荔枝核殼 等

分爲末空心長流水煎湯下二錢

吳茱入厥陰氣分溫肝逐寒山梔瀉三焦火熱由膀胱出枳

子 52-642



石硫黃一猪大腸二將硫黃為末入猪腸中爛煮三時取

出去腸蒸餅為丸如梧子大每服十九日漸加之凡服硫黃者忌食諸

禽獸

硫黃火之精也亦號將軍大黃至寒亦號將軍故用之以補火以其大

熱有毒故用猪臟爛煮以解之庸俗之人忌而罕用蓋不知

其有破邪歸正返滯還清消陰回陽化魄生魂之力也吳鶴

戴元禮有言曰諸涼藥皆滯惟黃連寒而不滯諸熱藥皆燥惟硫黃熱而不燥昔仁和吏早衰服之年至九十他如范文

正公之金液丹得效之玉真丸和劑之來復丹半硫丸靈砂丹百選之二氣丹活人之返陰丹楊氏之紫霞丹但所主各

有飲當爾按人有真陽虛衰桂附所不能補者非硫黃不能補之其性雖燥毒而卻疎利與燥瀉者不同荷製鍊得宜誠

為救危妙藥若用之不當貽禍匪輕

成方切用

補火丸

祛寒門卷十三

附金液丹硫黃十兩研末瓷盒盛水和赤石脂封口鹽泥固

濟日乾地內埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢火

養七日七夜加頂火一觔煅取出研末蒸餅丸米飲下治久

寒錮冷勞傷虛損傷寒陰證

來復丹太陰元精石舶上硫黃硝石各一兩硝黃同微炒不

結成砂子五靈脂去砂青皮陳皮各一兩醋和丸米飲下治伏暑

泄瀉身熱脈弱玉機微義曰硝石性寒佐以陳皮其性疎快

生冷或冒暑熱中脫閉結揮霍變亂此藥通利三焦分理陰陽服之甚驗若因暑火淫熱者勿用

半硫丸半夏硫黃等分生薑糊丸治老人虛秘冷秘

靈砂丹水銀三兩硫黃一兩鍊成研細糯米糊丸治諸虛錮

冷

二氣丹硝石硫黃等分為末石器炒成砂再研糯米糊丸梧

子大每服四十九井水下治伏暑傷冷二氣交錯中脫痞結

或嘔或泄霍亂厥逆返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁四肢逆

冷硫黃五兩硝石太陰元精石各一兩附子炮乾薑炮桂心

各五錢用鐵銚先鋪元精末一半次鋪硝石末一半中間蓋

硫黃末又着硝石一半蓋硫黃再以元精末蓋上用小盞合

着炭三觔燒令得所勿令煙出研末和前藥末飯丸梧子大

每服十五至二十丸艾湯下汗出為度

本事方破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏硫黃水銀各一

成方切用

黑錫丹

祛寒門卷十三

兩陳皮青皮各五錢先將硫黃入銚鎔開次下水銀鐵杖攪

勻令無星細研糊丸每服三十丸如煩躁冷鹽湯下陰證艾

湯下

傷寒百問方硫黃五錢艾湯調下治身冷脈微厥而煩躁令

臥汗出而愈

黑鉛丹黑鉛硫黃各二兩將鉛鎔化漸入硫黃候結成片傾

地上上火毒研至無聲為度治陰陽不升降上盛下虛頭目

眩暈

黑錫丹

治真元虛億陽氣不固陰氣逆沖三焦不和冷氣刺痛飲食



無味腰背沉重膀胱久冷夜多小便女人血海久冷赤白帶下及陰證陰毒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一百粒即便回陽此藥大能升降陰陽補虛益元墜痰除溼破癖

黑錫去滓硫黃二兩附子炮陽起石研細肉豆蔻炒

金鈴子蒸去沉香舶茴香破故紙木香肉桂兩

用鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並細末和勻自朝至暮以研至黑光色爲度酒糊丸如桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每四十九空心鹽薑湯下女人艾棗湯下急證用百丸

喻嘉言曰此方用黑錫水之精硫黃火之精二味結成靈砂

成方切用

黑錫丹

三 補藥門 卷十三

爲君諸香燥純陽之藥爲臣用金鈴子苦寒一味爲反佐用沉香引入至陰之分爲使凡遇陰火逆沖眞陽暴脫氣喘痰鳴之急證舍此藥再無他法可施昌每用小囊佩帶隨身恐遇急證不及取藥且欲以吾身元氣溫養其藥藉手効靈厥功歷歷可紀即如小兒佈痘與此藥迥不相值然每有攻之太過如用蜈蚣穿山甲桑蟲之類其痘雖勃然而起然頭面偏身腫如瓜匏瘡形溼爛難乾乃至眞陽上越氣喘痰鳴兒醫撒手駭去昌投此丸領其陽氣下入陰中旋以大劑地黃湯峻補其陰以畱戀夫眞陽肌膚之熱反清腫反消溼爛反乾而成厚膚如此而全活者不知凡幾因附本方項下以廣

用方者之識

五德丸

治脾腎虛寒發泄驚悸等證或暴傷生冷或感時氣寒溼或酒溼傷脾腹痛作泄或飲食失宜嘔惡痛泄無火等證

補骨脂四兩北五味或用肉豆蔻吳茱萸製木香二兩乾薑四兩

湯或米湯或人參湯俱可下 腹痛多嘔者加胡椒二兩更妙

七德丸

治生冷傷脾初患瀉痢肚腹疼痛凡年少氣血未衰及寒溼

成方切用

五德丸 七德丸 唐鄭相國方

三 補藥門 卷十三

食滯凡宜和胃者無不神效此即佐關煎之偏裨也

補骨脂炒乾薑炒蒼朮炒台烏藥 吳茱萸 木香 荜

下 神麴糊爲丸梧子大每服七八十九或百丸白滾湯

唐鄭相國方

治虛寒喘嗽腰脚痠痛

破故紙十兩胡桃肉二十兩蜜調如飴每晨酒服一

大匙不能飲者熱水調忌薑棗油菜羊血

破故紙屬火入心包命門能補相火以通君火暖丹田壯元

陽胡桃屬木能通命門利三焦溫肺潤腸補養氣血有木火

相生之妙氣足則肺不虛寒血足則腎不枯燥久服利益甚多不獨上療喘嗽下強腰腳而已也古云黃藥無知母破故蝦也李時珍曰命門在兩腎中央為生命之原相火之主腎命相通藏精而惡燥胡桃狀類皮汁青黑故入北方佐破故紙潤燥而調血使精氣內充血脈通調諸證自然愈矣

加杜仲一觔生薑炒蒜四兩名青娥丸治腎虛腰痛經曰腰腎將應矣再加牛膝酒浸黃藥鹽水炒川草薺童便蜜丸治同

### 復陽丹

治陽虛嘔吐泄瀉腹痛寒疝等證

北五味炒甘草炙附子製炮薑 胡椒一兩白麪二兩為末

### 成方切用

復陽丹

三氣飲

三氣飲

和勻入溫湯搗丸桐子大每服一錢隨證用藥引下

### 三氣飲

治氣血虧損風寒溼三氣乘虛內侵筋骨歷節疼痛之極及

痢後鶴膝風痛等證

當歸 枸杞

杜仲

熟地

甘草

北細辛

獨活

或代以

芍藥

牛膝

茯苓

肉桂

白芷

附子

生薑

如

氣虛者加人參白朮隨宜 風寒勝者加麻黃一二錢 此

飲亦可浸酒大約每藥一觔可用燒酒六七觔浸十餘日徐

徐服之

治脾煎一名

治脾虛不能攝血等證凡憂思鬱怒積勞及誤用攻伐等藥

犯損脾陰致中氣虧陷神魂不寧大便脫血不止或婦人無

火崩淋等證兼嘔惡尤為危候速宜用此單救脾氣則統攝

固而血自歸源此歸脾湯之變方其效如神若犯此證而再

用寒涼則胃氣必脫無不即斃者

白朮

當歸

山藥

東仁

甘草

遠志

製

五分

炮薑

錢

蓮肉

去心炒

人參

隨宜

錢

如血未止加烏梅二

錢

凡畏酸者不可用或加地榆錢半亦可 滑脫不禁加醋

炒文蛤一錢 下焦虛滑不禁加鹿角霜二錢為末攪入藥

中服之 氣虛甚者加炙黃耆二三錢 氣陷而墜者加炒

成方切用

歸脾煎

一

五丹

升麻

五七分或白芷亦可

兼泄者加補骨脂一錢炒用

陽虛畏寒者加附子一二三錢

血去過多陰虛氣餒心

跳不寧者加熟地人參七八錢或一二兩

一

五丹

治脾腎虛寒不時易瀉腹痛陽痿怯寒等證此即參附湯之

變方也

人參

製附子

等

煉白蜜為丸如菜豆大每用白滾湯送

下三五分或一錢凡藥餌不便之處或在途次隨帶此丹最

妙

九

五丹

治脾胃虛寒如五德丸之甚者

熟地八兩 附子製四兩 肉豆蔻炒 吳茱萸 焦薑 補骨脂酒炒 萸

芩 五味子二兩 粉甘草炙一兩 煉蜜丸或山藥糊丸桐子大每

服六七十丸或百丸滾白湯下如氣虛者加人參或二兩或

四兩尤妙

聖朮煎

治飲食偶傷或吐或瀉胸膈痞悶或脇肋疼痛或過用剋伐

等藥致傷臟氣而脈息無力氣怯神倦者速宜用此不得因

其虛滿虛痞而畏用白朮此中虛實之機貴乎神悟也若痛

脹覺甚者即以此煎送神香散最妙若用治寒溼瀉嘔吐證

成方切用

九炷丹 聖朮煎

聖 卷十三

尤為聖藥

白朮用冬朮味甘者炒五錢 乾薑炒 赤肉桂一二錢 陳皮不用或

若治虛寒瀉痢嘔吐等證則人參甘草之類當隨宜加用

若治中虛感寒則麻黃柴胡之類亦隨宜加用

成方切用卷十四目錄

消暑門 正方二十 附方二十四

消暑丸

黃連消暑丸

小半夏茯苓湯方見燥溼門

四味香薷飲

黃連香薷飲

三物香薷飲

六味香薷飲

縮脾飲

成方切用

目錄

下 消暑門 卷十四

大順散

來復丹方見祛寒門

枇杷葉散

冷香飲子

桂苓甘露飲

又桂苓甘露飲

清暑益氣湯

黃耆人參湯

清燥湯

二妙散

三妙散

補肝湯

六一散

益元散

碧玉散

溫六丸

吳萸六一散

五苓散

竹葉石膏湯

人參白虎湯

生脈散

五味子湯

成方切用

補氣湯

水葫蘆丸

大黃龍丸

潑火散

總論消暑諸方

雞蘇散

青六丸

三生益元散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

消暑門  
卷十四

成方切用卷十四

消暑門

暑本夏月之熱病左傳陰陽人於樹下其名久矣在仲景謂之中暈凡盛暑烈日之時或於長途或於田野不辭勞苦致病頭眩煩躁肌體大熱大渴等證遇無汗者必以得汗為正治宜先散外邪得汗已方清其內若多汗者宜察氣之虛實火之微甚或清或補可也亦有畏暑貪涼不避寒氣或於溪堂大廈或於風地樹陰或乍熱乍寒之時不謹衣被以致寒邪襲於肌表而病發熱惡寒頭痛無汗身形拘急肢體痠疼等證惟宜溫散為主當以傷寒法治之又痛等證治宜溫中為主苟其不分表裏不察陰陽則殺人慘於刀

消暑丸

治伏暑煩渴發熱頭痛脾胃不利

成方切用

半夏一觔醋五 茯苓 甘草 半觔

湯下有痰心胃湯下

長夏炎蒸溼土司令故暑必兼溼證見便祕煩渴或吐或利

者以溼勝不得施化此方不治其暑頗治其溼用半夏茯苓

行水之藥少佐甘草以和其中半夏用醋煮者醋能開胃散

水斂熱解毒也使暑氣溼氣俱從小便下降則脾胃和而煩

渴自止矣 熱蒸其溼是為暑無溼則但為乾熱而已非暑也

本方一黃連二錢名黃連消暑丸治伏暑煩渴而多熱痰

小半夏茯苓湯 金匱

治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸

方見燥溼門

四味香薷飲

治感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重或煩渴或吐瀉

香薷一斤厚朴薑汁炒藳豆炒五錢黃連三錢冷服香薷辛熱必

謂治溫以清涼而行之也熱服作瀉

香薷辛溫香散能入脾肺氣分發越陽氣以散皮膚之蒸熱

厚朴苦溫除溼散滿以解心腹之凝結藳豆甘淡能消脾胃

之暑溼降濁而升清黃連苦寒能入心脾清熱而除煩也

珍曰有處高堂大厦而中暑者緣納涼太過飲冷太多陽氣

為陰邪所遏反中入內故見頭痛惡寒之證用香薷以發越

陽氣散水和脾則愈王履曰此非中暑蓋亦傷寒之類爾按

香薷乃夏月發汗之藥其性溫熱只宜於受寒之人若暑火

成方切用四味香薷飲證服之反成大害凡元氣虛者用之適足以招

暑今人謂能解暑藥用代茶是開門揖盜也

除藳豆名黃連香薷飲治中暑熱盛口渴心煩或下鮮血

過加茯苓治痺瘡獨熱不寒曰痺瘡當責之暑邪除黃連加

木瓜甘草香附陳皮蒼朮紫蘇名二香散蓋合香薷飲香治

外感內傷身熱腹脹除黃連名三物香薷飲治傷暑嘔逆泄

瀉再加茯苓甘草名五物香薷飲驅暑和中再加木瓜名六

味香薷飲治中暑溼盛再加人參黃耆白朮陳皮名十味香

薷飲治暑溼內傷頭重吐利身倦神昏喻嘉言曰傷寒夾陰

濕傷暑夾陰誤用香薷飲入喉便後發於香薷飲之便

中加人參黃耆白朮陳皮木瓜兼治內傷誠有見也三物香

薷飲加羌活防風治夏月僵仆手足搐搦名暑風或再加黃

香薷藥

縮脾飲

清暑氣除煩渴止吐瀉霍亂及暑月酒食所傷

藳豆炒乾葛二兩砂仁草果煨去烏梅甘草炙每服

四錢

暑必兼溼而溼屬脾土暑溼合邪脾胃病矣故治暑必先去

溼砂仁草果辛香溫散利氣快脾消酒食而散溼藳豆專解

中宮之暑而滲溼溼盛則葛根能升胃中清陽而生津

多燥則葛根生津烏梅清熱解渴甘草補土和中

大順散

成方切用縮脾飲大順散 來復丹

治暑伏熱引飲過多脾胃受溼水穀不分清濁相干陰陽

氣逆霍亂吐瀉臟腑不調

乾薑 桂 杏仁去皮甘草 等分先將甘草用白砂炒次

入薑杏炒過篩去砂淨合桂為末每服二三錢湯點服

夏月過於飲冷食寒陽氣不得伸越故氣逆而霍亂吐瀉也

脾胃喜燥而惡溼喜溫而惡寒乾薑肉桂散寒燥溼杏仁甘

草利氣調脾皆辛甘發散之藥升伏陽於陰中亦從治之法

也吳鶴皋曰此方非治暑乃治暑月飲冷受傷之脾胃

不從治之法

來復丹

治伏暑泄瀉身熱脈弱

方見祛寒門補火丸附方內

枇杷葉散

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉去毛 陳皮去白 丁香 厚朴去皮薑汁 白茅根 麥

門冬 乾木瓜 甘草 香薷半錢 擣羅爲末每服二錢水

一盞生薑三片煎七分溫服溫湯調服亦得如煩躁用井花

水調下小兒三歲以下可服五分更量大小加減

冷香飲子

治傷暑口渴霍亂腹痛煩躁脈沈微或伏

成方切用

附子炮 陳皮錢一 甘草炙 草果錢半 水盞半薑十片煎八分去

渣井水頓冷服

桂苓甘露飲

治中暑受溼引飲過多頭痛煩渴溼熱便祕

滑石四兩 石膏 寒水石 甘草二兩 白朮 茯苓 澤瀉一兩 猪

苓 肉桂錢五 每服三錢或五錢此五苓六一之合劑以清

六腑之熱也

張子和去猪苓減三石一半加人參乾葛各一兩 藿香木香各一

錢減桂只用一錢每服三錢亦名桂苓甘露飲治伏暑煩渴

脈虛水逆渴飲飲水入

清暑益氣湯

東垣

治長夏溼熱炎蒸四肢困倦精神減少胸滿氣促身熱心煩

口渴惡食自汗身重肢體疼痛小便赤澀大便溏黃而脈虛

者暑溼蒸人脾土受傷故肢倦便溏暑熱傷肺故氣促心煩

爲心液故自汗溼盛故身痛身重寒傷形表邪外盛

故脈大而有餘暑傷氣元氣耗傷故脈虛而不足

黃耆 人參 白朮 蒼朮 神麴 青皮 陳皮 白甘草

麥冬 五味 當歸 洗酒黃蘗 炒酒澤瀉 升麻 葛根 薑

棗煎 熱傷氣參者益氣而固表溼傷脾二朮燥溼而強脾火盛則

金病而水衰故用麥冬五味以保肺而生津肺爲水之上源

成方切用 清暑益氣湯 五 卷十四 消暑門

不能生水麥冬合用黃蘗以瀉熱而滋水青皮平肝而破滯

人參生脈生津 當歸養血而和陰神麴化食而消積升葛解肌熱而升清

上升能生津液 澤瀉瀉溼熱而降濁陳皮理氣甘草和中合

之以益氣強脾除溼清熱也東垣曰脾虛肺氣先絕故用黃

陰火傷其生發之氣營衛大虧血虛又加黃蘗以救腎水蓋甘寒瀉火

生陰血也更能當歸和血又加黃蘗以救腎水蓋甘寒瀉火

火滅則心氣得平而安也心火乘脾故用炙甘草瀉火而補脾

少用恐滋滿也中滿者去之若腹中急痛急縮者卻宜多用

咳者去人參爲清濁相干故以橘皮理之長夏溼勝故加二

朮澤瀉上下分消其溼熱也溼勝則食不化炒麴辛甘青皮

辛溫消食快氣五味麥冬人參甘微酸寒瀉火熱而益肺金

救庚金也醫貫曰有傷暑吐衄者暑傷心虛不能生血不

宜通用寒涼以傷心宜清暑益氣加丹皮生地犀角之

類蓋暑傷心亦傷氣其脈必虛以參者補氣斯無弊也

除青皮澤瀉乾葛名黃耆人參湯東垣 治暑傷元氣注夏倦怠

胸滿自汗時作頭痛時痛時止除白朮青皮麥冬五味加茯苓豬苓柴胡羌活防風連翹知母名補肝湯東垣治陰汗如水

清燥湯東垣

治肺金受溼熱之邪痿躄喘促胸滿少食色白毛敗頭眩體

重身痛肢倦口渴便秘經曰肺者相傳之官治節出焉火盛

治節故肢體或縱或縮而成痿躄也火上逆肺故喘促肺主

皮毛故色白毛敗溼熱填於膈中故胸滿壅於陽明則食少

上升於頭則眩注於身則體重流於關節則身痛肺受火傷

黃耆錢蒼朮錢白朮錢陳皮錢澤瀉錢人參錢茯苓錢升

成方切用

分黃連錢五味子錢柴胡錢

肺屬辛金而主氣大腸屬庚金而主津燥金受溼熱之邪則

寒水肺生化之源絕源絕則腎水虧金不能生水而痿躄諸證作

矣金者水之母也氣者水之源也黃耆益元氣而實皮毛故

以爲君二朮參苓甘橘神麴健脾燥溼理氣化痰所以運動

其土土者金之母也麥冬五味保肺以生津當歸生地滋陰

而養血黃檗黃連燥溼而清熱黃檗合蒼朮爲二妙散治

麻柴胡所以升清豬苓澤瀉所以降濁使溼熱從小便出則

燥金肅清肺爲高水出高原而諸證平矣朱丹溪曰今世風

混同論治古聖論風痰條目不同治法亦異夫風病外感善

五臟散爲諸證其昏惑癱瘓腎胃暴病鬱冒蒙昧暴痛皆屬  
於火其四肢不舉足痿舌強痰涎有聲皆屬於土悉是溼熱  
之病當作諸痿論治大抵祇宜補養若以外感風邪治之寧  
免實虛虛虛之禍乎或曰內經治痿獨取陽明何也曰只諸  
痿生於肺肺主一語已見大意金體燥而居上主氣畏火者也  
土性溼而居居中主四肢畏木者也嗜欲不節則水失所養  
寡於畏而侮所勝肺得火邪而熱矣肺受熱則金失所養  
木寡於畏而侮所勝肺得火邪而熱矣肺受熱則金失所養  
一身脾傷則四肢不爲人用而諸痿之病作矣瀉南方則肺  
金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而肺經不  
虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿大法無過於此

六一散河間

治傷寒中暑表裏俱熱煩躁口渴小便不通瀉痢熱瘧霍亂

吐瀉下乳滑胎解酒熱毒偏主石淋暑熱皆陽邪在表則發

上則煩渴在下則便秘或熱瀉火氣煎灼精結成石則爲石淋

成方切用六一散

滑石兩甘草兩爲末冷水或燈心湯調下丹溪曰泄瀉及嘔吐生薑湯下

中寒者加硫黃少許

滑石重能清降寒能瀉熱滑能通竅淡能行水使肺氣降而

下通膀胱火退則肺氣下降故能祛暑住瀉止煩渴而利小便也利則大便實

而瀉自止加甘草者和其中氣又以緩滑石之滑降也其

數六一者取天一生水地六成之之義也故又名天水散劉

表裏諸病蓋取其能通除上下三焦溼熱也然唯體盛溼多

之人空服之以解暑利水使溼熱從小便出若無溼之人而

服此則反耗其津液而渴轉甚矣又當用生脈散清癰無

溼之人及肥人內夾虛寒誤用六一散解暑驅溼反促其臟

腑氣絕者比比

爲丁加薄荷少許肺清名雞蘇散加青黛少許肝清名碧玉散加

紅麴五錢名清六九治赤痢赤屬血分受傷紅加乾薑五錢

名溫六九治白痢白屬氣分受傷乾加生柏葉生車前生藕

節名三生益元散治血淋加牛黃治虛煩不得眠除甘草加

吳茱萸一兩名吳萸六一散治溼熱吞酸除滑石加黃耆六

兩大棗煎熱服名黃耆六一散治諸虛不足盜汗消渴凡渴證防

發癰疽宜黃耆六一散吞忍冬丸

五苓散

治暑溼爲病發熱頭疼煩躁而渴

方見燥溼門

成方切用

五苓散 竹葉石膏湯 人參白虎湯 生脈散

八 消暑門 卷十四

竹葉石膏湯

治傷暑發渴脈虛

人參白虎湯

治太陽中暈身熱汗出足冷惡寒脈微而渴

以上二方俱見清火門

生脈散

千金

治熱傷元氣氣短倦怠口渴多汗肺虛而咳肺主氣火熱傷肺故氣短金爲

火制不能生水故口渴氣少故倦怠肺主皮毛虛故汗出虛

火乘肺故欬李東垣曰津者庚大腸所主三伏之時爲庚金

受困若以津液汗大泄溼熱亢甚燥金受困風木無制故風

溼相搏骨節煩疼一身盡痛也○凡溼熱大行金爲火制絕

寒水生化之源致肢體痿

頓腳軟眼黑最宜服之

人參 麥冬分五五味子粒七

肺主氣肺氣旺則四臟之氣皆旺虛故脈絕氣短也人參甘

溫大補肺氣而瀉熱爲君麥冬甘寒補水源而清燥金爲臣

五味酸溫斂肺生津收耗散之氣爲佐蓋心主脈而百脈皆

朝於肺補肺清心則氣充而脈復故曰生脈夏月火旺克金

當以保肺爲主清晨服此能益氣而禦暑也李東垣曰手陽

小腸皆屬足陽明胃大腸主津小腸主液大腸小腸受胃之

陽氣乃能行津液於上焦灌漑皮毛充實腠理若飲食不節

又曰夏月加黃耆甘草服之令人氣力湧出

加陳皮炙甘草名五味子湯蒸餅爲丸名補氣丸治肺虛少

成方切用

水葫蘆丸 大黃龍丸

九 消暑門 卷十四

自汗怔忡再加茯神遠志木通名茯神湯治脈虛欬則心痛

喉中介介或腫

水葫蘆丸

治冒暑毒解煩渴

川百藥煎兩人參錢二麥門冬 烏梅肉 白梅肉 乾葛

甘草兩半爲細末麪糊丸如雞頭實大含化一丸夏月出行

可度一日

按諸葛孔明五月渡瀘溪人不毛分給此丸於軍士故名水

葫蘆曹孟德遙指前有梅林失於未備爾

大黃龍丸



治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食

船上硫黃 硝石一兩 白礬 雄黃 滑石五錢 白麴四兩 五味

研末入麴和勻滴水丸如梧子大每服三十九丸新汲井水下

潑火散 即地榆散

治中暑昏迷不省人事欲死者并治傷暑煩躁口苦舌乾頭

痛惡心不思飲食及血痢

地榆 赤芍藥 黃連 青皮去白 每服三錢漿水調服

若血痢水煎服

喻嘉言總論消暑諸方曰元豐朝立和劑局萃集醫家經驗之方於中暑一門獨詳以夏月暑證五方歷試見聞廣爾其

成方切用

潑火散

十 消暑門 卷十四

取用小半夏茯苓湯不治其暑顧治其溼又以半夏茯苓少加甘草名消暑丸見消暑在消其溼名正言順矣其香薷飲用香薷藊豆厚朴為主方熱盛則去藊豆加黃連為君治其心火溼盛則去黃連加茯苓甘草治其脾溼其縮脾飲則以脾為溼所浸淫而重滯於藊豆葛根甘草中佐以烏梅砂仁草果以快脾而去脾所惡之溼甚則用大順散來復丹以治暑證之多瀉利者又即縮脾之意而推之也其枇杷葉散則以胃為溼所竊據而濁穢故用香薷枇杷葉丁香白茅根之辛香以安胃而去胃所惡之臭甚則用冷香引子以治暑證之多嘔吐者又即枇杷葉散而推之也醫者於熱溼虛寒淺

深緩急間酌而用之其利溥矣而後來諸賢以益虛繼之河

間之桂苓甘露飲五苓三石意在生津液以益胃之虛子和

之桂苓甘露飲用人參葛根甘草藊香木香益虛之中又兼

去濁或用十味香薷飲於局方五味中增人參黃耆白朮陳

皮木瓜益虛以去溼熱乃至東垣之清暑益氣湯人參黃耆

湯又補中實衛以去其溼熱肥白內虛之人所宜服者也中

暑必兼躁煩熱悶東垣倣仲景竹葉石膏湯之制方名清燥

湯仍以去溼為首務夫燥與溼相反者也而清燥亦務除溼

非東垣具過人之識不及此矣又如益元散之去溼而加辰

砂則并去其熱五苓散之去溼而加人參則益虛加辰砂減

成方切用

總論消暑諸方

十一 消暑門 卷十四

桂則去熱白虎湯加人參則益虛加蒼朮則勝溼合之局方則大備矣然尚有未備焉嘗觀暑風一證其卒倒類乎中風而不可從風門索治百一選方雖有大黃龍丸初不為暑風立法管見從而贊之曰有中暈昏死灌之立甦則其方亦可得暑風之一班矣儻其人陰血素虧暑毒深入血分進以此丸寧不立至危殆乎良方復有地榆散治中暑昏迷不醒人事而欲死者但用平常涼血之藥清解深入血分之暑風良莫良於此矣後有用之屢效而美其名為潑火散者知言哉夫中天火運流金燦石而此能潑之益見暑風為心火暴甚煎熬陰血舍清心涼血之外無可撲滅爾綜羣方而論之因

其詳故益加詳焉

成方切用

總論消暑諸方

主

消暑門  
卷十四

成方切用卷十五目錄

燥溼門 正方二十七 附方二十九

五苓散

四苓散

蒼朮五苓散

元戎五苓散

桂苓丸

茯苓白朮湯

春澤湯

二朮四苓湯

成方切用

目錄

茯苓琥珀湯

藹苓湯

豬苓湯

茯苓甘草湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

腎着湯

小半夏加茯苓湯

小半夏湯

越婢湯

加味腎氣丸

辰砂五苓散

茵陳五苓散

豬苓散

澤瀉湯

白茯苓湯

又春澤湯

節庵導赤散

一  
燥溼門  
卷十五

胃苓湯

柴苓湯

防己黃耆湯

防己茯苓湯

舟車丸

瀉川散

疏鑿飲子

實脾飲

五皮飲

麥門冬湯

大分清飲

小分清飲

成方切用

草薢分清飲

縮泉丸

琥珀散

茵陳蒿湯

茵陳三物湯

升陽除溼防風湯

禹功散

羌活勝溼湯

羌活除溼湯

東垣升陽除溼湯

目錄

二 燥溼門 卷十五

大橘皮湯

八正散

防己飲

當歸拈痛湯

蒼朮丸

平胃散

見消導門

成方切用

目錄

三 燥溼門 卷十五

成方切用卷十五

燥溼門

淫病有出於天氣者雨露之屬是也多傷人臟氣有出於地氣者泥水之屬是也多傷人皮膚筋脈有由於飲食者酒醴之屬是也多傷人六腑有由於汗液者如大汗沾衣不遑解換之屬是也多傷人骨髓有淫從內生者以水不化氣陰不從陽而然也悉由脾腎之虧敗其爲證也以在肌表則爲發熱惡寒自汗在經絡則爲痺爲重爲筋骨疼痛腰痛不能轉側四肢痿弱皮痛在肌肉則爲麻木耐腫黃疸按肉如泥不起在臟腑則爲嘔惡脹滿小水秘澀黃赤大便泄瀉腹痛後重視取癰疽等證凡肌表經絡之病淫由外而入者也飲食氣血之病淫由內而生者也此其在外者爲輕在內者爲重是固然矣然及其其也則不爲不淫而不連臟者裏淫而不連經者此其淫病之變不爲不多故凡治此者必當辨表裏察虛實而求其本也然淫證雖多而辨治之法其要惟三則一曰淫熱一曰寒淫一曰風淫蓋淫從土化而分旺四季故時當溫熱則火土合氣而病爲淫熱時值寒涼則水土合德而病爲寒淫此淫病

力切用

五苓散

一

卷十五

之隨時令而爲寒熱也其有與風相搏而病爲風淫者其變尤爲無常凡治淫熱者宜利宜清治寒淫者宜燥宜溫治風淫相搏者或微發其汗或

顧其陽虛其法尤宜通髮矣

九苓散

治太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少  
少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者此湯  
主之及中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水  
入卽吐名曰水逆表以外證未罷言裏以煩渴屬腑言邪熱挾積飲上逆故外水格而  
寒痞滿服瀉心湯不解渴而煩躁小便不利功擅蕩熱導飲及傷  
方程郊倩曰邪在上焦而治在下焦者使濁陰出下竅而清  
陽之在上竅者自能宣化矣心邪不從心瀉而從小便瀉又  
一法也汪詡菴曰此乃正治非通治諸溼腹滿水飲水腫嘔  
又一法也乃厥實而瀉其腑也

逆泄瀉水寒射肺或喘或欬中暑煩渴身熱頭痛膀胱積熱  
便秘而渴霍亂吐瀉痰飲溼瘧身痛身重此皆傷溼之見證也溼勝則脾不運  
上不能制水溢於皮膚則腫脹併於大腸則泄瀉水停心下  
則嘔逆水寒射肺則喘欬暑先入心故煩渴五苓利小水降  
心火故兼治中暑煩渴肺病則金不能生水膀胱熱則陽不  
能化陰故便秘而渴陰陽不利則霍亂吐瀉淫勝則身痛身  
重大抵下不通利則陰陽不能升降而變證多矣

豬苓 茯苓 朮入共十澤瀉一兩六桂半兩按經病當用

暑者加硃砂燈心煎

太陽之熱傳入膀胱之腑故口渴而便不通經曰淡味滲泄爲陽二苓甘淡入肺而通膀胱爲君

成方切用

五苓散

卷五十五

走血分然必上行入肺清其鹹味涌泄爲陰澤瀉甘鹹入腎化源而後能下降利水也

膀胱同利水道爲臣益土所以制水故以朮之苦溫健脾去溼爲佐膀胱者津液藏焉氣化則能出矣故以肉桂辛熱爲使熱因熱用引入膀胱以化其氣使溼熱之邪皆由小水而出也

有大熱如狂小便不利而用此湯者欲使太陽隨經之邪直達膀胱由溺而出也大熱利小便亦釜底抽薪之義陳來章曰治秘之道有三一曰肺燥不能化氣故用蒼朮澤瀉之甘淡以泄肺而降氣一曰脾溼不能升精故用薤白之苦溫以燥脾而升精一曰膀胱無陽不能化氣故用肉桂之辛熱以溫膀胱而化陰使水道通利則上可以止渴中可以去溼下可以泄邪熱也東垣曰五苓散太陽裏之下藥也太陽高則汗而發之下則引而竭之渴者邪入太陽本也當下之使從膀胱出也小便利者不宜用蓋太陽病熱而渴小便若利則胃中津液已耗不宜再用五苓以劫奪其津液也五苓散分陰陽膀胱經之半表半裏也理中湯治吐瀉理中氣而分陰陽也活人云脈浮大是表證當汗其人發熱煩渴

小便赤卻當下此是表裏俱見五苓散主之○裏表之裏也  
太陽本膀胱腑也○五苓利水何以能止渴生津蓋濕熱壅  
於中焦則氣不得施化故津竭而小便不通也○用五苓利其  
小便則濕熱下消津回而渴止矣○內經通因通用之意東  
垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以導其溼傷食者  
有形之物也輕則消利或損穀重則方吐下○若汗下之  
後內亡津液而便不利者不可用五苓恐重亡津液而益虧  
其陰也○勿治之便利自愈○一切陽虛不化氣陰虛而泉竭  
以致小便不利者若再用五苓以  
劫其陰陽禍如反掌不可不慎

去桂名四苓散

李東垣曰無惡寒證不可用桂周揚俊曰五  
苓為渴而小便不利者設若不渴則茯苓甘  
草湯足矣若但加辰砂名辰砂五苓散並治小便不利用二

名三朮五苓散治寒溼加茵陳名茵陳五苓散治溼熱發

黃便祕煩渴加羌活名元戎五苓散治中焦積熱去桂澤瀉

名豬苓散金匱治嘔吐病在膈上思飲水者但用肉桂茯苓等

戒方切用

五苓散

三 燥溼門 卷十五

分蜜丸名桂苓丸治冒暑煩渴引飲過多腹脹便赤但用澤

瀉五白朮二名澤瀉湯治心下支飲常苦眩冒但用茯苓

白朮等分名茯苓白朮湯治脾虛不能制水溼盛泄瀉再加

郁李仁入薑汁服名白茯苓湯治水腫加川楝子治水疝加

人參名春澤湯再加甘草合四君子亦名春澤湯治無病而渴與

病瘥後渴者去桂加蒼朮甘草芍藥梔子黃芩羌活名二朮

四苓湯通治表裏溼邪兼清暑熱倍桂加黃耆如朮之數治

傷暑大汗不止加甘草滑石梔子入食鹽燈草煎名節庵導

赤散治熱蓄膀胱便秘而渴如中溼發黃加茵陳水結胸加

木通合益元散治諸溼淋瀝再加琥珀名茯苓琥珀湯南謙治

小便數而欠頻來而短少也合平胃散名胃苓湯一名對金飲子治

中暑傷溼停飲夾食腹痛泄瀉及口渴便秘此上下分消其

泄瀉有屬風屬溼屬寒屬火此因於外感者也○外感則言七情

感動臟氣不平亦致泄瀉此因於內傷者也○外感則言七情

內則當調五臟又有因飲食所傷而泄者法當消導因風冷

泄者當解散因痰積上焦致大腸不固而泄者當除痰有脾

胃氣虛而泄者當補中益氣使胃氣升騰而泄自止合黃連香薷飲名藳苓湯治傷暑

泄瀉合小柴胡湯名柴苓湯治泄瀉發熱口渴瘧疾熱多寒

少口渴心煩以上三方並加薑棗煎

豬苓湯仲景治陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便不通成氏曰脈浮發熱

水熱在裏也小便不利熱結下焦津液不通熱在表也渴欲飲

字誤也○是脈字下脫一不字也活人云脈浮者五苓散脈沉

成方切用豬苓湯四 燥溼門 卷十五

者豬苓湯按太陽篇五苓散陽明篇豬苓湯桂朮辛甘為陽

主外阿膠滑石甘寒為陰主內若脈浮則常用五苓散若

豬苓矣少陰篇下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠下利不

文誤釋少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠下利不

明矣也渴者陽邪入裏心煩不眠知挾熱也欬而渴嘔有停飲

也渴而下利知小便必不利是熱邪已入膀胱也宜利小便

而便實通治溼熱黃疸口渴渴溺赤五苓湯溼勝故用滑石

豬苓 茯苓 澤瀉 滑石 阿膠兩一

熱上壅則下不通下不通熱益上壅又溼鬱為熱熱蒸更為

溼故心脾而嘔渴便秘而發黃也淡能滲溼寒能勝熱茯苓

甘淡滲脾肺之溼豬苓甘淡澤瀉鹹寒瀉腎與膀胱之溼滑

煩渴不眠要使水道通利則熱邪皆從小便下降而三焦俱

清矣吳鶴臯曰以諸藥過燥故又加阿膠以存津液王好古曰滑石

為至燥之劑徐之才曰燥可去溼桑白皮赤小豆之類是也蓋皆以行水之藥為燥也

茯苓甘草湯 仲景

治傷寒水氣乘心厥而心下悸者先治其水卻治其厥不爾

水漬入胃必作利也太陽證飲水過多水停心下必悸火畏水故心惕然動不安也亦治

傷寒汗出不渴者經曰傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之汗而不渴為邪未入裏故但解表利亦治膀胱腑欬而遺溺

水而兼和中

茯苓 桂枝 兩二 甘草 兩一 生薑 兩三

淡能滲水甘能寧心助陽故用茯苓辛能散飲溫能發汗解

成方切用

茯苓甘草湯 腎著湯

五 燥淫門 卷十五

肌故用薑桂益土可以制水甘平能補氣和中故用甘草

去生薑加白朮名茯苓桂枝白朮甘草湯仲景治傷寒吐下後

心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉發汗則動經身為振

搖者逆滿氣衝寒邪伏飲上搏於胸也故令頭眩沉為在裏且既經吐下復發其汗則陽益虛而津液耗故振搖也

與此湯導飲和 金匱用治心下有痰飲胸脇支滿目眩

腎著湯 金匱一名乾薑苓朮湯

治傷淫身重腹痛腰冷不渴小便自利飲食如故病屬下焦

腎主水淫性下流必舍於其所合而歸於坎勢也腰為腎之腑冷淫之邪著而不移故腰冷身重是著痹也此由身勞汗

出衣裏冷淫宣明用治胞痹膀胱熱痛滿於小便上為清涕

風寒淫邪客於胞中氣不能化故水道不通足太陽經上額絡腦太陽經氣不得下行上入腦而流於鼻則為清涕

乾薑 炮 茯苓 兩四 甘草 多 白朮 兩二 有寒者加附子經心錄加

肉桂澤瀉杜仲牛膝治同

喻嘉言曰腰冷如坐水中非腎之精氣冷也故飲食如故便

利不渴且與腸胃之腑無預況腎臟乎故但用甘溫從陽淡

滲行水之藥足矣

小半夏加茯苓湯 金匱三因名大半夏湯

治卒嘔吐心下痞滿間有水眩悸水氣上逆則嘔停膈間則痞上干於頭則眩凌於心

悸則

半夏 升一 生薑 兩半 茯苓 兩三

半夏生薑行水氣而散逆氣能止嘔吐茯苓寧心氣而泄腎

成方切用

小半夏加茯苓湯 越婢湯

六 燥淫門 卷十五

邪能利小便火因水而下行則悸眩止而痞消矣

除茯苓名小半夏湯金匱治支飲嘔吐不渴亦治黃疸金匱云

渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之○嘔吐津液去必渴不可因渴而遽以為熱除茯苓

生薑加人參白蜜名大半夏湯金匱治反胃食入即吐東垣曰

薑之類治嘔吐但治上焦氣逆表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者唯宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用辛

藥瀉之故服小半夏湯不愈者服大半夏湯立愈此仲景心法也

越婢湯 金匱

治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱者經曰

并沉為石水并浮為風水水在皮膚故脈浮裏無熱故

不渴病本於風故汗出惡風無大熱者熱未盡退也麻黃 兩六 石膏 兩八 生薑 兩三 甘草 兩二 大棗 十二 惡風者加附子

風水在肌膚之間用麻黃之辛熱以瀉肺石膏之甘寒以清

胃肺主通調水道甘草佐之使風水從毛孔中出又以薑棗

為使調和營衛不使其太發散耗津液也胃為十二經之主

若婢經曰脾主為胃行其津液是方名越婢者以脾治水穀為卑臟

防己黃耆湯 全價

治風水脈浮身重汗出惡風及諸風諸溼麻木身痛東垣曰

風人皆知之細核則有區別如久坐亦麻木繩縛之人亦麻

木非有風邪乃氣不行也當補肺氣麻木自去矣亦有因

氣虛而風邪入而踞之所

防己黃耆 兩 白朮 七錢 甘草 炙五錢 每服五錢加薑棗煎

腹痛加芍藥喘加麻黃有寒加細辛氣上衝加桂枝熱腫加

成方切用 防己黃耆湯 七 卷十五

黃芩寒多掣痛加薑桂溼盛加茯苓蒼朮氣滿堅痛加陳皮

枳殼蘇集

防己大辛苦寒通行十二經開竅瀉溼為治風腫水腫之主

藥黃耆生用達表治風注膚痛溫分肉實腠理白朮健脾燥

溼與黃耆並能止汗為臣防己性險而捷故用甘草甘平以

緩之又能補土制水為佐薑棗辛甘發散調和營衛為使也

去白朮薑棗加茯苓 君桂枝名防己茯苓湯 治水在皮膚

四肢聶聶而動名皮水 防己行經絡茯苓善滲泄黃耆達皮

節疼痛名風水脈浮腫按之沒指其腹如鼓不惡風不渴

名皮水當發其汗又云惡寒不渴名風水不惡寒而渴名皮

如藥汁

加味腎氣丸 金匱腎氣丸即桂附八味丸治婦人轉胞無車前

治脾腎大虛肚腹脹大四肢浮腫喘急痰盛小便不利大便

溼黃已成蠱證亦治消渴飲一澀一經曰腎者胃之關也關

類也上下溢於皮膚則為附腫腎消者腎水衰竭龍雷之火

不安其位上炎於肺消渴引飲飲入於胃下無火化直入勝

元地黃補陰壯真水滋腎為治下消之劑

熟地黃 兩 茯苓 三兩 山藥 微炒 丹皮 洗 山萸肉 酒 澤瀉 酒 牛膝

酒車前子 炒 肉桂 兩 附子 五錢 蜜丸

土為萬物之母脾虛則上不能制水而洋溢水為萬物之源

生水腎虛則水不安其位而妄行以致泛濫皮膚肢節之間

成方切用 加味腎氣丸 本 卷十五

因而攻之虛虛之禍不待言矣經曰母虛盛母

滋真陰而能行水補命火因以強脾桂附補命門火火能生

則使溺通加車前利小便而不走氣加牛膝益肝腎藉以下

行使水道通而腫脹已又無損於真元也喻嘉言曰胃為水

之原脾不能散胃之水精於肺而病於中肺不能通胃之水

道於膀胱而病於上腎不能司胃之關時其輪漚而病於下

以致積水浸淫無所不至又曰按此方濟生以附子為君此

薛新甫重訂以茯苓為君然腎之關門不開必以附子為君

蒸動腎氣其關始開胃中積水始下以陽主開故也開即

不用茯苓牛膝車前而水亦下關閉即車前茯苓乎張景岳曰

抑莫如茯苓牛膝車前而水亦下關閉即車前茯苓乎張景岳曰

水腫證乃脾肺腎三臟相干之病蓋水為至陰故其本在腎

水化於氣故其標在脾水畏土故其制在脾今脾虛則氣

不化精而化水脾虛則上不制水而反赴腎虛則水無所主

而妄行求古治法惟全真內加減腎氣湯為對證之方予履

用之無不見效此雖壯水之劑而實即脾肺腎三臟之正治

也蓋腎為先天生氣之源若先天元氣虧於下則後天胃氣失其所本而由脾及肺治節所以不行是以水積於下則氣塞於上而喘脹由生但宜峻補命門使氣復元則三臟必皆安矣今論其方如所用甘附以化陰中之陽也熟地山藥山茱以養陰中之水也茯苓澤瀉以化陰中之濕也此藥通氣化於精即所以治腎也補而不滯利而不伐凡病水腫於中後及氣虛本弱者但能隨證加減用之其應如響諸方之第一更無出其右者又因腫脹之治凡脾腎虛弱如前論加減腎氣湯者誠然善矣然用之之法病當因此虛而治之在呼吸乃以大劑參附熟地之類幸得挽回愈後喜飲未及兩月忽病足股盡腫脹及於腹按之如鼓堅而且硬因其前次之病中氣本傷近日之病又因酒淫度非加減腎氣湯不余遂連進數服雖無所碍然終不見效人皆料其必不可治去補力亦與實漏厄者何異元氣不能復病必不能退遂悉去利水等藥而專用參附理陰煎仍加白朮大劑與之三劑而足腫漸消二十餘劑而腹脹盡退白

成方切用

舟車丸

河間做仲景十棗例製此湯治一切水滯

丸

卷十五

治水腫水脹形氣俱實

腫脹者水道壅遏也形氣俱實者口水先腫上體肩背手肘三陽經陰水先腫下體腰腹腫脹是三陰經腫脹脾腫則腹脹胃腫則腹脹肝腫則腹脹名鼓脹為木橫克土難治脾腫則腹脹胃腫則腹脹為氣虛虛弱為急為氣血俱虛脾腫則腹脹胃腫則腹脹為氣虛虛弱為急為氣血俱虛脾腫則腹脹胃腫則腹脹為氣虛虛弱為急為氣血俱虛

黑牽牛

兩 炒四

大黃

酒浸

甘遂

炒

橘紅

兩 木香

錢五

輕粉

水丸

牽牛大黃大戟芫花甘遂皆行水之厲劑能通行十二經之

水然腫屬於脾脹屬於肝水之不行由於脾之不運脾之不

運由於木盛而來侮之是以不能防水而洋溢也青皮木香

疏肝泄肺而健脾與陳皮均為導氣燥溼之品使氣行則水

行脾運則腫消也輕粉無竅不入能去積痰故少加之然非

實證不可輕投

減芫花大戟青皮陳皮木香加芒硝郁李仁名濬川散豈湯

下五分治同

疏鑿飲子

治遍身水腫喘呼口渴大小便秘上證為溼熱甚而氣實也

脈必沉數陰水見

羌活 秦艽 檳榔 商陸 椒目 大腹皮 茯苓皮

成方切用

疏鑿飲子

實脾飲

十

卷十五

木通 澤瀉 赤小豆 等分加薑皮煎

外而一身盡腫內而口渴便秘是上下表裏俱病也羌活秦

艽解表疏風使溼以風勝邪由汗出而升之於上腹皮苓皮

薑皮辛散淡滲所以行水於皮膚以皮商陸檳榔椒目赤豆

去脹攻堅所以行水於腹裏木通瀉心肺之水達於小腸澤

瀉瀉脾腎之水通於膀胱實為水也上下內外分消其勢亦

猶神禹疏江鑿河之意也

實脾飲

嚴氏

治肢體浮腫色悴聲短口中不渴二便通利脾胃虛寒上不

行而浮腫以無鬱熱故口不渴而便不秘此為陰水嚴氏曰治陰水發腫用此先實脾土



白朮土炒 茯苓 甘草炙 厚朴炒 大腹子 草豆蔻 木香

木瓜 附子 黑薑 加薑棗

脾虛故以白朮甘草補之脾寒故以薑附草蔻溫之脾滯故以大腹茯苓利之脾滯故以木香厚朴導之然土之不足由於木之有餘木瓜酸溫能於土中瀉木兼能行水與木香同為平肝之品使木不尅土而肝和則土能制水而脾實矣水病當以健脾為主使脾實而氣運則水自行宜參苓為君視所挾證加減苟徒用利水藥多致不救醫貴曰治腫滿先以脾土為主宜補中益氣湯六君子湯或疑水脹喘滿而用補劑不益脹滿乎曰肺氣既虛不可復行其氣腎水既衰不可復利其水服補劑初覺不快過時藥力得行漸有條理矣喻嘉言曰治水以實脾為先不但陰水為然然陰水者少陰腎中之真陽衰微不能封閉而泛溢無制爾方中不用桂而用厚朴大腹尚有可議

成方切用

麥門冬湯

士 燥淫門 卷十五

麥門冬湯

治水溢高原肢體皆腫經曰三焦者決瀆之官水道出焉上焦不治水溢高原中焦不治水停中

水畜勝肺 治下焦不治 麥門冬五十枚 粳米五十

吳鶴皋曰肺非無為也飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱肺熱則失其下降之令以致水溢高原淫於皮膚而為水腫醫罕明此實脾導水皆不能愈故用麥冬清肺開其下降之源粳米益胃培乎生金之母此治病必求其本也或問此證何以辨之曰肢體皆腫小腹不急初起便有喘滿此其候也

五皮飲澹寮

治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫

五加皮 地骨皮 茯苓皮 大腹皮 生薑皮 一方五加易陳皮羅氏五加易桑白皮治病後脾肺氣虛而致腫滿五加祛風勝溼地骨退熱補虛生薑辛散助陽水為陰邪大腹下氣行水茯苓滲溼健脾於散瀉之中猶寓補助之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮也

大分清飲

治積熱秘結小水不利或致腰腹下部板痛或溼熱下利黃疸溺血邪熱畜血腹痛淋閉等證

成方切用

五皮飲 大分清飲 小分清飲

主 燥淫門 卷十五

茯苓

澤瀉 木通二錢 豬苓 梔子 枳殼 車前子錢

如內熱甚者加黃芩黃檗龍膽之屬 如大便堅硬脹痛者

加大黃二三錢 如黃疸小水不利熱甚者加茵陳二錢

如邪熱畜血腹痛者加紅花青皮各一錢五分

小分清飲

治小水不利溼滯脹腫不能受補等證

茯苓 澤瀉 豬苓錢二 米仁錢二 枳殼 厚朴錢一 如陰虛

水不能達加生地牛膝各二錢 如黃疸者加茵陳二錢

無內熱而寒滯不行者加肉桂一錢

草薢分清飲

治陽虛白濁小便頻數凝白如油名曰膏淋腎氣虛不能化

既有熱則水道清而清濁不分或敗精滲入東而小便數勝

胞中及服熱藥飲食後滲入皆成淋濁

川草薺 石菖蒲 烏藥 益智仁 甘草稍分減 入鹽服

一方加茯苓

草薺能解陽明厥陰溼熱去濁而分清史國信曰若欲與陽

先分肝火草薺能泄陽明之滲入厥陰清肝火 烏藥能疏邪逆諸氣逐寒而溫腎益

智脾藥兼入心腎固腎氣而散結烏藥益智等分山藥糊丸

石菖蒲開九竅而通心甘草稍達莖中而止痛使溼熱去而

心腎通則氣化行而淋濁止矣此以疏泄而為禁止者也

琥珀散

成方切用 草薺分清飲 琥珀散

治氣淋血淋膏淋砂淋心腎氣鬱清濁相干熱奇勝

而痛膏淋便出如膏砂淋精結成石勞淋遇勞即發冷淋寒

戰後溼大抵多屬於熱熱其生溼則水液渾濁而為淋若冷

氣滯於膀胱而作淋者十無一二也

滑石 二琥珀 木通 菖蒲 木香 當歸 鬱金妙

為末服

滑石滑可去著利竅行水篇蓄苦能下降利便通淋琥珀能

降肺氣通於膀胱木通能瀉心火入於小腸小腸為心之腑

應於心者其水必自小腸滲入膀胱經所謂胞移熱於膀胱則溼濁血是也 血淋由於血亂當歸

能引血歸經氣淋由於氣滯木香能升降諸氣諸淋由心肝

火盛鬱金能涼心散肝下氣而破血也大法鬱金用開鬱

青皮木香行氣諸藥

牛膝破血黃藥生地滋陰東垣用藥凡例小腹

用青皮疏肝黃藥滋腎蓋小腹小便乃肝腎部位

茵陳蒿湯 仲景

治傷寒陽明病但頭汗出腹滿口渴二便不利溼熱發黃服

沉實者經曰陽明病發熱汗出此為熱越則不發黃若但頭

黃黃者脾胃之色也熱甚者身如橘色汗如漿汁頭為諸陽

之會熱蒸於頭故但頭汗而身無汗夫熱外越則不裏鬱下

溼則不內存今便既不利身又無汗故鬱而為黃內有實熱

故渴熱甚則津液內竭故小便不利凡熱在裏熱入血室

及水結胸膈皆有頭汗之證乃傷寒傳變故與雜病不同○溼

在經則日晡發熱鼻塞在關節則身痛在臟腑則濡泄小便

反滿腹或脹滿溼熱相搏則發黃熱勝色明而便燥溼勝色

晦而使溼又黃病與溼相似但溼病在表一身盡痛黃病

在身不痛

茵陳 六兩 大黃 二兩 梔子 十四枚炒

成方切用 茵陳蒿湯 禹功散

茵陳發汗利水以泄太陰陽明之溼熱故為治黃主藥梔子

為臣大黃為佐分泄前後則腹得利而解矣茵陳梔子能導

大黃能導溼然由大便出

大黃易黃連名茵陳三物湯治同加厚朴枳實黃芩甘草入

生薑燈草煎名茵陳將軍湯治同去梔子大黃加附子乾

薑治寒溼陰黃前證為陽黃如身黃而色暗者為陰黃宜此

下之無汗為表實宜汗之或吐之若小便清是無熱也仲景

云發黃小便自利當與虛勞門小建中湯自利腹滿而喘不

可除熱而除之必噉小半夏湯主之王海藏曰內感傷寒勞

役形體飲食失節中州變寒病生黃非外感而得只宜理中

大小建中等方

禹功散 子和

治寒溼水疝陰囊腫脹囊如水晶陰汗不絕謂之疝得之

二便不利寒溼所凝不

黑牽牛四兩茴香一兩為末每一錢薑汁調下或加木香一

兩

牽牛辛烈能達右腎命門走精隧行水泄溼兼通大腸風秘

氣秘茴香辛熱溫散能暖丹田祛小腸冷氣同入下焦以泄

陰邪也

升陽除溼防風湯東垣

治大便秘塞或裏急後重數至圕而不能便或有白膿或血

慎勿利之利之則必至重病反鬱結而不通矣以此湯升舉

成方切用升陽除溼防風湯 羌活勝溼湯

五燥溼門 卷十五

其陽則陰自降矣通大便有用升

蒼朮四錢防風二錢茯苓 白朮 芍藥錢一如胃寒泄瀉腸

鳴加益智半夏各五分薑棗煎

蒼朮辛溫燥烈升清陽而開諸鬱故以為君白朮甘溫茯苓

甘淡佐之以健脾利溼防風辛溫勝溼而升陽白芍酸寒斂

陰而和脾也劉宗厚曰飲食入胃輪精心肺氣必上行然後

泄利者法當填補中氣升之舉之不

可疏下此東垣發前人所未發也

羌活勝溼湯局方

治溼氣在表頭痛頭重或腰脊重痛或一身盡痛微熱昏倦

也溼熱則為熱然溼乃陰邪故微熱而昏倦

羌活 獨活錢一川芎 藁本 防風 甘草分五蔓荊子分三

如身重腰中沉沉然中有寒溼也加酒洗漢防己附子

經曰風能勝溼羌獨防藁蔓皆風藥也溼氣在表六者辛

溫升散又皆解表之藥使溼從汗出則諸邪散矣藁本善治

荆防善散太陽風溼二活祛風勝溼兼通關節川芎能升厥

陰清氣上治頭痛甘草助諸藥辛甘發散為陽氣味甘平發

中有若水溼在裏則當用行水滲洩之劑喻嘉言曰經曰溼

補也若水溼在裏則當用行水滲洩之劑喻嘉言曰經曰溼

易下之則難故當變常法而為表散吳鶴皋曰脾弱溼傷者

發黃者五皮茵陳之類主之今溼流關節非前藥所宜矣無

效不入唯風為能故凡風濕之病非風藥不能到也三因用

此湯加柴胡五分治臥而多驚悸多驚悸者邪在少陽厥陰

也如淋加澤瀉五分經曰肝腎之病同一治此下焦風寒三

成方切用大橘皮湯

經合病非風藥行經不可也大橘皮湯

除獨活蔓荊川芎甘草加升麻蒼朮名羌活除溼湯治風溼

相搏一身盡痛除川芎加黃耆當歸蒼朮升麻名升陽除溼

湯治水疝腫大陰汗不絕再加麥芽神麴豬苓澤瀉除當歸

黃耆亦名升陽除溼湯東垣治脾虛瀉痢

大橘皮湯

治溼熱內攻心腹脹滿小便不利大便滑瀉小便併於大腸

滑瀉及水腫等證

滑石錢六甘草 赤茯苓錢一豬苓 澤瀉 白朮七錢桂分五陳皮

錢木香 檳榔分三加薑煎每服五錢

赤茯苓澤瀉瀉火行水白朮補脾肉桂化氣此五苓散也  
滑石清熱利溼甘草瀉火調中此六一散也溼熱內甚故加  
檳榔峻下之藥陳皮木香行氣之品使氣行則水行以通小  
便而實大便也

八正散局方

治溼熱下注咽乾口渴少腹急滿小便不通溼熱下注小腹急滿則小便當  
行矣而卒不行或淋痛尿血或因熱為腫

車前子 木通 瞿麥 篇蓄 滑石 甘草稍 梔子炒  
大黃 加燈草煎一方加木香

木通燈草清肺熱而降心火肺為氣化之原心為小腸之合  
成方切用 八正散 主 燥溼門 卷十五

也車前清肝熱而通膀胱肝脈絡於陰器膀胱津液之腑也  
瞿麥篇蓄降火通淋此皆利溼而兼瀉熱者也滑石利竅散  
結梔子大黃苦寒下行此皆瀉熱而兼利溼者也甘草稍者  
取其徑達莖中甘能緩痛也雖治下焦而不專於治下必三  
焦通利水乃下行也未用藥口小便不通有熱有溼有氣結  
如不因肺燥但膀胱有熱則瀉膀胱此正治也如因肺燥不  
能生水則當滋脾健胃此謂隔三車前子茯苓清肺也黃芩  
黃芩瀉肺熱也若水自走脾健胃也又曰小便不通屬氣  
虛血虛實熱痰閉皆宜用之以升其氣氣升則水自降氣虛  
用參朮升麻等先服後吐或就參耆藥中調理吐之血虛用  
四物湯先服後吐或就芍藥湯探吐之痰多二陳湯先服後  
吐或加香附木通通實熱當利之或八正散蓋大便動則小便  
自通矣或問以吐法通小便其理安在曰譬如滴水之  
器上竅閉則下竅無自以通必上竅開而下竅始出也

當歸拈痛湯東垣

治溼熱相搏肢節煩痛肩背沉重或偏身疼痛或腳氣腫痛  
腳膝生瘡膿水不絕及溼熱發黃脈沉實緊數動滑者溼熱

則痛足膝腫痛溼熱下注也發黃溼熱薰蒸脾胃也腳氣多  
主水溼亦有夾風夾寒之異溼熱勝而為病或成水泡瘡或  
成赤腫丹毒或如疔氣攻上引下俱可用此湯損益為治  
凡手足前廉屬陽明後廉屬少陽外廉屬少陽內廉屬厥陰  
內前廉屬太陰內後廉屬少陰以管貼身垂下大指居前小  
指居後定之手足痛者當分是經絡用本經藥為引行其  
氣血則愈太陽羌活防風陽明升麻白芷葛根少陽柴胡  
厥陰吳茱萸川芎青皮太陰蒼朮白芍少陰獨活細辛

茵陳 羌活 防風 升麻 葛根 蒼朮 白朮 甘草  
黃芩 酒 炒 苦參 酒 炒 當歸 豬苓 澤瀉 知母 一方加人

參 成方切用 當歸拈痛湯 太 燥溼門 卷十五

羌活透關節防風散留溼為君升葛味薄引而上行苦以發  
之白朮甘溫和平蒼朮辛溫雄壯健脾燥溼為臣溼熱相合  
肢節煩痛苦參黃芩知母茵陳苦寒以泄之酒炒以為因用  
血壅不流則為痛當歸辛溫以散之入參甘草甘溫補養正  
氣使苦寒不傷脾胃治溼不利小便非其治也豬苓澤瀉甘  
淡鹹平導其畱飲為佐上下分消其溼使壅滯得宣通也王  
微義曰此方東垣本為治腳氣  
溼熱之劑後人用治諸瘡甚驗

防已飲

治腳氣足脛腫痛憎寒壯熱腳氣自外感得者山嵐瘴水或  
茶酒油麵溼熱之毒有溼有熱皆下流故注於足溼熱分  
乎淫勝則憎寒熱勝則壯熱有頭痛諸證者狀類傷寒但

脛腫掣痛為異爾此病忌用補劑及淋洗以溼熱得地處也亦不宜大瀉治之喜通而惡塞若腳氣衝心喘急不止嘔吐不休者死水凌火故也○先痛而後腫者氣傷血也先腫而後痛者血傷氣也筋脈弛張腫痛者名淫腳氣宜利溼疎風踴縮枯細不腫而痛者名乾腳氣即熱也宜潤血清燥

防己 木通 檳榔 生地 酒洗 川芎 白朮 炒 蒼朮 炒 鹽 黃蘗

炒 甘草稍 犀角 熱加黃芩時令熱加石膏肥人有痰加

竹瀝薑汁或南星大便秘加桃仁紅花小便赤澀加牛膝或

木瓜薏苡仁

防己行小療風瀉下焦之溼熱檳榔攻堅利水墜諸藥使下

行木通降心火由小腸出草梢泄脾火徑達腎莖黃蘗生地

滋腎陰而涼血解熱蒼白二朮燥脾溼而運動中樞腫由血

成方切用

防己飲 蒼朮丸

五 燥溼門 卷十五

鬱川芎行血中之氣痛由肝實犀角涼心而清肝合之以清

熱利溼消腫止痛也

蒼朮丸

治寒溼在脾泄瀉久不能愈者

眞茅山蒼朮 米泔浸一宿切如無即好白朮代之八兩破故紙酒浸曬 白芍 炒 黃

四厚朴 薑汁 雲苓 二甘草 炙 川椒 去閉口者 小茴香 炒 一

爲末糯米糊爲丸桐子大每服食遠清湯下七八十丸

成方切用卷十六目錄

潤燥門 正方二十八 附方七

麥門冬湯

炙甘草湯

清燥救肺湯

通幽湯

當歸潤肺湯

濟川煎

潤腸丸

活血潤燥丸

潤燥湯

成方切用

目錄

一 潤燥門 卷十六

又潤腸丸

決津煎

韭汁牛乳飲

活血潤燥生津湯

甘露飲

桂苓甘露飲

小甘露飲

消渴方

地黃引子

治久嗽方

瓊玉膏

麻仁蘇子粥

桑白皮等汁十味煎

滋燥養營湯

白茯苓丸

文蛤散

黃耆湯

宣明黃耆湯

宣明麥門冬飲子

易老麥門冬飲子

豬膏湯

成方切用

豬膏金銀花酒

豬膏髮煎

人參白虎湯

竹葉石膏湯

甘麥大棗湯

目錄

二

潤燥門  
卷十六

成方切用卷十六

潤燥門

內經病機十九條獨遺燥氣他凡秋傷於燥皆謂秋傷於溼歷代諸賢隨文作解弗察其訛賴喻嘉言特為正之大意謂春傷於風夏傷於暑長夏傷於溼秋傷於燥冬傷於寒覺六氣配四時之旨與五運不相背戾而千古之大疑始一抉也夫燥金所傷木摧肝木甚則自戕肺金蓋肺金主氣而治節行焉此惟土生之金堅剛不撓故能生殺自由紀綱不紊若病起於秋而傷其燥金受火刑化剛為柔方圓且隨型流欲仍清肅之舊其可得耶經謂欬不止而出白血者死白血謂色淺而似肉似肺者非肺金白創何以有此試觀草木青莢可掬一乘金氣忽焉改容焦枯上首而燥氣先傷上焦華蓋豈不明耶此則病機之諸氣臆變皆屬於此諸痿喘嘔皆屬於上二條明指燥病之言矣生氣通天論秋傷於燥上逆而欬發為痿厥燥病之要一言而終與病機二條適相脗合矣要知肺氣不燥則諸氣稟清肅之令而過身四達亦何致臆鬱耶諸痿喘嘔之屬於上者上亦指肺不指心也若統上焦心肺並言則

成方切用

麥門冬湯

卷十六  
潤燥門

心病不主痿喘及嘔也惟肺燥甚則肺葉痿而不用肺氣逆而喘鳴食難過膈而嘔出三者皆燥證之極者也經文原有逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿之文其可稱為溼乎其左肢脇痛不能轉側脇乾面塵身無膏澤足外反熱腰痛驚駭筋攣丈夫癰疽婦人少腹痛目味背瘡則燥病之本於肝而散見不一者也肝臟見燥證固當急救肝葉勿令焦損然清其肺金除其燥卡尤為先務若肺金自病不及於肝即顧力救肺焦枯且恐立至尙可分功緩同手

治火氣上逆咽喉不利

麥門冬七升半夏一升人參三兩甘草二兩大棗十二枚粳米三升水一

斗二升煮六升服一升日三夜一喻嘉言曰此胃中津液乾枯虛火上炎之證用寒涼藥而火反升徒知與火相爭知母貝母屢施不應不知胃者肺之母氣也仲景於麥冬人參梗

米甘草大補中氣大生津液隊中增入半夏之辛溫一味用以利咽下氣此非半夏之功實善用半夏之功擅古今未有之奇矣

炙甘草湯 仲景

治傷寒脈結代心動悸及肺痿欬唾多心中溫溫液液者  
向中止能自還者曰結不能自還曰代氣血虛衰不能相續也心中動悸實氣內虛也肺痿濁唾多者以胃中之津液上供悉從燥熱也實鑑用治呃逆

甘草 炙四兩 生薑 桂枝 人參 阿膠 蛤粉炒 生地黃 麥冬 心麻仁 研半 大棗 十二枚 水酒各半煎內阿膠烱化服

人參麥冬甘草大棗益中氣而復脈生地阿膠助營血而寧

成方切用 清燥救肺湯 二 潤燥門

心麻仁潤滑以緩脾胃薑桂辛溫以散餘邪加清酒以助藥

力也聖濟經云津液散為枯五臟痿弱營衛涸流淫劑所以潤之麻仁阿膠麥冬地黃之甘潤經益血復脈通陽也

此仲景傷寒門中之聖方也予余選用治虛勞外傷用肺痿實竟本方所治亦何止此哉外家所取在於益氣之虛潤肺金之燥至於桂枝辛溫則有不宜不知桂枝能通營致津液則肺氣能轉輸運以漸而下尤為要緊所以云治心中溫溫液液也吐涎沫而不效不為必遺尿小便數血此屬陰虛火熱甚也吐涎沫而不效不為必遺尿小便數以上虛不能制下此肺中冷也必涎涎唾用炙甘草乾薑湯以溫之○肺痿延睡多心中溫溫液液者用炙甘草湯此補虛勞也與補陰虛火熱不同故肺痿有寒熱之異

清燥救肺湯

治諸氣膈鬱諸痰喘嘔

二桑葉 經霜者得金氣而柔順不 石膏 稟清肅之氣極清甘  
潤取之為君去枝梗三錢 肺熱二錢半 草 金一錢 人參 生胃之津養 胡麻仁 炒研 真阿膠 八錢 麥門冬 去心一分 杏仁 泡去皮尖 枇杷葉 一片刷去毛 水一碗煎六分頻頻滾熱服痰多加貝母瓜蒌血枯加生地黃熱甚加增

石膏 喻嘉言曰諸氣膈鬱之屬於肺者屬於肺之燥也而古今治

氣鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之燥者諸痿喘嘔之屬於上者亦屬於肺之燥也而古今治法以痿嘔屬陽明以

喘屬肺是則嘔與痿屬之中下而唯喘屬之上矣所以千百方中亦無一方及於肺之燥也即喘之屬於肺者非表即下

成方切用 清燥救肺湯 三 潤燥門

非行氣即瀉氣間有一二用潤劑者又不得其肯綮總之內

經六氣脫誤秋傷於燥一氣指長夏之溼為秋之燥後人不

敢更端其說置此一氣於不理即或明知理燥而用藥夾雜

如弋獲飛蟲茫無定法示人也今擬此方名清燥救肺湯大

約以胃氣為主胃土為肺金之母也其天門冬雖能保肺然

味苦而氣滯恐反傷胃阻痰故不用也其知母能滋腎水清

肺金亦以苦而不用其他苦寒降火傷胃之藥尤在所忌蓋

肺金自至於燥所存陰氣不過一綫爾儻更以苦寒下其氣

傷其胃其人尚有生理乎誠做此增損以救肺燥變生諸證

如沃焦救焚不厭其煩庶克有濟爾

通幽湯 東垣

治幽門不通上衝吸門噎塞不開氣不得下大便艱難名曰

下脘不通治在幽門 下脘即幽門胃之下口也人身上下有

即會厭氣喉上掩飲食者也衝其吸入之氣不得下歸肝腎

為陰火所拒故隔噎不通渴陰不得下降而大便乾燥不行

胃之滯與陰火俱在其中則腹脹作矣治在幽門使幽門通

利泄其陰火調其燥血生其新血則幽門通吸門亦不受邪

是渴陰得下歸地也

當歸身 升麻 桃仁 紅花 甘草 原生地 原熟地

或加檳榔

當歸二地滋陰以養血桃仁紅花潤燥而行血檳榔下墜而

破氣滯加升麻者天地之道能升而後能降清陽不升則濁

成方切用 通幽湯 濟川煎

陰不降經所謂地氣上為雲天氣下為雨也 李東垣曰陰經

大便難者取足少陰夫腎主五液津液是則大便如常若饑

飽勞役損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪火伏血中

耗散其陰津液虧少故大便燥結少陰不得大便以幸潤之

太陰不得大便以幸潤之得食者以苦泄之血燥者以桃仁

酒製大黃通之風燥者以麻仁加大黃利之氣塞者以杏仁

杏仁卑角仁潤之不可藥用牽牛巴豆之類下之損其津液

暫得通快燥結加大黃麻仁名當歸潤腸湯治同

愈其遂成不救

濟川煎

凡病涉虛損而大便閉結不通則硝黃攻擊等劑必不可用

若勢有不得不通者宜此主之此用通於補之劑也

當歸三五 牛膝二 肉苁蓉 酒洗去鹹 澤瀉 一分 升麻 五七分

枳殼一錢虛甚 如氣虛加人參無妨碍 如有火加黃芩

腎虛加熟地

潤腸丸 東垣

治腸胃有伏火大便秘澇全不思食風結血結 風結即風秘

傳於大腸或素有風病者亦多秘氣秘由氣不升降血秘由

亡血血虛津液不足熱秘由大腸熱結冷秘由冷氣橫於腸

胃凝陰固結津液不通非燥糞也仲景曰脈浮而數能食不

大便者此為實名曰陽結脈沉而遲不能食身體重大便反

難名曰陰結李東垣曰實秘熱秘即陽結

也宜散之虛秘冷秘即陰結也宜溫之

大黃 歸尾 羌活 錢桃仁 研 大麻仁 去殼 蜜丸一方有

防風風溼加秦艽卑角子 性用

歸尾桃仁潤燥活血羌活搜風散邪大黃破結通幽麻仁滑

腸利竅血和風疏腸胃得潤則自然通利矣 朱丹溪曰古方

成方切用 潤腸丸 決津煎

氣品劑蓋肺氣不降則難傳送用枳殼沉香調子杏仁等是

也又老人虛人風人津液少而秘者宜滑之用胡麻麻仁阿

膠等是也如妄以峻藥逐之則精液走

氣血耗雖暫通而即秘矣必發生他證

加防風卑角仁蜜丸名活血潤燥丸治同 卑角得澤則滑

去羌活加升麻紅花生熟二地名潤燥湯 俱東垣方治同

熟當歸酒浸枳實炒等分蜜丸亦名潤腸丸治痔病肛門燥

澀

決津煎

治婦人血虛經滯不能流暢而痛極者當以水濟水若江河

一決而積垢皆去宜用此湯隨證加減主之此用補為瀉之

神劑也



當歸三五錢 肉桂一二錢 熟地二錢或五錢 烏藥錢或不用亦可

錢一 如嘔惡者加焦薑一二錢 如陰滯不行者非加附子

不可 如氣滯而痛脹者加香附一二錢或木香七八分

如血滯血澇者加酒炒紅花一錢 如小腹不煖而痛極

者加吳茱萸七八分 如大便結澇者加肉蓯蓉三錢或鎖

陽亦可煮粥彌佳 如氣虛者宜少用澤瀉烏藥之類甚者

不用亦可

### 韭汁牛乳飲 丹溪

治胃脘有死血乾燥枯槁食下作痛翻胃便秘胃脘有死血  
躁暴多怒積久而成癥熱也枯槁者血聚則肝氣燥燥熱故  
槁也瘀血阻礙故食下作痛翻胃而吐出也瘀血不去則新

### 成方切用

韭汁牛乳飲

六

卷十六

血不生故腸枯而便秘。腸鳴翻胃多因氣血兩虛胃脘痛  
冷而成飲可下而食不下槁在吸門即喉間之會厭也食下  
胃脘痛須臾吐出槁在賣門胃之上口也此上焦名噎食下  
焦久吐出槁在兩門胃之下口也此中焦名膈食吞吐槁  
在兩門小腸下口也此下焦名翻胃又有寒痰瘀  
血食積壅塞胃口者或補或消或潤宜隨病施治

韭菜汁 牛乳 等分時時呷之有痰阻者加薑汁一方去

牛乳加陳酒治血膈尤捷

韭汁辛溫益胃消瘀牛乳甘平潤燥養血瘀去則胃無阻血

潤則大腸通而食得下矣 治噎膈諸藥非汁散於竹瀝薑汁

血虛根汁止嘔芽根汁涼血甘汁和胃芽根汁消食芽根汁殺

蟲或加燒酒米醋白蜜和諸汁煎服亦佳朱丹溪曰反胃噎

膈大便燥結宜牛羊乳時時呷之兼服四物湯為上策不可

服人乳人乳有五味之毒七情之害也。按噎膈不通服香

燥藥取快一時破氣而燥血是速其死也不如

少服藥飲牛乳加韭汁或薑汁或陳酒為付

活血潤燥生津湯 丹溪

治內燥津液枯少

當歸 白芍 熟地黃錢 天冬 麥冬 栝蘂八分 桃仁研紅

花五分

歸芍地黃滋陰養血枯槁二冬潤燥生津桃仁紅花活血去

瘀凡陰虛血燥而兼痰滯者此方最宜

甘露飲

治胸中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿血吐血衄血目瞼

垂重常欲合閉或即饑煩不欲食飲及目赤腫痛不任涼藥

口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發皆可服之又治脾胃受溼痰

### 成方切用

活血潤燥生津湯

甘露飲

七

卷十六

熱在裏或醉飽房勞溼熱相搏致生疳病身目皆黃肢體微

腫胸滿氣短大便不調小便黃澀或時身熱

生地 熟地 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼

枇杷葉 甘草 一方加桂荅名桂荅甘露飲

此方創自潔古老人朱丹溪以為此心肺胃三經藥也主治

胸中客熱口臭齒爛心煩咽痛等證許學士又去麥冬加犀

角主治與上略同別如眼赤并一切瘡瘍已散未散皆可治

之然小甘露飲去熟地者以手陽明胃與腎無相關之勢故

加桔梗使與裏合治胃則以腎為關故加熟地二冬也 按此

固本丸為主而加入他藥原因胃中溼熱下流歸坎則水源

濁泛故見證如此而當日立方之意實從救腎起見清胃者



麻仁蘇子粥 本事方

治老人風秘 許叔微曰一婦年八十四忽腹痛頭痛惡心不進食其家憂惶子辨前藥皆誤此是老人風秘服藥雖愈全不於胸中則腹脹惡心不思飲食上至於巔則頭痛不語也 此粥兩啜而氣漸下結食如飯及產後大便不通 婦人產後十餘枚漸得通利不藥而愈矣 種疾發胃則多日多則大便不通故難於用藥

大麻仁 紫蘇子 等分洗淨合研再用水研取汁煮粥

麻仁陽明正藥滑腸潤燥利便除風蘇子兼走太陰潤肺通腸和血下氣行而不峻緩而能通故老人產婦氣血兩虛者所宜用也

桑白皮等汁十味煎 許仁則

成方切用 麻仁蘇子粥 桑白皮等汁十味煎

十 調經門

治氣嗽經久將成肺痿乍寒乍熱唾涕稠黏喘息氣上唇口焦乾亦有唾血者漸覺瘦悴小便赤少色敗毛聾此亦成蒸及久嗽成肺癰唾涎成膿出無多少

桑白皮 升地骨皮 三升 二味合煎汁三升 生地汁 升生麥冬汁 二升 生葛

根汁 竹瀝 升生薑汁 白蜜 棗膏 升牛酥 三合 以麥冬

生地葛根竹瀝薑汁和煎減半再內桑皮地骨汁和煎三分

減一再入酥蜜棗膏攪勿停手煎如飴糖夜臥時取一胡桃

大含之稍加至雞子大或盡日丸服亦得桑皮瀉肺行水麥

冬補肺生津地骨退熱除蒸竹瀝清痰通絡 能除痰涎之生

蘗祛寒而溫胃棗膏補土以生金地汁葛汁甘寒以除大熱

白蜜牛酥甘潤以止久嗽也

滋燥養營湯

治火燥肺金血虛外燥皮膚皴揭筋急爪枯或大便風秘肺皮毛肝主筋爪肝血不足風熱勝而筋燥故外見皮毛枯槁肌膚燥癢內有筋急使秘之證

當歸 二錢 洗 生地黃 熟地黃 芍藥 炒 秦艽 防風

甘草 五分 前證為血虛而水涸當歸潤燥養血為君二地滋腎水而補

肝芍藥瀉肝火而益血為臣黃芩清燥肺之火而退陽亢防

散肝膽之風而不燥 防風 秦艽 能養血榮筋防風

乃血藥之使 甘草 甘平瀉火入潤劑則補陰血為

成方切用 滋燥養營湯 白茯苓丸

白茯苓丸

七 調經門

佐使也

白茯苓丸

治腎消因中消之後胃熱入腎消燥腎脂令腎枯燥遂致此

疾兩腿漸細腰腳無力 腎消即下消乃上消中消之傳變候

無病則氣能管束津液其精微者榮養筋骨血脈餘者為

洩肺病則津液無氣管束而精微者水隨洩下如膏油也

茯苓 黃連 花粉 草薢 熟地黃 覆盆子 人參

元參 蛇牀子 七錢 雞肝 鹿皮 炙 龜板 石斛 七錢 蜜

丸磁石湯送下

茯苓降心火而交肺腎連清脾火而瀉心石斛平胃熱而瀉

腎熱地元參生腎水覆盆蛇牀固腎精人參補氣花粉生津

革薛清熱利溼脬脰之脾也能消水穀通小腸膀胱而止  
便數善治膈消磁石色黑入腎補腎益精故加之以為使也  
喻嘉言曰友人病消渴後渴少止反加躁急足膝痠痛予主  
是丸加犀角有醫曰腎病而以黃連犀角治心母乃倒乎予  
曰腎者胃之關也胃熱下傳於腎則關門大開心之陽火得  
以直降於腎心火灼腎燥不能濡子用犀角黃連對治其下  
降之陽光寧為倒乎服之果効再用  
六味地黃丸加犀角而肌澤病起矣

### 文蛤散

本文云渴欲飲水不止者文蛤散主之文蛤一味杵為散以  
沸湯五合和服方寸匙

金匱於小溲微覺不利蚤用文蛤一味治之方書從不錄用  
詎知輭堅之品非劫陰即傷陰獨此一種平善無過兼可利

### 成方切用

文蛤散

黃耆湯

宣明黃耆湯

主

調燥門  
卷十六

水誠足寶乎投傷寒論用此治候以水嚥人面肌膚粟起之  
表證今消渴裏證亦用之蓋取其功擅輭堅且利水微熱爾

### 黃耆湯

治心中煩躁不生津液不思飲食

黃耆 熟地黃 芍藥 五味子 麥冬 天冬 人參

甘草 茯苓 加鼈聚烏梅煎

黃耆人參補氣熟地芍藥補血烏梅五味斂耗生津天冬麥  
冬瀉火補水茯苓淡以利溼甘草甘以和中溼去氣運則脾  
和而思食生津而燥退矣

### 宣明黃耆湯

治心移寒於肺為肺消飲少溲多當補肺平心

黃耆 五味子 人參 麥門冬 桑白皮 枸杞子 熟

地黃 為末每服五錢

### 宣明麥門冬飲子

治心移熱於肺傳為膈消胸滿心煩精神短少

人參 茯苓 麥門冬 五味子 生地黃 甘草 知母

葛根 栝蒌根 等分 咬咀每服五錢加竹葉十四片

喻嘉言曰宣明二方為內經心移寒移熱兩證各出其治一  
種苦心非不可嘉然移寒移熱其勢頗銳而生精養血其應  
差緩情非的對易老門冬飲子亦然子謂心之移寒必先束

### 成方切用

宣明麥門冬飲子

易老門冬飲子

主

潤燥門  
卷十六

肺之外郭用參耆補肺加散寒之藥可也而用枸杞熟地黃  
補腎則迂矣用桑白皮瀉肺其如外束之寒何至心之移熱  
治以鹹寒先入其心如文蛤散之類自無熱可移正直走大  
梁解圍之上着何不及之所以觀於海者難為水也

### 易老門冬飲子

治老弱虛人大渴

人參 枸杞子 白茯苓 甘草 五味子 麥門冬 加

薑煎

喻嘉言曰按易老方即變宣明麥冬飲子去生地知母葛根  
加枸杞也方下不言心移熱於肺唯以治老弱虛人大渴而

增枸杞之潤去地黃之泥知母之苦葛根之發立方於無過  
治本之圖不為迂矣

### 豬膏湯

治過勞四肢筋液耗竭數數轉筋爪甲皆痛不能久立名曰  
筋極肝主筋筋極六極之一也經曰陽氣者清則養神柔則  
養筋筋過勞其津液不能榮養故動急而筋數轉  
也爪甲者筋之餘筋屬木猶木枯則枝  
葉皆萎也不能久立筋衰不能束骨也

豬脂 薑汁二酒合五 先將豬脂薑汁熬取三升再入酒分

三服

津竭筋枯非草木之藥卒能貢効豬脂潤能養筋薑汁辛能  
潤燥酒和血而性善行取易達於四肢也

### 成方切用

豬膏湯 豬膏髮煎

西

潤燥門  
卷十六

除薑汁加金銀花煮酒飲治瘡疥最良

### 豬膏髮煎

金匱

治諸黃令病從小便出

豬膏牛 亂髮如鷄子 二味和煎髮消藥成分再服

徐忠可曰此為黃疸之穀氣實者設也腎為胃關胃家穀氣  
實則氣閉而腎燥故以豬膏潤腎燥髮灰利陰血則胃燥和  
而鬱解仲景於婦人胃氣下泄陰吹而正喧者亦用此方註  
曰此穀氣之實也以豬膏髮煎導之乃利陽明之陰以洩穀  
氣之實也然此之穀氣實又非穀疸之比蓋穀疸原由風寒  
不能消穀此則真穀氣過實熱而閉爾予友駱天游黃疸腹

大如鼓百藥不效用豬膏四兩髮灰四兩一劑而愈仲景豈  
欺我哉

### 人參白虎湯

原治太陽中喝汗出惡寒身熱而渴

### 竹葉石膏湯

治虛煩燥渴

以上二方俱見瀉火門

喻嘉言曰按此二方治火熱傷其肺胃清熱救渴之良劑也  
故消渴病之在上焦者必取用之東垣以治膈消潔古以治  
能食而渴者其不能食而渴者用錢氏白朮散倍加葛根而

### 成方切用

人參白虎湯

竹葉石膏湯

圭

潤燥門  
卷十六

東垣論消渴未傳能食者必發腦疽背疽其不能食者必成  
中滿鼓脹一變其方為蘭香引子用石膏知母生熟甘草人  
參加入蘭香防風白芷薤仁連翹桔梗升麻半夏再變其方  
為生津甘露飲子用石膏人參生熟甘草知母加黃藥杏仁  
山梔草澄茄白葵白荳蔻白芷連翹薑黃麥門冬蘭香當歸  
身桔梗升麻黃連木香柴胡藿香全蠍而為之辭曰此制之  
緩也不惟不成中滿亦不傳下消矣三消皆可用子實不敢  
信其然也乃至三因之石子薤苳湯潔古之清涼飲子俱從  
此方增入他藥引入他臟全失急救肺胃之意此後賢之所  
以為後賢耶

甘麥大棗湯 金匱

治婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸亦補脾氣人血室先受積冷而鬱久為熱則臟為之燥靈樞曰一陰主關關之固折則肝氣絕而喜悲則知燥氣乘肝為悲傷欲哭象如神靈所作病從血來故曰陰象也靈樞曰胃善伸數欠伸黑則知燥氣侵胃為欠伸但使肝氣津潤君火不亢則臟陰不燥何致乘肝侵胃今合甘麥大棗湯主之

甘草 錢 小麥 升 大棗 枚 以水六升煮取三升分溫三服

小麥能和肝陰之客熱而養心液且有消煩利溲止汗之功故以為君甘草瀉心火而和胃生金故以為臣大棗調胃而通津液利其上壅之燥故以為佐蓋病本於血心為血主肝之子也心火瀉而土氣和則胃氣下達肝臟潤肺氣調則燥止而病自除也

成方切用 甘麥大棗湯

未 調經門 卷十六

成方切用卷十七目錄

瀉火門 正方五十四 附方四十七

黃連解毒湯

三黃金花丸

梔子金花丸

大金花丸

藥皮湯

三補丸

梔子藥皮湯

三黃瀉心湯

三黃丸

附子瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

半夏瀉心湯

成方切用 目錄

十 瀉火門 卷十七

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

白虎湯

人參白虎湯

白虎加蒼朮湯

桂枝白虎湯

化斑湯

柴胡石膏湯

竹葉石膏湯

又竹葉石膏湯

白頭翁湯

甘桔湯

甘草湯

甘桔防風湯

如聖湯	訶子清音湯
枳桔湯	桔梗湯
又桔梗湯	
保陰煎	
滋腎丸	
療腎滋本丸	黃蘗滋腎丸
大補丸	潛行散
升陽散火湯	
火鬱湯	節菴升陽散火湯
抽薪飲	
成方切用	目錄
徒薪飲	二
龍膽瀉肝湯	瀉火門
東垣龍膽瀉肝湯	
又龍膽瀉肝湯	
清流飲	
涼膈散	方見祛風門
當歸龍薈丸	
化陰煎	
瀉青丸	方見祛風門
人參瀉肺湯	
瀉白散	

黃芩一物湯	清金丸
東垣加減瀉白散	寶鑑加減瀉白散
謙甫加減瀉白散	
利膈散	
化肝煎	
導赤散	
清胃散	
獨活散	
天門冬散	
玉女煎	
成方切用	目錄
瀉黃散	丰
又瀉黃散	瀉火門
地黃煎	卷十七
左金丸	
又茱連丸	戊己丸
連附六一湯	抑青丸
瀉心湯	
約陰丸	
導赤各半湯	
消毒犀角飲	

蓮子清心飲

服蠶煎

普濟消毒飲

約營煎

紫雪

碧雪

人參清肌散

人參散

白朮除溼湯

石膏散

成方切用

玉泉散

清骨散

二母散

元參升麻湯

陽毒升麻湯

消斑青黛飲

蒼耳散

辛夷散

玉屑無憂散

腎熱湯

目錄

四

萬火門  
卷十七

綠豆飲

香連丸

黃連丸

雪梨漿

大清飲

成方切用

目錄

五

萬火門  
卷十七



成方切用卷十七

瀉火門

內經至真要大論所列病幾凡言火者五言熱者四似皆謂之火也然諸病之見於諸篇者復有此言熱而彼言寒此言實而彼言虛者豈果本經之自矛盾耶蓋諸篇所言在專悉病情故必詳悉盡本篇所言亦不過總言五運六氣之大約原非確指為實火實熱也故於篇末復以有無虛實二字總結於後此軒岐之明見萬世正恐後人誤以火熱二字悉認為實火而曉示如此此其火有虛實熱有真假從可知矣蓋火得其正即為陽氣此火之不可無亦不可衰衰則陽氣之虛也火失其正為邪熱此火之不可有尤不可甚甚則真陰傷敗也然陽以元氣言火以病氣言故凡病在元氣者不得以火論何也蓋人之元氣止於充足焉為得也惟病在形體者乃可以言火所謂無形者其氣即在血所謂有形者其化實即此是也故凡火之為病其在外者必見於皮膚筋骨其在內者必見於臟腑九竅如果有熱證可據則火性急烈誠可畏也然實火止隨形

成方切用

黃連解毒湯

瀉火門

質因謂之凡火又謂之邪火不過病之標爾洗之除之又何難哉惟虛火則本於元氣之虛而再攻其火非徒即刃矣是以諸病之殺人而尤惟火病為最者正以凡火未起必殺人而以虛作實則無不殺之矣○瀉火諸藥黃連梔子瀉心肝大腸之火山梔子降火從小便出其性能屈曲下行石膏瀉腸胃之火山梔子降火從小便出其性能屈曲下行脾肺大腸之火黃蘗瀉肝腎諸經之火知母清肺胃肝腎之火地骨皮退陰中之火善除骨蒸夜熱生地麥門冬清肝肺涼血中之火天門冬瀉肺大腸之火桑皮瓜蒌薤白貝母解上焦痰逆之火柴胡乾葛解肝脾諸經之熱大毒膽草瀉肝腎膀胱之火槐花清肝解肝脾諸經之熱大毒芍藥石解清肝胃之火天花粉清痰止渴解上焦之火連翹瀉諸經之浮火元參清上焦之浮火山荳根解咽喉之火膽星開心脾胃脘之痰火青黛蘆薈胡黃連瀉五臟之火熱鬱火苦參瀉疳蝕之火木通下行瀉小腸之火滑石利小腸膀胱之火澤瀉車前子利癰閉之火人中白清肝脾腎之陰火童便降陰中血分之浮火大黃朴硝瀉陽明諸經實熱之火人參黃耆白朮甘草除氣虛氣脫無根之散失之火熟地當歸枸杞山黃滋心腎不交陰分無根之火附子乾薑肉桂救元陽失位陰盛格陽之火凡此治火之

法已若盡之然亦筌蹄之說而神明存乎人矣

黃連解毒湯

其自製者

相傳北方為太倉公火劑而崔氏治劉護軍又云

治一切火熱表裏俱盛狂躁煩心邪入於陽則狂心為熱所擾則煩躁則煩之甚也

口燥咽乾火盛大熱乾嘔熱毒錯語不眠熱昏其神崔尚書錯語正熱盛亦令人錯語若認而錯語者吐血衄血傷寒吐

宜承氣湯通而錯語者宜黃連解毒湯吐血衄血傷寒吐當汗不汗蘊熱熱甚發斑入胃

通血上行也

黃連 黃芩 黃蘗 梔子 等分

三焦積熱邪火妄行故用黃芩瀉肺火於上焦黃連瀉脾火

於中焦也子能令母實實則瀉其子黃蘗瀉腎火於下焦梔

子通瀉三焦之火從膀胱出蓋陽盛則陰衰故用大苦大寒

成方切用

黃連解毒湯

瀉火門

兼三焦而統治之瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也然非

實熱不可輕投劉河間曰傷寒表熱極甚身痛頭痛不可忍

柴胡天水涼膈之類和解恐不能退其熱勢之甚或大下後

而三下後熱勢尚甚本氣損虛而脈不能實擬更下之恐脫

而瀉利併少而急瀉者必欲作利也並宜黃連解毒湯

水丸名三黃金花丸治中外諸熱寢汗齖牙夢語驚悸吐衄

淋祕勞嗽骨蒸加大黃名梔子金花丸去梔子加大黃名大

金花丸治略同去梔子名蘗皮湯治三焦實熱用粥丸名三

補丸治三焦有火熾燥喉乾二便閉結及溼痰夜熱經日壯

少火生氣故少火宜升壯火宜降今以黃芩瀉上黃連瀉中

黃蘗瀉下則壯火降而少火升氣得生而血得養三焦皆受

益去寒連加甘草名梔子蘗皮湯治傷寒發黃身熱發黃

矣



必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也  
大陷胸湯主之若滿而不痛者此為痞柴胡不中與也  
宜半夏瀉心湯凡用瀉心者皆屬誤下之證非傳經熱邪也

半夏升黃連一兩黃芩甘草人參乾薑三兩大棗十二枚

成氏曰否而不泰為痞苦先入心瀉心者必以苦故以黃連

為君黃芩為臣以降陽而升陰也辛走氣散痞者必以辛故

以半夏乾薑為佐以分陰而行陽也欲通上下交陰陽者必

和其中故以人參甘草大棗為使以補脾而和中

則痞熱消而大汗以解矣

此方藥味蓋本理中人參

而脈反細不可下者瀉心湯主之脈有力者黃連瀉心湯

則瀉心湯主之瀉心湯主之瀉心湯主之瀉心湯主之

於心陽之分寒亦成熱矣寒已成熱則不能外出而裏非實

成方切用

藏又不能下行唯用苦寒從其下而瀉之仍慮下焦之陰邪

上入兼辛熱以溫之陰陽兩解不攻痞而痞自散所以寒熱

互用若陰痞不關陽鬱則鬱而不成熱故是上下陰陽部分

拒格而成瀉心之法藥不可用也又曰人皆曰汗多亡陽不

知下多亦亡陽以亡陰中之陽故曰亡陰下焦之陽驟虛

氣必上逆則上焦之陽反而下而實以火氣不下行故也

治多瀉上補下心君得苦寒而安則反能從陽引之入陰故

芥連梔子瀉亦成補若汗下相因有虛無實溫補猶恐不足

前法一無所用矣

除人參再加甘草

前四兩名甘草瀉心湯

治傷寒中風醫

反下之下利穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩醫

復下之其痞益甚此非結熱但以胃虛客氣上逆故使鞭也

為下後裏虛胃弱內損陰氣故加甘草以和中益胃復其陰

退虛熱大要痞滿下利者為虛使閉者為實按甘草甘令人

滿故中滿證忌之而別錄甄權並云甘草能除滿以脾健運

寒之下利腸鳴也難證腸鳴亦多屬脾胃虛經云脾胃虛則

勝鳴腹滿又云中氣不足勝為之苦鳴宜參朮補劑加甘草

芥連枳實乾薑等丹溪曰腹中水鳴乃加生薑四兩名生薑

水激動其水也宜二陳湯加芥連梔子

瀉心湯

治汗解後胃中不和心下痞硬乾嘔噯食臭完穀

不化脇下有水氣腹中雷鳴下利

火盛邪熱不殺穀故完穀不化脇下有水氣上逆伏飲搏膈故痞

故腹中雷鳴下利謂之痞也

生薑以散邪邪飲益胃後陽到而病除

熱不變色而澄徹清冷者為寒邪胃門滯滯小便黃赤者為

即出不及尅化所謂邪熱不殺穀也

白虎湯

治傷寒脈浮滑表有熱裏有寒

三陽合病脈浮大腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語

遺尿發汗則譫語下之則頭上生汗手足逆冷自汗出者

身重口不仁譫語陽明證也而少陽證也遺尿太陽證也

攻裏則陰氣不竭而虛陽上脫必煩汗出而手足逆冷治陽

冷若自汗出者三陽熱甚也與此湯以解內外之熱

明病脈洪大而長不惡寒反惡熱頭痛自汗口渴舌胎白痛

鼻乾不得臥心煩躁亂目睛潮熱或陽毒發斑胃熱諸病

盛故脈洪大外無寒邪故不惡寒反惡熱中風有汗身熱無

汗傳入陽明則有汗謂之熱也故易明病法多汗身熱故

熱淫於內以苦發之故以知母苦寒為君熱則傷氣必以甘寒為助故以石膏甘草為臣津液內燥故以粳米甘平益氣

為使不致傷胃也又煩出於肺躁出於腎石膏清肺而瀉胃

火知母清肺而瀉腎火甘草和中而瀉心脾之火或瀉其子

或瀉其母心不顯治陽明氣分熱也石膏甘草不但清裏

方可用或有血虛身熱神虛發熱及陰虛發熱而赤煩躁類

白虎湯證誤投之不可救也按白虎證脈洪大有功類白虎

證脈大而虛以此為辨又按陰虛陽盛格陽而陰虛者為

外外冷而內熱經所謂重陰必陽陽盛格陰而格陰於

則寒是也當於小便分之使清者外雖微熱而中必寒便赤

者外雖微冷而內實熱而口中燥潤及舌苔淺淡蓋舌為

心苗應南方火邪在表則未生胎邪入裏津液耗結則生胎

而滑胎白者丹田有熱胸中有寒邪在半表半裏也熱入潮

深則燥而濕熱聚於胃則黃宜承氣及白虎若熱病口乾舌

成方切用 白虎湯 卷十七 海火門

黑乃腎水刑於心火熱益深而病篤矣然亦有胎黑屬寒者

邪在陽明肺受火劫故用辛寒以清肺所以有白虎之名白

虎西方金神也吳鶴皋曰如秋金之令行則夏火之炎退成

氏曰立秋後不可服為大寒之劑易老曰有是病則投是藥

苟拘於時則誤手若以白虎為大寒承氣又何以行於冬

陽明汗多而渴忌五苓猪苓津液大耗也

加入參三兩名人參白虎湯 治傷寒渴欲飲水無津者

日不解表裏俱熱大渴燥煩者白虎加人參湯主之又云傷

寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎林億校正謂於此

表裏差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒中渴表裏發熱前

後二證或云表裏俱熱或云表熱裏寒皆可服之一種發熱

無汗其表不解全是麻黃 亦治太陽中暈身熱汗出惡寒是

與葛根證安可用白虎也 亦治火傷肺胃傳為膈消

冷脈微而渴 身熱惡寒為在表足 亦治火傷肺胃傳為膈消

除諸證曰肺消以地黃丸治其血分腎消 加蒼朮名白虎加

以白虎湯治其氣分病不能除腎之罪也 加蒼朮名白虎加

若虎湯治淫濕脈沉細者 治名濕淫先受暑後受濕暑淫相

痛多汗渴而譫語李東垣曰動而傷暑火熱傷氣辛苦之人

多得之宜入參白虎湯靜而傷暑淫勝身重安樂之人多得

之宜蒼朮 加桂枝名桂枝白虎湯 治溫瘧但熱不寒骨節

白虎湯 加桂枝名桂枝白虎湯 治溫瘧但熱不寒骨節

疼痛時嘔除粳米加人參名化斑湯治胃熱發斑脈虛者加

柴胡黃芩半夏名柴胡石膏湯治暑嗽喘渴

成方切用 白虎湯 竹葉石膏湯 八 海火門

竹葉石膏湯 仲景 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐 傷寒解後餘熱未盡津液

逆故 亦治傷暑發渴脈虛 欲吐 亦治傷暑發渴脈虛

竹葉二石膏 一人參 二甘草 二麥冬 一半夏 粳米 十

加薑煎 竹葉石膏之辛寒以散餘熱 竹葉能止嘔 人參甘草麥冬粳

米之甘平以益肺安胃補虛生津半夏之辛溫以豁痰止嘔

故去熱而不損其真導逆而能益其氣也

又方竹葉石膏末通薄荷梗甘草亦名竹葉石膏湯治胃

實火盛而作渴 實則用承氣以攻下此云胃實非有停滯但

子 52-680

陽欲勝兩火旺則金囚故以竹葉瀉火以桔梗救金薄荷散火於上木通泄火於下甘草石膏直入戊土而清其中三焦火平則炎蒸退而津液生矣○外實經也內實腑也戊土胃也

白頭翁湯 仲景

治傷寒熱利下重欲飲水者 陽熱之利與陰寒不同陰利宜理中四逆溫臟陽利黃芩必焦

黃熱臭便出作聲 臍下必熱宜涼藥

白頭翁 兩 秦皮 黃連 黃蘗 三兩

白頭翁苦寒能入陽明血分而涼血止澀秦皮苦寒性清能

涼肝益腎而固下焦 清血色青故 黃連涼心清肝黃蘗瀉火

補水並能燥溼止利取其寒能勝熱苦能堅腎清能斷下也

徐忠可曰此主熱利下重蓋下陷則傷陰陰傷則血熱雖後重而不用調氣之藥病不在氣爾周揚俊曰邪傳厥陰少陽

成方切用

竹葉瀉火 白頭翁湯 甘桔湯

九

瀉火門

其表也臟腑相連於法禁下故但謀去其熱熱除而利自止矣

甘桔湯 金匱名桔梗湯

治少陰咽痛喉痺肺癰吐膿乾欬無痰火鬱在肺 手少陰心脈挾咽足

少陰腎脈循喉嚨火炎則痛經曰一陰一陽結謂之喉痹一陰少陰君火一陽少陽相火也金匱云熱之所過血爲之凝

滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿成難治火鬱在肺則乾欬無痰

甘草 兩 桔梗 兩 或等分王好古加減法失音加訶子聲不

出加半夏上氣加陳皮涎嗽加知母貝母欬渴加五味酒毒

加葛根少氣加人參嘔加半夏生薑吐膿血加紫苑肺癰加

阿膠胸膈不利加枳殼痞滿加枳實目赤加梔子大黃面腫

加茯苓膚痛加黃耆發斑加荊芥防風痰毒加牛蒡子大黃

不得眠加梔子

甘草甘平解毒而瀉火桔梗苦辛清肺而利膈又能開提氣

血表散寒邪排膿血而補內漏故治咽痛喉痺肺癰欬嗽取

其辛苦散寒甘平除熱也 金匱曰欬而胸滿振振咽乾不渴

喻嘉言曰此上提之法其新起提其敗血或從唾出或從

便出足以殺其毒此因胸滿振振不渴病尚在表用此開提

肺氣若勢已入裏又當引之從胃入腸此法不中用矣病日

日喉癰惡寒爲裏閉於外熱鬱於內忌用膈藥等劑點喉使

陽鬱不得伸又忌硝黃等寒劑下之使陽邪陷裏宜用表藥

提其氣升以助陽也如不惡寒脈滑實者又當用寒劑下之

酸收之也○外臺祕要曰五臟之尊心雖爲主而肺居其

上肺爲華蓋下覆四臟合天之地通達風氣性愛溫而惡寒

心火更炎上蒸其肺金被火侮則葉萎倚着於肝肝發癰則

欬因心肝虛弱不能傳陽於下焦遂至正陽俱虧變成嗽矣

肺主皮毛遇寒則燥而葉起肺嗽因寒倚着於肝而肝成病

由不能扣金而鳴也先養肺抑心肝虛熱和其腎自愈矣

成方切用 甘桔湯 十 瀉火門

除桔梗名甘草湯 治同加防風名甘桔防風湯治同加防

風荊芥連翹名如聖湯 宋仁 治上焦風熱加訶子和童便服

名訶子清音湯治中風不語 肺屬金主音金空則有聲風痰

散逆破結桔梗利肺氣甘草和元氣童便降火潤肺或加木

通以利機竅也○足少陰腎脈挾舌本足太陰脾脈通舌本

手少陰心別脈繫舌本三經虛則痰涎壅塞其脈道舌下轉運

黃耆<sup>分七</sup>杏仁百合甘草<sup>各三</sup>加薑煎亦名桔梗湯<sup>生清</sup>治肺癰

吐膿監乾多渴

保陰煎

治男婦帶濁遺淋色赤帶血脈滑多熱便血不止及血崩血淋或經期太蚤凡一切陰虛內熱等證

生地 熟地 芍藥<sup>錢二</sup>山藥 川續斷 黃芩 黃蘗<sup>錢半</sup>生

甘草<sup>錢一</sup>如小水多熱或兼怒火動血者加焦梔子一二錢

如夜熱身熱加地骨皮一錢五分 如肺熱多汗者加麥

冬地骨皮血熱甚者加黃連一錢五分 如血虛血滯筋骨

腫痛者加當歸二三錢 如氣滯而痛者去熟地加青皮陳

皮丹皮香附之屬 如血脫血滑及便血久不止者加地榆

一二錢或烏梅一二個或百藥煎一二錢文蛤亦可 如少

年或氣血正盛者不必用熟地山藥 如肢節筋骨疼痛或

腫者加秦艽丹皮各一二錢

滋腎丸 又名通關丸東垣

治下焦邪熱口不渴而小便秘及腎虛蒸熱腳膝無力陰痿

陰汗衝脈上衝而喘<sup>腎中有水有火水不足則火獨旺故虛</sup>

力陰痿陰汗衝脈起於<sup>熱肝腎虛而淫熱壅於下焦故腳膝無力</sup>

而上至胸水不制火故氣逆上而喘

黃蘗<sup>酒炒</sup>知母<sup>酒炒</sup>一兩桂<sup>錢一</sup>蜜丸

小便者足太陽膀胱所主生於肺金肺中伏熱水不能生是

絕小便之源也渴而小便不通者肺氣不得降是也故用清

燥金之正化氣薄淡滲之藥瀉火而清肺滋水之化源也若

熱在下焦而不渴是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰

中之陰藥治之<sup>痰滲之藥若二苓澤瀉琥珀燈心木通車前</sup>

小便不通漸成中滿腹堅如石腿裂出水夜不得眠不能飲

食東垣診治歸而不至不寐因記素問曰無陽則陰無以生

無陰則陽無以化又云膀胱者兩部之官津液藏焉氣化則

能出矣此病癰秘是無陰則陽無以化也此因膏粱積熱損

傷腎水火又過上而為嘔噦內關外格之證悉具死在旦夕

矣處處北方大苦寒之劑黃蘗知母各一兩桂一錢為引

與前陰如刀刺火燒溺如瀑泉腫脹遂消此證一在上焦氣

分而渴一在下焦血分而不渴二者之殊至易辨爾又曰凡

病在下焦皆不渴血中有溼故不渴也○若膀胱陽虛陰無

以化又當用八味腎氣丸按消渴證以渴為主而分氣血故

血分亦有渴者淋證以淋為主而分氣血故

而分氣血故血分亦有渴者

成方切用<sup>滋腎丸</sup>升陽散火湯

去桂名療腎滋本丸治腎虛目昏去桂加黃連名黃蘗滋腎

丸治上熱下冷<sup>似陽極</sup>水衰心煩單黃蘗一味名大補丸治腎

虛膀胱虛熱腰股痛而足心熱為末薑汁酒調服名潛行散

治痛風腰以下溼熱流注

升陽散火湯<sup>東垣</sup>

治肌熱表熱四肢發熱骨髓中熱熱如火燎捫之烙手此病

多因血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土並宜服

此

柴胡以發少陽之火為君升葛以發陽明之火羌活以發太陽之火獨活以發少陰之火為臣此皆味薄氣輕上行之藥所以升舉其陽使三焦暢遂而火邪皆散矣人參甘草益脾土而瀉熱芍藥瀉脾火而斂陰且酸斂甘緩散中有收不致有損陰氣為佐使也經曰少火生氣天非此火不能生人非此火不能育生陽之則光則濁陰自歸下竅而飲食傳化無抑遏之患矣東垣聖藥胃治之必主升陽俗醫知降而不知升是撲其少火也安望其衛生耶又曰古人用辛散每佐以酸收故桂枝湯中必用芍藥猶兵家之節制也

除人參獨活加葱白名火鬱湯治同火鬱者內熱外寒脈沉而數火鬱無從散故外寒沉為在裏沉而數知為內熱也

成方切用

升陽散火湯

辛

瀉火門

陶節菴升陽散火湯人參白朮茯神甘草陳皮麥冬當歸芍藥柴胡黃芩加薑棗金器煎治傷寒又手冒心尋衣摸牀譫語昏沉不省人事節菴曰俗醫不識誤認風證不知此乃肝熱乘肺元氣虛衰不能主持名撮空證小便利者可治有痰加薑炒半夏大便燥實諸證發渴加大黃瀉瀉加白朮升麻○陽虛故又手自冒其心熱皆其神故也衣摸牀小便利則肺氣猶降膀胱猶能化氣而腎水未枯故可治

抽薪飲

治諸凡火盛而不宜補者

黃芩 石斛 木通 梔子 黃蘗 枳殼 錢 細甘草 煎成食遠溫服 如熱在經絡肌膚者加連翹天花粉以解之 熱在血分大小腸者加槐蕊黃連以清之 熱在陽明

頭面或躁煩便熱者加生石膏以降之 熱在下焦小水痛澇者加草龍膽車前以利之 熱在陰分津液不至者加麥冬生地芍藥之類以滋之 熱在腸胃實結者加大黃芒硝以通之

徙薪飲

治三焦氣火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以此劑其甚者宜抽薪飲

黃芩 麥冬 芍藥 黃蘗 茯苓 丹皮 陳皮 如多鬱氣逆傷肝脇肋疼痛或致動血者加青皮梔子

龍膽瀉肝湯局方

成方切用

抽薪飲 徙薪飲

辛

瀉火門

治肝膽經實火溼熱脇痛耳聾膽溢口苦筋痿陰汗陰腫痛白濁洩血肝者肝膽之部也火盛故作痛膽脈絡於耳故也決斷出焉膽虛數謀慮而不決膽氣上溢故口為之苦肝主筋溼熱勝故筋痿肝脈絡於陰器故或汗或腫或痛白濁洩血皆肝火也

龍膽草 黃芩 梔子 澤瀉 木通 車前子 當歸 生地黄 柴胡 生甘草

龍膽瀉肝湯

三焦之熱以佐之澤瀉瀉腎經之溼木通車前瀉小腸膀胱之溼以佐之然皆苦寒下泄之藥故用歸地以養血而補肝用甘草以緩中而不使傷胃為臣使也



東垣無黃芩梔子甘草亦名龍膽瀉肝湯治前陰熱癢臊臭

此因飲酒風溼熱合於下焦為邪厥陰肝脈絡於陰器柴胡入肝為引澤瀉車前木通利小便亦除濕氣所謂在下者因

瀉車前加人參五味天冬麥冬黃連知母亦名龍膽瀉肝湯

治筋癢攣急口苦爪枯亦治前證加人參者扶土所以抑木平木潤燥所以養筋用黃連知母者上以瀉心火下以瀉腎火一為肝子一為肝母也

治陰虛挾熱瀉利或喜冷或發熱或下純紅鮮血或小水赤痛等證

生地黃 芍藥 茯苓 澤瀉 二當歸 一黃芩 黃連 一錢  
成方切用 龍膽瀉肝湯 清流飲 當歸龍薈丸 主 瀉火門 卷十七

分枳殼 甘草 一錢 如熱甚者加黃蘗 小水熱痛者加梔子 燥渴者加花粉麥冬

當歸龍薈丸 宣明

治一切肝膽之火神志不寧驚悸搖擗躁擾狂越頭暈目眩

耳鳴耳聾胸膈痞塞咽嗑不利腸胃燥澀兩脇痛引少腹肝

移熱於肺而欬嗽肝屬風木主筋主怒故搖擗狂越皆移熱於肺而欬嗽肝屬風木主筋主怒故搖擗狂越皆

當歸 酒洗 龍膽草 酒洗 梔子 炒 黃連 炒 黃蘗 炒 黃芩 炒 一錢 大黃 酒

青黛 水蘆薈 錢五 木香 錢二 麝香 分 蜜丸 薑湯下

肝木為生火之本肝火盛則諸經之火相因而起為病不止

一端矣故以龍膽青黛直入本經而折之而以大黃芩連梔

藥通平上下三焦之火也蘆薈大苦大寒氣燥入肝能引諸

化陰煎 寒已甚當歸辛溫能入厥陰和血而補陰故以為君少加木

治水虧陰涸陽火有餘小便癃閉淋濁疼痛等證

生地 熟地 牛膝 豬苓 澤瀉 生黃蘗 生知母 綠豆 三錢 龍膽草 五分 車前子 一錢 加食鹽少許 若水虧居

成方切用 當歸龍薈丸 化陰煎 瀉青丸 主 瀉火門 卷十七

多而陰氣大有不足者可遞加熟地用至一二兩亦可

治肝火鬱熱不能安臥多驚多怒筋癢不起目赤腫痛肝屬

肝者將軍之官風淫火熾不易平也龍膽大黃苦寒味厚沉

活氣雄防風善散竝能搜肝風而散肝火所以從其性而升

之於上也少陽火鬱多煩躁梔子能散三焦鬱火而使邪從



小便下行少陽火實多頭痛目赤川芎能上行頭目而逐風

邪且川芎當歸皆血分之藥能養肝血而潤肝燥血虛故肝燥故

多驚又皆血中氣藥辛能散而溫能和一瀉一散一補同為

平肝之劑故曰瀉青然必壯實之人方可施用余于容口時

有餘之說舉手便云平肝按聖濟經云原四時之所化始於

木究十二經之所養始於春女子受娠一月是厥陰肝經養

之肝者乃春陽發動之始萬物生之之源故戒怒養陽使先

天之氣相生於無窮是為生之切要也不可泥於此說內經

六節臟象論曰所謂得五行時之勝各以氣命其臟求其勝

也皆歸始春蓋春屬肝木乃吾身之氣此氣若有不充

則門氣何所稟承如春無所生則夏長秋收冬藏者何物乎

五行之中唯木有發榮暢茂之象花葉蓂莢榮而可愛結

實成實食之以全生皆此木也使天地而無木則世界黯淡

無色矣由是言之培之養之猶恐不暇而向欲剪之伐之乎

外臺祕要曰五行五臟皆互相生肝雖處中而為臟首位在

甲乙懷養懷仁故應春而王也為心之母餘臟循次而生焉

成方切用瀉青丸 人參瀉肺湯 瀉白散 主 瀉火門 卷十七

人參瀉肺湯

治肺經積熱上喘欬嗽胸膈脹滿痰多大便澀

人參 黃芩 梔子仁 枳殼 薄荷 甘草 連翹 杏  
仁去皮 桑白皮 大黃 桔梗

按人參肺熱反能傷肺此清肺經積熱以人參瀉肺立名可

見瀉其肺熱必不可傷其肺氣也况人參之溫以一味清涼

桑白皮 地骨皮錢 甘草五粒 糯米百粒

桑白皮甘辛而寒行水降火瀉肺氣之有餘除痰止咳能利

二便而療熱渴地骨皮寒瀉肺中之伏火淡泄肝腎之虛熱

涼血退蒸甘草瀉火而益脾稹米清肺而補胃竝能瀉熱從

小便出肺主西方故曰瀉白時珍曰此瀉肺諸方之準繩也

物湯丹溪清金丸瀉肺金血分之瀉白散瀉肺氣分之火黃芩

加人參五味茯苓青皮陳皮名加減瀉白散東治欬嗽喘急

嘔吐加知母黃芩桔梗青皮陳皮亦名加減瀉白散實治欬

而氣喘煩熱口渴胸膈不利除甘草稹米加黃芩知母麥冬

五味桔梗亦名加減瀉白散羅謙 治過飲傷肺氣出腥臭唾

成方切用瀉白散 利膈散 太 瀉火門 卷十七

涕稠黏隘喉不利口苦乾燥原文云桑皮地骨味苦微寒降

母苦寒治氣出腥臭清肺利氣為臣五味酸溫以收肺氣麥

冬苦寒治唾涕稠黏口苦乾燥為佐桔梗辛溫輕浮治痰逆

利咽膈為使也

利膈散

治脾肺大熱虛煩上壅咽喉生瘡

雞蘇葉 荊芥穗 防風 桔梗 牛蒡子炒 人參 甘草

等分為末每服二錢不拘時沸湯點服咽喉口瘡甚加殭

蠶蠶

按此方清上焦熱全用辛涼輕清之氣不雜苦寒降下之味

其見甚超較涼膈散諸方為更勝

化肝煎

治怒氣傷肝而因氣逆動火致為煩熱脇痛動血等證

青皮 陳皮 白芍 二錢 如血見下部者 梔子 炒 丹皮 錢一

五土貝母 錢二 如大便下血者加地榆小使下血者加木

通各一錢五分 如兼寒熱者加柴胡一錢 如火盛加黃

芩一二錢 如脇腹痛脹加白芥子一錢 脹滯多者勿用

導赤散 錢乙

治小腸有火便赤淋痛面赤狂躁口糜舌瘡齦牙口渴小腸

相表裏心熱則小腸亦熱故便赤淋痛心屬君火是五臟六

腑火之主故諸經之熱皆應於心面赤煩躁齦牙口渴皆心

成方切用 化肝煎 導赤散 卷十七 門

熱也舌為心苗若心火上炎薰蒸於口則口糜口瘡輕手按

至皮毛之下肌肉之上則熱日中大甚是熱在血脈為心熱

方主之如治白濁沙淋等證合消遙散

生地黃 木通 甘草梢 淡竹葉

生地涼心血竹葉清心氣 故清上焦 木通降心火入小腸

宜木通相火宜澤瀉行水通利 草梢達莖中而止痛 便赤以

共導丙丁之火由小水而出也 小腸為丙火心為丁火心熱

老用導赤散合五苓散治口糜神效 經曰膀胱移熱於小腸

膀胱不便上為口糜亦有因用利中湯者因脾胃虛寒之

火被遏上炎故用參朮甘草補其土 滋陰散其寒則火得所

助接引退舍矣綱目曰心氣熱則上宜宜導赤散腎氣虛則

天門冬散

治肺壅熱鼻乾大便祕澇

天門冬 皮 桑白皮 升麻 大黃 枳殼 炒 甘草 荆芥

按此方藥味較人參瀉肺湯為少減然用升麻且升且降以

散上焦壅熱可取

清胃散 東垣

治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦滿面發熱其牙喜寒惡熱

或牙齦潰爛或牙宣出血或唇口頰腮腫痛 足陽明胃脈循

頰口齒齦頰頰車上耳前主上牙齦喜寒飲而惡熱手陽明

大腸脈上頸貫頰入下齒使口主下牙齦喜熱飲而惡寒足

陽明別絡絡腦故腦痛陽明之脈營於面故面熱二經熱盛故

唇口齒頰頰而腫痛也齒為骨屬腎牙宣牙齦出血或齒縫

出血也亦名齒齬乃腎病若血多而湧出不止為陽明熱盛

以陽明多氣多血也唇屬脾胃大腸經燥則乾熱則裂風則

成方切用 天門冬散 清胃散 玉女煎 卷十七 門

關寒則揭若腫破裂如蠶繭名曰齦唇唇舌者

肌肉之末也人中平滿者為唇反唇反肉先死

生地黃 牡丹皮 黃連 當歸 升麻 一方加石膏

黃連瀉心火亦瀉脾火脾為心子而與胃相表裏者也當歸

和血生地丹皮涼血以養陰而退陽也石膏瀉陽明之火熱

升麻升陽明之清陽清升熱降則腫消而痛止矣 薛新甫曰

牙痛者承氣湯輕者清胃散大腸熱而齦腫痛者清胃散甚

者調胃湯六鬱而痛者越鞠丸中氣虛而痛者補中益氣湯

玉女煎

治水虧火勝六脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴

鴻火門  
卷十七

黃連 六兩 薑 一兩 吳茱萸 一兩 水九

肝實則作痛心者肝之子實則瀉其子故用黃連瀉心清火

為君使火不尅金金能制木則肝平矣吳茱萸辛熱能入厥陰

肝行氣解鬱又能引熱下行故以為反佐一寒一熱寒者正

治熱者從治 而治之亦曰反治 故能相濟以立功也肝居於

左肺居於右左金者謂使金令得行於左而平肝也 東垣曰

諸嘔吐酸皆屬於熱此上焦受外來客邪也以難病論之嘔

吐酸水者其則酸水浸其心火令牙酸不能相對以火熱

療之必減若病機作熱攻之誤矣或問吞酸素問以為熱東

垣以為寒何也丹溪曰吐酸與吞酸不同吐酸出酸水如

醋平時津液隨上升之氣鬱而成積滯中生熱故隨木化逐

作酸味非熱而何其有鬱之久伏於腸胃之間略不得上

不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫暖

理開發或得香熱湯九汁液得行亦可暫解非寒而何素問

成方切用 左金丸 約陰丸 卷十七

熱言其本也東垣言其末也子嘗治吞酸用黃連吳

茱萸炒時令送為佳使君茱萸為輔蒸餅為丸吞之仍

致糲食蔬菓自養則病易安 丹溪之論亦未易盡絕之此

意有熱有寒不可執一 戴氏曰房勞腎虛之人胸膈多有

隱痛此因腎虛不能納氣氣虛不能生血之故氣與血虧水

也盛則流暢虛則木有不濡者所以作痛宜破故紙之類補

腎芎歸之類補血若作 尋常腹痛治則殆矣

加炒蒼朮陳皮亦名茱萸丸治同加芍藥等分為丸名戊

己丸治熱痢熱瀉 熱瀉者黃連也戊為胃土己為陰吳

茱萸加附子一兩名連附六一湯治胃腕痛寒因熱用也用

約陰丸

黃連一味吳茱萸浸一宿為丸名抑青丸大瀉肝火治左脇

作痛單黃連煎服名瀉心湯治心熱

治婦人血海有熱經脈先期及過多者或兼腎火而帶濁不

止及男婦大腸血熱便紅等證

常歸 白朮 白芍 妙生地 茯苓 地榆 黃芩 白石

脂 醋 北五味 丹皮 續斷 等分為細末煉蜜丸服

火盛者加黃連 兼肝腎之火盛者加知母黃蘗各等分

大腸血熱便紅者加黃連防風各等分

導赤各半湯 節菴

治傷寒後心下不硬腹中不滿二便如常身無寒熱變神

昏不語或睡中獨語目赤口乾不飲水與粥則嘔不與勿思

形如醉人名越經證 傷寒不硬不滿二便如常病在少陰

成方切用 約陰丸 導赤各半湯 消渴犀角飲 卷十七

於少陰心火上而通肺也邪熱入裏故目赤舌

黃連 黃芩 犀角 知母 山梔 滑石 麥冬 人參

甘草 茯苓 加燈心草煎

陳來章曰熱入心經涼之以黃連犀角梔子心熱上逼於肺

清之以黃芩知母麥冬泄之以滑石甘草燈心者欲使心肺

之邪熱從小腸膀胱出也故亦曰導赤然邪之越經而傳於

心者以心神本不足也故又加人參茯苓以補之

消毒犀角飲

治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅甚腮項結核口舌生瘡及遍

生瘡癰已潰未潰並宜服之

犀角沖磨 防風 荆芥穗錢 鼠粘子炒二錢 炙甘草錢一

按此方顯清上焦蘊熱與利膈散略同彼可多服此可暫服

蓮子清心飲局方

治憂思抑鬱發熱煩躁或酒色過度火盛尅金口苦咽乾漸成消渴遺精淋濁遇勞即發四肢倦怠五心煩熱夜靜甚

及女人崩帶煩躁遺精淋濁者心虛而有熱也心火妄動不能下交於腎故元精失守也遇勞即發為勞淋勞則動其心火也晝偏熱者陽虛也崩中由損傷衝任氣血俱虛經曰陰虛陽搏謂之崩由陰虛而陽搏之血得熱而妄行也帶者病本於帶脈而得名亦屬血白屬氣由陰虛陽竭營氣不升衛氣下陷或淫痰濕熱蘊積而下流也

石蓮肉 人參 黃耆 茯苓 柴胡 黃芩 地骨皮

戊方切用

消毒犀角飲 蓮子清心飲 張鑑煎

圭清火門 卷十七

麥冬 車前子 甘草錢二 空心服

參者甘草所以補陽虛而瀉火東垣曰參者甘草瀉火之聖藥助氣化而達

州都勝腕也氣化則能出地骨退肝腎之虛熱柴胡散肝膽之火邪黃

芩麥冬清熱於心肺上焦茯苓車前利溼於膀胱下部中以

石蓮清心火而交心腎則諸證悉退也

服蠶煎

此方性味極清極輕善入心肝二臟行滯氣開鬱結通神明養正除邪大有奇妙

生地 麥冬 白芍 石菖蒲 石斛 丹皮 茯神 陳

皮錢 木通 知母錢五分 如痰勝多鬱者加貝母二錢 痰

盛兼火者加膽星一錢五分 陽明火盛內熱狂叫者加石

膏二三錢 便結脹滿多熱者加元明粉二三錢調服或漸

加大黃亦可 氣虛神困者加人參隨宜

普濟消毒飲東垣

治大頭天行初覺憎寒體重次傳頭面腫盛口不能開上喘

咽喉不利口渴舌燥俗云大頭天行初覺不相訪問染者多不致察問多有病此者醫以承氣加下之稍緩翼日如故下之又緩終莫能愈漸至危篤東垣視之曰夫身半以上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱在於心肺之間上攻頭而為腫盛以承氣瀉胃中之實熱是為誤伐無過病以適至其所為準因處此方全活甚眾遂名普濟消毒飲

黃芩 黃連 陳皮 白生甘草 元參 柴胡 桔梗

戊方切用

普濟消毒飲

圭清火門 卷十七

連翹 板藍根 馬勃 鼠粘子 薄荷 僵蠶 升麻

為末湯調時服之或蜜拌為丸噙化一方無薄荷有人

參三錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

芩連苦寒瀉心肺之熱為君元參苦寒橘紅苦辛甘草甘寒

瀉火補氣為臣連翹薄荷鼠粘辛苦而平藍根甘寒馬勃癰

蠱苦平散腫消毒定喘為佐升麻柴胡苦平行少陽陽明之

陽氣不得伸桔梗辛溫為舟楫不令下行為載也此解本之東垣而稍

加刪潤然十書中無此方見於準繩

約營煎

治血熱便血無論脾胃大小腸膀胱等證皆可用

生地 芍藥 續斷 地榆 黃芩 槐花 荆芥穗 炒烏

梅一 如火盛者加梔子黃連膽星之屬 如氣虛者加人

參白朮 如氣陷者加升麻防風

紫雪局方

治內外煩熱不解狂易叫走發斑發黃口瘡腳氣瘡毒蟲毒

熱毒藥毒 黃金兩 寒水石 石膏 滑石 磁石 三觔水煮搗前 升麻

元參一 甘草 炙半 犀角 羚羊角 沉香 木香 兩五 丁香

一兩並搗入前藥 硝石 二觔提淨入前藥汁中微

汁中煎去渣入後藥 朴硝 火煎不住手將柳木攪候

入後二味 辰砂 研細 麝香 常門子 一兩二錢 研細 合成

成方切用 紫雪 碧雪 毛 瀉火門 卷十七

退火氣冷水調服每一二錢 本事方無黃金

寒水石石膏滑石硝石以瀉諸經之火而兼利水為君磁石

元參以滋肺腎為臣犀角羚羊角以清心寧肝升麻甘草以升

陽解毒沉香丁香木香以溫門調氣麝香以透骨通竅丹砂

黃金以鎮驚安魂瀉心肝之熱為佐使諸藥用氣硝獨用質

者以其水鹵結成性峻而易消以瀉火而散結也

碧雪

治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁嘔物妨悶致咽閉壅

塞及天行時熱發狂昏憤 芒硝 朴硝 硝石 馬牙硝 青黛 石膏 寒水石 研

甘草 分 增甘草煎湯一升去渣入諸藥再煎用柳木棍

不住手攪令消溶得所入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝

成霜研為細末每用少許含化津嚥不拘時候如覺喉壅閉

塞不能吞物即以小竹筒吹藥入喉中即愈

按此方做紫雪之制而不用黃金犀角等貴重之藥亦為簡

便 人參清肌散

治午前潮熱氣虛無汗 熱發午前陽虛而陰火乘之也火燥

無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘則無汗而寒按此有

餘乃病邪有餘陰陽和則無病過中則皆病也經云日陽盛

生外熱陰盛生內寒皆亢 則為害非真陰真陽盛也

成方切用 人參清肌散 人參 白朮 茯苓 甘草 炙 半夏 麴 當歸 赤芍藥

柴胡 乾葛 加薑棗煎

四君以補陽虛歸芍以調陰血半夏和胃而行痰柴葛升陽

而退熱蓋以甘溫瀉火 甘溫能 辛溫活血 血即 辛甘解肌 有

宜實表無 此之無汗與傷寒無汗不同故但解其肌熱而不

必發出其汗也

前藥各一兩加黃芩五錢每服三錢加薑棗煎名人參散 許

微 治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭痛目昏盜汗倦怠一切血

熱虛勞 喻嘉言曰此邪熱淺在經絡未深入臟腑雖用柴葛

苓半夏兼動其痰合之當歸赤芍黃芩併治其血中之

熱止用三錢為劑蓋方成知約庶敢用柴胡乾葛爾

白朮除溼湯 東垣

治午後發熱背惡風四肢沉困小便色黃又治汗後發熱午  
發熱熱在陰分陽陷陰中也背為陽腹為陰背惡寒者陽不  
得伸也脾主四肢四肢沉困溼勝而脾不運也小便黃溼兼  
熱也汗後而熱不退  
或陰虛或陽虛也

人參 赤茯苓 甘草 炙 柴胡 錢五 白朮 兩一 生地黃 地骨皮

知母 澤瀉 錢七 每服五錢如有刺痛加當歸七錢小便

利減苓瀉一半

陽陷陰中熱在血分故以生地滋其少陰而以知母地骨瀉

血中之伏火也柴胡升陽以解其肌 陽陷陰中故以 苓瀉利

溼兼清其熱參朮甘草益氣助脾氣足陽升虛熱自退脾運

成方切用

白朮除溼湯 石膏散

羌 瀉火門 卷十七

而溼亦除矣 方名除溼而治在退熱 欲熱從溼中而下降也

石膏散 外臺

治勞熱骨蒸四肢微瘦有汗脈長者 此指勞熱因陽邪入裏 傳為骨蒸令人先寒後

熱漸成羸瘦者有汗胃 實也脈長陽明證也

石膏研細每夕新汲水服方寸匕取熱退為度

石膏大寒質重能入裏降火味辛氣輕能透表解肌離寒而

甘能緩脾火勞有實熱者非此不為功故外臺祕要名附錄

皆載之 玄珠曰五行六氣水特其一爾一水既虧豈能勝五

絡至死不悟夫涼劑能清火養水熱劑能補火燥水理易明

也勞為熱證明矣尚可補乎雖無熱無積之人脈微無力方 可補之必察其胃中及右腎二火俱虧後用補劑可也證治 要訣云治虛勞獨用熱藥者謂釜中無水而進火也過用冷

藥有經下無火而添水 也非從無益而又害之

玉泉散 亦名六一甘露散

治陽明內熱煩渴頭痛二便祕結瘟疫斑黃及熱痰喘嗽等

證

石膏 六兩 粉甘草 兩一 為細末每服一二三錢新汲水或熱

湯或人參湯調下或加硃砂三錢此益元散之變方也其功

倍之

清骨散

治骨蒸勞熱 火炎水虧真陰消燦故肌骨之熱蒸而熱也 靜夜熱者是陽氣陷入陰中也名曰熱入血室晝夜俱熱者 是重陽無陰也當急瀉其陽峻補其陰晝病則在氣夜病則

成方切用

石膏散 玉泉散 清骨散 二母散

在

辛 瀉火門 卷十七

銀柴胡 錢半 胡黃連 秦艽 鱉甲 童便 地骨皮 青蒿 知

母 錢一 甘草 五分

地骨胡連知母之苦寒能除陰分之熱而平之於內柴胡秦

艽青蒿之辛寒能除肝膽之熱而散之於表鱉陰類而甲以

骨能引諸藥入骨而補陰甘草甘平能和諸藥而退虛熱也

二母散

治肺勞有熱不能服補氣之劑者 肺虛挾火或痰嗽發熱陰 虛已甚再服補陽之藥則 火益亢而陰愈虧故有雖 虛而勞不能服溫補藥者

知母 貝母 等分炒為末

火旺燥金肺虛勞熱能受溫補者易治不能受溫補者難治  
故又設此法以滋陰用貝母化痰瀉肺火知母滋腎清肺金  
取其苦寒勝熱潤能去燥也

元參升麻湯

治發斑咽痛 發斑者陽明胃熱也  
咽痛者太陰肺火也

元參 升麻 甘草 等分

升麻能入陽明升陽解毒元參能入太陰清金制火甘草甘  
平能散能和故可利咽散斑也

除元參加犀角射干黃芩人參名陽毒升麻湯治陽毒發斑  
頭項背痛狂躁罵言咽腫吐血溫服取汗

成方切用

消斑青黛飲 節菴

二母散 元參升麻湯 消斑青黛飲

圭 瀉火門 卷十七

治傷寒熱邪傳裏裏實表虛陽毒發斑 血熱不散蒸於皮膚  
則為斑形如錦紋紫黑者熱極而胃爛也多死此或因陽證誤投熱藥或因下早  
表熱乘虛入胃或因下遲熱陷胃中皆發斑○有陰證發斑  
者元氣大虛寒伏於下通其無根失守之火上獨薰肺傳  
於皮膚淡紅而稀少也宜大建中湯誤投寒劑則殆矣

青黛 黃連 犀角 石膏 知母 元參 梔子 生地

黃 柴胡 人參 甘草 如薑棗煎入苦酒 一匙和服

發斑雖由胃熱亦諸經之火有以助之青黛黃連以清肝火

梔子元參以清心肺之火知母生地以清腎火犀角石膏以

清胃火此皆大寒而能解鬱熱之毒者引以柴胡使達肌表

柴胡清少 使以薑棗以和營衛其用人參甘草者以和胃也

胃虛故熱毒乘虛入裏而發於肌肉也加苦酒者其酸收之  
義乎

替耳散 無擇

治鼻淵 鼻流濁涕不止名鼻淵乃風熱燥腦而液外溢也經  
根在頰發痛也原病式曰如以火燔金熱極則反化為水肝  
熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱盛則出涎肺熱甚則出涕  
盛極消燥以致之也

白芷 薄荷 辛夷 蒼耳子 錢半 為末食前葱茶湯調

下二錢

凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆上所致白芷主手足陽  
明上行頭面通竅表汗除溼散風辛夷通九竅散風熱能助

成方切用

消斑青黛飲 替耳散 辛夷散

圭 瀉火門 卷十七

胃中清陽上行頭腦替耳疏風散溼上通腦頂外達皮膚清  
荷泄肺疏肝清利頭目葱白升陽通氣茶清苦寒下行使清

升濁降風熱散而腦液自寧矣

辛夷散 嚴氏

治鼻生瘰肉氣息不通不聞香臭 鼻為肺竅氣清則鼻通氣  
熱則鼻塞氣熱甚盛蒸於

肺門則生瘰肉猶溼  
地得熱而生芝菌也

辛夷 白芷 升麻 藁本 防風 川芎 細辛 大通

甘草 等分為末每服三錢茶調下 外用燒罌為末加磚  
砂少許吹鼻中能消

之

經曰天氣通於鼻若胃中無痰火積熱則平時上升皆清氣



也由溼火內焚風寒外束氣血壅滯故鼻生瘰肉而室塞不通也辛夷升麻白芷辛溫輕浮能升胃中清氣上行頭腦防風藥本辛溫雄壯亦能上入顛頂勝濕祛風細辛散熱破結通精氣而利九竅芎藭補肝潤燥散諸鬱而助清陽此皆利竅升清散熱除溼之藥木通通中茶清苦寒以下行瀉火甘草和中又以緩其辛散也時珍曰肺開竅於鼻陽明胃脈挾鼻上行腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不利玉屑無憂散陳無擇

治喉風喉痺咽喉腫痛咽物有礙或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癰小兒爛癖及骨屑硬塞

戊方切用

辛夷散

玉屑無憂散

腎熱湯

玉

瀉火門卷十七

元參 黃連 荊芥 貫衆 山豆根 茯苓 甘草 砂

仁 滑石 五錢 礞砂 寒水石 三錢

為末每一錢先抄入口徐

以清水嚥下

元參黃連寒水石清火貫衆山豆根解毒滑石茯苓利水砂

仁礞砂輕堅

並能消

荊芥散結甘草和中故能統治諸病也

丹溪曰咽痛必用荊芥虛火上炎必用玄參○又有氣血大虛虛火游行無制客於咽喉遂成咽痛脈必浮大重取必滿宜濃煎人參湯細細呷之如用清降之藥立斃

腎熱湯千金

治腎熱耳流膿血不聞人聲

耳為腎竅舌為心竅以舌非孔竅故心亦寄竅於耳十二經中

除足太陽手厥陰其餘十經皆入絡耳中腎治內之陰心治外之陽清淨精明之氣上走空竅而聽斯聰矣若二經不調

陰陽不和或煩勞陰虛或衛氣不下循經脈或得於風邪或經脈積熱或大怒氣逆或淫飲痞隔或熱聚不散流出膿血或風熱搏結成核塞耳皆令暴聾宜通耳調氣安腎之劑

慈石 煅紅淬 牡蠣 鹽水煮 白朮 炒五兩 麥冬 芍藥 四兩 甘草 兩

生地黃汁 葱白 一升 大棗 十五枚 分三服

慈石體重辛鹹色黑補腎祛熱通耳明目故以為君牡蠣鹹

寒輭痰破結生地大寒瀉火滋腎麥冬甘寒補肺清金肺為

又聲屬金王太僕曰肺白芍酸寒平肝和血經曰肝病氣逆

虛則不能報息而耳聾耳得血皆能生水而制火退熱而歛陰白朮甘草大棗補

脾之品益土氣正以制腎邪也土能防水經云頭痛耳鳴腸

間者陽數者皆固本之藥使精氣充足邪熱自退耳竅自通

氣虛也胃之所生也仲景曰耳聾無

戊方切用

腎熱湯

綠豆飲 香連丸

香

瀉火門卷十七

加葱白者以引腎氣上通於耳也

綠豆飲

凡熱毒勞熱諸火熱極不能退者用此最妙

用綠豆不拘多寡寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦可待冰冷

或厚或稀或湯任意飲食之日或三四次不拘此物性非苦

寒不傷脾氣且善於解毒除煩退熱止渴大利小水乃淺易

中之最佳最捷者也若火盛口乾不宜厚但略煮半熟清湯

冷飲之尤善除煩清熱

香連丸 直指

治脾胃兩經中溼火傳變大腸下痢赤白膿血相雜裏急後

重溼熱之積干於血分則赤干於氣分則白赤白兼下者氣血俱病也後重裏急者氣滯不通也按裏急後重有因火

熱者有因氣滯者有因積滯者有因

黃連二十兩吳茱萸十兩四兩八錢醋糊丸米飲下一

方等分蜜丸一方加甘草八兩黃連用蜜水拌蒸曬九次入

木香為丸

痢為飲食不節寒暑所傷溼熱蒸鬱而成黃連苦燥溼寒勝

熱直折心脾之火故以為君用吳茱萸同炒者取其能利大腸

壅氣且以殺大寒之性也裏急由於氣滯木香辛行氣溫

脾能通利三焦泄肺以平肝使木邪不尅脾土氣行而滯亦

去也一寒一熱一陰一陽有相濟之妙經所謂熱因寒用寒

成方切用

香連丸 雪梨漿 大清飲

薑 瀉火門

因熱用也

釋古云近日香連丸絕非舊法難用消熱瀉下之藥人自為政亦名香連殺入如麻真可痛恨

加石蓮肉治噤口痢

石蓮清心火開胃口加大黃治熱痢積滯大黃瀉胃熱瀉

積加訶子龍骨名黃連丸

明加吳茱萸肉豆蔻烏梅湯丸並

治痢疾斷下

烏梅龍骨肉豆蔻訶子皆瀉大腸

雪梨漿

解煩熱退陰火此生津止渴之妙方也用清香甘美大梨削

去皮用大碗盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃水必甘

美但類飲其水勿食其渣退陰火極速也

大清飲

治胃火煩熱狂躁嘔吐等證可與白虎湯出入酌用

知母 石斛 木通一錢五分 石膏生用三錢 或加麥門冬

按人身熱病最多蓋素蘊之熱挾天時之熱而橫發爾是則

胃氣清和遇暄熱而不覺其熱者乃為平人迨至積熱既久

然後治之已為失算況於藥不對病乎所以肥人之病多因

血肉過盛而積飲食之熱瘦人之病多因津液素衰而生火

炎之熱治肥人之熱慮虛其陽治瘦人之熱慮虛其陰未可

執方妄施矣茲所錄以上諸方各宜自為推廣也

成方切用

大清飲

薑

瀉火門

成方切用卷十八目錄

除痰門 正方三十一 附方二十一

苓桂朮甘湯

二陳湯

陳皮半夏湯

半夏茯苓湯

二陳加梔連生薑湯

導痰湯

加味二陳湯

三聖丸

成方切用

目錄

生薑半夏湯

潤下丸

二賢散

順氣消食化痰丸

金水六君煎

金沸草散

半夏白朮天麻湯

六安煎

和胃二陳煎

括痰丸

苓朮二陳煎

除痰門  
卷十八

礞石滾痰丸

竹瀝達痰丸

清膈煎

茯苓丸

控涎丹

辰砂散

寧志膏

三子養親湯

常山飲

截瘧七寶飲

成方切用

目錄

滌痰湯

星香散

牛黃丸

貝母丸

清肺飲

清氣化痰丸

蘇子降氣湯

定喘湯

七氣湯

三因七氣湯

二

除痰門  
卷十八

四七湯

白金丸

一  
百  
花  
膏

加味百花膏

六君子湯

見治氣門

六味地黃丸

見補養門

八味地黄丸

見補養同

成方切用

目録

三

除喪門  
卷十八

成方切用卷十八

除痰門

內經止有稱飲之說並無痰證之名至仲景始立四飲之名而痰飲居其一今後世相傳無論是痰非痰開口便言痰火有云怪病之爲痰者有云痰爲百病母者但治其風爲病必有所以致之者如因風因火而生痰者但治其風火風火息而痰自清也因虛因實而生痰者但治其虛實虛實愈而痰自平也未聞治其痰而風火可自散虛實可自調者此所以痰必因病而生非病之因痰而致也治之之法全在詳辨虛實果其年力猶盛血氣未傷或以肥甘過度或以溼熱盛行或逆氣內連肝膈皆能驟致痰飲但察其形氣病氣多屬有餘者即實痰也此則宜行消伐但去其痰無不可也如其形羸氣弱年及中衰或以多病或以勞倦或以憂思酒色致成勞損年風卒厥者或脈見細數藏無陽邪時爲嘔惡泄瀉氣短聲暗等證但察其形氣病氣本非有餘者皆虛痰也此則但宜調補若或攻之無不危矣總之治痰之法但能使元氣日強則痰必日少卽有微痰亦自不能爲害而且充助胃氣若元氣日衰則水

方切用

苓桂朮甘湯

一

除痰門

卷十八

穀津液無非痰爾隨去隨生有能攻之使盡而且保元氣無恙者乎故善治痰者惟能使之不生方是補天之手苟不辨其虛實而欲一槩攻之如王隱君所論內外百病皆生於痰悉用滾痰丸之類其亦但知目前而不知日後之患哉○諸家治痰之法多有治其標者雖不可執亦不可廢也詳列如左

成方切用

苓桂朮甘湯

卷之十八

苓桂朮甘湯

金匱

治心下有痰飲胸脇支滿目眩

扶苓兩四桂枝

白朮三兩  
甘草二兩

痰飲陰象阻抑其陽用此陽藥化氣以伸其陽此正法也茲所主乃在胸脇支滿目眩者何耶靈樞謂心包之脈是動則病胸脇支滿然則痰飲積於心包其病自必若此目眩者痰飲阻其胸中之陽不能布水精於上也茯苓治痰飲伐腎邪

通水道桂枝通陽氣和營衛開經絡白朮治風眩燥痰水除

脹滿成者治痰宜先補脾脾復健運之常而痰自化矣

甘草得茯苓則不資滿而反泄滿本下氣除煩滿故用之也

金匱曰短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣

丸亦主之喻嘉言曰子辨息論中已詳仲景分別呼吸言病

之旨矣今短氣亦分呼吸各出一方呼吸之短用苓桂朮甘

湯以通其陽陽氣化則小便能出矣吸氣之短用腎氣丸以

通其陰腎氣通則小便之關門利矣

二陳湯局方陳皮半夏貴其陳久則少燥散之性故名二陳

治一切痰飲為病欬嗽脹滿嘔吐惡心頭眩心悸稠者為痰

水溼其本也得火則結為痰隨氣升降在肺則欬在胃則嘔

在頭則眩在心則悸在背則冷在脇則脹中脘有痰令人憎

寒壯熱頭痛類外感表證久則潮熱夜重又類陰火內傷

走注肢節疼痛又類風證但肌色如故脈滑不勻為異

成方切用二陳湯

半夏薑製陳皮去茯苓錢甘草分加薑煎薑能製半夏之毒治痰

通用二陳風痰加南星白附皂角竹瀝寒痰加半夏薑汁火

痰加石膏青黛溼痰加蒼朮白朮燥痰加栝蒌杏仁食痰加

山查麥芽神麴老痰加枳實海石芒硝氣痰加香附枳殼脇

痰及在皮裏膜外加白芥子四肢痰加竹瀝

半夏辛溫體滑性燥行水利痰為君痰因氣滯氣順則痰降

麗安常曰善治痰者不治痰而治氣故以橘紅利氣痰由溼

氣順則一身津液亦隨氣而順矣生溼去則痰消故以茯苓溼為臣中不和則痰涎聚又以

燥主脾家溼痰雖俱化痰而寒溼燥潤各異脫或悞施貽害

匪淺用者宜審之○有血不足陰火上逆肺受火傷肅清之

令不得下行由是津液渾濁生痰不生血者名燥痰當用潤

劑如地黃門冬枸杞之類滋陰降火而痰自清若投二陳立

見危殆有頭風眩暈骨痛投以風藥不效投以痰藥見功又

有眼赤羞明與之涼藥不廖異以痰劑獲愈有人坐處吐痰

滿地不其稠黏只是沫多此氣虛不能攝涎不

可用利藥宜六君子加益智仁一錢以攝之

去茯苓甘草名陳皮半夏湯再加栝蒌名栝蒌半夏湯去陳

皮甘草名半夏茯苓湯治水氣嘔惡加黃芩名茯苓半夏湯

宣明治熱痰加黃連梔子生薑名二陳加梔連生薑湯治膈上

熱痰令人嘔吐去生薑加砂仁枳殼名砂枳二陳湯行痰利

氣加膽星枳實名導痰湯治頑痰膠固非二陳所能除者加

星以助半夏加枳實以成衝牆倒壁之功○有痰飲流入四

肢肩背痠痛手足罷軟誤以為風則非其治宜導痰湯加木

薑片子再加菖蒲治驚悸健忘怔忡不寐導痰湯加木香香

附名順氣導痰湯治痰結胸滿欬逆上氣加枳實栝蒌龍子

山查神麴治食積痰嗽發熱加蒼朮枳殼片子薑黃名加味

二陳湯仁治痰攻眼腫併酒家手臂重痛麻木除甘草加乾

薑薑汁糊丸名溫中化痰丸實治胸膈寒痰不快除茯苓甘

草加黃連麴糊丸薑湯下名三聖丸治痰火嘈雜心懸如饑

單用陳皮生薑名橘皮湯金匱治乾嘔噦及手足厥者單用半

夏薑汁名生薑半夏湯金匱治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

心中憤憤然無奈者

潤下丸

子 52-697

治膈中痰飲

廣陳皮去白八兩甘草二兩蒸餅糊丸或將陳皮鹽水煮

爛曬乾同甘草為末名二賢散薑湯下溼勝加星夏火盛加

芩連

陳皮燥溼而利氣溼去則痰消氣順則痰下食鹽潤下而輒

堅潤下則痰降輒堅則痰化痰在膈中故用甘草引之入胃

甘草經蜜炙能健脾調胃脾胃健則痰自行矣

順氣消食化痰丸瑞竹堂

治酒食生痰胸膈膨悶五更欬嗽過飲則脾溼過食辛熱油膩故滿悶五更欬嗽由胃有積熱至此時火氣流入肺中故嗽

順氣消食化痰丸

咸方切用

四除痰門卷十八

半夏製薑膽星一青皮陳皮去白萊菔子生用蘇子沈水山查

麥芽神麴葛根杏仁去尖香附製一薑汁和蒸餅

糊丸一方半夏南星白礬皂角生薑等分同煮至南星無點為度去皂角薑切同曬乾用

痰由溼生半夏南星所以燥溼痰由氣升蘇子菔子杏仁所

以降氣痰由氣滯青皮陳皮香附所以導滯痰因於酒食葛

根神麴所以解酒山查麥芽所以化食溼去食消則痰不生

氣順則欬嗽止痰滯既去滿悶自除也

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛為痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒欬

嗽嘔惡多痰喘急等證神效妙劑 此六君子湯之變方也

當歸錢二三熟地錢三五陳皮半錢半夏錢二茯苓錢二炙甘草錢一加

生薑三五七片如大便不實而多溼者去當歸加山藥

如痰盛氣滯胸膈不快者加白芥子七分 如陰寒盛而嗽

不愈者加細辛五七分 如兼表邪寒熱者加柴胡一二錢

金沸草散活人

治肺經傷風頭目昏痛欬嗽多痰風盛則氣壅氣壅則痰升故頭目昏痛而欬嗽直指

方云欬嗽感風者鼻塞聲重傷冷者悽清怯寒挾熱為焦煩

受溼為鬱滯瘀血則胸膈悶停水則心下怔忡三因方云

金沸草散大劑煎湯重漱而愈

旋覆花即金沸草前胡細辛一錢荆芥半錢赤茯苓六分半夏五分甘草一分

咸方切用

金水六君煎 金沸草散 五除痰門卷十八

枳殼桔梗有熱加柴胡黃芩頭痛加川芎

風熱上壅荆芥輕辛發汗而散風痰涎內結前胡旋覆消痰

而降氣半夏燥痰而散逆甘草發散而緩中茯苓行水細辛

溫經蓋痰必挾火而兼溼故下氣利溼而證自平茯苓用赤

者入血分而瀉丙丁也

半夏白朮天麻湯東垣

治脾胃內傷眼黑頭眩頭痛如裂身重如山惡心煩悶四肢

厥冷謂之足太陰痰厥頭痛痰厥者溼痰厥逆而生也痰逆

黑色也。東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足寒而氣

逆也太陰少陰二經雖不上循頭然痰與氣逆壅於膈中頃

而為痛也

半夏製麥芽神麴錢白朮錢蒼朮錢人參錢黃耆錢陳

皮茯苓澤瀉錢天麻錢乾薑錢黃蘗錢酒洗錢每服五錢

痰厥頭痛非半夏不能除而能和胃頭旋眼黑虛風內作非

天麻不能定黃耆人參甘溫可以補中亦可以瀉火二朮甘

苦而溫可以除痰亦可以益氣健脾胃益氣苓澤瀉熱導水

陳皮調氣升陽神麴消食蕩胃中滯氣麥芽化結助戊己運

行胃為戊土乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦寒以療少火在泉

發躁也東垣曰夫風從上受之風寒傷上邪從外入令人頭

胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者過在手太陽少陰乃

淫熱頭痛也如氣上不下頭痛者下虛上實也過在手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭半寒痛者先取手少

治風寒欬嗽痰滯氣逆

六安煎

成方切用

半夏白朮天麻湯

六

除痰門

礞石滾痰丸

王隱君

如胸脇疼痛者加天台烏藥

豆大白滾湯下名括痰丸治一切停痰積飲吞酸嘔酸脹悶

加肉桂一二錢去杏仁加乾薑豬苓為末湯浸蒸餅為丸綠

煎治痰飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等證如肝腎兼寒者再

瀉茯苓一錢五分白朮一二錢乾薑炒黃二錢名苓朮二陳

治胃寒生痰惡心嘔吐滿悶噯氣去杏仁白芥子加豬苓澤

去杏仁白芥子加炒乾薑一二錢砂仁四分名和胃二陳煎

痰者皆不可用此

痰氣然後察其寒熱虛實而調補之若氣虛猝倒及氣平無

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

痰者皆不可用此

治實痰老痰怪證百病風木太過剋制脾土氣不運化積滯

之處謂之老痰變生諸證不可測識

青礞石一兩沉香五錢大黃酒蒸黃芩兩將礞石打碎用焰硝一

兩同入瓦罐鹽泥固濟曬乾火煅石色如金為度礞石煅過

不堪用陳久者佳新研末和諸藥水丸量人虛實服之薑湯

送下服後仰臥令藥在胸膈之間除逐上焦痰滯不宜飲水

行動

礞石剽悍之性能攻陳積伏匿之痰吐痰水上以礞石摻之

藥大黃蕩熱去實以開下行之路黃芩瀉肺涼心以平上僭

之火沉香升降諸氣上至天而下至泉以導諸藥為使也然

成方切用

礞石滾痰丸

除痰門

乃峻劑非體質者不可輕投王隱君曰痰證古今未詳方書

為病之源或頭風作眩目運耳鳴或口眼喎斜動搖不寧其

痰或四肢游風腫硬似瘰癧或為齒齦齩痛牙齦浮而痛

瘰癧或喉氣吞酸心下嘈雜或胸膈或咽嗝不利咯之不出

痰之不下其痰如墨有如破絮挑膠肉之狀或心下如停

水鐵心氣冷痛或夢寐驚悸或足腕痠軟腰膝骨節痛

痛或四肢筋骨疼痛難移以名狀並無常處以致手臂麻痺

若風溼或脊上一條如錢之狀或起者或浮身習習如臥草

者或眼黏滯癢口糜舌爛喉痺等證或繞項結核狀若瘰癧

或胃脘間如有二氣交紐噎息煩悶有如煙火上衝頭面烘

熱或為失志癲癩或中風癱瘓或勞瘵在再之疾或風毒腳

氣或心下怔忡或畏人捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水黑汁

其為肺癰腸毒便膿膿破內外為病百端皆痰所致其狀不

同難以盡述蓋津液既凝為痰不復周潤二焦故口燥咽乾

大便結滯面如枯骨毛髮焦枯婦人則因此月水不通若能

逐去敗痰自然服餌有效余用滾痰丸

以愈諸疾不可勝數特相傳於世云

加元明粉一兩硃砂為衣治同減大黃黃芩各六兩加橘紅

半夏各三兩甘草三兩竹瀝薑汁為丸名竹瀝痰丸治同

力稍和緩

清膈煎

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮一錢貝母二錢膽星一錢海石一錢木通二錢白芥子五錢

分如火盛痰不降者加童便一小鍾如渴甚者加天花

粉二錢如熱在上焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏二

三錢如痰火上壅而小水不利者加澤瀉一二錢如痰

火閉結大便不通而兼脹滿者加大黃數錢或朴硝一二錢

酌宜用

成方切用

清膈煎

茯苓丸

九

除痰門

茯苓丸指迷方

治痰停中脘兩臂疼痛脾主四肢脾滯而氣不下故

半夏二兩茯苓一兩枳殼五錢風化硝二錢半如一時未易

中少時盛水置當風處即薑汁糊丸薑湯下

乾如芒硝刮取亦可可用薑汁糊丸薑湯下

半夏燥溼茯苓滲水枳殼行氣化滯驅堅去生薑制半夏

之毒而除痰使痰行氣通臂痛自止矣嘉言曰痰藥雖多此

四散令人肩背痠痛兩手罷轉誤以為風則非其治宜導痰

湯加木香薑黃各五錢輕者指迷茯苓丸重者控涎丹若血

虛不能榮筋而致臂痛宜

蠲痺門物湯各半帖如服

控涎丹一名妙應丸

治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引釣痛走易不定或手足



冷瘧氣脈不通此乃痰涎在胸膈上下 認癰瘰非也

甘遂去心大戟去皮白芥子 等分爲末糊丸臨臥薑湯服五七

丸至十九痰猛加丸數腳氣加檳榔木瓜松枝卷柏驚痰加

硃砂全蠍驚氣成塊加穿山甲鼈甲延胡索蓬朮熱痰加盆

硝寒痰加胡椒丁香薑杜

李時珍曰痰涎爲物隨氣升降無處不到入心則迷成癰瘰

入肺則塞竅爲喘欬背冷入肝則膈痛乾嘔寒熱往來入經

絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引釣痛入皮肉則癰癤癰腫陳

無擇三因方竝以控涎丹主之殊有奇功此乃治痰之本痰

之本水也淫也得氣與火則結爲痰大戟能泄臟腑水淫甘

成方切用 控涎丹 辰砂散

遂能行經隧水淫直達水氣所結之處以攻決爲用白芥子能散皮裏膜外

痰氣唯善用者能收奇功也虛弱人慎用○丹溪曰胃氣虛

而愈 辰砂散 靈苑

治風痰諸癰癩狂心疾諸癰因驚恐憂怒火盛于心痰塞心

醒身熱脈浮在表者陽癰屬六腑易治身冷脈沉在裏者

陰癰屬五臟難治其真痰火與驚而巳癰狂亦由於此

辰砂光明者乳香光瑩者棗仁五錢溫酒調下恣飲沉醉聽

睡一二日勿動若驚寤不可復治辰砂鎮心瀉心火乳香入

心散瘀血棗仁補肝膽而寧心

知人參一兩蜜丸彈丸大各服一丸每服一丸薄荷湯下

治同

三子養親湯 韓志

治老人氣實痰盛喘滿懶食痰不自動因火而動氣有餘便

食故懶紫蘇子沉水白芥子 萊菔子 各微炒研煎服或等分或

看病所主爲君

白芥子除痰紫蘇子降氣萊菔子消食然皆行氣豁痰之藥

氣行則火降而痰消矣吳鶴皋曰治痰先理氣此治標爾經

也李時珍曰治病先攻其甚若氣實而喘則氣反爲木

痰反爲標矣是在智者神而明之若氣虛者非所宜矣

常山飲 局方

成方切用 三子養親湯 常山飲

瘧久不已者用此截之瘧初起不宜截截則邪氣未

常山二錢草果二錢檳榔 知母 貝母 烏梅二錢薑三

片棗二枚半酒半水煎露一宿日未出時面東空心溫服渣

用酒浸煎待瘧將發時先服一方有良薑甘草無檳榔一方

加穿山甲甘草

古云無痰不作瘧常山引吐行水祛老痰積飲檳榔下氣破

積能消食行痰陰陽不和則瘧作陽勝則熱 陰勝則寒知母滋陰能治

陽明獨勝之火草果辛熱能治太陰獨勝之寒貝母清火散

結瀉熱除痰烏梅酸斂滯收生津退熱斂除故合爲截瘧之

劑也趙以德曰嘗究本草知母草果常山烏梅檳榔穿山甲

皆云治瘧集以成方者爲知母性寒入足陽明治獨勝

之熱便退就太陰草果溫燥治足太陰獨勝之寒使退就陽  
明二經和則無陰陽交錯之變是為君藥常山主寒熱瘧吐  
胸中痰結是為臣藥烏梅湧痰瘧除痰瘧破滯氣是為佐  
藥穿山甲穴山而居遇水而入則是有陰陽貫穿經絡於  
營分以破暑結之邪為使藥也惟脾胃有痰者用之收斂  
李士材曰常山生用多用則吐與甘草同用必吐若酒浸  
炒透但用錢計每見奇功未見其或吐也世人泥於老人久  
病忌服之說使良藥見疑沉疴難起抑何愚耶李時珍曰常  
山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分之後用之得  
宜得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥  
竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草  
果檳榔則入脾蓋無痰不作瘧一物之功亦在驅逐痰水而  
已

截瘧七寶飲 易簡

治實瘧久發不止寸口脈弦滑浮大者 脈弦為肝風滑為痰  
浮為在表大為陽若  
脈沉細微 不問鬼瘧食瘧並皆治之

成方切用 截瘧七寶飲 主 除痰門  
卷十八

常山 酒炒 草果 煨 檳榔 青皮 厚朴 陳皮 甘草 等分

用酒水各一鍾煎熟絲綿蓋之露一宿於當發之早而東溫  
服其來將去可服藥退其大者勢正盛服藥與之混戰從  
自舌兩但瘧之來大則速藥不損及五

常山能吐老痰積飲檳榔能下食積痰結草果能消太陰膏  
梁之痰陳皮利氣厚朴平胃青皮伐肝 肝為皆為溫散行痰

之品加甘草入胃佐常山以吐瘧痰也 王機微義曰此方乃  
脾寒治也用之亦效者肺病入陰陽利并脾氣鬱結濁液凝  
滯閉塞中脘因得燥熱以暢胸膈以氣通而痰止若中氣  
虛弱內有鬱火之人復用燥熱愈助燥熱將誰救楊仁齋  
曰瘧有水有血惟水飲所以作寒熱惟血所以增寒熱常  
山能逐水故也若是血證當加桃仁五靈脂為佐入生薑蜜  
同煎苟無行血之品何以收十全之功耶保命集云瘧食發

者乃邪氣深遠而入血分為陰經有邪宜  
加桃仁於桂麻湯中發散血中之風寒  
瘧瘧湯 嚴氏

治中風痰迷心竅舌強不能言 心在竅為舌心別脈繫舌根  
脾脈連舌本散舌下腎脈痰  
舌本二脈虛則痰涎乘虛閉其脈道故舌不能轉運言語也  
若二脈以血不能榮養而瘖者又當加補血藥○風痰其  
經絡舌強不能言其證為重若輕  
熱上攻舌腫不能轉者其證為輕

半夏 製 膽星 二錢 橘紅 枳實 茯苓 二錢 人參 黃蒲 竹  
第廿 甘草 五分 加薑煎

心脾不足風邪乘之而痰與火寒其經絡故舌本強而難語  
也人參茯苓甘草補心益脾而瀉火陳皮南星半夏利氣燥  
淫而祛痰菖蒲開竅通心枳實破痰利膈竹茹清燥開鬱使

成方切用 瘧瘧湯 星香散 主 除痰門  
卷十八

痰火降則經通而舌柔矣 嘉言曰此證最急此藥最緩有  
調下牛黃丸審其屬虛用此湯調下二月九庶足開痰通  
二丹丸見就風門○有風中心脾者有痰寒心竅者有風寒  
壅滯者致舌木木強又有氣虛血虛腎虛及老  
人暴不能言者宜十全大補湯加菖蒲遠志

星香散  
治中風痰盛體肥不渴者  
膽星 八錢 木香 二錢 為末服或加全蠍

南星燥痰之品製以牛膽以殺其毒且膽有益肝膽之功  
之經屬 佐以木香取其行氣以利痰也 木香能疏肝  
風木 肥而不  
渴宜燥可知加全蠍者以散肝風也 中風體虛有痰者宜六  
君子或四君子湯調下

牛黃丸

治風癇迷悶涎潮抽搐風癇或感風寒暑濕或飲食不節逆成或數日一發或一日數發發則眩仆倒地昏不知人癱瘓抽搐口目喎斜或隨厥氣作六畜之聲

膽星 全蠍去足 蟬蛻五分 牛黃 白附子 礞石洗 防風

天麻錢五分 麝香分 煮棗肉和水銀五分細研入藥末為丸

荆芥薑湯下

牛黃清心解熱開竅利痰天麻防風南星全蠍辛散之味烈

蠶蟬蛻清化之品白附頭面之藥去頭面 皆能搜肝風而散

痰結麝香通竅水銀劫痰引以薑芥者亦以逐風而行痰也

按牛黃丸之方頗多互有異同然大要在於搜風化痰寧心

通竅多用冰麝牛雄金珠犀珀若中臟者宜之如中腑中血

成方切用 牛黃 貝母 清肺飲 齒 卷十八

脈者反能引風入骨此方藥味頗簡故姑錄之以舉其餘也

貝母丸 消痰熱潤肺止咳或肺癰肺痿乃治標之妙劑

貝母兩 為末用砂糖或蜜和丸龍眼大或噙化或嚼服之

若欲劫止久嗽每貝母一兩宜加百藥煎蓬砂天然黃各一

錢五分尤妙如無百藥煎即醋炒文蛤一錢亦可或栗殼亦

可酌用若治肺癰宜加白礬一錢同貝母丸服如前法最妙

清肺飲

治痰淫氣逆而欬嗽受火傷則氣逆而為欬喉有停滯

要皆歸於肺以肺為五臟之蓋下通膀胱外達皮毛為氣之

主而出聲也大法新嗽證為表邪宜發散脈實為內熱宜

清利脈濡散為肺虛宜溫肺久嗽曾經解利以致肺胃俱虛  
飲食不進宜溫中助胃兼治嗽藥。素問曰肺之令人欬何  
也曰五臟六腑俱令人欬非獨肺也皮毛者肺之合也皮何  
先受邪氣邪氣以從其合也五臟各以其時受病非其時各  
傳以與之有自外得者肺上皮毛風寒暑溼之邪自皮毛入  
內傳臟腑而為嗽也有自內發者七情饑飽內有所傷則邪  
氣上逆肺為氣出入之道故五臟之邪上蒸於肺而為嗽也  
然風寒暑溼有不為嗽者蓋所感者重不爾於皮毛經傷臟  
腑而成傷寒溫熱諸病七情亦有為嗽者蓋病尚淺只在  
本臟未傳入肺所以傷寒以有嗽為輕而七情饑飽之嗽必  
久而後發也

杏仁去皮 貝母 茯苓 桔梗 甘草 五味子 橘紅分

加薑煎火嗽加青黛枯蕒海石食積痰加香附山查枳實

淫痰除貝母加半夏南星燥痰加枯蕒知母天冬午煎嗽屬

胃火宜清胃加石膏黃連午後嗽屬陰虛宜滋陰降火加芍

成方切用 清肺飲 清氣化痰丸 韋 卷十八

歸芍地知槩二冬竹瀝薑汁傳送黃昏嗽為火浮於肺不可

用涼藥宜五倍五味訶子斂而降之勞嗽見血多是肺受熱

邪宜加歸芍阿膠天冬知母款冬紫苑之類久嗽肺虛加參

耆如肺熱用沙參

此治嗽之通劑也杏仁解肌散寒降氣潤燥貝母清火散結

潤肺化痰五味斂肺而寧嗽茯苓除溼而理脾橘紅行氣甘

草和中桔梗清肺利膈載藥上浮而又能開壅發表也

清氣化痰丸

治熱痰氣有餘則為火痰有餘則為痰痰隨火而升

半夏 膽星 兩 橘紅 枳實 炒 杏仁 尖 枯蕒 仁 油 黃芩 炒

茯苓一 薑汁糊丸淡薑湯下

此治痰火之通劑也半夏南星以燥溼氣黃芩栝蒌以平熱氣陳皮以順裏氣杏仁以降逆氣枳實以破積氣茯苓以行水氣水溼火熱皆生痰之本也氣之亢而為火猶民之反而為盜盜平則還為良民而復其業矣火退則還為正氣而安其位矣故化痰必以清氣為先也

蘇子降氣湯局方

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘嗽嘔血或大便不利肺為氣主火升冠肺故氣高痰湧或喘或嗽其則皆便用通利而愈不通故暫通復礙因而下血

成方切用

蘇子降氣湯 定喘湯

未 除痰門 卷十八

蘇子 半夏 前胡 厚朴 炒橘紅 當歸 甘草 肉桂

五 加薑煎一方無桂有沉香

蘇子前胡厚朴橘紅半夏皆能降逆上之氣兼能除痰氣行

則痰行也數藥亦能發表既以疏內壅又以散外寒也

多痰 外感 當歸潤以和血甘草甘以緩中下虛上盛故又用官桂

引火歸元也 玉機微義曰其散鬱和中之劑華蓋曰口鼻出

順其氣氣降則血歸經矣宜蘇子降氣湯加人參阿膠各錢下養正丹洛按方內多發長破氣動血之藥養正丹金石

煎煉而成皆偶用治標之藥未可以為定制也

定喘湯

治肺虛感寒氣逆膈熱而作哮喘 肺有膠固之痰外有非時之感則令人哮喘由寒束

於表陽氣併於膈中不得泄越故膈熱氣逆聲粗為哮喘外感之有餘也

白果 三十枚 炒 麻黃 湯款冬花 桑白皮 蘇子 杏仁 皮

黃芩 甘草 半夏 加薑煎

表寒宜散麻黃杏仁桑皮甘草辛甘發散瀉肺而解表裏熱宜清款冬溫潤白果收瀉定喘而清金蘇子降肺氣黃

芩清肺熱半夏燥溼痰以其成散寒疏壅之功也

七氣湯 三因方亦名四七湯

治七情氣鬱痰涎結聚咯不出嚔不下胸滿喘急或欬或喘或攻衝作痛 七情者喜怒憂思悲恐驚也七情之病令人氣結痰聚陰陽不得升降故有痞滿喘欬等

成方切用

七氣湯 四七湯

未 除痰門 卷十八

半夏 薑汁炒 厚朴 薑汁炒 茯苓 紫蘇 加薑煎

氣鬱則痰聚故散鬱必以行氣化痰為先半夏辛溫除痰門

鬱厚朴苦溫降氣散滿紫蘇辛溫寬中暢肺定喘消痰茯苓

甘淡滲溼益脾通心交腎痰去氣行則結散鬱解而諸證平矣

加白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯 治七情鬱結陰陽反

戾吐利交作寒熱眩運痞滿噎塞

四七湯 局方亦名七氣湯

治七情氣鬱痰涎結聚虛冷上氣或心腹絞痛或膨脹喘急

針經云胃絡不和喘出於陽明之上

逆真元耗散喘出於腎氣之上奔

人參 官桂 半夏 甘草 加薑煎心腹痛加延胡索

能行血中氣  
滯氣中血滯

李士材曰夫七情過極皆傷其氣丹溪以越鞠丸主之而此

獨異者蓋鬱久則濁氣閉塞而清氣日薄矣故雖痛雖膨而

不用木香枳殼用人參以壯主氣之臟肺官桂以制謀慮之

官肝者將軍之官謀慮出焉桂能平肝鬱久生痰半夏為之驅逐故不和國

老為之調停況桂性辛溫疏氣甚捷鬱結者還為和暢矣湯

名四七者以四味治七情也王儀微義曰經云寒則氣收宜辛散之甘緩之此治氣虛寒鬱

也

白金丸

成方切用

白金丸 百花膏

除痰門

治癲狂失心癲多喜笑尚知畏懼證屬不足狂多忿怒人莫能制證屬有餘此病多因驚憂痰血塞於心竅所致難經云諸陽為狂諸陰為癲

白礬三兩 鬱金七兩 薄荷糊丸

白礬酸鹹能輒頑痰鬱金苦辛能去惡血痰血去則心竅開

而疾已矣

百花膏

治喘嗽不已或痰中有血虛人尤宜

百合 款冬花 等分蜜丸龍眼大臨臥薑湯下或噙化加

紫苑百部烏梅名加味百花膏

款冬瀉熱下氣清血除痰百合潤肺寧心補中益氣最為理

嗽要藥

成方切用

百花膏

除痰門

成方切用卷十九目錄

殺蟲門 正方二十

烏梅丸

溫臟丸

集効丸

蠟蟲丸

使君子丸

獼肝丸

掃蟲煎

化蟲丸

成方切用

消渴殺蟲方

雄檳丸

目錄

殺蟲門 卷十九

成方切用卷十九

殺蟲門

風字從虫蟲風化也淫熱久則生蟲腐草為榮陳麥為  
蠶之類果實外殼完整蟲生於內人之腸胃無物不受豈  
得無蟲三尸丸通理或有之其猖狂於腸胃為痛為嘔為  
噎為嗜種種煩苦須使醫藥自來殺蟲之方每多險峻今  
人腸胃脆薄須兼養胃益血理中乃安不刻蟲乃人身之  
常有者偶為食傷或吐或瀉出和中自安不致伐味者  
不知妄用雷丸使君之類  
反致傷氣血而疾作矣

烏梅丸

仲景

治傷寒厥陰證厥吐蚘為寒厥厥者死腸厥者脈微而嘔  
蚘厥者蚘上入膈則煩煩更復止得食則嘔而久蚘蚘腸  
食臭復出也此為腸寒當自吐蚘與烏梅丸溫臟安蚘亦  
治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出亦主久痢

成方切用

烏梅丸

殺蟲門 卷十九

烏梅

三百枝

細辛

桂枝

人參

附子

炮

黃蘗

六兩

黃連

一斤

蜜丸

蜜丸

川椒

去

當歸

兩

苦酒

也

浸烏梅

一宿

去核

蒸熟

和藥

蚘得酸則伏故以烏梅之酸伏之蚘得苦則安故以連蘗之

苦安之蚘因寒而動故以桂附薑椒溫其中臟而以細辛當

歸潤其肝腎人參用以助脾脾中蚘為胃寒之故則成蚘厥宜

分吞烏梅丸程郊倩曰烏梅丸於辛酸入肝中微加苦寒

納上逆之陽邪而預之使下也雖曰安蚘實是安胃故謂之

久見陰陽不相順接而下利之證皆可以此方治之

經曰凡陰陽不相順接便為厥方時行曰經云手足之  
厥走手足之三陽從手足之陽從手足之陽從手足之陽  
從足走腹是三陰三陽俱相接於手足者也陽氣內陷不與  
陰氣相順接  
故手足逆冷

溫臟丸

治諸蟲積既逐而復生者多由臟氣虛寒宜溫健脾胃以杜其源

人參隨宜 川椒去閉口者 白芍炒 茯苓 細樅肉 使君子肉 檳榔二兩 白朮炒 當歸四兩 炮薑 吳茱萸湯泡一兩 為末神麴糊丸桐子大每服五七十丸或百丸饑時白湯下如臟寒甚者加製附子一二兩

集効丸

治蟲嚙腹痛作止有時或耕起往來腹痛有作止者蟲嚙則來者蟲不安其位也

成方切用

溫臟丸 集効丸 蠟蟲丸

二 殺蟲門 卷十九

大黃炒兩半 鶴虱炒 檳榔 訶子皮 蕪荑炒 木香 乾薑炒

附子七錢五分 蜜丸食前烏梅湯下婦人醋湯下

氣也

蠟蟲丸

治諸蟲積脹痛黃瘦等病

蕪荑 雷丸 桃仁 乾茶炒煙 雄黃微 錫灰 阜角炒煙

檳榔 使君子等 輕粉減半 細樅肉加倍 如蟲積堅固者加巴

豆霜與輕粉同湯浸蒸餅丸綠豆大每服五七分滾白湯下

陸續服之

使君子丸

治蟲脹腹痛及食勞發黃喜食茶米炭土等物飲食停滯諸蟲至脹滿嘔病或發黃身腫喜食生米茶葉土炭者蟲之所嗜也

使君子去殼 南星製 檳榔一兩 右藥合炒如喜食生米用麥

芽一筋炒喜食茶葉用茶葉炒喜食炭土用炭土炒取藥為

末蜜丸每晨砂糖水下誘之以甘與炒以所嗜諸物同意

獾肝丸

治鬼疰傳尸勞瘵此五疰之一其證使人寒熱沉沉然不知所苦而無處不惡死後傳人乃至滅門

獾肝一具須從獾身取下不留多偽 陰乾為末滾水服二錢日三

成方切用

使君子丸 獾肝丸 掃蟲煎

三 殺蟲門 卷十九

吳鶴舉曰獾肝治鬼疰此何以故凡物惡人而僻處晝伏而夜出者皆陰類也故假之以治陰疾獨用其肝者肝為厥陰

藏魂之臟也按物之惡人僻處晝伏夜出者狐鼠皆然不獨有退葉獨異於他獸此其所以能治鬼疰也與

掃蟲煎

治諸蟲上攻胸腹作痛

青皮 小茴香炒 吳茱萸一錢 檳榔 烏藥一錢 細樅肉三錢

烏梅二兩 甘草八分 雄黃五分 細末 將前八味用水一

鍾半煎八分去渣隨入後一味末再煎三四沸攪勻徐徐服

之 如惡心作吐加炒乾薑一二錢或先啖牛肉脯少許俟

一茶頃頓服之更妙

化蟲丸

治腸胃諸蟲為患腸胃之中無物不容所以變生諸蟲者結

而後蟲生之義也

鶴虱 胡粉 炒 苦楝根 東引末 檳榔 蕪荑 使君子 錢枯

分 爲末亦可麪糊作丸量人大小服之一歲兒可五

分

消渴殺蟲方 夷堅志

治消渴有蟲

苦楝根 取新白皮一握切焙入麝香少許煎空心服雖困

成方切用 化蟲丸 消渴殺蟲方 雄檳丸

頓不妨取下蟲三四條類虻而色紅其渴乃止

消渴一證有蟲耗其津液而成者蓋飲醇食炙積成胃熱溼

熱生蟲理固有之臨病宜諦審也

雄檳丸

治腹痛胃痛乾痛有時乾痛者不吐不瀉而但痛也有時者

也

雄黃 檳榔 白礬 等分飯丸每服五分

雄黃之辛毒檳榔之苦降白礬之酸瀉皆殺蟲之品也故合

用以治之吳鶴皋曰古方殺蟲如雷丸貫衆乾漆蠅庭百部

正氣也加苦參黃連者蟲得苦而伏也加烏梅河子者蟲得酸而輟也加藜蘆瓜蒂者欲其帶蟲吐出也加芫花黑豆者

欲其帶蟲瀉下也用雄黃川椒蛇牀樟腦水銀檳榔者治瘡疥之蟲也用胡桐淚黃若子韭子蟾酥者治蝨齒之蟲也用川樟皮海桐皮者治風癰之蟲也用青柏子覆盆葉者治九竅蠹蝕之蟲也用敗鼓心桃符板虎骨死人枕獾爪鵝骨者驅勞瘵之蟲也

成方切用 雄檳丸

五 殺蟲門 卷十九



成方切用卷二十目錄

經帶門 正方二十一 附方七

溫經湯

膠艾湯 方見胎產門

柏子仁丸

升陽舉經湯

東垣升陽舉經湯

固經丸

通瘀煎

連附四物湯

成方切用 目錄

四物加芩朮湯

四物加芩連湯

熱六合湯

寒六合湯

氣六合湯

風六合湯

正氣天香散

調經飲

毓麟珠

啟宮丸

抑氣散

五物煎

牡丹皮散

芎歸六君子湯

逍遙飲

如聖散

人參荊芥散

固下丸

白芷散

當歸煎丸

婦寶丹 見理血門

成方切用 目錄

二 經帶門

成方切用卷二十

經帶門

婦人諸病本與男子無異而其有異者則唯經帶胎產之屬不得不另詳方論此外雖證但與男子相同者自有各門方治故不以男女分而資贅於此○

溫經湯 金匱

治婦人少腹寒久不受胎兼治崩中去血或月水來過多及

至期不來 金匱曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即

此病屬帶下何以故會經中產瘀血在少腹不去何以知之歷年血寒積結胞門而甚焉者也故就婦人年五十其天癸已絕者而亦必據證斷之以立法也謂婦人年五十其天癸已絕應不從經血起見矣然而病證下利數十日不止知非偶感矣暮即發熱病屬陰矣少腹裏急明乎病屬下焦矣因而

成方切用

溫經湯

經帶門

腹滿是雖脾病而根于下焦矣手掌煩熱掌屬心主心血鬱則煩熱也唇口必得脾家營氣而津潤營氣鬱則陰火之故乾燥非渴也渴則為胸中熱胸無熱而但陰分有鬱火故不渴而乾燥也然皆非相因的對之證故疑而問仲景乃略其下利發熱腹滿而斷之為帶下且決其曾經半產瘀血在少腹不去謂下利而發熱陰虛者有之因而少腹裏急下多亡陰者有之腹滿脾虛者有之手掌煩熱陰虛者有之若唇口乃營氣所主下利之病不應見此然而有是證又合之少腹裏急手掌煩熱明是血瘀而火鬱故知以藥用溫經湯者因半產之虛而積冷氣結血乃瘀而不故以歸芍芎調血吳茱萸桂枝以溫其血分之氣而行其瘀肺為氣主麥冬阿膠以補其本上以統血參甘以補其虛丹皮以去標熱然下利已久脾氣有傷故以薑半正脾氣名曰溫經湯治其本也唯溫經故凡血分虛寒而不調者皆主之

吳茱萸 當歸 芎藭 芍藥 人參 桂枝 阿膠 丹

皮 生薑 甘草 麥冬 半夏 右十二味以水一

斗煮取三升分溫三服

膠艾湯 金匱

治婦人陷經漏下黑不解或損傷衝任月水過多淋瀝不斷方見胎產門

婦人之經雖從下出實由心胃之氣主之故升降有期今日

漏下是無期也所漏者黑是下有因寒而滯之物故曰陷經

陷者有降無升久則為黑色故以膠艾湯主之四物通調肝

血加甘膠峻補之病本於寒故以艾溫而行之也 丹溪謂婦

為有水紫為熱黑為熱極故兼水化假令其人素從熱病來者容有之然而仲景之言道其常也

栝子仁丸 良方

成方切用

膠艾湯 栝子仁丸 升陽舉經湯

經帶門

治經行復止血少神衰 女子善懷每多憂思憂多則傷心心

所藏而衝任之脈枯故經閉不行也○經曰月事不來者胞

脈閉也胞脈者屬心而絡于胞中今氣上逼肺心氣不得下

降故月事不來

栝子仁 油牛膝 酒浸 卷栝 五錢 澤蘭 續斷 二兩 熟地黃 一兩 蜜丸

米飲下

栝子仁安神而養心地黃續斷牛膝補肝腎而益衝任卷栝

澤蘭活血脈而通經閉

升陽舉經湯 東垣

治崩漏身熱自汗短氣倦怠懶食 此由勞傷所致

補中益氣湯 見治 氣門 加白芍黑山梔薑棗煎

補中湯以益氣升陽退熱收汗加芍藥以斂陰黑梔以清熱

又東垣蘭室秘藏升陽舉經湯黃耆當歸白朮錢各三羌活防

風藁本錢各二獨活附子炮甘草錢各半人參熟地川芎錢各一細

辛六分桃仁十箇紅花肉桂芍藥各五分每服三錢漸加五錢

治經水不止原文曰如右尺脈按之空虛是氣血俱脫大寒

證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰燥陽欲先亡也

當溫之舉之升之燥之當大升浮氣血切補命門之下脫也

固經丸良方

治經行不止及崩中漏下紫黑成塊衝任為經脈之海若無

調適矣若勞動過度損傷臟腑衝任之氣虛不能約制經血

故經多暴下或由陰虛陽搏為熱所乘攻傷衝任血得熱則

妄行也脈數疾小為順大者為逆紫黑成塊者熱甚而反兼

水化非寒也玉機微義曰血得寒則凝既行而紫黑故知非

成方切用固經丸 通瘀煎 三 經帶門 卷二十一

龜板炙四兩芍藥酒炒黃蘗酒炒黃芩二兩香附童便浸炒樗皮兩酒

經多不止者陰氣不足以制胞絡之火故越其常度也崩中

漏下者虛而挾熱也紫黑成塊者火極似水也黃芩清上焦

之火黃蘗瀉下焦之火龜板芍藥滋陰而養血皆壯水以制

陽光也香附辛以散鬱樗皮瀉以止脫

通瘀煎

治婦人氣滯血積經脈不利痛極拒按及產後瘀血實痛并

男婦血逆血結等證

歸尾三五錢山查 香附 紅花新者炒木香七錢烏藥一二錢青

皮 澤瀉一錢五分水煎加酒一二小鍾 兼寒滯者加肉桂

一錢或吳茱萸五分 火盛內熱血燥不行者加炒梔子一

二錢 微熱血虛者加芍藥二錢 血虛滯滯加牛膝 血

瘀不行者加桃仁二十粒去皮或加蘇木延胡之類 瘀極

而大便結燥者加大黃一二三錢或朴硝蓬朮亦可

連附四物湯丹溪

治經水過期紫黑成塊紫血熱也黑熱甚也過期而成塊氣

或挾痰停水以混之也如煙塵豆

汁屋漏水混濁稠者淫痰也

四物湯理血加香附黃連四物以益陰養血加黃連

成方切用連附四物湯 調經飲 四 經帶門 卷二十一

四物加芩朮湯亦名溫治經水過多黃芩抑陽白朮四物加

芩連湯治經水適斷五心煩熱經來色黑或如豆汁如豆汁

淫也芩連苦燥 四物加梔連為熱六合湯加薑附名寒六合

湯加陳朴名氣六合湯加羌朮為風六合湯皆經產通用之

藥也

調經飲

治經脈阻滯氣逆不調多痛而實者

當歸錢三五牛膝 山查錢二香附 青皮 茯苓一錢五分如因

不忌生冷而寒滯於內加肉桂吳茱萸之類 如脹悶者加

厚朴一錢或砂仁亦可 氣滯者加烏藥一錢或痛在小腹

者加小茴香一錢五分

正氣天香散 紺珠

治一切諸氣氣上湊心胸攻築脇肋刺痛月水不調 婦人憂鬱故氣病為多氣為血帥氣滯則血亦不能行故月候不調

香附 八錢 烏藥 二錢 陳皮 一錢 蘇葉 一錢 乾薑 五分 每五六錢煎

烏藥陳皮專入氣分而理氣香附紫蘇能入血分而行氣引以乾薑使入氣分兼入血分用諸辛溫以解鬱散肝令氣調而血和則經行有常自無痛壅之患矣

毓麟珠

治婦人血氣俱虛經脈不調或斷續或帶濁或腹痛或腰痠  
成方切用 正氣天香散 毓麟珠 五 經帶門 卷二十

或飲食不甘瘦弱不孕服一二劑即可受胎凡種子諸方無以加此

甘草 川芎 兩熟地 煨 菟絲子 製 當歸 四兩 杜仲 炒 人參 白

朮 土 茯苓 芍藥 鹿角霜 川椒 為末蜜丸彈子大  
空心嚼服一二丸用酒或白湯送下或為小丸吞服亦可

如經遲腹痛宜加破故紙 炒 肉桂各一兩甚者再加吳茱萸  
五錢或加龍骨一兩 醋 如子宮寒甚或泄或痛加製附子

或炮薑 宜 有鬱怒氣不順而為脹為滯者宜加香附 酒 二兩或甚者再加沉香五錢 血熱多火經蚤內熱者加川斷地骨皮各二兩或另以湯劑暫清其火而後服此或以湯引

送下亦可 男子製服宜加枸杞胡桃肉鹿角膠山藥山茶

黃巴戟肉各二兩

啟宮丸

治子宮脂滿不能孕育 婦人肥盛不孕往往因此

芎藭 白朮 半夏 麴 香附 一兩 茯苓 神麴 橘紅 甘

草 二錢 芎丸

橘半白朮燥溼以除其痰 肥而不孕多由痰盛故以香附神麴理氣以消其滯川芎散鬱以活其血則壅者通塞者啟矣

茯苓甘草用以去溼和中也

抑氣散 嚴氏

成方切用 啟宮丸 抑氣散 五物煎 六 經帶門 卷二十

治婦人氣盛於血變生諸證頭運膈滿 凡人氣血和平則無於胸膈則滿上攻於頭則運

香附 四兩 陳皮 二兩 甘草 炙 茯苓 一兩 每服二錢  
經曰高者抑之香附能散鬱氣陳皮能調諸氣茯苓神能安心

氣甘草能緩逆氣氣得其平則無亢害之患矣 氣盛於血固用行氣之藥則真氣耗散陰火愈盛而氣血兩虛矣是方雖和平祇可暫用須用滋血之藥使陰血充足則陽火自平乃正治之法蓋補其不足即所以制其有餘也

五物煎

治婦人血虛凝滯蓄積不行小腹急痛產難經滯等證此即四物湯加肉桂也

當歸<sup>三五錢</sup>熟地<sup>三四錢</sup>白芍<sup>二錢</sup>川芎<sup>一錢</sup>肉桂<sup>一二錢</sup>如兼胃

寒或嘔惡者加乾薑 水道不利者加澤瀉或茯苓 氣滯

者加香附或丁香木香砂仁烏藥 陰虛痼痛者加小茴香

血瘀不行臍下若覆杯漸成積塊者加桃仁或酒炒紅花

牡丹皮散<sup>良方</sup>

治血痕<sup>瘀血凝聚而成伏於隱僻之處盤結膠固須破血活血之品治之</sup>

丹皮 桂心 歸尾 延胡索<sup>三分</sup>牛膝 赤芍藥 莪朮<sup>六分</sup>

三稜<sup>四分</sup>水酒各半煎

丹皮桂心赤芍牛膝以行其血三稜莪朮歸尾延胡以行其

血中氣滯氣中血滯氣血週流則結者散矣

成方切用

牡丹皮散

芎歸六君子湯

逍遙飲

七

經帶門

芎歸六君子湯

治經水後期其來濇少形體肥盛<sup>體肥而經水後期濇少者氣虛而痰滯於經絡也</sup>

當歸 川芎 人參 白朮 茯苓 甘草 橘紅 半夏

加薑煎

二陳治其痰滯參朮補其氣虛<sup>氣行則痰行</sup>芎歸活其經血

逍遙飲

治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源血氣日枯漸至經脈不調者

當歸<sup>錢</sup>熟地<sup>錢</sup>棗仁<sup>錢</sup>芍藥 茯苓<sup>錢</sup>甘草<sup>錢</sup>陳

皮<sup>八分</sup>遠志<sup>三五分</sup>製 如氣虛者加人參一二錢 經水過期兼

痛滯者加酒炒香附一二錢

如聖散

治崩漏不止<sup>凡非時血行淋瀝不已謂之漏下忽然暴下如崩然謂之崩中有五色以應五藏</sup>

櫻櫚<sup>燒</sup>烏梅<sup>一兩</sup>黑薑<sup>半兩</sup>每服二錢烏梅湯下瀉能止血故

用櫻櫚酸能收斂故用烏梅溫能守中故用乾薑黑能止血

故並煨用

人參荊芥散<sup>婦寶</sup>

治血風勞<sup>血風勞者血脈空疎感受風邪寒熱盜汗展轉不已乃成勞也</sup>

人參 白朮 熟地 棗仁<sup>炒</sup> 鱉甲<sup>炙</sup> 羚羊角 枳殼

柴胡 荊芥<sup>五分</sup>防風 甘草<sup>炙</sup> 芎藭 當歸 桂心<sup>三分</sup>加

成方切用

聖散

人參荊芥散

固下丸

八

經帶門

薑煎

陳來章曰血中之風荊芥防風散之木盛生風羚羊角柴胡平

之陰虛發熱地黃鱉甲滋之血氣痛滯月水不調芎藭當歸

桂心枳殼調之倦怠食少盜汗心忪人參白朮炙草棗仁補

而收之

固下丸<sup>子和</sup>

治赤白帶下<sup>帶下起於風寒淫熱所傷入於胞中或中經脈下焦奇經之分因帶脈而得故名故曰帶赤者屬血白者屬氣</sup>

其狀如涕相連而下言帶者亦病形也有淫熱流滯下焦者

有肝腎陰淫淫勝者有驚恐而未棄土位濁液下流者或思

想無窮而為白淫者或係經淫熱屈滯於小腹之下者病未

營衛累滯而成也

梲皮兩半 白芍五錢 良薑三錢 黃蘗三錢 粥丸米飲下

陳來章曰梲皮苦燥淫寒勝熱瀉固下故赤白帶因於淫熱者用之爲君古方有蒼朮梲皮側藥梲皮蒼朮梲皮等 芍藥之酸斂陰氣收下瀉爲臣良薑之熱以散寒淫黃蘗之寒以祛熱淫並炒黑以止血收脫爲佐使也

白芷散良方

治赤白帶滑脫不禁良方曰帶下由於風寒淫熱所傷傷肝經者色白如涕傷脾經者黃如爛瓜傷腎經者黑如衄血

白芷一兩 海螵蛸二兩 胎髮五錢 酒調二錢白芷辛溫燥

成方切用 白芷散 當歸煎丸

九 經帶門 卷二十一

黑又能止血

當歸煎丸 嚴氏

治赤白帶下腹中痛不飲食羸瘦此血虛有熱之證法當涼補脈訣云崩中日久爲白帶漏下多時骨髓枯言崩久則血少復亡其陽故白滑之物下漏不止

當歸 熟地 阿膠炒 續斷 白芍炒 牡蠣煅粉 地榆炒黑

醋糊丸米飲下

歸芍熟地續斷阿膠補肝滋腎以治血虛牡蠣地榆清熱收脫以止帶下赤芍酸寒能散惡血去瘀所以生新散之亦以收之也

成方切用卷二十一目錄

胎產門 正方三十七 附方二十一

膠艾湯

又方

又膠艾湯

當歸芍藥散

桂枝茯苓丸

乾薑人參半夏丸

橘皮湯

半夏茯苓湯

釣藤湯

成方切用 目錄

當歸貝母苦參丸

羚羊角散

天仙藤散

紫蘇飲

白朮散

鯉魚湯

竹葉湯

紫苑湯

安榮散

胎元飲

固胎煎	
涼胎飲	
參朮飲	
表實六合湯	風溼六合湯
升麻六合湯	柴胡六合湯
大黃六合湯	人參六合湯
朴實六合湯	蛇子六合湯
石膏六合湯	茯苓六合湯
膠艾四物湯	附子六合湯
成方切用	
四物大黃湯	
當歸散	
達生散	
束胎丸	枳殼散
殿胞煎	
豬蹄湯	
當歸補血湯加慈白方	
參朮膏	
黑神散	
九蜜煎	古黑神散

二 胎產門  
卷二十一

清化飲	
失笑散	
通靈散	
清魂散	
當歸羊肉湯	
當歸生薑羊肉湯	
返魂丹	
免懷湯	
艾附暖宮丸	見理血門
佛手散	見理血門
成方切用	
歸芍湯	見理血門

三 胎產門  
卷二十一

成方切用卷二十一

胎產門

上節論曰調理妊婦在于清熱養血白朮補脾為安胎君藥條實黃芩安胎聖藥清熱故也朱丹溪曰產後當大補氣血雖有雜證從未治之此二說雖若近理而實未可奉為定訓也蓋人之氣未傷自不齊而胎前產後之虛實其然人人各殊是以用藥之難當如盤珠不可膠柱而鼓瑟今女科每執方以藥治諸病其受害不知若干人矣

膠艾湯 金匱

仲景云婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊

娠忽下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

血宜以膠艾湯溫補其血而妊婦亦其一但致病有不回無端漏下者此平日血虛而加客邪半產後續下血不絕此因

失血血虛而正氣難復若妊婦下血因疲者固有之而兼腹中痛則是因胞阻者阻其欲行之血而氣不相順非產前

成方切用

膠艾湯

當歸芍藥散

胎產門

害也故同以膠艾湯主之養陰補血莫如四物血妄行必挾風而為痰濁膠以鹽皮為主能去風以清水煎成能滲濁艾性溫而善行能導血歸經甘草以和之使四物不偏于陰三味之力也而運用之巧實在膠艾

乾地黄 艾葉 當歸 芍藥 阿膠 芍藥 甘草

水五升清酒三升合煮取二升去渣內膠令消盡溫服一升

日三服不瘥更服一方加乾薑二兩

經漏腰痛腹滿搶心短氣加黃耆千金翼治從高墜下損傷

五臟吐血及金瘡經肉絕者加乾薑

又方阿膠一觔蛤粉炒艾葉數莖亦名膠艾湯方治胎動不

安腹腹痛或胎上搶心去血腹痛指迷方加秦艽

當歸芍藥散 金匱

治婦人懷妊腹中疝痛

芍藥 助澤瀉 助茯苓 白朮 當歸 芍藥 六味枳為

散取方寸七酒和日三服

疝痛者正氣不足使陰得乘陽而水氣勝土脾鬱不伸鬱而

求伸土氣不調則急痛矣故以歸芍養血茯苓扶脾澤瀉瀉

其有餘之舊水芍藥暢其欲遂之血氣不用黃芩疝痛因虛

而稍挾寒也然不用熱藥原非大寒正氣充則微寒自去爾

桂枝茯苓丸

金匱云婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動

在臍上者此為癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利時胎

成方切用

桂枝茯苓丸

胎產門

動也下血者後斷三月衄也所以血不止者其癥不去故也

當下其癥桂枝茯苓丸主之

微然癥病女人物有之或不在于子宮則仍行經而受孕經斷

即是孕矣未及三月而得漏下不止者其癥不去故也

下則真欲落矣今在臍上者每月月集之時血氣相搏

而為漏下實非胎病故曰癥瘕是每月月集之時血氣相搏

之曰害至六月胎動此宜動之時矣但較前三月經水利時

胎動下血則已斷血三月不行乃復正不止是前之

漏下新血去而癥反堅牢不去故須下之為安耳

桂枝 茯苓 牡丹皮 桃仁 芍藥 等分末之煉蜜

丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

桂枝芍藥一陽一陰茯苓丹皮一氣一血調其寒溫扶其正

氣桃仁以之破惡血消癥瘕而不嫌于傷胎血者所謂有病



則病當之也且病之初必因寒桂能化氣而消本寒癥之成必挾淫熱為窠囊若滲淫氣丹清血熱芍藥斂肝血而扶脾使能統血則養正即所以去邪耳然消癥方甚多一舉而兩得莫有若此方之巧矣每服甚少而頻更巧要知癥不礙胎其結原微故以漸磨之

乾薑人參半夏丸 金匱

治妊娠嘔吐不止

乾薑 人參 半夏 各二兩

末之以生薑汁糊為丸如梧子大

每服十丸日三服

諸嘔吐酸皆屬于火此言胃氣不清暫作嘔吐者也若妊娠

成方切用

乾薑人參半夏丸 橘皮湯 半夏茯苓湯

三 胎產門 卷二十一

嘔吐不止則因寒而吐上出為嘔不止則虛矣故以半夏治嘔人參補虛而以生薑汁協半夏以下其所逆之飲

橘皮湯

治妊娠嘔吐不下食

惡阻以間食而嘔黃之謂虛嘔吐以食火也乃厥陰之血既黃其胎少陽之火虛而上逆也

橘皮 竹筴 人參 白朮 各十八銖

生薑 一斤 厚朴 十二銖

竹筴能平少火厚朴能下逆氣橘皮生薑所以開胃人參白

朮所以益脾開胃益脾欲其安緩云爾

半夏茯苓湯

治孕娠惡阻

惡阻者惡心而妨阻飲食也此是下部氣血不足復益脾胃之氣以固養胎元故脾胃自弱故

一開穀氣便惡心而妨阻也

半夏 生薑 各三十銖 乾地黃 十八銖 旋覆花 白芍藥 人參

芎藭 細辛 橘皮 甘草 桔梗 各十二銖

半夏生薑能開胃而醒脾地黃芎藭能養陰而益血人參甘

草能和中而益氣橘皮桔梗旋覆細辛皆辛甘調氣之品可

以平惡逆之氣而進飲食者也 半夏為妊娠所忌以其燥陰者故餘與人養胎之品用半夏者蓋五方焉

名故餘與人養胎之品用半夏者蓋五方焉

釣藤湯 良方

治癰癥胎動不安 癰癥手足抽掣也熱為陽風主動肝風相火為病也

釣藤鈎 當歸 茯神 人參 各二錢 桔梗 桑寄生 各五錢

成方切用

釣藤湯 當歸貝母苦參丸

四 胎產門 卷二十一

加黃芩梔子柴胡白朮風痰加半夏南星竹瀝風勝加全蠍

何蠶

釣藤之甘寒以除心熱而散肝風柴胡桔梗之辛涼黃芩梔

子之苦寒以平少陽厥陰之風熱風熱去則癰癥止矣人參

茯神以益氣而寧神當歸寄生以養血而安胎也

當歸貝母苦參丸 金匱

治妊娠小便難飲食如故

當歸 貝母 苦參 等分煉蜜丸如小豆大每服三丸加

至十丸

從來小便難傷寒熱邪傳裏則有之必先見表證或化源鬱

熱者有之上必見渴中氣不化者有之飲食必不調中氣下陷者有之必先見脾胃證下焦鬱熱有之必不渴而飲食如故今妊娠飲食如故而小便難必因便溺時得風冷鬱於下焦而為熱致耗膀胱之水故以苦參能入陰治大風開結氣除伏熱為君當歸辛溫能入陰利氣善治衝帶之病為臣其證雖不由肺然膀胱者氣化之門下竅難則上必不利故以貝母開肺氣之鬱為佐全不用利水藥病不因水鬱也

羚羊角散 本事方

治妊娠中風涎潮忽仆目吊口噤角弓反張名子癇 陰主靜陽主動

風陽邪也諸風眩掉皆屬肝木故有搐搦眩冒反張之證

成方切用

羚羊角散 紫蘇飲

五 胎產門卷二十一

羚羊角 錢一

獨活

防風

芍藥

當歸

棗仁

炒茯神

杏仁

薏仁 五分

木香

甘草 二分

加薑煎一方有五加皮

羚羊角之辛涼以平肝火防風獨活之辛溫以散風邪茯神

酸棗以寧神當歸川芎以活血杏仁木香以利氣薏仁甘草

以調脾也 扶土所以抑木故薏仁亦治筋急拘攣之證

紫蘇飲 嚴氏

治胎氣不和湊上胸腹腹滿頭痛心腹腰脇痛名子懸 由下焦氣

實相火旺盛舉胎而上上逼心胸也

蘇葉

當歸 七分

芍藥

人參

陳皮

大腹皮

五分

草二

加薑煎空心服心腹疼痛甚者加木香延胡索

芎歸芍藥以和其血蘇橘大腹以順其氣氣順血和則胎安矣既利其氣復以參甘養其氣者順則順其邪逆之氣養則養其沖和之氣也

天仙藤散 陳景初

治子氣

婦人衝任素受血風因妊娠而足腫喘悶妨食甚則脚指出黃水病名子氣非水也

天仙藤

即青木香藤微炒

香附

烏藥

陳皮

甘草

炙

紫蘇三葉木瓜生薑各三片空心煎服或為末鹽湯調下日

三服

天仙藤之苦溫疏氣活血能解血中之風氣香附烏藥陳皮

之辛溫以行鬱氣紫蘇生薑之辛溫以疏表氣甘草之甘緩

成方切用

天仙藤散 白朮散

太 胎產門卷二十一

以和正氣少加木瓜以除溼熱利筋骨調營衛也

白朮散 全生

治子腫面目肢體虛腫如水狀 胎中挾溼水與血搏滯氣流

原因煩渴引飲過多或濕瀉損傷脾胃脾虛不能制水五六箇月多有之

白朮

薑皮

陳皮

茯苓皮

大腹皮

五分

為末米飲下

指迷方有桑白皮無白朮 此即五皮飲 丹溪除薑皮腹皮加川芎

木通

水病當令上下分消薑皮橘皮辛而能散使水從毛竅出腹

皮苓皮淡而能泄使水從溺竅出水盛由于土衰故用白朮

之甘溫以扶脾土而隄防之不致汎溢也

鯉魚湯 千金

治妊娠腹大胎間有水氣

白朮五兩 茯苓四兩 當歸 白芍二兩 右細剉片以鯉魚一尾修

事如食法煮取汁去魚不用每服四錢入魚汁一盞半生薑

七片橘皮少許煎至七分去滓空心服或服鯉魚

按此方用歸芍以養血苓朮以實脾薑橘以和胃止用鯉魚

汁以利水絕不雜用利水之藥走氣傷陰暗損胎元且制小

其服以緩治之深為有見

竹葉湯

治妊娠心驚膽怯終日煩悶名子煩受胎四五箇月相火用

成方切用

鯉魚湯 竹葉湯 紫苑湯 七

能乘肺以致煩躁胎動不安亦有停痰積飲滯於胸膈致令煩躁者

麥冬錢半 茯苓 黃芩錢一 人參錢五 淡竹葉十片 如有痰者加竹

瀝少許

竹葉清煩黃芩消熱麥冬涼肺心火乘肺故 茯苓寧心人參

補虛妊娠心煩固多虛也

紫苑湯 良方

治子嗽 紫苑 天冬錢一 桔梗五錢 甘草錢一 桑白皮 杏仁三錢 竹節分一

入蜜溫服

子嗽由於火邪當以清火潤肺為務桔梗桑皮之涼以瀉之

天冬竹節之寒以清之紫苑炙草之溫杏仁白蜜之澤以潤之也

安榮散 本事

治子淋心煩悶亂子淋膀胱小腸虛熱也虛則不能制水熱

則亦有因房勞內傷胞門衝任

人參 細辛兩一 當歸 甘草 燈草五錢 木通 滑石 麥冬

錢三 為末每二錢麥冬湯調下

陳來章曰虛熱宜補故用人參甘草之甘淋悶宜通故用木

通燈草之滲滑石之滑肺燥則天氣不降而麥冬能清之腎

燥則地氣不升而細辛能潤之經口地氣上為雲天氣下為

成方切用 安榮散 胎元飲 人參胎元門

也血燥則溝瀆不濡而當歸能滋之也

胎元飲

治婦人衝任失守胎元不安不固者隨證加減用之或間日

或二三日常服一二劑脾腎兩虧而胎不固者此方最宜蓋

多尤

人參隨宜 當歸 杜仲 芍藥錢二 熟地錢三 白朮錢一 炙甘草錢一

陳皮七分 無滯 如下元不固而多遺濁者加山藥五味子

補骨脂之屬 氣分虛甚者倍白朮加黃耆但耆朮氣浮能

滯胃口倘胸膈有飽悶不快者須慎用之 倘虛而多寒兼

嘔者加炮薑七八分或一二錢 或虛而兼熱者加黃芩一

錢五分或加生地二錢去杜仲 陰虛小腹作痛加枸杞子

二錢 多怒氣逆者加香附無妨或砂仁亦妙 有所觸而

動血者加川斷阿膠各一二錢 嘔吐不止加震天麴二錢

煨薑二三片

固胎煎

治肝脾多火多滯而墮胎者

黃芩二錢 白朮一錢 當歸一錢 砂仁五分 陳皮一錢 芍藥一錢

涼胎飲

治胎氣內熱不安等證

生地 芍藥 黃芩 當歸 枳殼 石斛 茯苓 九

成方切用

甘草 七分 如熱甚者加黃芩一二錢

參朮飲

治妊娠轉胞 轉胞者胎逼及胞壓在一邊胞系轉戾下急

當歸 熟地黃 芍藥 人參 白朮 陳皮 白朮

夏 甘草 加薑煎空心服 此即入珍湯去茯苓加

氣虛補以四君血虛補以四物痰飲消以二陳使氣得升舉

而胞自通也 丹溪曰轉胞之病婦之稟受弱者憂悶多者性

因思胞不自轉為胎所壓胎若舉起胞系自疏水道自通矣

近思宅寵人患此脈似清重則弱子曰此得之憂患滿為血

少氣虛強為有飲血少則胎弱不能舉氣虛有飲中焦不調

而臨則胎知所避而就下乃以上藥與服隨以指探喉中吐

出藥汁候氣定又與之八貼而安此恐偶中後治數人皆效

○仲景云婦人本肥盛今反羸瘦胞系了戾但利小便則愈

宜服腎氣丸以中有茯苓 又法將孕婦倒豎胎轉而小便

自通矣

表實六合湯

治妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病

四物湯 每味一兩 麻黃 細辛 五錢

凡婦人傷寒六經治例皆同有懷妊者則以安胎為主藥中

有犯胎者則不可用也海藏皆以四物為君養血安胎餘同

傷寒例分證而治麻黃細辛發汗解表故加用之治表實無

汗者

四物四兩加桂枝地骨皮各七錢名表虛六合湯治妊娠傷

成方切用

寒表虛白汗 地骨皮涼血故 身熱惡寒頭痛項強脈浮而弱

四物四兩加防風蒼朮各七錢名風溼六合湯治妊娠傷寒

中風溼氣肢節煩痛頭痛身熱脈浮四物四兩加升麻連翹

各七錢名升麻六合湯治妊娠傷寒下後過經不愈溼毒發

斑如錦紋者四物四兩加柴胡黃芩各七錢名柴胡六合湯

治妊娠傷寒胸脇滿痛而脈弦少陽經證四物四兩加大黃

五錢桃仁十枚 妙名大黃六合湯治妊娠傷寒大便閉小便

赤氣滿而脈沉數太陽陽明本病也急下之 大黃桃仁

有用之者謂有病病當之也經曰婦人重身毒 所忌然傷寒間

之何如岐伯曰有故無損亦無損也此之謂與 四物四兩加

人參五味各五錢名人參六合湯治妊娠傷寒汗下後欬嗽

不止四物四兩加厚朴枳實各五錢名朴實六合湯治妊

娠傷寒虛痞脹滿陽明本虛者本胃四物四兩加梔子黃芩

各五錢名梔子六合湯治妊娠傷寒汗下後不得眠四物四

兩加石膏知母各五錢名石膏六合湯治妊娠傷寒大渴而

煩脈長而大四物四兩加茯苓澤瀉各五錢名茯苓六合湯

治妊娠傷寒小便不利太陽本病本勝脫四物四兩加阿膠

艾葉各五錢名膠艾四物湯加甘草黃芩乾薑治妊娠傷寒

汗下後血漏不止損動胎氣者四物四兩加附子肉桂各五

錢名附子六合湯治妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛

脈沉遲者少陰病也桂陽雖辛熱動胎之藥然四物四兩加

成方切用當歸散主胎產門

生地酒大黃各五錢名四物大黃湯治妊娠傷寒畜血證

婦人妊娠若畜血抵當桃仁莫妄施要教母子俱無損大黃四物對分之

當歸散金匱

妊娠有宜常服者婦人血少有熱胎動不安及數半產難產

病悉皆主之

當歸 芎藭 芍藥 黃芩 白朮 為末酒調服日二

衡任血盛則能養胎而胎安歸芍藥能養血而益衝任又

懷妊宜清熱涼血血不妄行則胎安黃芩養陰退陽能除胃

熱白朮補脾燥溼亦除胃熱胎氣係於脾脾虛則脾胃健則

能運化精微取汁為血以養胎自無惡阻嘔逆之患矣易簡

方加山茱萸治經三四月不行或一月再至數月不行者血

歸芍藥補之以白朮山茱萸一月再至者脾虛有

熱也白朮能補脾黃芩能涼血山茱萸能固經

達生散亦名東胎散丹溪

妊娠八九月服數十劑易生有力詩曰誕彌厥月先生如達

多因氣血虛弱營衛滯達服此則易生如達矣

當歸酒芍藥人參 白朮 紫蘇 甘草 大腹皮

陳皮 蘇五葉黃楊腦子七箇煎黃芩木或加枳殼砂仁

或春加川芎夏加黃芩冬如木方或有別證以意消息

當歸芍藥以益其血人參白朮以益其氣腹皮陳皮紫蘇葱

葉以疏其壅氣血不虛不滯則臨產自無畱難之患矣丹溪

成方切用達生散主胎產門

難往往往見於鬱悶安適之人富貴奉養之家若貧賤者鮮有

之苦方有瘦胎飲為渴陽公主而作惡其至則之謂子厥母

苦於難產遇胎動而渴而去之謂之渴母氣虛亦不能自運爾常補母

氣則見健易產令其有孕五六六月以方隨母之性藥與時令

加滋服無不應因名曰達生散云昔湖陽公主難產方士

道瘦胎飲用枳殼四兩甘草二兩炙五月後日服一錢潔古

改以枳朮名東胎丸寇宗奭明其不然蓋孕婦全賴血氣以

養胎血氣充實胎乃易生彼公主奉養太過氣實有餘故可

服之若一藥濫施誤之甚矣按瘦胎飲又名散胎散治胎肥

難產臨月服之張氏如香野行和實胎陽下見胎者生

草產母用力須待兒下身身腰力早并安服催生藥多致

不致方可用力一送催兒下生若用力太早并安服催生藥多致

唯無益而有害之矣古方有用免腦者有用豬脂者有用油

蜜急白者有用葵子者有用牛乳輪皮滑石者有用金鳳子

者有用枳殼者有用萬年青子者大都取其滑澤之義雖近

理而莫必其效也又有用身衣者有用髮退灰者有用草

頭灰者有用百草霜者有用伏龍肝者有用整頭灰者有用

鹿麻子貼于足心者有手握石燕者雖曰各有深意但燒灰而服者徒劫燥其津液手握足貼者勿驗爾意平時失於將理至于臨產艱難頻以雜藥催之皆或也○又回生丹方書中大誇其催生之效并產後種種功能然不過破瘀之效爾今世執而用之者為害甚多所以不錄

### 殿胞煎

治產後兒枕疼痛等證如神

當歸五錢 川芎 炙甘草 茯苓 肉桂一二三錢 水或五七分

煎熱服 如脈細而寒或嘔者加炒黃乾薑一二錢 如脈

弱陰虛者加熟地三五錢 如氣滯者加香附一二錢或烏

藥亦可 腰痛加杜仲二三錢 如血熱多火者去肉桂加

酒炒芍藥一二錢張景岳曰丹溪云芍藥性酸大伐發生之

### 成方切用

殿胞煎 治產後 當歸補血湯加上方

寒不過于生血藥中稍覺其清兩非若苓連輩之大苦大寒者也使芍藥猶忌則他之更寒者尤為不可用矣余每見產家過慎者或因太暖或因年力方壯而飲食藥餌大補過度以致產後動火者病熱極多若盡以產後為虛必須皆補宜盡熱哉且芍藥性清味酸而收最宜于陰氣散失之證豈不為產後之要藥乎不可不辨也

### 豬蹄湯 靈苑

治乳少

豬蹄一隻 通草一兩

豬蹄鹹能潤下通草淡能通竅

### 當歸補血湯加葱白方

治產後無乳乳者血氣之所成也故氣血充盛之婦未嘗無乳凡見無乳者皆氣弱血虛之婦也○古方中用穿山甲王不留行及漏蘆等物唯氣血有餘而兼壅滯者宜之虛弱者當禁之矣

常歸錢一 黃耆兩一 葱白枚一

當歸黃耆大補其氣血此養乳汁之源也葱白辛溫直走陽

明以達于乳房故用之為使此通乳汁之渠也

### 參朮膏 丹溪

治產後胞損成淋瀝證或遺尿

人參二錢 白朮錢二 黃耆半錢 茯苓 陳皮 桃仁錢一 炙甘草五分

用豬羊胞煮湯入藥煎服

產後胞損必令氣血驟長其胞可完若稍遲緩恐難成功故

以參耆朮草以補之加陳皮以宣其滯桃仁以活其血茯苓

以助其下行用豬羊胞煮湯入藥煎服取其以胞補胞之義

### 成方切用

參朮膏 黑神散 治產後 胎產門

不特引經也丹溪曰收生不謹以致損胞而得淋瀝有餘氏胞雖在內自亦可治胎其胞虛其因語曰難產之人多是氣虛難產之後氣血充虛因用峻補以參朮膏煎以豬羊胞極微時與之旬劑

### 黑神散 局方

治產後惡露不盡攻衝作痛及胞衣不下胎死腹中由血滯不行也

熟地黃 歸尾 赤芍 蒲黃 桂心 乾薑炒 甘草兩黑

豆半升 每服二錢酒童便各半煎便產須知有生地黃

前證皆因血瘀不行熟地歸芍之潤以濡血蒲黃黑豆之滑

以行血桂心乾薑之熱以破血乾薑辛熱能去惡生新 用甘

草者緩其正氣用童便者散其瘀逆加酒者引入血分以助

藥力也。產後惡露不行坐蓐勞傷者以前四味從輕治之若寒多及秋冬宜之若性急形瘦有火之人及夏月均宜審用。

去蒲黃黑豆加茯苓錢半吳黃五分當歸全熟地各三錢芍

藥白者酒炒炙甘草炒乾薑肉桂北細辛各一錢水煎名九

蜜煎治產後陽氣虛寒或陰邪入厥心腹疼痛嘔吐不食四

肢厥冷古黑神散百草霜白芷等分每二錢煎入童便醋少

許和服治橫生逆產及胎前產後虛損崩漏等證

清化飲

治產後因火發熱及血熱妄行陰虧諸火不清等證

白芍 麥冬 丹皮 茯苓 生地 石斛 黃芩

成方切用 錢二 錢二 錢二 錢二 錢二 錢二 錢二 錢二 清化飲 失笑散 五 胎產門

骨蒸多汗者加地骨皮一錢半 熱甚而渴或頭痛者加石

膏一二三錢 內熱便瀉者加木通一二錢或黃蘗梔子皆

可隨證用之 如兼外邪發熱加柴胡一二錢

失笑散 局方

治惡露不行心包絡痛或死血腹痛 惡血阻而不行上胸片

痛而作

蒲黃 五靈脂 等分爲末煎膏醋調服

生蒲黃性滑而行血五靈脂氣燥而散血 氣脈入肝皆能入厥陰

而活血止痛故治血痛如神

本方各一兩加木通赤芍各五錢每四錢入鹽少許服名通

靈散治九種心痛

清魂散 羅氏

治產後惡露已盡忽昏迷不知人 產後氣血虛弱又感風寒也

澤蘭葉 炙甘草 人參 川芎 荆芥 爲末溫酒調

下更宜燒漆器焙醋炭于牀前使聞其氣

氣血虛弱故以人參甘草補其氣外感風邪故以荆芥疏其

風 荆芥最散血中 之風故以爲澤蘭川芎以去其天下之瘀血風邪去餘

血下氣血生則神清矣肝藏魂故曰清魂

當歸羊肉湯

治產後發熱自汗肢體疼痛名曰葶勞

成方切用 清魂散 當歸羊肉湯 夫 胎產門

黃耆 人參 當歸 生薑 用羊肉一觔煮汁去肉入

前藥煎服如惡露未盡加桂枝 行血 有寒加吳茱萸有熱加生

地汁有氣加細辛

參者補氣而固衛當歸養血而調營生薑辛溫引氣藥入氣

分而生新血羊肉甘熱用氣血之屬以補虛勞熱退而汗收

矣 吳黃曰產後不可輕易發汗蓋有產時傷力發熱有去血

動飲食停滯亦皆發熱熱煩傷寒要須詳辨大抵產後大血

虛虛若汗之則變筋傷肉或昏迷不醒或抽搐不定或大

妙聖清熱地黃佐之加較前藥胡乾薑人參主之蓋乾薑

辛熱能引血藥入血分氣藥入氣分且能去惡生新有陽生

陰長之道以熱治熱深合內經之旨如惡露不盡者益母丸

夏其餘六經治例皆同必以四物湯爲主乃養血務本之要

也劉河間曰大抵產病天行從增損柴胡雜證從增損四物宜詳脈證而治之

除人參黃耆用羊肉一觔生薑五兩當歸三兩名當歸生薑羊肉湯

全治產後腹中疝痛及寒疝腹痛虛勞不足

返魂丹 四錢益母草膏丸產寶

治胎前產後一切諸病及月經不調赤白帶下

五月五日六月六日或小暑日益母草花正開時連根採收

陰乾用花葉及子石臼搗末蜜丸或搗汁于砂鍋內文武火

熬成膏服忌鐵如胎動腹痛下血不止當歸湯下橫生逆產

胎衣不下炒鹽湯下產後血運口渴狂言產後中風失音口

噤及血結奔痛時發寒熱面赤心煩或鼻衄舌黑口乾並童

成方切用

返魂丹

七

胎產門 卷二十一

便和酒下產後喘嗽惡心吐酸脇痛無力酒下產後瀉血

湯下產後痢疾米湯下產後崩漏糯米湯下產後帶下膠艾

湯下產後二便不通煩躁口苦薄荷湯下凡產後以童便化

服一丸能調經絡破血痛

益母草功擅消水行血去瘀生新利大小便故為經產所需

然其性辛散寒滑唯血滯血熱者宜之稍挾虛寒者服之為

害不淺今人以其有益母之名而濫用之誤矣觀其能消疔

腫散乳癰可知其性之全無補益矣時珍曰益母草根莖花

風熱明目調經用子為良若胎產腫消水行血

免懷湯

欲摘乳者此方主之婦人之血上則為乳下則為經欲摘乳者通其月事則乳汁下行免乳脹之苦矣

當歸尾 赤芍藥 酒紅花 酒牛膝 各五錢

四味皆下行導血之品故以用之名曰免懷者子生三年然後免于父母之懷也

免懷湯

胎產門



成方切用卷二十二目錄

嬰孩門 正方四十九 附方五

初生拭口法

甘草下胎毒法

豬乳法

襁褓法

乳哺法

乳兒法

哺兒法

雜將護法

成方切用

柴歸飲

升麻葛根湯

疏邪飲

柴葛煎

參蘇飲

惺惺散

透邪煎

麻黃湯

加味葛根湯

紅花湯

目錄

一 嬰孩門  
卷二十二

五味異功湯

羌活透肌湯

透肌散

紫草化毒湯

搜毒煎

涼血養營煎

甘桔湯

消毒飲

加味如聖散

前胡化斑湯

成方切用

活血散

犀角地黃湯

四順清涼飲

黃連解毒湯

八參白虎湯

七正散

加味導赤散

辰砂益元散

退火回生散

當歸黃連湯

目錄

二 嬰孩門  
卷二十一

保元湯

十二味異功散

九味異功煎

六物煎

六氣煎

白朮茯苓澤瀉湯

補中益氣湯 方見治氣門

四物湯 方見理血門

當歸活血湯

內托散

戒方切用 目錄

八珍湯 方見治氣門

附子理中湯 方見祛寒門

十全大補湯 方見治氣門

止痛活血散

治痘瘡溼爛方

痧證初起方

三 嬰孩門

成方切用卷二十二

嬰孩門

小兒之病與大人無異惟初生保護及痘疹等證不得不另集方法以便施用。世俗所謂驚風即四時感證也。方中行痘書喻嘉言寓意草中論之最詳當從傷寒門循經治治切不可用抱龍丸鎮驚丸等金石藥鎮壓外邪深入臟腑為害不淺。

初生拭口法

嬰兒初生急以綿裹指拭兒口中舌上惡血穢露謂之玉銜若啼聲一發即入腹成百病。薛氏曰嬰兒初生口含血塊啼門遇天行時氣久熱或飲食停滯或外感風寒發熱等因發為瘡疹急須於未啼時用軟帛裹指揩去其血雖出痘亦輕矣。又看舌下若連舌有膜如石榴子若啼不出聲不轉速

成方切用 初生拭口法 甘草下胎毒法

一 嬰孩門

以指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即活。若舌下

血出多者以亂髮燒灰同豬脂少許和塗之。聖惠云看齒根

葦刀割斷點豬乳佳如兒口難開先點豬乳

甘草下胎毒法

用粉甘草中指一節拍碎以水二蜺殼煎一蜺殼以綿纏蘸令兒吮之若吐出惡汁為佳若服一蜺殼不吐即不須更服

不問嬰兒虛實寒熱皆須服之。心鑑曰古方書言嬰兒始生

牛黃欲下胎毒今人率承用之不知今人稟受攝養與古人不同其藥乃傷脾敗陽之物若與兒服後必生異證只宜用淡豆豉煎濃汁與三五日其毒自下又能助養脾氣消化乳食。薛氏預以甘草細切少許臨產時以綿裹沸湯煮內覆草汁拭其口次用下胎毒諸法。

豬乳法

嬰兒初生至滿月內常時時旋取豬乳滴口中佳豬兒候母

將之即得

強保法

千金論云小兒用父故衣女用母故衣勿使新綿切不可過厚恐令兒壯熱生瘡發癰皆自此始巢氏云兒始生肌膚未筋骨軟弱宜時見風日若不見風日則令肌膚脆軟便易損傷嬰兒常藏於襁褓之內重衣溫暖譬如陰地草木不見風日輒脆不任風寒○嬰兒皆當以故絮著衣莫用新綿也天氣和暖無風之時令母常抱日中嬉戲數見風日則令血和氣剛肌肉硬密堪耐風寒不致疾病○又當習薄衣之法當從秋習之不可於春夏減其衣令兒受風寒○冬月但當著夾衣及衲衣之類極寒則漸加以舊綿人家多愛子乃以綿衣過厚適所以為害也○又當消息無令汗出乃為方切用乳法 襁褓法 乳哺法

成方切用乳法 襁褓法 乳哺法

工 卷二十一 嬰孩門

乳哺法

湯氏曰小兒乳哺須要得法乳者奶也哺者食也乳後不得便與食哺後不得便與乳小兒脾胃怯弱乳食相併難以消化周歲以上必成乳癖于腹中作疼作熱疳病從此起也丹溪曰小兒腸胃尚脆而窄若稠熱乾硬酸鹹甜辣一切魚肉水果皆難消化俱是發熱難化之物皆宜禁絕只與熟菜白粥非唯無病且無口可以養德此物外生粟味鹹乾性涼可為長陰之助然粟大補肺大潤俱為難化亦宜少與婦人無知唯務姑息畏其啼哭無所不與積成病疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迨至成人筋骨柔弱有食則不飽忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大義亦虧可不慎與至于乳母尤宜謹節飲食下咽乳汁便通情慾中動乳脈便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾痛立至不吐則瀉不瀉則熱或為口瘡或為驚搐或為夜啼或為腹痛病

乳兒法

之初來其溺必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患於未形也

凡乳母氣血為乳汁也五情善惡悉氣血所生宜戒喜怒一切禁忌不用孤臭癯瘦氣嗽病者及身體疥癬頭瘡長少唇緊音啞耳聾鼻癰病等方可乳兒 夏天盛熱時乳母浴後或兒啼不可與奶使兒胃有熱毒秋成赤白痢浴後可令定息良久乳之可無患也 聶氏曰盛啼不可食乳恐氣逆不順聚而為噎亦能成疾 千金論曰凡乳兒不可過飽飽則溢而成嘔吐若乳來多猛取出授後再乳切須於乳時令先捏去宿熱乳然後乳之如乳母欲臥寐當以臂枕之令乳成方切用乳兒法 哺兒法

三 卷二十一 嬰孩門

哺兒法

與兒頭平母欲睡著時即奪其乳恐其不知飽足亦成嘔吐父母交合之間兒臥于側或驚起不可乳兒蓋氣亂未必定能殺兒也 聖惠方云醉淫喘乳能殺小兒聖濟總論乳者夏欲怒怒則令上氣顛狂母不欲醉醉則令身熱腹滿母方吐下而乳則致虛羸母有積熱而乳則變黃不能食新房而乳則瘦悴交不能行

錢乙云兒多因愛惜過當兩三歲猶未飲食致脾胃虛弱平生多病半年後宜煎陳米稀粥時時與之十月後漸與稠粥調飲以助中氣自然易養少病惟忌生冷油膩甜物等寶鑑云兒五歲未滿勿食雞肉及子恐腹內生蟲

雜將護法

嬰兒百日任脈生能反復乳母當存節喜怒適其寒溫 嬰兒半晬尻骨已成乳母當教兒學坐 嬰兒二百日外掌骨成乳母教兒地上匍匐 嬰兒三百日臍骨成乳母教兒獨立 嬰兒周晬膝骨已成乳母教兒行步

上件並是定法世人不能如法往往抱兒過時損傷筋骨切宜戒之

柴歸飲

治痘疹初起發熱未退無論是痘是邪疑似之間均宜用此

平和養營之劑以為先著有毒者可托有邪者可散實者不

成方切用

雜將護法 柴歸飲 升麻葛根湯

日 嬰孩門 卷二十二

致助邪虛者不致損氣 凡陽明實熱邪盛者宜升麻葛根湯壯熱呵欠頓悶時發驚悸或吐或瀉手足時冷面頰赤嗽嚏者為痘證也呵欠頓悶肝之證也時發驚悸心之證也或吐或瀉手足時冷者脾之證也頰赤嗽嚏肺之證也腰痛喜寐腎之證也五臟之證盡顯者其痘必多但顯一二證者其痘必少其本總由

于淫火之毒也 當歸二錢 芍藥一錢半 荆芥一錢 炙甘草一錢 柴胡一錢

加薑煎服 血熱者加生地 陰虛者加熟地 氣虛脈

弱者加人參 虛寒者加炮薑肉桂 腹痛者加木香砂仁

嘔惡者加乾薑陳皮 若治麻疹以乾葛易荆芥

升麻葛根湯

小兒初間發熱壯盛為風寒為痘疹莫能辨的此方穩當

方見表散門

表熱壯盛此邪實于表也經曰輕可去實故用升麻葛根以疏表甘草佐之可以和在表之氣芍藥佐之可以和在表之營去其實邪和其營衛風寒則解痘疹則出誠初間之良劑也如至四五日痘中夾疹者亦此方主之疹散只依常法治痘

疎邪飲

治痘疹初起發熱凡氣血強壯無藉滋補者單宜解邪此方為主以代升麻葛根湯及蘇葛等方最為穩當

芍藥酒炒 柴胡用甘草 蘇葉 荆芥穗 水煎熱服 無

成方切用

疎邪飲 參蘇飲

五 嬰孩門 卷二十二

火者加生薑三片 火盛內熱者加黃芩 渴者加乾葛 去蘇葉荆芥加乾葛黃芩連翹名柴葛煎治痘疹表熱及痘疫等證

參蘇飲

治痘證初起風寒壯熱體重頭痛痰嗽壅盛

方見表裏門

風寒客于外故用紫蘇乾葛以發表痰嗽壅于內故用半夏前胡桔梗陳皮茯苓以安裏邪去之後中外必虛人參甘草急固其虛此則表和而痘易出裏和而氣不虛表裏無失斯良劑矣

惺惺散

發熱之初未明是痘形體怯弱者宜之

人參 白朮 甘草 細辛 白茯苓 天花粉 白芍藥

桔梗各七分

參苓朮草防其虛也細辛桔梗所以疏其陽花粉白芍所以和其陰

透邪煎

凡麻疹初熱未出之時惟恐誤藥故云未出之先不宜用藥然解利得宜則毒必易散而勢自輕減欲求妥當當先用此方為主

成方切用

惺惺散 透邪煎 麻黃湯

太 嬰孩門 卷二十七

當歸二錢 芍藥二錢 酒炒一錢 防風八分 荆芥穗一錢 升麻三分 甘草七分

水煎服 如熱甚脈洪滑者加柴胡一錢此外凡有雜證俱可隨宜加減

麻黃湯

治痘疹天寒滕密表熱壯盛

方見表散門

解表之藥有三品辛涼辛溫辛熱也夏月表氣易泄宜用辛涼春秋表氣平調宜用辛溫若天寒之時表氣閉密辛涼辛溫不能解散故以麻黃桂枝之辛熱者以主之亦各當其可而已佐以杏仁利其氣也佐以甘草和其氣也

加味葛根湯

凡小兒發熱看有痘情耳冷指冷脚冷眼如含水懶于言笑是也宜用此服至見點

升麻 葛根 前胡 桔梗 山查 青皮 木通 荆芥

撫芎 甘草 加燈心

高鼓峰曰如服此湯而不見點是毒盛也其證必重若熱甚氣悶語腰無力冬月可加麻黃一錢夏月加石膏一錢甚者加至二錢如冬月熱甚過四五日重證已見而舌灰白色者亦須以石膏合麻黃用之夏月蘇葉薄荷俱可用之如見點如糠糲齊布熱甚口臭此脾經痘也死不治矣去葛根青皮加紅花蟬脫名紅花湯三日後如見點三日

成方切用

加味葛根湯

七 嬰孩門 卷二十七

痘已齊而大熱不退此是毒盛危候見矣須以涼藥涼血紅花湯去升麻撫芎山查加生地丹皮與之然此是乾紅候百不一活如熱微者不妨紅花湯去升麻撫芎山查木通加殭蠶大力子名桔梗湯六日已過痘腳已齊又三日發熱起頂濃漿至矣當用木通殭蠶荆芥連翹花粉丹皮丹參等以和其毒其有變白色而發癢者氣血虧也五味異功散見治氣門四君子湯附方加白芍以救其元氣虛甚者參朮加至五六錢大劑用之自然有救或泥于庸醫發未盡而禁補或反咎發表欠透以致令其內陷者此殺人之論不可信也信手大補不一二劑必然窠下漿來生氣勃然矣即有搗破者亦自循皮爛臭而回

生

羌活透肌湯

治痘出見點未盡

羌活 陳皮 柴胡 前胡 半夏 茯苓 甘草 桔梗

川芎 當歸 山查

表氣未疏則出有不盡故用羌芎柴前以疏表裏氣未利則出有不速故用二陳桔梗以調裏當歸活表裏之血山查消裏之滯血活滯消則痘之出也易易耳

透肌散

治氣弱痘出不盡

成方切用

羌活透肌湯 透肌散 紫草化毒湯 搜毒煎

八 嬰孩門 卷二十二

紫草 錢二 木通 錢一 白芍藥 錢一 人參 錢一 蟬脫 升麻 甘草 錢一 分五

人參甘草能益氣而補中紫草木通能透肌而起痘升麻蟬

脫能退熱而消風用芍藥所以調陰氣而和營衛也

紫草化毒湯

治痘已出未出熱壅不使

紫草 錢二 陳皮 錢一 升麻 甘草 錢一 分五 如小便赤加木通

紫草活竅利血化毒陳皮快膈消痰利氣升麻消風發散瘡

痍甘草補虛和中解熱木通加之為導熱邪由溺而泄爾

搜毒煎

解痘疹熱毒熾盛紫黑乾枯煩熱便結純陽等證

紫草 地骨皮 牛蒡子 黃芩 木通 連翹 蟬退

芍藥 水煎 渴者加花粉麥冬 陽明熱甚頭面牙齦腫

痛者加石膏知母 小腸乾結臍腹實脹者加大黃芒硝

血熱妄行者加犀角童便 小水熱閉者加山梔車前子兼

表熱者加柴胡

涼血養營煎

治痘瘡血虛血熱色紅熱渴或色燥不起及便結溺赤凡陽盛陰虛等證

生地 當歸 白芍 甘草 地骨皮 紫草 黃芩 紅

花 水煎服量兒大小加減 渴者加天粉 肌熱無汗加

成方切用

涼血養營湯 甘桔湯 消毒飲

九 嬰孩門 卷二十二

柴胡 血熱毒不透者加犀角 毒熱甚者加牛蒡子木通

連翹之屬

甘桔湯

治痘疹咽喉腫痛

方見瀉火門

消毒飲

治痘疹咽喉腫痛膈上熱盛

牛蒡子 錢二 荊芥穗 錢一 防風 生甘草 錢一 分五

牛蒡子疏喉中風壅之痰荊芥穗清膈間風壅之熱生甘草

緩喉中風壅之氣防風散諸風不去之邪

如味如聖散

治痘疹瘰癧風熱聲啞喉痛

桔梗 牛蒡子 麥門冬 甘草 元參 荆芥 防風

生犀角 黃芩

牛蒡子 麥門冬 療風痰而清肺熱荆芥防風散風邪而升鬱

熱甘草桔梗黃芩利咽喉而清氣熱犀角元參涼心膈而療

結熱熱去則金清金清則聲啞瘥矣

前胡化斑湯

治痘疹中夾斑淡紅色 淡紅色斑之輕者也其原由初間不

傷寒雖證不同傷寒之斑宜主寒涼痘中之斑寒之則血凝

成方切用

如味如聖散 前胡化斑湯 治痘疹中夾斑淡紅色 淡紅色斑之輕者也其原由初間不

酒紅花 當歸 前胡 荆芥 白芷 甘草 赤芍

陳皮 鬱金 胡荽子

紅花當歸赤芍所以活斑中之血前胡白芷陳皮荆芥所以

利表裏之氣胡荽甘草鬱金所以散滯氣爾

活血散

治痘證氣血凝滯

木香 當歸尾 赤芍 川芎 紫草 酒紅花

每服三錢

氣貴利而不貴滯血貴活而不貴凝木香川芎調其氣滯赤

芍歸尾紫草紅花血竭理其血凝

犀角地黃湯

治痘疹血熱及諸失血證

方見理血門

心生血生地黃所以涼心血肝藏血白芍藥所以和肝血火

能載血牡丹皮所以去血中之火熱能動血生犀角所以解

諸經之熱

四順清涼飲

治實熱內壅腹脹秘結痘不能出

大黃 當歸 芍藥 甘草

成方切用

犀角地黃湯 四順清涼飲 黃連解毒湯

士 嬰孩門

痘以熱而出固不能以無熱若實熱內壅腹脹便秘則三焦

之氣不化而痘不能以出矣故用大黃通其滯當歸活其血

芍藥養其陰甘草調其胃通利之後表裏氣血皆承順矣故

黃連解毒湯

如形質虛弱而大便秘結不堪攻下者用蜜導

治痘疹裏熱壅盛

方見瀉火門

無熱固不化毒熱壅則毒亦不化故用黃連瀉心火黃芩瀉

肺肝之火黃柏瀉腎火梔子瀉上下之火無他證而惟熱壅

故用藥亦精專焉

人參白虎湯

治痘證裏熱渴甚

方見瀉火門白虎湯附方

石膏清胃熱胃清則不渴人參知母甘草化氣而生津液液

生則熱自除

七正散

治痘證小便秘澀

車前子 赤茯苓 山梔仁 生甘草梢 木通 扁蓄

龍膽草

治痘必欲利小便者水循其道而後地平天成故也是方也

成方切用

人參白虎湯 七正散 加味導赤散

嬰孩門 卷二十二

車前能滑竅赤苓能滲溼木通能通滯山梔能瀉火草梢能

通莖扁蓄能利水膽草能利熱七物者導其熱邪正其中氣

故曰七正

加味導赤散

治痘疹小便黃赤口乾煩渴

生地黃 人參 麥門冬 木通 甘草 竹葉 燈心

內熱故用生地黃小便黃赤故導以木通竹葉燈心口乾煩

渴故潤以麥冬人參甘草乃氣化而津液自生也

辰砂益元散

治痘疹裏熱小便黃赤神氣不清

方見消暑門六一散附方

滑石清利六腑甘草解熱調中辰砂安神去怯去甘草滑石

辰砂各一錢水飛過加冰片三厘每用冷水調服一錢名退

火回生散治痘證血滯枯澀火炎則水乾是故枯澀用滑石

意入冰片者欲其

速達而無壅滯也

當歸黃連湯

治痘瘡毒盛灰白色不癢

當歸 黃連 丹皮 殭蠶 荊芥 牛蒡子 花粉 銀

花 生地 加燈心

保元湯

辰砂益元散 當歸黃連湯 保元湯

嬰孩門 卷二十二

自行起發至頂已起矣而因氣虛有險證者宜此

人參 黃耆 甘草 加生薑

氣虛頂陷者此方主之

為古不用藥逆者為內言小兒痘瘡惟順愛心鑑三卷

轉危為安宜用保元湯如減主之此方原出東垣治慢驚上

衰木旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣滋助陰

陽作為膿血其證雖異其理則同去白芍藥加生薑改名保

元湯灸黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑一片水煎服

之險證者初出圖暈乾紅少潤也將長光澤頂陷不起也

老淫潤不斂也結痂而胃弱內虛也痂落而口渴不食也

後生癰毒也癰腫潰而微遲也凡有諸證宜此湯或加

胃發熱惡寒吐泄忘臥脹滿痞塞神短脈微者當以人參為

君黃耆為臣若表虛自汗亡陽潰瘍痘證陰瘡者當以黃耆

為君人參為臣

不可執一也



十二味異功散

治痘出不光澤不起張根窠不紅表虛癢塌

人參 豆蔻 白朮 當歸 丁香 肉桂 厚朴 陳皮

半夏 茯苓 附子 木香

中氣有餘氣血充滿則痘光澤起發根窠紅活表無癢塌之

患中氣不足則表亦虛而諸證作矣是方也人參白朮茯苓

當歸所以補胃附子肉桂丁香豆蔻所以溫胃半夏木香陳

皮厚朴所以調胃胃陽明也陳氏云陽明主肌肉胃氣充足

則肌肉溫暖光澤起脹而無癢塌之患亦見道之言也

起頭不充滿而發癢窠脫落如梅花片下發瀉者虛甚也

五味異功散加黃耆木香其者附子肉桂吳茱萸俱常用

成方切用

十二味異功散 九味異功散 六物煎 西 嬰孩門 卷二十二

九味異功煎

治痘瘡寒戰齧牙并治男婦陽氣虛寒等證可代陳氏十二

味異功散等方

人參 當歸 熟地 黃耆 乾薑 炮製附子 肉桂

錢一分 或一錢 丁香 或一錢 右量兒大小加減用水一鍾

半煎七分徐徐與服如泄瀉腹痛加肉豆蔻麩炒一錢或白

朮一二錢

六物煎

治痘疹氣血不足隨證加減用之神效不可盡述并治男婦

氣血俱虛等證

熟地 或用甘草 當歸 芍藥 俱隨宜 川芎 三四分 人參 或

或無不虛者不宜用 水煎服

如發熱不解或痘未出之先宜加柴胡以疎利或加防風佐

之 見點後痘不起發或起而不貫或貫而漿薄均宜單用

此湯或加糯米人乳好酒肉桂以助營氣 紅紫血熱不退

宜加紫草或犀角 脾氣稍滯者宜加陳皮山查 胃氣虛

寒多嘔者加乾薑 或用或加丁香 腹痛兼氣滯者加陳皮木

香 表虛氣陷不起或多汗者加黃耆 氣血俱虛未起未

貫而先癢者加肉桂白芷 元氣大虛寒戰齧牙泄瀉宜去

芍藥加黃耆附子乾薑肉桂

成方切用

六氣煎 白朮茯苓澤瀉湯

圭 嬰孩門 卷二十二

六氣煎

治痘瘡氣虛癢塌倒陷寒戰齧牙并治男婦陽氣虛寒等證

黃耆 肉桂 人參 白朮 當歸 甘草 右咬咀水

煎服 加減法照前六物煎

白朮茯苓澤瀉湯

治痘證水泡 中有實熱腸有停水溼熱外行初則痘色晶亮

釜中發 頃則痘皆水泡矣此乃水不能潤下竈底燃薪

白朮 茯苓 澤瀉

白朮甘而燥能益土以防水茯苓甘而淡能益土以決防澤

瀉而潤能潤下而利水水利溼消泡自瘳矣

補中益氣湯

治中氣虛弱痘不起脹難經曰氣主噓之故氣者噓長為物者也痘不起脹氣之弱也

方見治氣門

參耆朮草以補氣升柴以升陽當歸以活其營陳皮以利其

氣

四物湯

治痘證根淡血弱痘至五六日氣蒸血附之時根腳淡為血弱故用當歸活血川芎行血熟地補血芍

藥斂

方見理血門

當歸活血湯

成方切用

補中益氣湯 四物湯 當歸活血湯 內托散

嬰孩門 卷二十一

治痘瘡色紫色枯用此涼血活血

生地 當歸 川芎 赤芍 紅花 紫草

色紫為血熱色枯為血滯熱者涼之枯者澤之調血之道也

生地涼血之品餘藥皆活血之品血涼而活壅熱可除矣

內托散

治表虛裏實氣血皆弱在表者痘頂灰陷為氣虛痘根色淡為血虛若息重氣粗則為裏實

人參 黃耆 甘草 當歸 川芎 白芍 厚朴 防風

白芷 肉桂 木香 桔梗

紅深黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩 淡白灰陷屬

虛寒者加丁香溫裏肉桂溫表 當貫膿而不貫膿者倍參

普當歸加糯米煎熟入人乳好酒

氣虛故用參耆甘草血虛故用歸芍川芎然防風白芷肉桂能引諸藥自內而托之于外木香桔梗厚朴能調壅實以歸

于和

八珍湯

治氣血兩虛醫貴未然之防痘證雖順若氣體虛弱不補恐有後失故用四君子以補氣四物以養血

方見治氣門四君子湯附方

附子理中湯

治胃中虛寒或又誤服涼藥瀉而手足厥冷者

方見祛寒門理中湯附方

成方切用

八珍湯 附子理中湯 十全大補湯 止痛活血散

嬰孩門 卷二十一

十全大補湯

治痘證十日以上血氣虛弱者

方見治氣門四君子湯附方

止痛活血散

治痘漿已滿血滯瘀痛不可忍者

白芍藥酒炒 二錢為細末酒調下

諸病瘕者為虛痛者為實瘕宜補而痛宜瀉此痛為血實而

滯故用芍藥以平血酒調以行滯

治痘瘡溼爛方

或以敗草灰敷之或以蠶繭灰入枯礬少許敷之或以牆上

白螺蛸殼燒灰敷之或以蛤粉敷之四法者皆是淫者燥之之意

疹證初起方

升麻 葛根 芍藥 甘草 桑皮 地骨皮 桔梗 牛蒡 荆芥 連翹

疹證即疹子又名瘡子不宜依證施治惟當治本本者手太陰足陽明兩經之邪熱也解其邪熱則諸證自退矣 若服前藥次日標形顯鼻見點多者最吉以其清陽喜上升也第二日葛根可去惡其開肌腠而乾津液也若熱甚勢重前湯加白虎苓粉之類斷不可少若服藥後而熱愈甚者正毒達

成方切用

治痘瘡淫癘方 疹證初起方

太 嬰門 卷十二

之故也得大汗而毒自解矣若略見標而不見形者此為亦毒不透後必防疔宜從養陰治甘露飲主之見潤燥門必多服乃效亦從汗解乃屢驗者有一等小兒乳疳一日可解不必盡也緣小兒稟質尙弱神氣有限如遇粗工不審虛實發散過多必致正氣虛脫而不可救者多矣○有疹毒痰喘甚難用石膏黃連如水淋石要知其毒痰火壅結上焦之故宜用瓜蒌霜枳殼花粉金沸草清火如被氣虛者加入人參立應○疹證多泄瀉慎勿止瀉惟用升麻葛根黃連甘草則瀉自止○疹家忌泄瀉瀉則陽明邪熱得解是亦表裏分清之義○疹後泄瀉及便膿血皆由邪熱內陷故也大便忌止瀉惟宜升散仍用升麻葛根湯加黃連扁豆若便膿血加滑石末必愈

成方切用卷二十三目錄

癰瘍門 正方二十六 附方七

皂莢丸

皂蛤丸

桔梗杏仁煎

腸癰秘方

金銀花酒

回毒金銀花酒

長春藥酒

四仙飲 金銀花膏

真人活命飲

成方切用

目錄

癰瘍門 卷二十三

托裏散

芍藥藥漿煎

當歸藥漿煎

灸法

芙蓉外敷法

見本草從新木芙蓉條

百草煎

蠟礬丸

雄礬丸

托裏十補散

托裏散

托裏溫中散

托裏溫中湯

螺蛳散

槐花蕊

棉花瘡點藥

又武定侯方

當歸補血湯加防風連翹方

十全大補湯 方見治氣門

連翹金貝煎

連翹歸尾煎

成方切用

降瀉散

後方

止痛當歸湯

目錄

上 癰瘍門 卷二十三

成方切用卷二十三

癰瘍門

外科方證至為繁多不能盡錄茲量採數方以備擇用若夫瀉熱解毒活血托裏之劑多散見於諸門唯在癰瘍之方則神而已○內經曰營氣不從逆於肉理乃生癰腫又曰諸痛癢瘡皆屬心火丹溪曰癰疽皆因陰陽相滯而生蓋營行脈中衛行脈外相並周流寒與濕搏之則凝滯而行遲為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣滯而鬱津液稠結為痰為核久滯入脈中血為之濁此陰滯於陽也血得邪而壅滯久滯入脈中血為之濁此陰滯於陽也血得邪而壅滯久滯入脈中血為之濁此陰滯於陽也血得邪而壅滯久滯入脈中血為之濁此陰滯於陽也

皂莢丸 金匱

治肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不眠 肺者五臟之華蓋處於胸中主氣候在皮毛勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺汗出惡風欬嗽短氣鼻寒項強胸膈脹滿久久不瘥則成肺痿風寒皮毛熱

成方切用

皂莢丸 桔梗杏仁煎

傷血脈風熱相搏氣血稽留結於肺則成肺癰多吐涎沫而無膿者肺痿也口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫欬吐膿血胸中隱痛者肺癰也 疔為正氣虛癰為邪氣實 皂莢 刮去皮 為末蜜丸以棗膏和湯服三丸 喻嘉言曰火熱之毒結聚於肺表之裏之溫之清之曾不少應堅而不可攻者令服此丸庶幾無堅不入聿成洗滌之功不可以藥之微賤而少之也

加蛤粉等分為末名皂蛤丸每服二錢酒下治婦人風邪客於乳房而成癰癰 此藥能導其乳汁散其風 出而自愈矣

桔梗杏仁煎

治欬嗽吐膿痰中帶血或胸膈隱痛將成肺癰者此方為第

一

二

三

四

五

一此桔梗湯  
之變方也

桔梗 杏仁 甘草 阿膠 麥冬 百合 金銀花 夏

枯草 連翹 貝母 紅藤 枳殼 水煎食遠服 火

盛兼渴者加天花粉

### 腸癰秘方

凡腸癰生於小肚角微腫而小腹隱痛不止者若毒氣不散  
漸大內攻而潰則成大患急宜以此藥治之

先以紅藤一兩許以好酒二碗煎一碗午前一服醉臥一時  
午後用紫花地丁一兩許亦如前煎服服後痛必漸止為效  
然後服末藥除根

### 成方切用

腸癰秘方 金銀花酒

二 癰瘍門 卷二十三

蟬脫 殭蠶 錢一當歸 天龍 大黃 石蝎 蛇草 錢五 老蜘蛛

二箇捉放新瓦上以酒 爲末每空心用酒調送一錢日逐

漸服自消

### 金銀花酒

治一切癰疽惡瘡不問發在何處或肺癰腸癰初起便服奇

效 癰疽之生始於喜怒憂思之下時飲食居處之不節或金

石草藥之發動寒暑濕熱之不時致陰陽不平而結營

衛之滯而腐潰輕者起於六腑重者起於五臟

沈痼而爲疽大抵實者爲癰深則爲疔矣○發于

小者爲癰疽腦疽疔瘡○重者爲癰疽肺癰腸癰等

出督脈經虛從腦而出 太陽經虛從背而出少陽經虛從

金銀花 五兩乾者不甘草一 水二碗煎一碗再入酒一碗

略煎分三服一日一夜服盡重者日二劑服至大小腸通利

則藥力到外以生者爛擣酒調敷毒四圍

金銀花寒能清熱解毒甘能養血補虛爲癰瘡聖藥甘草亦

共甘解毒之上劑也

金銀花 兩二甘草 兩一黃耆 兩四酒一升重湯煮服名曰毒金銀花

湯治痛癢色變紫黑者又黃耆當歸金銀花甘草大劑煎服

名四仙飲治氣血俱虛服之未成即消已成即潰已潰即愈

附長春藥酒黃耆 兩二當歸 兩二大生地 兩六兩銅

甘草 兩二地骨皮 兩二兩廣陳皮 兩二兩用白糯米二斗

做酒釀一垵將前藥後六味用綿包好入垵內隔湯煮三炷

### 成方切用

真人活命飲

三 癰瘍門 卷二十三

香將黃耆膏傾入再煮三炷香將埋埋地下三尺餘深七日

七夜取起濾清聽用 此酒不特外科虛證極妙凡勞傷虛損

此酒馳名 於天下也 服之無不神效所以蘇州陸德敷家以

附金銀花膏 一名忍 四月採鮮花擣汁熬膏茶酒任點服養

陰退陽補虛療風尤宜於火熱熾盛之人永無疔疽之患

酒亦佳 花葉同功而 花香尤勝

### 真人活命飲

治一切癰疽腫毒初起未潰者

金銀花 錢五陳皮 錢五當歸 錢五防風 錢五白芷 甘草 錢五貝母

天花粉 錢五乳香 錢五沒藥 錢五皂角刺 錢五川山甲 錢五

三片

粉炒 好酒煎善飲者多飲酒以行藥勢忌酸物鐵器酸性能收斂

凡藥皆忌

金銀花散熱解毒癰瘡聖藥故以為君花粉清痰降火白芷除溼祛風並能排膿消腫當歸和陰而活血陳皮燥溼而行氣防風瀉肺疏肝貝母利痰散結甘草化毒和中故以為臣凡毒氣托裏護心能發毒氣外出不致內攻沒藥散瘀消腫定痛故以為佐穿山甲善走能散皂角刺辛散剽銳皆厥陰陽明正藥能貫穿經絡直達病所而潰壅破堅故以為使加酒者欲其通行週身使無邪不散也此藥當服于未潰之先未成者散已成者潰若已潰後不可服

托裏散 成方切用

癰瘍門 卷二十三

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈弦洪實數腫甚欲作膿者脈弦洪實數乃實熱堅滿之證故宜下之

金銀花 當歸 兩 大黃 朴硝 花粉 連翹 牡蠣 皂角刺 黃芩 赤芍 錢一 每五錢半酒半水煎

金銀花清熱解毒癰瘡主藥當歸赤芍調營血大黃芒硝瀉胃熱黃芩清肺火牡蠣軟堅癰瘡連翹花粉散結排膿角刺鋒銳直達病所而潰散之也東垣曰瘡瘍及諸病而赤雖伏火熱毒禁不得攻裏為陽氣拂鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火就燥則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少即燥藥以潤之如見風脈風瀉只宜發表風藥便可以通利大便若止乾燥秘瀉尤宜潤之慎不可下九竅不利皆壅滯也便下汗之則愈瀉目熱大便秘實不知其氣不降也便下汗之則愈瀉目熱不知其氣血不和也

氣在經宜發表以去之也東垣曰瘡瘍及諸病而赤雖伏火熱毒禁不得攻裏為陽氣拂鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火就燥則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少即燥藥以潤之如見風脈風瀉只宜發表風藥便可以通利大便若止乾燥秘瀉尤宜潤之慎不可下九竅不利皆壅滯也便下汗之則愈瀉目熱大便秘實不知其氣不降也便下汗之則愈瀉目熱不知其氣血不和也

最速

芍藥蒺藜煎

治通身溼熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡神效外以螻蛄粉敷之

龍膽草 梔子 黃芩 木通 澤瀉 芍藥 生地 白蒺藜 連刺搗碎五錢 如火不甚者宜去龍膽草梔子加當歸茯苓米仁之屬 如溼毒盛者加土茯苓五錢或一二兩

當歸蒺藜煎 治癰疽瘡疹血氣不行邪毒不化內無實熱而痛腫淋漓者悉宜用之此與芍藥蒺藜煎相為奇正也當酌其詳

成方切用 芍藥蒺藜煎 當歸蒺藜煎 灸法 五 癰瘍門 卷二十三

當歸 熟地 芍藥 何首烏 甘草 防風 川芎 白芷 荆芥穗 白蒺藜 炒搗碎 或水或酒煎然水不如酒或以水煎服後飲酒數盞以行藥力亦可 陽虛不能化毒者加桂枝甚者再加乾薑附子 氣虛不化者加人參黃耆 毒陷不能外達者加穿山甲或皂刺

灸法 治一切癰疽惡瘡 凡人初覺發背欲結未結赤腫焮痛以溼紙覆其上先乾處即癰頭也取獨頭大蒜切片安于頭上用艾灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方佳最要早覺早灸

爲上若有十數頭者卽用蒜研作餅鋪頭上聚艾平餅上燒之若初發赤腫一片中間有黃粟米頭子便用獨蒜片安于頭上若艾灸十四或四十九壯使毒氣外出則易愈李迅曰灸勝于用藥三壯一易百壯爲率但頭項已上切不可用恐引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約艾一篩初灸肉不痛直灸至好肉方痛至夜火城滿背高阜頭孔百數則毒外出否則內通五臟而危矣綱目曰精要謂頭上發毒不得灸此言過矣頭爲諸陽所聚艾炷宜小壯數宜少小者如鼠核許者灸三五壯而已按東垣灸元好問腦疽以大艾炷灸之痛者艾炷宜小壯數宜少若不痛者艾炷大壯數多亦無妨也

### 芙蓉外敷法

見本草從新木芙蓉條

### 成方切用

芙蓉外敷法 百草煎

太 癰瘍門 卷二十三

### 百草煎

治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒溼氣留聚走注疼痛等證無不奇效

百草 凡田野山間者無論諸品皆可取用然以山草爲勝辛香者佳冬月可用乾者不及鮮者力速須預爲採取之 右不論多少取以多煎濃湯乘熱熏洗患處仍用布帛蘸熨良久務令藥氣蒸透然後敷貼他藥每日二三次不拘但以頻敷爲善蓋其性之寒者可以除熱熱者可以散寒香者可以行氣毒者可以解毒無所不用亦無所不到湯得藥氣則湯氣無害藥得湯氣則藥力愈行凡用百草以煎膏者其義亦以此

此誠外科中最要最佳之法亦傳之方外人須用二三十斤煎濃湯二三鍋用大盆盛貯以煎蠟洗良久每日一二三次內服廊清飲分利等劑妙甚

治一切瘡癰惡毒先服此丸護膜托裏使毒不攻心或爲毒蟲蛇犬所傷宜服之

黃蠟 兩 白礬 兩 一 先將蠟溶化候少冷入礬和勻爲丸酒下每服十丸二十丸漸加至百丸則有力瘡愈後服之亦佳加雄黃名雄礬丸治蠱毒蛇犬蟲咬毒

心爲君主不易受邪凡患癰疽及蛇犬所傷毒上攻心則命立傾矣黃蠟甘溫白礬酸澀竝能固膜護心解毒定痛托裏

### 成方切用

蠟礬丸 托裏十補散

七 癰瘍門 卷二十三

排膿使毒氣不致內攻故爲諸證所必用酒頓黃明膠亦妙方見本草從新黃明膠

托裏十補散 局方卽外科精要十宣散

治癰瘡初發或已發邪高痛下瘡盛形羸脈無力者癰疽不丹毒火熱因虛勞氣鬱者止宜補形氣調經服自當消散不待汗之下之也

當歸 黃耆 人參 二川芎 桂心 白芷 防風 厚朴 桔梗 甘草 錢一 每服二錢加至六錢熱酒調下千金加

芍藥連翹木香乳香沒藥亦名托裏散治發背疔瘡參耆補氣芍歸活血甘草解毒桂心白芷桔梗排膿厚朴瀉實滿防風散風邪爲表裏氣血之藥共成助陽內托之功也

丹溪曰冬月腫瘍用之可轉重為輕若夏月腫瘍用之以桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參耆難為收斂也久遠分冬夏無論經絡不能無誤也機要曰治瘍須明托裏疏通藏腑調和營衛三法內之外者其脈洪實發熱煩躁外無脈者深于內其邪深矣當疏通臟腑以絕其源外之內者其脈浮數微腫在外形證外顯邪氣極而內行當先托裏內外之中者外無微惡之氣內亦臟腑宣通知其托裏在名當和營衛用此三者雖未即瘥必無變證

### 托裏溫中湯

治瘡瘍為寒變而內陷膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便秘澀食則嘔逆氣短呃逆不得安臥時發昏憤

此孫和治上焦濕熱方也六脈沈微色變膚涼加以呃逆胃中虛寒身寒遂于盛夏用此大辛熱之劑蓋捨時從證之變法也

附子錢一 乾薑錢一 羌活錢一 茴香錢一 丁香錢一 沉香錢一 益智仁錢一

甘草錢一 陳皮錢一 木香錢一 生薑錢一

### 成方切用

托裏溫中湯 托裏黃耆湯

八 癰瘍門 卷二十三

衛生寶鑑曰經云寒淫于內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣自裏之表為君羌活味苦辛溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐不下食益智沈香丁香大辛熱以散寒邪為佐瘡氣內攻聚而為滿木香茴香陳皮辛苦溫治痞散滿為使

### 托裏黃耆湯

總錄

治諸瘡潰後膿多內虛潰後膿血出多陰陽兩竭宜大補氣血

黃耆 人參 當歸 桂心 茯苓 遠志 麥冬 五味

子 等分為末每服五錢食遠服

人參黃耆補氣固衛當歸桂心活血生肌茯苓滲淫健脾麥

冬清熱補肺遠志辛散專理癰疽五味酸溫善收腫大丹溪道遺後補氣血理脾胃實為至要否則數月半年之後虛證仍見轉成他病矣

### 鰥蛇散

治淫熱破爛毒水淋漓等瘡或下部腎囊足股腫痛下部諸瘡無不神效

海鰥蛇不必浸淡 人中白或人中黃礞砂亦可等分 為細末先以百草濃煎

湯乘熱熏洗後以此藥滲之如乾者以麻油或熬熱豬油或

蜜水調塗之 若腫而痛甚者加冰片少許更妙 若涇瘡

膿水甚者加蜜陀僧等分或煨過官粉亦可

### 槐花蕊

### 成方切用

鰥蛇散 槐花蕊 棉花瘡點藥 又武定侯方

九 癰瘍門 卷二十三

治楊梅下疳神方

凡棉花毒或下疳初感或毒盛經久難愈用新槐蕊揀淨不必炒每食前用清酒送下三錢許早午晚每日三服之服至二三升則熱毒盡去可免終身餘毒之患亦無寒涼敗脾之慮此經驗神方也

如不能飲即用滾水鹽湯俱可送之但不及酒送之快捷也

### 棉花瘡點藥

杏仁取霜 真輕粉等分 敷瘡上二三日即痂落

### 又武定侯方

雄黃錢半 杏仁三十粒 輕粉錢一 為末以雄豬膽汁調敷之

三日即愈天下第一方



當歸補血湯加防風連翹方

治瘡瘍有血無膿搔癢不止有血無膿表氣不足也

當歸 防風 黃耆 連翹

達于表二物得之而效愈速也此藥服之數劑諸瘡化毒生膿膿滿毒盡則去病根而無濕嫩之患○若膿日久不乾者去黃耆加白朮茯苓以燥之如治爛痘之法則善矣

十全大補湯

治氣血虛弱頸面腹背皆瘡者瘡疥生于手足者為輕生于頸面腹背者乃氣血虛弱之甚小人道長之象故宜大補

方見治氣門四君子湯附方

成方切用

當歸補血湯加防風連翹方

十 瘡門

四君同黃耆以大補其氣四物同桂心以大補其血氣血得其補則腹背之瘡先愈而君子道長小人道消矣 參苓白朮散亦可酌用見補養門

連翹金貝煎

治陽分癰毒或在臟腑胸乳肺膈之間者此方最佳甚者連用數服無有不愈

金銀花 土貝母 蒲公英 夏枯草 紅藤 連翹

七錢 好酒二碗煎一碗服服後暖臥片時 火盛煩渴氣腫者加天花粉 若陽毒內熱或在頭項之間者宜用水煎

連翹歸尾煎

治一切無名腫毒流注等最宜用之

連翹 歸尾 甘草 金銀花 紅藤 好酒煎服

如前 如邪熱火盛者加槐蕊二三錢

降癰散

治癰疽諸毒消腫止痛散毒未成者即消已成者斂毒速潰可愈若陽毒熾盛而疼痛勢凶者先宜用此方其解毒散邪之功神效 若堅頑深固者用後方

薄荷葉 茅根 野菊花 土貝母 右薄荷野菊

乾者可為末鮮者可搗爛同貝母研勻外將茅根煎濃湯去渣用調前藥末乘熱敷患處仍留前剩湯頓暖不時潤於藥上但不可用冷湯冷則不散不行反能為痛約敷半日即宜換之真妙方也

成方切用

連翹歸尾煎 降癰散 後方

十二 癰門

後方

凡疽毒堅頑深固及結核痰滯宜用此方

生南星 土貝母 朴硝 薄荷 石灰 右

同為末用鹽酒杵稠黏敷患處經宿乾則易之不必留頭若膿成者留頭亦可或炒熱攤絹上隔絹貼之亦可或用麻油調或用熱茅根湯調亦可若欲止痛速效加麝香或冰片少許更妙

止痛當歸湯

治腦疽背疽穿潰疼痛

當歸 生地黃 芍藥 黃耆 人參 甘草 多官桂

當歸生地活血涼血人參黃耆益氣補中官桂解毒化膿

成膿則芍藥和脾酸以斂之甘草扶胃甘以緩之則痛自減

前日止痛之曰世人皆謂乳沒珍貴之藥可住疼痛不知臨病

矣制宜殊非一端熱痛涼之寒痛溫之風痛除其風溼痛導

其溼燥痛潤之塞痛通之虛痛補之實痛瀉之膿鬱而閉者

開之惡肉敗潰者引之陰陽不和者調之經絡閉澀者利之

而無權也

成方切用

止痛當歸湯

三 難陽門 卷二十三

成方切用卷二十四目錄

眼目門 正方一十九 附方六

人參益胃湯

雞子黃連膏

羊肝丸

濟生羊肝丸

圓明膏

本事方

兔矢湯

滋陰地黃丸

消風養血湯

成方切用

目錄

一 眼目門 卷二十四

金露散

補陽湯

益陰腎氣丸 方見補養門

駐景丸

加味駐景丸

定志丸

張子和定志丸

地芝丸

真人明目丸

防風飲子

神效明目丸

二百味草花膏

飛絲芒塵入目方

明目六事方

目疾者戒沐頭宜濯足

益氣聰明湯 見補養門

又法

成方切用

目錄

二

眼門  
卷二十四

成方切用卷二十四

眼目門

成方切用

人參益胃湯

人參益胃湯

治勞役飲食不節內障目病

內障者睛裏昏暗與不病之眼

○東垣曰五臟六腑之精氣皆稟受於脾胃而上貫于目脾者諸陰之首也目者氣血之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明于目矣心者君火也主神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百脈皆榮于目既分役運動勢乃妄行及因邪氣所并而損其血脈故諸病生焉醫者不理脾胃及養血安神治標不治本不明正理也

黃耆 人參 甘草 白芍藥 黃蘗 蔓荊子 每四錢日二服

參耆甘草大補中氣以強脾胃蔓荊升清陽而通九竅白芍

入厥陰而和營血 黃蘗除溼熱而瀉相火 治目不明

目雖為肝竅而五臟六腑之精氣皆上注于目而為之精  
精之聚為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡  
氣之精為白眼肉之精為眵後出於項中此則眼具五臟之精而與  
脈并為系上屬于腦後出於項中此則眼具五臟之精而與  
故其證多而方亦廣茲錄數方以備採用其五臟之精而與  
瀉火養血之劑散見于各門可以通用○目有五輪白睛  
為氣輪屬肺金故獨堅青睛為風輪屬肝木內包膏汁滴  
養瞳神目角大小皆為血輪大皆屬心君火大皆赤者為  
實火小皆屬心包相火小皆為赤者為虛火兩脾為肉輪屬  
脾土土藏萬物故包四輪開動為陽為應閉靜為陰則  
瞳神有神水先天真氣所化潤澤之精汁積而成者能滋養  
門通於膽發于心是真氣所化潤澤之精汁積而成者能滋養  
絡之血也有真氣目之經絡中往來生用之氣先天之元  
陽也真有精先後天元氣所化潤澤之精汁積而成者能滋養  
瞳神也目有堅殼數重真血滋神水神水包神膏膏中一

卷二十四

氣虛而有火可於參耆中微加連藥使精氣足而清陽升則臟腑和而障翳退矣

### 雞子黃連膏

治火眼暴赤疼痛熱在膚腠洩而易解者用此貼之即可愈  
若熱由內發火在陰分者不宜外用  
藥非惟不能去內熱且以閉火邪也

用雞子一枚開一小孔單取其清盛以磁碗用黃連一錢研為末摻於雞子清上以筋徹底連打沫得數百使成浮沫約得半盞許即其度矣安頓少頃用筋撥開浮沫傾出清汁用點眼皆勿得緊閉眼胞擠出其藥必熱淚攤出數次即愈  
內加冰片少許尤妙 若雞子小而清少者加水二三匙同

### 成方切用

雞子黃連膏 羊肝丸

二 眼目門 卷二十四

### 打亦可

### 羊肝丸 類苑

### 治目疾內障

倪仲賢曰經曰心者五臟之專精目者其竅也內挾心火為勢妄行火炎不制神水受傷上為內障此五臟病也諸脈皆屬于目相火者心包絡也主百脈上榮于目火盛則百脈沸騰上為內障此虛陽病也膀胱小腸三焦膽脈俱循于目其精氣亦上注為目之精四府一衰則精氣盡敗郭火乘之上為內障此六府病也神水黑眼皆注於陰白經赤脈皆注於陽陰陽年故能為視陰微不立陽盛則注經目則火食氣壯火散氣上為內障此弱陰病也四者皆為陰弱不能配陽也

### 夜明砂

淨淘蟬蛻

木賊去節

當歸一兩酒洗

以羊肝四兩水煮擣

### 爛和丸

蚊食血之蟲夜明砂皆蚊眼也故能散目中惡血而明目

食蚊而眼不化未賊輕揚而善磨木故能平肝散翳而去障其矢為夜明砂未賊輕揚而善磨木故能平肝散翳而去障蟬性善蛻故能退翳當歸能入厥陰養血而和肝用羊肝者羊性屬火取其氣血之屬能補氣血引諸藥入肝以成功也

羊肝丸之方頗多茲錄其一

濟生羊肝丸黃連一兩羯羊肝一具去筋膜生用擣爛和丸

### 成方切用

圓明膏 兔矢湯

三 眼目門 卷二十四

于東垣丹溪用參耆補氣血亦能明者蓋目主氣血盛則明府得利出入升降而明虛則玄府無以出入升降而昏此則必用參耆四物等劑助氣血運行而明也

### 圓明膏

治內障生翳及瞳子散大因勞心過度飲食失節

麻黃 黃連 生地

錢五

訶子

溼紙粉甘草二錢歸身

以水二碗先煮麻黃至一碗去沫入後藥同熬至滴水

散去渣入蜜少許再熬點之

柴胡麻黃發表散邪當歸生地和肝養血黃連清肝火甘草

和中州瞳子散大故加訶子以收之也

### 兔矢湯

治瘡疹入眼及昏暗障翳

免矢錢 茶清調或吞服須待瘡疹瘰癧後服之免者明月之精得金之氣其矢名明月砂能解毒殺蟲故專能明日又可兼治勞瘡也

滋陰地黃丸 一名熟地黃丸東垣

治血弱氣虛不能養心心火旺盛肝木自實瞳子散大視物不清肝為心母子能令母實故心火旺則肝木作實肝主風和之氣乖亂而精液隨之走散矣精液走則光華失故視物不清也網目日心脈挾口系肝脈連目系手足少陽之脈結于目外小背風熱從此道上交頭目致偏頭痛腫瞳子散大視物昏花血虛陰弱故也宜涼血養血收火散火而除風熱

成方切用

滋陰地黃丸 消風養血湯

四 眼目門 卷二十四

熟地 兩生地 方七錢半

柴胡 八錢 黃芩 酒炒 當歸 酒洗 五錢 黃連 酒炒

五味子 地骨皮 天門冬 枳殼 炒 甘草 炙 人參 錢二 蜜

丸茶清下日二服忌食辛熱之物助火寒冷之物損胃使藥不上行

熱地當歸養血生地地骨涼血黃芩瀉肺火黃連瀉肝火天冬清肺而滋腎柴胡散肝而升陽五味收耗而斂散人參甘草以益氣補中枳殼以利氣行滯也

消風養血湯

治目赤腫痛 風熱傷血則赤風熱作實則腫風熱攻注則痛為外皆下為內皆目痛赤腫從上下者為太陽證宜溫之散之從下上者為陽明證宜寒之下之從外走內者為少陽證

宜和解之

荆芥 蔓荊子 菊花 白芷 麻黃 防風 桃仁 去尖 紅花 酒炒 川芎 五分 當歸 酒洗 白芍 酒炒 草決明 石決明 甘草 錢一 荆芥 防風 麻黃 白芷 甘菊 蔓荊 輕浮上升並能消風散熱桃仁 紅花 川芎 歸芍 辛散酸收並能養血去瘀兩決明皆除肝經風熱專治目疾瘀去血活則腫消風散熱除則痛止又曰為肝竅搜風養血皆以和肝加甘草者亦以緩肝而止痛也保命集云日病在府則為表當除風散熱在藏則為裏當養血安神暴發者為表易療久病者在裏難治金露散

治目赤腫痛翳障諸疾

成方切用

金露散 補陽湯

五 眼目門 卷二十四

天竺黃 新香 海螵蛸 浸洗 月石 二兩 硃砂 飛 蘆甘石 片子 各佳

淨入錢 為極細末磁瓶收貯每用時旋取數分研入冰片

少許諸目疾皆妙 若治外內皆障取一錢許加珍珠八釐須放豆腐膽礬三釐 若爛弦風眼每一錢加銅綠飛丹各中藥熟用 膽礬三釐 若爛弦風眼每一錢加銅綠飛丹各

八釐 如赤眼腫痛每一錢加乳香沒藥各五釐

補陽湯

治青白目翳 陽不勝其陰則生目翳所謂陰盛陽虛則九竅不通乃陰埃障日之象也

人參 黃耆 白朮 炒 茯苓 甘草 陳皮 柴胡 羌活

獨活 防風 知母 炒 當歸 酒洗 生地 酒洗 熟地 白芍 酒炒

瀉 肉桂 去皮

參朮苓草黃耆陳皮甘溫益氣之品也固所製補陽羌獨柴防辛溫散翳之品也亦所以升陽二地歸切知母澤瀉乃陰分之藥亦所以濟夫羌防柴獨使不散其真陽兩川肉桂者取其辛熱熱者火之象可以散陰翳辛者金之味可以平肝木蓋眼者肝木之竅也

益陰腎氣丸 東垣

治腎虛目暗不明

方見補養門六味地黃丸附方

精生氣氣生神故腎精一虛則陽光獨治陽光獨治則壯火食氣無以生神令人目暗不明壯水之主以制陽光故用生

成方切用

益陰腎氣丸 駐景丸

六 眼目門 卷二十四

熟地黃歸稍五味山黃澤瀉丹皮味厚之屬以滋陰養腎

則火自降養山藥所以益脾而增萬物之母扶神所以養神

而生明照之精柴胡所以升陽而致神明之氣于睛目之窠

也 孫思邈云中年之後有目疾者宜補不宜瀉可謂開萬世之學矣東垣此方其近之

駐景丸

治肝腎陰虛兩目昏暗 目為肝竅瞳子神光屬腎故肝腎陰虛則目昏暗也

枸杞子 車前子 兩 熟地黃 兩 菟絲子 兩 酒浸 蜜丸酒下

熟地枸杞補肝滋腎菟絲益精強陰車前利水而瀉肝腎邪

熱也 車前子清肝明目利小便而不走氣以此瀉邪則補藥更為得力張子和曰目赤腫是厥陰肝經風熱利小便能去肝

經風熱

加當歸五兩和氣血以益肝脾 肝藏血脾統血目得血而能視五味二兩斂耗散而助金水 能斂肺金滋腎水收瞳神散大 川椒一兩補火以逐下焦寒滯名加味駐景丸

定志丸 局方

治目不能遠視能近視者 海藏曰目能近視責其有水不常服益心強志能療健忘

服益心強志能療健忘

遠志 菖蒲 兩 人參 茯苓 兩 蜜丸硃砂為衣張子和方

無菖蒲加茯神柏子仁酸棗仁亦名定志丸酒糊丸薑湯下

安魂定驚

人參補心氣菖蒲開心竅茯苓能交心氣于腎遠志能通腎

成方切用

定志丸 地芝丸 真人明目丸

七 眼目門 卷二十四

氣于心硃砂色赤清肝鎮心心屬離火火旺則光能及遠也

地芝丸 東垣

治目能遠視不能近視 海藏曰目能遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎

生地黃 天冬 兩 枳殼 甘菊花 兩 蜜丸茶清或酒下 茶

欲火熱之下降酒者微藥力之上行

生地涼血生血天冬潤肺滋腎枳殼寬腸去滯甘菊降火除

風

真人明目丸

治腎水虛竭肝有風熱目昏多淚 腎主目之瞳子腎水虛竭則目昏肝之液為淚肝有

風熱則



頭則上動矣必坐陽而損目况夫溼氣難乾而風而梳拂不  
已則風溼襲于首而併於目甚者至於喪明此沐頭之宜戒  
也然何以宜濯足也足太陽之經根于足之小指端上貫于  
睛明足少陽之經根于足大指岐骨間上貫于瞳子筋足陽  
明之經根于足中指內間上貫于承泣易曰水流溼火就燥  
若以溫水濯其兩足則頭目間之熱邪亦能引之而下況夫  
溫濯之餘腠理疏泄又足以瀉經中之邪是亦去病之一助  
也故曰宜濯足

成方切用

目疾者戒沐頭宜濯足

十

眼目門  
卷二十四

成方切用卷二十五目錄

救急門 正方三十 附方二十三

六君子加天麻方

四君子加薑汁竹瀝方

獨參湯

五磨飲 方見治氣門

火醋熏鼻法

禮拜法

附子理中湯 方見祛寒門

生脈散加香薷方

成方切用

目錄

十一

救急門  
卷二十五

脫陽脫陰

瘧死

溺死

瘞死

中惡

蠱毒

鹽漬毒

服鉛粉

蛇蟲犬咬傷

蛇傷三方

礮毒

諸菌草毒及蟻蟻入腹

蜈蚣傷二方



壁虎咬

瘋狗咬

湯泡傷

又法

刀斧傷

骨哽

魚骨哽

諸骨哽

誤吞銅鐵金銀

吞髮繞喉不出

成方切用

頓開不能合

呃逆不止

舌脹滿口

乳蛾喉痹

又法

霍亂攪腸痧

鼻衄不止

又方

蟲入耳中

跌打損傷

蝎子螫

常犬咬

雞骨哽

目錄

二

急救門  
卷三十五

產婦血暈

產後子腸不收

成方切用

目錄

三

急救門  
卷三十五

成方切用卷二十五

救急門

凡人以疾病死而得終其天年者雖曰不幸猶正命也若  
卒暴之疾暴橫之過人如給溺砒蠱蛇犬之傷小如骨哽  
刀斧湯火之害此等死者則非正命矣君子順受其正胡  
然而以非命歸耶茲採數方以備急用而臨用之際其要  
在隨證制宜以施活人  
手眼方為應變之才爾

六君子方見治氣門四加天麻方

治暴死幸然而倒口噤吐沫風燥則筋急故令口噤吐沫者  
不省人事風為陽邪故脈來虛大邪氣盛而正氣虛也  
身體溫暖令身體溫暖脈來虛大邪氣盛而正氣虛也

脈虛而以辛散之劑驅風則懨懨之氣必絕非其治也故用  
參朮苓草之甘溫者急固其氣復用半夏陳皮之辛利者以

成方切用

《參子加麻方》曰君子加薑汁竹瀝方獨參湯

平其沫天麻之加定風邪爾

四君子方見治氣門加薑汁竹瀝方

治暴死有痰聲者名曰痰厥若痰聲澆澆隨息漸至而  
其者是氣已脫也不治

痰厥者頑痰塞其清陽呼吸之道也痰既塞之氣欲通之故  
令喉中有聲經曰壯者氣行則愈怯者著而成病故用參朮

苓草之溫補者以壯氣佐之竹瀝薑汁以行痰

獨參湯

行立之間暴眩仆絕喉無痰聲身無邪熱者陰虛陽暴絕也  
此方主之

人參二兩去蘆煎

陰陽之有人身互為其根而不可離者也陰陽道虧之則孤

陽無所依附亦自飛越故令人暴仆眩絕過不在痰故無痰

聲病不引感故無體熱斯時也有形之陰血不能急生無形

之呼吸所宜急固況夫陰生於陽又太極之妙乎故以獨參

主之取其為固元益氣之聖品爾

五磨飲子

治暴怒暴死名曰氣厥宜扶正生使氣順即稍安  
再用皂角末吹鼻令嚏

方見治氣門四磨飲附方

怒則氣上氣上則上焦氣實而不行下焦氣逆而不吸故令

暴死氣上宜降之故用沉香檳榔氣逆宜順之故用木香烏

成方切用

《五磨飲子》火醋熏鼻法禮拜法

藥佐以枳實破其滯也磨以白酒和其陰也若挾虛者用四

磨飲

火醋熏鼻法

凡感臭穢瘴毒暴絕者名曰中惡不治即死宜燒炭火一杓

以醋沃之令患人鼻受醋氣則可復甦既甦以香正氣散

主之方見和

禮拜法

凡遇屍喪觀古廟入無人所居之室及造天地鬼神壇場歸  
來暴絕面赤無語者名曰尸疰亦曰鬼疰即中祟之謂也進

藥便死宜移患人東首使主人焚香北面禮拜之更行火醋

重鼻法則可復甦否者七竅逆血而死

子理中湯

腹痛額頭黎黑手足收引脈來沉下無氣以息者中寒暴死也  
腹痛病因固有數種但額頭黎黑手足收引脈來沉下則中寒之驗也所以無氣以息者呼出主陽吸入主陰三陰受其真寒則病不能吸吸亡則此方主之  
呼不能存矣故令人鼻化  
此方主之  
湯附湯等方俱

方見社寒門理中湯附方

寒者溫之故用附子乾薑及人參白朮甘草所以生其呼吸之氣也進藥後更著艾灸其關元此內外交治之法是證也有死一日夜而治之復甦者幸勿因其危而輕棄之  
凡冬月

厥方切用

附子理中湯 生脈散加香薷方 脫陽脫陰

三 救急門

氣者以火炒熱盛囊中熨其心頭冷即易之若遠以火烘冷與火爭必死浴以熱湯亦死或用薑汁熱酒各半溫服  
服散暑門 加香薷方

人本陰虛復暑途饑困勞倦暴仆昏絕者此方主之  
人本陰虛復暑途饑困勞倦暴仆昏絕者此方主之  
人本陰虛復暑途饑困勞倦暴仆昏絕者此方主之  
人本陰虛復暑途饑困勞倦暴仆昏絕者此方主之

用人參益元而固脫香薷辟邪而卻暑麥冬之清所以扶其

不勝之肺五味之酸所以斂其欲脫之真  
凡人平素體氣不

幸死以路上熱上頭昏令人暴其中即活薑湯童便皆可灌之或用熱上大蒜等分持水灌之或置日中或令近火以熱湯灌之即活切勿飲以冷水及臥  
冷地正如凍死人若連進火即死

凡男婦交感而死在男子名曰脫陽在女子名曰脫陰男子雖

死陽事猶然不委女子雖死陰戶猶然不閉俱不治  
若男女能緊緊抱佳以口接氣暖氣呼通間有得生者但臨時慌忙焉知料理所以多死  
亦有夢中脫死者其陽必舉其陰必泄尸容有喜色為可辨也皆在不救

縊死

切不可割斷繩索急用手鬆衣物緊塞穀道抱起解繩安放平正揪髮向上揉其項痕捻圓喉管腳踹兩肩以兩管吹氣入耳內或刺雞冠熱血滴口中男用雌女用雄鼻即氣轉再屈伸其手足將手摩之若氣不接將腰打三四拳或以皂角末搐鼻  
附子至暮身冷猶可活

溺死

成方切用

縊死 溺死 驚死 中毒

四 救急門

急倒提出水用牛一頭令橫臥以腹合牛背上牽牛徐行令吐出腹中之水以老薑擦牙即活口噤者撬開橫一筋于牙間使水得出如無牛以鍋覆地將溺人臍對鍋臍俯臥以手托其頭水出即活或俯臥橫上腳後稍高鹽擦臍中待其水自流出或用皂角末綿裹納下部出水即活切忌火烘逼寒入內以致不救

墮死

如原有燈勿動切忌火照但痛蔽其腳跟或敲大拇指而唾其面或以皂角末吹入鼻中得嚏即醒

凡中蠱毒令營白礬不瀉食黑豆不腥即是中毒可濃煎石  
橘皮汁飲之或熱茶化胆礬五分探吐出惡毒或米飲調真  
金末三錢令下 凡中砒霜毒急飲以人溺及人糞汁或  
持烏柏樹根葉汁或藍汁令服或刺羊血熱服 中鹽鹵毒  
縱飲生豆腐漿解之 中諸菌蕈毒及蠱蟻入腹黃土和水  
飲下之 綠豆湯甘草湯能解百毒

服鉛粉  
以麻油調蜂蜜加飴糖與服

蛇蟲犬咬傷

凡惡蛇傷急于傷處上下紮縛使毒不散走隨浸糞缸內食  
成方切用 服鉛粉 蛇蟲犬咬傷 五 救急門

蒜飲酒令飽使毒不攻心或礬石甘草等分冷水服二三錢  
更搗蒜敷患處加艾圓灸之 此法兼治 又方五靈脂一兩雄  
黃五錢為末酒調服洋敷患處又方貝母為末酒調盡醉飲  
之頃久酒自傷處為水流出血水盡以藥渣敷上重先可  
活 凡蜈蚣傷取大蜘蛛放傷處吸去其毒 中急投蜘蛛水  
又方鹽水洗淨雞糞塗之 壁虎咬用桑柴灰水煎數沸  
濾濃汁調白礬末塗之 蝎子螫用白礬半夏等分醋調塗  
之 外臺白凡遇一切毒瘡之切不可起惡念 凡瘋狗咬  
傷用番木鱉半個碎切斑蝥七個去頭翅足若過一日加一  
個糯米一撮慢火炒脆去斑蝥取米研末好酒調服取下惡

物多日凶者頭上有紅髮三根拔去之若仍凶腹內有狗聲  
者再加木鱉一箇斑蝥廿一枚如前製法與服 服後以黃連  
三月不可聽鑼鼓聲再發則難治終身不得食羊犬肉稍輕  
者急下無風處捏去惡血孔乾者針刺出血用小便或鹽湯  
洗淨持葱貼上若常犬咬者淨洗血水用虎骨煨研敷患處  
或爛肉杏仁敷之

雞子清調大黃末塗之炒黃檗末亦可一法以冷燒酒澆淋

其妙

成方切用 湯泡傷 刀斧傷 骨哽 誤吞銅鐵金銀 六 救急門

海螵蛸末敷之血立止古壙石灰為末亦可金瘡血出不止  
用原蠶蛾炒為末敷之

骨哽

凡魚骨硬食橄欖即下如無鮮者用橄欖核磨水飲之 橄欖  
骨魚骨屬著即死物 又貓涎亦能下魚骨哽 凡雞骨哽用  
野苧根搗爛如龍眼大雞湯化下如魚骨哽魚湯化下 諸  
骨哽用犬屎一足取其涎徐徐嚥下或用礬砂井花水洗化  
下或醋煎威靈仙嚥下 或加砂餅凡治哽之法可以類推如  
治髮哽虎犬治骨 鵝鵝鵝掌治魚哽慈石治針哽髮灰  
更亦各從其類也 誤吞銅鐵金銀

但多食肥肉自隨大便而出吞針者煮蠶豆同韭菜食針菜

白從大便下而出誤吞銅者食葶藶荻菰即化

吞髮繞喉不出

取白亂髮燒灰白湯調下一錢

頓車開不能合

醉之睡中用皂角末吹其鼻嚏透自合

呃逆不止

用紙撚刺鼻中得嚏自止

舌脹滿口

以生蒲黃末塗之或加乾薑末

成方切用

霍亂攪腸沙 鼻衄不止

七 救急門 卷二十五

乳蛾喉痹

凡乳蛾水漿不入先用皂角末點破再取杜牛膝汁和醋含

嚙又法艾葉擣汁口含良久腫自消冬月無葉掘根用之又喉閉者取

山豆根汁含嚙即開有藥不能進者急取病人兩臂撻數十

次使血聚大指上以髮繩扎住拇指針刺指甲縫邊出血甲指

縫邊乃少如放痧一般左右手皆然其喉即寬

霍亂攪腸沙

以針刺手指近甲處一分半許出血即安仍先自兩臂撻下

令惡血聚于指頭後刺之

鼻衄不止

亂髮燒灰存性細研水服併吹入鼻中又方白芨末新汲水

調下又法紙數十層水浸溼安頂中以火熨之紙乾立止又

法用線扎中指中節左孔出血扎左指右孔出血扎右指兩

孔出血則俱扎之又法以大蒜擣餅貼足心

蟲入耳中

以貓尿滴耳中蟲即出以生薑擦貓鼻貓即尿

跌打損傷

韭汁和童便飲散其瘀血骨折者蜜和葱白擣勻厚封酒調

白芨末二錢服

產婦血暈

成方切用

蟲入耳 跌打損傷 產婦血暈 產後子腸不收

八 救急門 卷二十五

猝時昏運藥有未及牀前燒炭沃醋或以醋塗口鼻令酸氣

入神收即醒或用破舊漆器或乾漆燒煙熏之使鼻受其氣

產後血既大行氣隨脫去察其面白眼閉口開手冷脈微氣

脫證也速用人參一二兩急煎濃湯灌之○凡產後血運本

屬氣虛而血壅痰盛亦有之如果形氣脈氣俱有餘胸腹脹

痛上衝血逆證也宜用失笑散若痰盛氣粗宜二陳湯加無

劑芎歸湯入珍湯之類主之

產後子腸不收

醋三分冷水七分和嚙其面一嚙一縮三嚙即收又法草麻

仁一兩擣膏塗頂心收即去之又法皂角末吹鼻中嚏作立

成方切用卷二十六目錄

勿藥元詮 正論二十六 附論四十八

上古天真論

老子論

廣成子論

又老子論

又上古天真論

譚景昇論

又上古天真論

白樂天論

方揚論

曹真人論

張虛靜論

成方切用

目錄

勿藥元詮  
卷二十六

淮南子論

金丹大要論

契祕圖論

呂純陽論

胎息經

胎息銘

張紫陽論

李東垣省言箴

疏五過論

龍虎經

經脈篇

陰陽應象大論

釋氏戒慾論

又上古天真論

又上古天真論

四氣調神論

醫家書

又四氣調神論

陰陽應象大論

吳氏論

又四氣調神論

藏器法時論

又藏器法時論

又藏器法時論

又藏器法時論

老子論

又四氣調神論

扁鵲論齊侯疾

刺法論

成方切用

目錄

勿藥元詮  
卷二十六

悟真篇

古歌

晉道成長生養性論

蔣氏調氣篇

蘇氏養生訣

李氏十六字訣

彭祖論

調息

莊子南華經

王龍溪論

李東垣論

調息之法

勞心勞力人須調息以保元氣

讀書家宜習養生法

醫家尤須愛養精力

小過天

道經六字訣

一秤金訣

金丹秘訣

按摩導引諸法

羅先生論

養生宜節飲食

論元宜節飲

脾胃為養生之本

草頭藥汁不可服

成方切用

目錄

三勿藥元論  
卷二十六

痰飲痞積等證宜灼艾

素有淫熱飲食宜清勝

蟲疳酒癰諸病初愈時不可驟服滋補藥

臥病常存退步心

眞空寺老僧論鄺子元心疾

病中不可偏信師巫

問疾來者勿得與之相接

病加於小愈

素不服藥不為無見

成方切用卷二十六

勿藥元論

攝生尚元非崇異也。生身以養壽為先。養身以御病為急。經曰：我命在我，不在於天。味用者，天善用者，延故人。之所生，神依於形，形依於氣，氣存則榮，氣敗則滅。形氣相須，全在攝養。設早使氣衰而形無所依，神無所主，致殞謝為命。盡覺知命者，哉夫！胎息為大道根源，導引乃宣暢要術。人能養氣以保神，氣清則神爽，運體以御病，體活則病離。現三元養壽之方，絕三尸九蟲之害，內究中黃妙旨，外契大道元言，則陰陽運用，皆在人之掌握，豈特遐齡可保，即元妙上乘，固不由茲始矣。噫！願人之精進，何如爾。

素問上古天真論曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，上古太古也。道造化之名也。老子曰：有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰道，道是也。法取法也，和調也，術數修身養性之法也。言既法陰陽而又濟之以術數，蓋陰陽之道逆之則災，害生從之則成方切用。上古天真論。一勿藥元論。卷二十六。

苛疾不起，故知道者必法。飲食有節，起居有常，不妄作勞，故能則之。如下文所云者是也。飲食有節，起居有常，不妄作勞，故能形與神俱，而盡其天年。度百歲乃去，節飲食以養內，慎起居以養外，不妄作勞以保其天。真則形神俱全，故得盡其天年。天年者，天界之全百歲。今者天年之樂，去者五臟俱虛，神氣皆去，形骸獨居而終矣。今時之人，不然也。以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真。多欲不節，則精竭神傷，則真氣隨之而散。蓋精能生其精，精盈則氣盛，氣盛則神全，神全氣堅，強老而益壯。若本乎精也，廣成子曰：必靜必清，無勞女形，無搖女精，乃可以長生。正此謂不知持滿，不時御神，保精如持盈，滿恐其傾覆，四時務快其心，逆於生樂，起居無節，故半百而衰也。快心事過，終必為殃。是半百而衰，皆以斷喪精神，事違道故，不能如上古之盡其天年也。老子曰：生之徒十有三，死之徒十有三，民之生動之死地，亦十有三。其今人。之謂歟。樂音洛。○又曰：夫上古之教下也，皆謂之虛邪賊風。

勞其目淫邪不能惑其心嗜欲人欲也目者精神之所注也目與元同則淫邪不能惑愚智賢不肖不懼於物故合於道無論愚智賢不肖但有養於中則無懼於物故皆合養生之道矣所以能年皆度百歲而動作不衰者以其德全不危也全者聖人之道也又何危焉○黃帝曰余聞上古有真人者提挈天地把握陰陽此下帝述所聞以語伯真不假修爲天眞俱全天地陰陽惟其闔闢握持言呼吸精氣獨立守神肌肉若一呼吸接於天故通其道法之神也呼吸精氣獨立守神肌肉若一呼吸接於天故通故通乎精有道獨存故能獨立神不外馳故曰守神神守於中形全於外身心皆合於道故曰肌肉若一卽首篇先賢與神俱得義理不壞也○按精氣神乃人身之三寶也今篇先賢與神俱得義理諸論採附於左以助參悟○白樂天曰黃喬赤松吸陰陽之氣食天地之精呼而出故吸而人新方揚曰凡亡於中者未有不取足於外者也故善養物者守根善養生者守息此言養氣當從呼吸也○曹真人曰神是性兮炁是命神不外馳炁自定既虛靜曰神若出便炁來神返身中炁自回此言守神以養

御之以道可以爲天人矣有道者能之。余何人哉。切宜省言而已。此言養身之道。以養氣爲本也。○按諸論無非精氣神之理。夫生化之道。以氣爲本。故疏五過論曰。氣內爲寶。此誠最重之辭。醫家最切之旨也。唯是氣義有二。曰先天氣。後天氣。先天氣者。眞一之氣。氣化於虛。因氣化形。此氣自虛無中來。後天氣者。血氣之氣。氣化於穀。因形化氣。此氣自調攝中來。此形下即精字也。蓋精爲天一所生。有形之祖。龍虎經曰。水能生萬物。聖人獨知之。經脈篇曰。人生先成精。精成而腦髓生。陰陽應象大論曰。精化爲氣。故先天之氣。氣化爲精。後天之氣。精化爲氣。精之與氣。本自互生。精氣既足。神自王矣。雖神由精氣而生。然所以統馭精氣而爲運用之主者。則又在吾心之神。三者合一。可以統馭精氣而爲運用之主者。則又在吾心之神。三者合一。可散氣散不聚。精逐氣亡。釋氏有戒慾者曰。斷陰。不如斷心。心爲功曹。若止功曹從者。都息邪心。不止斷陰。何益。此言深得制慾之要。亦足爲人。故能壽敝天地而無有終時。此其道生。敝盡也。門之一助也。合於道。故後天地而生。原天地之始。先天地而化。要天地之中。終形去而心在。氣散而神存。故能壽敝天地俱與道俱生也。古之時有至人者。淳德全道。人淳。麗其德。全體妙道。和於陰陽。



上古天真論

四  
卷二  
十六  
勿藥元詮

此之器託不傳

棄者失時時不  
回顧而放去

論曰春三月

萬物以榮

刑以儆志生

焦妻三

逆不順也

水侮之因爲

極物生以天  
也蕃音煩

後故萬物華

1

英成吏氣尋

德養三之道

奉收者少

欲入而陽拒  
寒熱往來而

重病  
畏水也

地氣以明

傳志安錄

人之道也

牧之道也



咸方切用

四氣調神論

制法論

八卷

咸方切用

刺法論

九勿藥元詮

此七編後

下津令無數

下子氣

故曰返本還

津液津液

卽低頭

聲齒須用外意精

猛以氣送入丹田中氣定又依前法爲之凡九開氣三嚥津而止然後以兩手擦摩兩腳心使湧泉之氣上徹頂門及膝下腰脊間皆令熱微次以兩手摩腰角耳項皆令極熱仍按腰脊間左右五六次極頭百餘梳而臥熟臥至明。又如李氏十六字訣云一吸便提氣氣歸臍一提便嚥水火相見注在十六字仙家名爲十六錠金丹一箇至簡之妙訣也無分在官不妨政事在俗不妨家務在士不妨本業只於六時中略得空閒及行住坐臥意一到處便可行之口中先須漱及三五次舌攪上腭仍以舌抵上腭滿口津生連津嚥下汨然有聲隨於鼻中吸清氣一口以意會及心口寂地直送至腹臍下一寸三分升出而海之中略存一存謂之一吸隨用下部輕輕如忍便狀以意力提起使氣歸臍遠及夾脊雙關腎門一路輕提上直至後頂上枕關透入泥丸頂內其升而上之亦不覺氣之上出謂之島吸清氣送入丹田稍存一存又自下部如前輕輕提上與臍相接而所謂氣氣歸臍壽與天齊矣凡嚥時口中有液愈妙無液亦要汨然有聲嚥之如一嚥一提或三五口或七或九或十二或二十四口要行即行要止即止只要不爲正事不使間斷方爲精進如有痼疾見効尤速久行之卻延年形體不變百疾不作自然不餓不渴安健勝常行之卻延年

成方切用

刺法論

十卷二六

感冒痞積逆滯不生癰疽瘡毒等疾耳聰目明心力強記宿疾俱瘳長生可望所謂造化吾手宇宙吾心功莫能述也按此三家之法若依孫氏則臥亦可書亦可依蘇氏則坐亦可夜亦可依李氏則閒亦可忙亦可此三說者惟李氏稍煩較難爲力然其中亦有可用者但不可拘泥耳故或用此或用彼取長舍短任意爲之貴得自然第無勉強則一身皆道何滯之有久而精之誠不止於病已也又觀之彭祖曰和氣導氣之道密室閉戶安牀暖席枕高二寸半正身臥瞑目閉氣以鴻毛著鼻上不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思如此則寒暑不能侵蜂蠆不能毒壽百六十歲鄰於真人夫豈虛語哉然總之金丹之術百數其要在神水華池玉女之術百數其要在還精採氣斯言得之矣此外有云轉轆轤運河車到玉關上泥丸者皆言提氣也有云進用武火出神文火者謂進欲其壯出欲其徐皆言呼吸也有云赤龍攪水混神水滿口勻者皆言津液也有想火入臍輪放火燒偏身者皆言陽氣欲其自下而升以溫元海三焦也再如或曰龍虎或曰鉛汞或曰坎離或曰夫婦或云導引或云其接師其宗旨無非此耳雖其名目極多而可以一言蔽之者則曰出入多而已醫道通仙術斯其爲最矣。此還精之法也

調息

調息一法貫徹三教大之可以入道小用亦可養生故

迎文垂教以目視鼻端自數出入息爲止觀初門莊子南華

經曰至人之息以踵王龍溪曰古之至人有息無睡故大易

隨卦曰君子以嚮晦入晏息晏息之法當向晦時耳無聞目

無見四體無動心無思慮如種火相似先天元氣元神停育

相抱真意綿綿老子曰綿綿若存開闔自然與虛空同體故能與虛

空同壽也世人之用一點靈光盡爲後天濁氣所掩是謂陽陷

於陰也。李東垣曰夜半收心靜坐片時此生發週身元氣

大要也。凡勞心勞力之人須隨時偷閒調息以保既耗之

元氣蓋氣根於息息調則氣調氣調則身中無不流通四達

而百脈安和神情清泰雖勞不苦人矣調息之法端緒靜

坐謝境澄心口目俱閉止於鼻中徐徐吸吸在我自然勿得

作意思爲著力太重反使本來不息之真室而不和。讀書

成方切用 調息 調息之法 士勿藥元

者必習養生法能習養生法不唯於身利更於心利舉其要

莫先於少睡少睡則神靈神靈則氣爽氣爽則神靈身心自然

安矣然少睡之工有六靜勿躁一也疎遠房室二也常

收此心於腔子中三也深夜勿寒勿暖四也行住坐臥不忘

九須加意調攝愛養自家精力精力不足則倦倦生厭厭生

躁躁生相乘則審脈辨證處方皆苟率而無誠意矣思欲救

死全生庸可期乎今之醫者鮮克不以奔競爲專務徒勞苦

而不自知

調息之法不拘時候隨便而坐平直其身縱任其體不倚不曲

解衣緩帶腰帶不寬則上務令周適口中舌攪數徧微微呵

出濁氣不得鼻中微微納之或三五徧或一二徧有津嚥下

叩齒數通舌抵上腭唇齒相着兩目垂簾令瞳眴然漸次調

息不喘不粗或數息出或數息入從一至十從十至百數至

數千攝心在數勿令散亂如心息相依雜念不生則止勿數任其自然名曰隨息與息俱出復與俱入隨之不已一旦自住不出不入忽覺此身從毛竅中八萬四千雲蒸雨散諸病自除諸障自滅坐久愈妙若欲起身須徐徐放手足勿得遽起能勤行之靜中光景種種奇特直可明心悟道靜能生慧不但卻病延年而已也息有四相呼吸有聲者風也守風則散不聲不滯而往來無形者氣也守氣則勞不聲不滯出入綿綿若存若亡神氣相依是息相也息調則心定真氣往來自能歸根命之蒂也

小週天 先要止念身心澄定面東腳坐平坐亦可前膝不呼吸和平用三昧印招無名指右掌加左掌上按於臍下叩齒三十六遍

成方切用

小週天

三勿藥元詮卷二十六

以集身神赤龍攪海內外三十六遍赤龍舌也內雙目隨舌轉運舌抵上腭靜心數息三百六十週天畢待神水滿漱津數遍用四字訣撮抵閉吸也撮提穀道舌抵上腭目閉上視鼻吸莫呼從任脈撮過穀道到尾閭以意運送徐徐上夾脊中關漸漸速些閉目上視鼻吸莫呼撞過玉枕頸後將目往前一忍直轉崑崙頂倒下鵲橋也分津送下重樓入離宮心至氣海坎宮略定一定復用前法連行三次口中之津分三次嚥下所謂天河水逆流也靜坐片時將手左右擦丹田一百八下連臍抱住放手時將衣被圍住臍輪勿令風入古云養得丹田暖暖熱此是神仙真妙訣次將大指背擦熱拭目十四遍去心肝火擦鼻三十六遍潤肺擦耳十四遍補腎

擦面十四遍脾健雙手掩耳鳴天鼓徐徐將手往上即朝天揖如是者三徐徐呵出濁氣四口收清氣雙手抱肩移筋換骨數遍擦玉枕關二十四下擦眼一百八下擦足心各一百八下

道經六字訣

呵呼咽噤吹嘻

每日自子至巳為六陽時

而東靜坐叩齒三十六通舌攪口中候水滿時漱鍊數遍分三口咽一人一身之水皆賴下華池之水甘淡以

意送至丹田微微撮口念呵字呵出心中濁氣念時不得有聲反損心氣即閉口鼻吸清氣以補心吸時亦不得聞吸聲

但呼出令短吸入令長如此六次再念呼字六遍以治脾再

成方切用

道經六字訣

金丹秘訣

三勿藥元詮卷二十六

念咽字六遍以治肺再念噤字六遍以治肝再念吹字六遍

以治腎再念嘻字六遍以治三焦客熱並如前法謂之三十六小週天也

詩曰春噤明目木扶肝至夏呼心火自閑秋咽定收金氣潤冬吹唯要坎中安三焦噤卻除煩

熱四季長呼脾化食切忌出聲聞兩耳其功尤勝保神丹

金丹秘訣曰一擦一兜左右換手九九之功真陽不走戌亥二

時陰旺陽衰之候一手兜外腎一手擦臍下田左右換手各

八十一半月精固久而彌佳凡大小便之時咬緊牙齒解

單方開亦最能固精

髮宜多梳面宜多擦目宜常運耳宜常彈將兩手心按兩耳以指彈腦名鳴天鼓

舌宜抵腭齒宜數叩津宜數嚥濁宜常呵清宜常吸背宜常

暖胸腹宜常護常摩穀道宜常撮肢節宜常搖手心足心宜常擦皮膚宜常乾沐浴即擦摩也大小便宜閉口勿言 夜寢語言大損元氣尤宜戒之

羅先生曰收拾一片真正精神揀擇一條直捷路徑安頓一處寬閒地步共好朋友涵泳優游忘年忘世俾吾心體段與天地為徒吾心意況共為魚活潑其形雖止七尺而其量實包太虛其齒雖近壯衰而其真不減童穉每讀一過頓開無限心胸勝服百劑清涼散也此下數條無非教人勿藥之意

養生者固宜節食尤宜節飲食傷人所易知飲傷人都不覺不特茶湯漿酒以及冰泉瓜果之傷謂之傷飲即服藥過多亦

### 成方切用

按摩導引諸法 羅先生論 養生宜節飲食 脾胃為養生之本

齒勿藥元詮 卷二十六

謂之傷飲其見證也輕則腹滿腸鳴為嘔為吐重則腹急如鼓為喘為呃甚則緊閉牙關涎流口角昏憤不省人事狀類

中風患此證者消滯皆是或未有識不得不為來者言之俗世

謂病時之人忌茶忌藥否則令人中滿深味之亦其有誤特  
謂茶之忌其所謂忌茶者非忌茶也忌茶湯也忌茶湯者非  
謂茶也忌湯藥也蓋病時之人中宮多滯若更過飲茶湯必致  
滯滯則以滯助滯鮮有不敗脾胃而戒中滿之候者孰謂恒  
言無補  
於世哉

脾胃者養生家第一要具也不可使之熟生物熱冷物輒硬物

凡草頭藥汁最能傷脾胃不可誤服胃氣虛者服之必  
死或或不止胃氣終難復更更有草類相似收採不真誤  
中藥人之毒於頃刻間而莫之  
救者矣歷有明驗言之慘人

凡胸腹中有痰有飲有積有痞或脹或痛或酸或嘈或吐或瀉

一二證時止時作經年不瘥者急須猛意以圖全愈毋俟他

日別病相加掣肘莫措然治之之法則灼艾先而藥石次蓋

灼艾之功遠踰草根木皮萬萬也雅陰血虧損者不可再用艾火傷陰灼艾後唯節

飲食為首務不可餐

素有淫熱之人飲食之間最宜清勝若厚味醞酒縱肆無節必

多痰火癰疽卒中之患須戒之凡毒病疳病酒病癰病初感

數病以淫熱為原滋補之藥乃助

人當臥病務須常存退步心心能退步則天寬地曠世情俗味

必不致過戀于心可計日而起矣不則今日當歸芍藥明日

甘草人參是以江河填漏卮雖多無益也先儒有言曰子臥

### 成方切用

按飲食過飽等證宜酌量 素有淫熱飲食宜清勝 臥病常存退步心

圭勿藥元詮 卷二十六

病時常於胸前多書死字每書數過頓覺此心寂然不動萬

念俱灰四大幾非我有又何病之足慮哉雖然此唯可與達

者言也鄒子元由翰林補外十餘年矣不得賜還嘗作條無

謂無異平日或曰真空寺老僧不用符藥能治心疾往叩之

老僧曰貴恙起於煩惱生於妄想夫妄想之來其幾有三或

思慮數十年前榮辱恩智悲歡離合及種種間情此是過去

業想也或事到跟前可以類應若乃畏首畏尾三番四復猶

豫不決此是現在妄想也或期日後富貴榮華皆如所願或

期功成名遂告老歸田或期子孫登榮以繼香與夫不可

必或不可必得之事此是未來妄想也三者妄想忽然而生

忽然而滅滅神家謂之幻心能照見其妄而斬斷念頭禪家謂

之靜心故曰不患念起單患覺起此心若同太虛煩惱何處

安睡又曰貴恙亦原於不妄妄起於妄妄起於妄妄起於妄

家謂之外感之欲夜深靜思思得清客禪家謂之內生之欲

以上安於心至若思慮文字忘其寢食禪家謂之理障經綸

職業不告勉勵禪家謂之事障二者之障雖非人欲亦損性

患若能遣之則心火不炎上矣可以下交於腎故曰虛不相  
緣振無所偶返流全一六慾不行又曰苦海無邊回頭是岸  
子元如其言乃獨處一室掃  
空萬緣靜坐月餘其病如失

病中但可安分調攝不可偏信師巫殺害生命不惟損貲造業  
更使心志狐疑溺情鬼窟而切身珍愛之圖反置勿問愚孰  
甚焉

凡有問疾來者勿得與之相接一人相接勢必人人相接多費  
語言以耗神氣心所契者又因契而忘倦心所憎者又以憎  
而生嗔甚或坐盈一室聲起談風縱不耐煩又不敢直辭以  
去嗔嗔病人力克幾何而堪若此恐不終朝而病已增劇矣  
智者於此休將性命徇人情

成方切用

病中不可偏信師巫問疾來者勿得與之相接  
病加於小愈 素不服藥不為無見

大勿藥元詮  
卷一二十六

病加於小愈者因小愈而放其心也天下事處逆者恒多易處  
順者反多難病當未愈而求愈欲不得逞志不得肆凡語言  
動止饑飽寒溫以及情性喜怒無不小心翼翼自然逆可為  
順而愈矣愈則此心不覺自慰保護漸疎恣口吻也爽寒溫  
也多語言也費營慮也近房室也任情性而煩惱也廣應酬  
而不自知勞且傷也其病豈有不加者乎因憶孟夫子生於  
憂患死於安樂之說信不可不書紳而銘座右也

有人素不服藥者不為無見但須知得病從何來當從何去便  
是藥爾如饑則食食即藥也不饑則不食不食即藥也渴則  
飲飲即藥也不渴則不飲不飲即藥也惡風知傷風避風便

是藥惡酒知傷酒戒酒便是藥逸可治勞靜可治躁處陰以  
卻暑就燠以勝寒衰於精者寡以慾耗於氣者守以默怯於  
神者絕以思無非對病藥也人惟不自知爾

長子月

素不服藥不為無見

大勿藥元詮



2034448

8  
Z121.5  
1.6

成方切用十四卷

浙江巡撫  
採進本

國朝吳儀洛撰儀洛字遵程海鹽人此書爲其醫學  
述之第四種取古今成方一千三百餘首本經按  
證加以論斷卷首載內經一十二方第一卷至第  
十二卷每卷各有上下分治氣理血補養瀉固表  
散漏吐攻下消導和解表裏祛風祛寒消暑燥濕  
潤燥瀉火除痰殺蟲經帶胎產嬰孩癰瘍眼目救  
急凡二十四門卷末載勿藥元詮七十四條大旨  
謂古方不宜今用故所錄皆切於時用之方凡例  
於汪桓醫方集解頗有微詞然桓書淺畧亦可無  
庸掊擊也



21101000442219